DEUTSCHE MEDICINISCHE WOCHENSCHRIFT.

Mit Berücksichtigung des deutschen Medicinalwesens nach amtlichen Mittheilungen, der öffentlichen Gesundheitspflege und der Interessen des ärztlichen Standes.

Begründet von Dr. Paul Börner.

Neunzehnter Jahrgang.

Redacteur Geh. Sanitäts-Rath Dr. S. Guttman in Berlin W.

Verlag von Georg Thieme, Leipzig-Berlin.

I. Ueber Endocarditis gonorrhoeica¹⁾.

Von Prof. Dr. E. Leyden.

Ich möchte Ihnen kurze Mittheilung von einem Befunde machen, von dem ich hoffen darf, dass er Ihr Interesse erregen wird. Derselbe knüpft sich an die Demonstration des hier vor mir liegenden Herzens, welches den Zustand einer ulcerativen Endocarditis darbietet; Sie sehen die äussere Aortenklappe zum Theil ulcerativ zerstört und mit grossen fibrinösen Vegetationen bedeckt; entsprechend dieser Stelle liegen auf der Vorhofsseite des inneren Mitralsipfels grosse blutig-fibrinöse Auflagerungen, welche noch jetzt, nachdem das Herz zwölf Tage in Alkohol gelegen, die Grösse einer halben Haselnuss zeigen: am frischen Präparat waren sie doppelt so gross. Beide Auflagerungen, der Aorten- und der Mitralklappe, communiciren mit einander durch ein Loch in der Scheidewand, welche an dieser Stelle durch die Ulceration zerstört wurde. Die Aortenklappen sind durch Ulceration insufficient geworden (es bestanden im Leben die deutlichen Zeichen dieser Insufficienz). Die linke Herzkammer ist dilatirt, die Wandung jetzt ziemlich dick; am frischen Präparat war die Herzmuskulatur schlaff, blass und liess (makroskopisch und mikroskopisch) ziemlich reichliche, zerstreute Flecken von fettiger Degeneration der Muskelfasern entdecken.

Das Herz zeigt also eine ulcerative (polypöse, maligne) Endocarditis, von welcher wir durch die neueren bacteriologischen Untersuchungen wissen, dass sie durch Mikroparasiten bedingt wird, welche sich in den Fibringerinnseln der ulcerirten Klappen entwickeln. Von solchen pathogenen Bakterien wurde bisher in den Auflagerungen der ulcerösen Endocarditis am häufigsten der Streptococcus und Staphylococcus pyogenes gefunden. Auch einige andere Bakterienformen sind zuweilen in solchen Gerinnseln angetroffen worden. Der vorliegende Fall ist dadurch ausgezeichnet — und dies ist der Grund, weshalb ich mir gestattete, ihn heute noch vorzulegen —, dass es mir gelungen ist, in den endocarditischen Auflagerungen den Gonococcus (Neisser) nachzuweisen, und zwar allein, d. h. unvermischt mit Strepto- oder Staphylococcen. Dieser Befund verdient einiges Interesse, sofern er die seit lange schwebende Frage der gonorrhoeischen Endocarditis zu entscheiden imstande ist.

Der Krankheitsfall selbst ist folgender:

Am 6. Mai abends wurde der 22-jährige Schneider Carl Laussmann von der chirurgischen Abtheilung auf die erste medicinische Klinik verlegt. Der chirurgischen Abtheilung war er Anfang April wegen Schmerzhaftigkeit und Schwellung am rechten Knie und in beiden Fussgelenken zugegangen. Man constatirte dort gleichzeitig chronische Gonorrhoe und Epididymitis. Das anfänglich geringe Fieber steigerte sich. Patient klagte über Stiche in der Herzgegend, es wurde eine Herzaffection constatirt, und Patient infolge dessen auf die erste medicinische Klinik verlegt.

Status praesens am 6. Mai: Patient ist ein mässig kräftig gebauter junger Mann von schlaffer Musculatur und blasser Gesichtsfarbe. Er liegt im Bett, klagt über Mattigkeit und Beklemmungen auf der Brust. Temperatur 37,4, Puls 126, abends Temperatur 38,9, Puls 126. Das linke Fussgelenk ist noch etwas geschwollen, aber frei beweglich, ebenso das rechte Kniegelenk. Athmung ruhig. Patient klagt wenig. Die Unter-

suchung des Herzens ergibt ziemlich hohen Spitzenstoss, noch innerhalb der linken Mamillarlinie. Man hört ein systolisches und diastolisches Geräusch; der zweite Ton über der Aorta fehlt. Sichtbarer Capillarpuls. Tönen der Carotiden. (Insufficienz der Aortenklappen, vielleicht auch Insufficienz der Mitrals.) Urin 600/1027, frei von Eiweiss. Nachmittags 4 Uhr Frösteln.

7. Mai. Morgentemperatur 38,3, Puls 104, Respiration 24; Abendtemperatur 39,1.

8. Mai. Morgentemperatur 37,4, Puls 100, Respiration 20; Abendtemperatur 38,7.

9. Mai. Morgentemperatur 38,4, Puls 88, Respiration 16; Abendtemperatur (5 Uhr) 39,6 (leichter Schüttelfrost). Milz ist heute palpabel und schmerzhaft. Gestern Abend bekam Patient Leibschmerzen. Urin frei von Albumen. Oefters Husten. Neigung zu Durchfällen.

10. Mai. Morgentemperatur 37,5, Puls 84, Respiration 16; Abendtemperatur 39,6 (kein Schüttelfrost).

11. Mai. Morgentemperatur 37,4, Puls 112; 9 Uhr 40,2 (starker Schüttelfrost).

12. Mai. Morgentemperatur 37,6, Puls 96; Abendtemperatur 38,0 (kein Schüttelfrost). Starker Schmerz. Vormittags (nach der Bouillon) Erbrechen. Abends 9 Uhr 39,8 (Schüttelfrost), Puls 112.

13. Mai. 9 Uhr Schüttelfrost; Erbrechen.

15. Mai. Morgentemperatur 38,4, Puls 112. Die Nacht war schlecht. Morgens nochmals Erbrechen. Patient sieht blass und verfallen aus. Mehrmals Erbrechen. Heute kein Schüttelfrost. Urin 200/1020. Spuren von Albumen. Die Herzdämpfung ist gegen früher nicht vergrössert; Spitzenstoss immer noch innerhalb der linken Mamillarlinie.

16. Mai. Morgentemperatur 37,5, Puls 116; Abendtemperatur 39,0. Heute wiederholtes Erbrechen. Kein Schüttelfrost. Verfall der Kräfte. Im Urin reichlich Albumen. Oedema pedum. Das Sediment des Urins enthält zahlreiche Cylinder, Blutkörperchen, Epithelien und lymphoide Zellen (acute infectiöse Nephritis).

18. Mai. Wiederholtes Erbrechen — so dass von der Digitalis

Temperaturcurve.

(und Strophanthus) Abstand genommen werden muss. Grosse Schwäche. Abends Nährklystiere und Opium.

Unter fortschreitendem Verfall tritt am 21. Mai der Exitus letalis ein. — Die Autopsie betreffend, so habe ich eben den Befund am Herzen demonstriert. Ich habe noch hinzuzufügen, dass sich in der vergrösserten Milz ein keilförmiger Infarct von etwa Haselnussgrösse fand, welcher bereits in Erweichung begriffen war. (Sonst nirgends Embolien.) Die Grenze war scharf demarkirt, hyperämisch, der Infarct selbst bestand aus grossen Zellen, das Stützgewebe begann zu zerschmelzen. Zerstreut lagen ziemlich reichliche, mässig grosse, sehr zierliche Hämatoidinkrystalle. — Die bacteriologische Untersuchung ergab an der Milz keine sicheren positiven Resultate. — Die Nieren waren hyperämisch, geschwellt, mikroskopisch mit kleinen, diffus zerstreuten Entzündungsherden durchsetzt, keine Embolien. Der Abstrich von einem frischen Schnitt der Niere ergab einige

¹⁾ Vortrag mit Demonstration im Verein für innere Medicin in Berlin.

runde Diplococcen, doch ohne entscheidenden Befund. Am mikroskopischen, gefärbten Schnittpräparat ist nichts von Bakterien zu constatiren.

Der Herzmuskel zeigt ganz ähnlich wie in meinem ersten Falle vom Jahre 1882 unzweideutige Zeichen von Myocarditis; zum Theil waren es kleine zerstreute Herde von fettiger Degeneration der Muskelfasern, zum Theil kleine zellreiche Herde, in denen die Muskulatur untergegangen war. Auch allgemein erschienen die Zwischenräume zwischen den Muskeln kernreich, die Venen stark gefüllt, und die kleinsten Arterien zum Theil mit grossen Lymphocyten so vollgestopft, dass sie verschlossen zu sein schienen. Bakterien wurden im Muskelfleisch nicht gefunden. — Dieser Befund am Myocardium entspricht ganz wie in dem ersten Falle einer infectiösen Myocarditis und hat, wie Martin (s. weiter unten) hervorhob, grosse Aehnlichkeit mit dem von mir geschilderten Befund einer diphtheritischen Myocarditis.

Die Hauptsache, die bacteriologische Untersuchung der Klappen-gerinnel, soll später eingehend gegeben werden.

Epikritisch sei zu dem Krankheitsbilde bemerkt, dass es den Charakter der malignen Endocarditis in evidenten Weise an sich trug, so dass über die Diagnose kein Zweifel bestand.

Als charakteristische Symptome hebe ich hervor:

1. den physikalischen Befund am Herzen (Insufficiencia Aortae et Mitralis),
2. das unregelmässige Fieber mit wiederholten Schüttelfrösten,
3. das wiederholte Erbrechen,
4. das Auftreten der Nephritis,
5. den malignen Verlauf mit schnellem Verfall der Kräfte.

Von noch grösserem Interesse war die Aetiologie dieser Endocarditis; es musste die Frage aufgeworfen werden, ob und wie dieselbe mit der noch fortbestehenden chronischen Gonorrhoe im Zusammenhang stand.

Der eben mitgetheilte Krankheitsfall ist ausserordentlich ähnlich einem anderen Falle von maligner Endocarditis, welchen ich im Jahre 1882 mitgeteilt habe.¹⁾ Sowohl die Symptome, wie der Krankheitsverlauf und der Befund an der Leiche sind ganz analog, auch dort wurde die Gonorrhoe als ätiologisches Moment angenommen. —

Das Vorkommen von Endocarditis nach Gonorrhoe ist auch sonst schon mehrfach behauptet worden. Vor kurzem hat Dr. W. His in einem bemerkenswerthen Aufsatz: Ueber Herzerkrankheiten bei Gonorrhoe diesen Gegenstand im Anschluss an eine eigene Beobachtung neu behandelt (Berl. klin. Wochenschrift 1892 No. 40 und Arbeiten der med. Klinik zu Leipzig 1893). Die Frage selbst ist aber nicht neu, obgleich sie in Deutschland nicht viel Beachtung gefunden hat. Bei näherem Studium der Litteratur ist man überrascht, eine beträchtliche Anzahl wichtiger Arbeiten über diesen Gegenstand zu finden.

Bereits Trousseau und Grisolle haben sich dahin geäussert, dass man diese Complication (Endocarditis) auch für die Gonorrhoe und den gonorrhoeischen Gelenkrheumatismus ebenso zulassen müsse, wie für den classischen Gelenkrheumatismus. In den sechziger Jahren wurden von verschiedenen Seiten Beobachtungen mitgeteilt, welche neben dem Gelenkrheumatismus des Trippers auch Endocarditis, freilich meist nur durch das Auftreten eines Geräusches am Herzen, constatirten, öfters ohne ernstere Symptome bald in Heilung übergehend.

Um diese Zeit gewann die acute ulceröse Endocarditis ein grösseres Interesse durch die genauen pathologisch-anatomischen Untersuchungen, besonders R. Virchow's. Auch das klinische Studium blieb nicht zurück (L. Traube). Das Interesse steigerte sich noch mit der Entwicklung der Bacteriologie, als der Nachweis geführt wurde, dass in den fibrinösen Auflagerungen der Herzklappen Mikroorganismen eingelagert sind. Die erste Beobachtung der Art (Nachweis der Mikrococcen bei Endocarditis ulcerosa) scheint, soweit ich die Litteratur durchstudiren konnte, von Hjelma Heiberg 1872 herzuführen; dieser Befund wurde zunächst von Virchow, v. Recklinghausen, E. Klebs, Eberth, seither vielfach bestätigt. Die Form der vorgefundenen Mikroorganismen war in der überwiegenden Zahl der Fälle Streptococcen und Staphylococcen, daher die Krankheit auch die Bezeichnung der septischen Endocarditis bekam. Später sind auch noch andere Formen von Mikrococcen in endocarditischen Auflagerungen gefunden, insbesondere der Pneumococcus von Netter 1886, Weichselbaum 1888, H. Meyer 1888.

Der Zusammenhang der Gonorrhoe mit der Endocarditis bekommt nun ein neues Interesse.

Diese Frage wird in der Litteratur, und zwar besonders in der französischen, mit grossem Eifer discutirt, und die Lösung derselben wird zu einem wichtigen Problem zugespitzt.

¹⁾ Vergl. meine Abhandlung: Ueber intermittirendes Fieber und Endocarditis. Zeitschr. f. klin. Medicin 1882 Bd. IV, p. 326–333. Derselbe Fall aus meiner Klinik ist bereits in die Dissertation von Schedler, Zur Casuistik der Herzaffectationen bei Tripper, Berlin 1880, aufgenommen.

Es ist, wie ich glaube, nicht ohne Interesse und für die Bedeutung des vorliegenden Gegenstandes wichtig, die hauptsächlichsten Arbeiten der einschlägigen Litteratur eine kurze Revue passiren zu lassen.

Als eine der ersten Arbeiten über diesen Gegenstand ist die Abhandlung von Dr. J. Marty¹⁾ zu nennen. Der Autor citirt bereits mehrere frühere Beobachtungen selbst schwer verlaufener Fälle, so z. B. eine Beobachtung von Lorain aus dem Jahre 1866, Insufficienz der Mitralis, welche letal verlief. Der Autor fügt einen Fall eigener Beobachtung hinzu und schliesst seine Abhandlung mit folgenden Sätzen:

1. Die Gonorrhoe kann sich mit Entzündung aller serösen Häute compliciren.
2. Die Complicationen am Herzen sind sehr selten, am häufigsten scheint das Ostium aorticum befallen zu werden.
3. Die specifische Endocarditis kann dieselben Symptome darbieten und dieselben Gefahren wie die einfache Endocarditis.
4. Das Endocardium wird ebenso häufig ergriffen als das Pericardium. —

Erwähnenswerth ist auch die These von Emile Morel: Des complications cardiaques de la blennorrhagie. Paris 1878. Die den Tripperprocess begleitende Endocarditis wird im ganzen als ein gutartiger Process bezeichnet.

In Deutschland ist eine der ersten Arbeiten über diesen Gegenstand die aus meiner Klinik hervorgegangene Inauguraldissertation von Dr. P. Schedler: Zur Casuistik der Herzaffectationen bei Tripper. Berlin 1880. Es handelte sich um einen tödtlichen Fall von Endocarditis ulcerosa nach Tripper (Gelenkaffection vorhergehend), denselben, den ich zwei Jahre später selbst ausführlicher publicirt habe. Zur Erklärung des Zusammenhanges der Endocarditis mit Tripper stellt Schedler, der die frühere Litteratur sorgfältig zusammengestellt und das ganze Problem sehr gründlich erfasst hat, zwei Theorien auf. Nach der einen dürften Mikroorganismen die Vermittler der beiden Krankheitsprocesse sein, nach der zweiten wären die Entzündungen der Synovial- und serösen Häute als Angioneurosen oder vasomotorische Störungen anzusehen.

Der Zeit nach folgt nun wohl meine eigene Beobachtung aus dem Jahre 1882 in der Abhandlung: Ueber intermittirendes Fieber und Endocarditis (Zeitschr. f. klin. Med. IV). Der schon in der Schedler'schen Dissertation kurz erwähnte, tödtlich verlaufene Fall betraf einen 22jährigen Kürschner, welcher vorher Tripper und Tripperrheumatismus überstanden hatte. Die bei Lebzeiten gestellte Diagnose der ulcerativen Endocarditis Aortae bestätigte sich, die Autopsie wies endocarditische Auflagerungen nach, eine bacteriologische Untersuchung wurde indessen aus äusseren Gründen nicht gemacht. Dieser Fall ist in der Litteratur unseres Gegenstandes mehrfach citirt und gewürdigt. Ich kann indessen, ohne irgend jemand zu nahe zu treten, nicht unterlassen, hinzuzufügen, dass dies keineswegs der erste Fall dieser Art war, den ich gesehen habe. Schon als ich Assistent der Traube'schen Klinik war, wurde, wie ich mich genau entsinne, ein Fall von Endocarditis mit Hirnembolie beobachtet, den Traube auf einen vorangegangenen Tripper bezog (ob dieser Fall publicirt ist, weiss ich nicht), und ich selbst habe einen analogen Fall in Strassburg beobachtet und klinisch vorgestellt, die Autopsie ergab ulcerative Endocarditis mit fibrinösen Auflagerungen.

Erwähnt seien einige Publicationen von Endocarditis gonorrhoeica ohne Autopsie, d. h. mit günstigem Ausgang. Einen solchen theilt M. Litten in seiner Arbeit über septische Processe (Zeitschr. f. klin. Med. 1890, II) mit.

Auch R. v. Velden hat in der Münchener med. Wochenschr. 1887 einige solche Fälle publicirt.

Eine besondere Beachtung verdient die Abhandlung von Herrn Dr. H. Martin in Vevey: Études sur les métastases suppuratives d'origine blennorrhagique. Revue médicale de la Suisse Romane 1882 No. 6 und 7. Sie ist fast gleichzeitig mit meiner Publication erschienen, mein Fall ist noch im Anschluss mitgeteilt. Diese ausgezeichnete Arbeit behandelt das Kapitel der Trippermetastasen in grossem Umfange, die Endocarditis findet vollständige Berücksichtigung und Würdigung. (Fälle von Meuriot, Desnos, Lallemond, Leyden). Der selbstbeobachtete Fall von Herrn Martin giebt ein ausgezeichnetes Beispiel der mannigfachsten Trippermetastasen, unter denen sich auch polypöse Excrescenzen auf den Klappen vorfinden. Die bacteriologische Untersuchung ergab in den Auflagerungen zweierlei Formen (die eine schien der Sarcineform zu entsprechen, die andere erschien körnig (punktirt?). Die klinische Beobachtung dieses Falles zeigt, dass wir es mit einer allgemeinen Infection zu thun haben, wofür der plötzliche Beginn der Krankheit nach einigen Tagen Unwohlseins spricht, ebenso die typischen Fiebercurven, die

¹⁾ De l'endocardite blennorrhagique. Arch. générale de Méd. 1876, December, p. 660–676.

schweren Allgemeinsymptome und die verschiedenen successiven Localaffectionen. Die Autopsie enthüllte die tiefen Störungen von Seiten des Urogenitalapparates und eine Reihe von Alterationen (Thrombosen, Embolien, Ecchymosen, Abscessen), welche eine allgemeine Infection mit Metastasen nachwiesen, die secundär von den Läsionen des Genitalapparates abzuleiten ist. Man fand Entzündung der Urethra, und Prostatitis; die Samenblasen, das Vas deferens und die Blase ergriffen (submucöse Abscesse in der Muscularis). Eitrige Infiltration im periprostatischen Zellgewebe, Lungenabscesse, Gangrän, eitrige Pleuritis. Am Herzen Endocarditis und Thromben mit Mikrococcen; im Myocard, in der Milz und den Nieren Abscesse mit Mikrococcen. Endlich Parotitis, Muskelabscesse, Gelenkeiterungen.

Es fragt sich nunmehr, fährt Dr. Martin fort, welcher Natur sind die infectiösen Massen? Man konnte beschuldigen a) das blennorrhagische Virus oder b) eine secundäre Pyämie.

Im ersten Falle wäre das Virus längere Zeit im Prostataabscesse liegen geblieben, ohne dass es sich im ganzen Organismus ausbreitete.

Im zweiten Falle (Pyämie) wäre der Eitercoccus mechanisch in die kranke Partie eingedrungen, ähnlich wie bei schwerem Typhus oder bei Wunden Pyämie hinzutritt.

Diese Frage ist noch nicht zu entscheiden, die gefundenen Coccen haben allerdings stellenweise eine eigenthümliche Form.

Fortfahrend in der Aufzählung der Litteratur nenne ich noch folgende Beobachtungen: Lancereaux 1886, Septische Endocarditis mit Staphylococcen. Dérignac, Endocardite blennorrhagique. Gaz. méd. de Paris 1884, No. 7. Ein Fall von Endocarditis nach Tripper: 25jähriger Maurer, schwerer Tripper, Entzündung des Schultergelenks, schliesslich Endocarditis mitralis mit Hypertrophie des linken Ventrikels. Ferner A. Genzinsky: Herzerkrankungen im Verlauf von Blennorrhoe. Przegląd lekarski 1889, No. 11. Zusammenstellung von 31 Fällen, wo im Verlauf der Blennorrhoe der Harnröhre Complicationen von Seiten der Circulationsorgane aufgetreten sind, und zwar:

1. Sowohl Peri- wie Endocarditis.
2. Mit oder ohne vorhergehenden Gelenkrheumatismus.
3. Verlauf, öfters wie bei Endocarditis ulcerosa, führt zu Herzfehlern.

Betreffs der Genese sind zwei Anschauungen berechtigt:

- a) Unmittelbare Folge der Gonococcen (bereits Nachweis in Gelenkflüssigkeiten).
- b) Secundäre Erscheinungen (durch Eindringen von pyogenen Organismen).

In der neuesten Monographie von Dr. Abel Souplet: La blennorrhagie maladie générale, Paris 1893, p. 26, werden die Trippermetastasen ebenfalls sehr eingehend kritisch behandelt. Wie bei der Pericarditis, so seien auch alle bisher publicirten Fälle von Endocarditis nicht beweisend.

Eine Reihe von Autoren betrachten die Herzsymptome als eine Pyämie (Howard), heute glauben wir mit Dérignac und Moussons und Lion, dass es primitive Complicationen der Blennorrhagie giebt, welche zweifellos von der Wirkung des Gonococcus ausgehen.

Träger (Wiener med. Presse 1880, No. 48) sagt: Die Endocarditis der Blennorrhoe ist eine seltene Affection, welche sich zum Theil als Complication einer den Rheumatismus begleitenden Blennorrhagie zeigt, theils, aber seltener, als direkte Manifestation der Blennorrhagie erscheint. Sie tritt in zwei Formen auf, a) als die schwere Form, Endocarditis ulcerosa, b) als eine weniger heftige Form, welche zur Chronicität neigt.

Zur ersteren gehören die Fälle von Leyden und His. Die berühmte Autopsie von Weichselbaum, welcher den Streptococcus in den Vegetationen fand, lässt glauben, dass diese Fälle eine secundäre Infection darstellen. Die Sache ist noch unentschieden.

Aus der vorstehend gegebenen Litteraturübersicht geht hervor:

1. Dass der Zusammenhang von Endocarditis und Gonorrhoe durch zahlreiche Beobachtungen wahrscheinlich gemacht worden ist.
2. Dass ein Theil dieser Fälle unter chronischem Verlauf glücklich, zum Theil in Heilung verlief.
3. Dass ein anderer Theil der Fälle einen bösartigen Verlauf mit dem Charakter der malignen Endocarditis zeigte und letal endete.

(Am häufigsten waren die Aortenklappen, seltener die Mitralklappe befallen. Meist, aber nicht constant, war gonorrhoeischer Gelenkrheumatismus der Endocarditis vorausgegangen. Alle Fälle betrafen männliche Individuen.)

Für die schweren Fälle von ulcerativer Endocarditis war es nun eine ebenso wichtige wie interessante Frage, ob sich auch bei der gonorrhoeischen Endocarditis Mikroorganismen auf den Klappen nachweisen lassen und welcher Natur dieselben waren.

Die obige Uebersicht der Litteratur ergibt, dass mehrmals bacteriologische Untersuchungen gemacht worden sind, aber die Resultate sind nicht entscheidend, das Problem ist nicht gelöst. In zwei Fällen ergab die Untersuchung Streptococcen auf den Klappen, meist waren die Befunde unbestimmt, und die Schlussbetrachtungen der Autoren schwebten noch in der Luft. Die einen hielten es für wahrscheinlicher, dass die bacteritische Endocarditis durch complicirende Streptococcen erzeugt sei, während andere die Möglichkeit einer direkten Wirkung des Gonococcus festhielten.

Die Lösung dieser Frage war erst mit den weiteren Fortschritten möglich, welche die Kenntniss von der künstlichen Reinzüchtung des Gonococcus in der allerneuesten Zeit gewonnen hat.

Wie bekannt, hat Neisser im Jahre 1879 im Eiter von Gonorrhoe eigenthümliche Mikrococcen entdeckt, welche er als Erreger der Gonorrhoe betrachtet und als Gonococcen bezeichnet. Diese Beobachtung wurde alsbald mehrfach bestätigt. Als charakteristisch wurde anerkannt die eigenthümliche Semelform und die Lagerung der Parasiten innerhalb der Eiterzellen. Diese mit Parasiten gefüllten Zellen wurden zunächst nur in dem Harnröhreneiter gefunden und daraus der Schluss gezogen, dass der Gonococcus nur in dem mit Cylinderepithel ausgestatteten Theil der Schleimhaut gedeihe. Erst nach und nach gelang der Nachweis des Gonococcus in der Blase bei Cystitis gon., im Uterus bei Endometritis, und auch in gonorrhoeischen Nierenabscessen, endlich wurden sie auch in perimetritischen Abscessen (Welder) und im Eiter eines abscedirten Tripperbubo (M. Wolff) gefunden.

Auch in dem stark eitrig gefärbten Erguss in's Knie bei einer gonorrhoeischen Kniegelenkentzündung fanden Petrone und Kammerer Gonococcen, letzterer allerdings nur spärlich und in kleinen Häufchen von höchstens vier Individuen.

Sehr wesentlich ist die Kenntniss des Gonococcus gefördert worden durch zwei Arbeiten: Dr. E. Bumm, Der Mikroorganismus der gonorrhoeischen Schleimhauterkrankungen (Gonococcus Neisser), Wiesbaden 1885, und Dr. E. Wertheim, Die ascendirende Gonorrhoe beim Weibe, Leipzig 1892.

Bumm gelang zuerst die Reinzüchtung auf Blutserum, wodurch die Erkennung und das Studium der Gonococcen sehr gefördert wurde. Letzterer (Wertheim) verbesserte die Züchtungsmethode (ich zeige Ihnen hier eine Cultur, welche ich Herrn Dr. Gebhardt, Assistenzarzt des Geh. Rath Olshausen, verdanke) und führte den Nachweis, dass das Vorkommen des Gonococcus keineswegs auf die mit Cylinderepithel bedeckten Schleimhautpartien beschränkt ist. Er führte ferner den wichtigen Nachweis, dass auch Tubenerkrankungen und selbst Erkrankungen des Peritoneums (beim Weibe) durch Gonococcus bedingt werden können, und eröffnete hiermit einen tieferen Einblick in diejenigen wichtigen Processe, welche er als die ascendirende Gonorrhoe beim Weibe bezeichnet. Auch Dr. Steinschneider (Franzensbad) hat (nach einer noch verbesserten Methode) Reinculturen des Gonococcus darstellen können (Berl. klin. Wochenschrift 1893, No. 29).

Was die Erkennung des Gonococcus betrifft, so blieb die von Neisser angegebene (Semmel-) Form sowie die intercelluläre Lage charakteristisch. Indessen in den Züchtungen und in Experimenten entwickelte sich der Gonococcus auch frei in Zoogloeaform, wie es die Zeichnung p. 47 (Wertheim) erkennen lässt. Als wichtiges Merkmal der Diagnose kam die schon von Bumm bemerkte Thatsache hinzu, dass sich der Gonococcus bei der Gram'schen Methode entfärbt, ein Umstand, welcher begreiflicherweise lange Zeit dem Auffinden des Gonococcus in Exsudaten hinderlich gewesen ist.

Durch diese bedeutsamen Arbeiten war der Gonococcus in Reincultur gewonnen, seine charakteristischen bacteriellen Eigenschaften besser erkannt, und seine Bedeutung für die aufsteigenden Processe (bei Weibern) in überraschender Weise beleuchtet. — Weniger Licht verbreiteten die Arbeiten über eine andere Reihe von Krankheiten, welche dem Tripper zugeschrieben werden, den sogenannten Trippermetastasen.

Als solche wurden seit lange bezeichnet, die gonorrhoeische Gelenkaffection und von noch grösserem Interesse kamen hinzu — die spinalen Affectionen und die Endocarditis.

Bei Gelegenheit einer Arbeit über gonorrhoeische Myelitis, die ich vor zwei Jahren publicirte (Zeitschr. f. klin. Med. XXI, p. 607) bin ich in meiner Auseinandersetzung der möglichen Entstehungsweise der Trippermetastasen näher getreten. Ich deducirte, dass die Möglichkeit des Eindringens einer mit lebenden Gonococcen gefüllten Zelle in die Circulation und damit eine direkte Gonococcenmetastase leicht begreiflich sei, dass aber bisher keine entschiedenen Thatsachen hierfür beigebracht werden könnten. Daher müsse man zwei andere Möglichkeiten festhalten: a) die Entstehung der Metastasen durch Toxine, ähnlich wie in den Nachkrankheiten vieler Infectiouskrankheiten (Nephritis infectiosa, Neuritis multiplex etc.)

oder b) durch eine Complication (Symbiose) mit Eitercoccen (Strepto- und Staphylococcen). Eine Entscheidung konnte ich nicht treffen, da die Untersuchung des Rückenmarks zwar submeningeale Zellanhäufungen, aber nichts von Coccen ergeben hatte.

Bezüglich der Endocarditis neigte ich mich, wie wohl bisher die meisten Autoren, der Ansicht zu, dass dieselbe einer Combination der Gonorrhoe mit Eitercoccen ihre Entstehung verdanke und vermuthlich mit Entwicklung dieser Strepto- und Staphylococcen auf dem Endocardium einhergehe.

Der eben mitgetheilte Fall von Endocarditis gonorrhoeica, von dem ich Ihnen die Präparate vorgelegt habe, bot eine Gelegenheit, dem interessanten, bisher ungelösten Problem näher zu treten, und ich muss gestehen, dass ich selbst durch den Befund der Gonococcen überrascht wurde.

Die Untersuchung geschah in folgender Weise. Bei Lebzeiten wurde das Blut (aus der Vene entnommen) bacteriologisch untersucht — ohne Erfolg. P. M. wurde aus dem linken Ventrikel (vor dessen Eröffnung — mittels der Pravaz'schen Spritze) Blut herausgezogen und Culturen angelegt. Es entwickelte sich nur ein indifferent (oidiumartiger) Pilz, weder Strepto- noch Diplococcen. Dieser Befund war mir insofern auffällig, als es sonst bei schweren septischen Processen fast immer gelingt, die Bacterien im Blut zu finden und zu züchten, ebenso bei septischer Endocarditis.

Die weitere Untersuchung der fibrinösen Auflagerung auf der Aortenklappe und Mitralklappe hat Herr Dr. med. M. Michaelis in folgender Weise ausgeführt.

Bacteriologische Untersuchung von Dr. Michaelis.

Das den Auflagerungen an der Klappe entnommene Stück wurde erst in 80%igem, dann in 96%igem Alkohol gehärtet, in Celluloidin eingebettet und mit dem Mikrotom geschnitten. Die Schnitte (in 70%igem Alkohol aufbewahrt, dieser jeden zweiten Tag gewechselt) mit Essigsäure behandelt, zeigten das Vorhandensein von Pilzrasen an den Rändern.

I. Es wurden nun zuerst Präparate nach der gewöhnlichen Gram'schen Methode hergestellt mit nachfolgender Picrocarminfärbung.

In diesen Präparaten wurden trotz sorgfältigster Durchmusterung keine Coccen gefunden.

Ein Gleiches war bei den nach Gram hergestellten Präparaten ohne folgende Nachfärbung der Fall.

II. Es wurden die Schnitte mit concentrirtem wässrigem Methylenblau resp. Fuchsin oder Löffler'schen Lösungen bis 2 Stunden lang gefärbt, in 96%igem Alkohol ausgewaschen und dann nach Behandlung mit absolutem Alkohol und Lavendelöl in Canada eingeschlossen; die Kerne zeigten sich in diesen Präparaten noch gut gefärbt, Coccen wurden nicht gefunden.

Nur in einem Präparat, das weniger mit Alkohol ausgewaschen worden war, zeigte sich an den Rändern blasse gefärbte Coccenrasen, von dem ausgehend bei schärfster Beobachtung noch einzelne kaum tingirte Diplococcen gefunden wurden.

III. Da hieraus ersichtlich, dass die Coccen infolge der Behandlung mit Alkohol ihren Farbstoff wieder abgegeben hatten, wurden die gefärbten Schnitte nur längere Zeit mit Aqua dest. ausgewaschen. Das in Aqua dest. mit Oelimmersion untersuchte Präparat zeigte an einzelnen Stellen des Randes intensiv gefärbte Coccenrasen, in deren nächster Umgebung zerstreut vereinzelte gut gefärbte Diplococcen von der Form des Gonococcus Neisser. Gleichzeitig fanden sich diese Diplococcen in den in dem Schnitte vorkommenden Zellen, und zwar neben dem gut tingirten Kerne in dem ungefärbten, in seinen Umrissen nur bei Abblendung erkennbaren Zelleibe, und zwar fanden sich Zellen, in denen 1—2 Diplococcen lagen, bis zu solchen, in denen bis auf den Kern die ganze Zelle von Diplococcenhaufen ausgefüllt war.

In dem nun in absolutem Alkohol entwässerten, in Lavendelöl aufgehellten und in Canadabalsam eingeschlossenen Schnitte zeigte sich das gleiche Bild; nur hatte die Färbung der Mikrococcen an Intensität etwas verloren. Daher wurde in der Folgezeit auch die Dauer der Entwässerung in Alkohol, wie auch der Aufenthalt der Schnitte in Lavendelöl auf das äusserste beschränkt.

IV. Um die Form noch mehr hervortreten zu lassen und so noch anschaulichere Bilder zu erhalten, wurde der Versuch einer Doppelfärbung, und zwar Vorfärbung mit Methylenblau mit nachfolgender Eosinfärbung gemacht. Auch hier zeigte sich wieder, dass die Behandlung mit Alkohol fast gänzlich auszuschliessen, da sonst Coccen überhaupt nicht gesehen wurden. Auch sonst waren noch einige Schwierigkeiten zu überwinden, da die Diplococcen gleichfalls den Eosinfarbstoff aufnahmen (wie auch die Färbung der Gonococcen mit Eosin schon durch Neisser constatirt) und so eine bläulichrothe Mischfarbe erhielten, die nicht intensiv genug von der übrigen Färbung abstach.

Durch Ausproben gelang es allmählich, klare demonstrative Präparate zu erhalten, in denen die übrige Substanz rosa, der

Zelleib blassrosa, die Kerne und Coccen blau gefärbt waren, und zwar wurden die Schnitte in folgender Weise behandelt:

a) 1—2 Stunden dauernde Färbung mit concentrirter, wässriger Methylenblau- oder Löffler'schen Methylenblaulösung.

b) Auswaschen in Aqua destillata, bis der entfärbte Schnitt nur Kerne und Coccen tingirt zeigt.

c) Zusetzen einer möglichst dünnen Eosinlösung bis zur schwachen Rosafärbung des Schnittes.

d) (Selbst auf die Gefahr einer etwaigen Trübung.) Ganz kurz dauernde Entwässerung in absolutem Alkohol und Aufhellung in Lavendelöl, Einschliessen in Canadabalsam.

V. Um zu sehen, ob nicht zu lange Entfärbung bei Benutzung der Gram'schen Methode die Ursache der Nichtfärbung der Diplococcen gewesen, wurde gleichzeitig ein etwa gleich dicker Schnitt einer Pneumonie mit dem der Endocarditis den verschiedenen Proceduren der Gram'schen Färbung unterzogen. Beide Präparate wurden stets gleichzeitig in die verschiedenen Lösungen übertragen. In dem Endocarditispräparat hatten sich, während die Kerne noch tingirt waren, die Diplococcen nicht gefärbt. Der Controllschnitt zeigte, dunkelgefärbt und intensiv hervortretend, Pneumococcen und Streptococcen.

Die betreffenden, in den Endocarditisschnitten gefundenen Diplococcen müssen als Neisser'sche Gonococcen angesprochen werden, da sie:

1. ihrer Form nach diesen gleichen (sie erscheinen kleiner als die in den eitrigen Secreten gefundenen, was veranlasst wird durch die langdauernde Einwirkung des Alkohols bei der Härtung. Dieses ist auch schon von Bumm constatirt, der sie ihrer Form nach Gonococcen en miniature nennt);
2. sich nach Gram nicht färben lassen;
3. durch Einwirkung von Alkohol sehr leicht entfärbt werden;
4. sich, abgesehen von den Pilzrasen am Rande, nur im Zelleibe vorfinden. Nur selten wurden in nächster Nähe von Zellaufen oder zwischen diesen vereinzelte Diplococcen oder kleine Diplococcenhaufen gefunden (nach Bumm p. 41, frei geworden durch Zerfall des vordem sie beherbergenden Zelleibes).

In dem übrigen grössten Theile des Schnittes, bestehend aus fibrinösen Massen, fanden sich keine Coccen.

Bumm, p. 74, weist schon auf die Schwierigkeit der Färbung der Gonococcen im Gewebe hin. Er giebt als beste Methode zur Färbung an: Etwa 1/2 Stunde dauernde Ueberfärbung in Methylviolettanilinwasser mit nachfolgender Entfärbung in Alkohol.

Er sagt hierüber folgendes: Da die Gonococcen den Farbstoff auch unter den günstigsten Umständen, nach der Ueberfärbung in Anilin oder Toluidinwasser nur wenig besser festhalten als die Kerne, handelt es sich darum, bei der Entfärbung in Alkohol genau den Zeitpunkt zu erfassen, wo die Coccen noch vollständig tingirt, die Kerne aber bereits um eine Nuance heller geworden sind. — Bricht man die Einwirkung des Alkohols zu früh ab, so werden die Coccen unter den dunklen Kernmassen und in dem noch tingirten Protoplasma nur schwer unterschieden, entfärbt man zu lange, so geben auch die Trippercoccen ihren Farbstoff ab und sind nur mit grosser Mühe als blasse Körner zu finden oder werden ganz unsichtbar.

Auch bei der Aufhellung in Nelkenöl fand er, dass dieses den Coccen die Farbe leicht entzieht, und liess er die Schnitte daher nur kurze Zeit in diesem liegen.

Die Anwendung der Bumm'schen Methode ergab nach einiger Uebung auch bei den Endocarditisschnitten ziemlich gute und klare Präparate.

Wertheim kommt in betreff der Schwierigkeit der Färbung der Gonococcen im Gewebe zu gleichen Resultaten wie Bumm. Er hat bei Anwendung der Bumm'schen Methode gute Resultate gefunden.

Doch gelang es ihm auch schon durch einfache Färbung in wässriger Methylenblaulösung ganz gute Bilder zu erhalten. Als bestes Färbemittel fand er eine Abänderung der Gram'schen Methode mit darauf folgender Färbung in Methylenblaulösung.

Die Schnitte kommen 3—5 Minuten in Gentianaviolettanilinwasser, eine Minute in Lugol'sche Lösung, Entfärbung in 95% Alkohol nur so weit, dass der Schnitt noch deutlich violett erscheint, dann einige Minuten Färbung in wässriger Methylenblaulösung, Auswaschen in Wasser, Differencirung und Entwässerung in Alkohol absolutus, Auflösung in Bergamottöl und Einschliessen.

Auch Wertheim weist auf die Schwierigkeiten hin, die die Behandlung des Schnittes mit Alkohol hervorruft.

Durch unsere Untersuchung ist also der Nachweis geführt, dass die in der endocarditischen Auflagerung gefundenen Mikroorganismen Gonococcen waren, und zwar handelte es sich um Reincultur der Gonococcen, da keine andere Bacterienart weder mikroskopisch noch durch Cultur nachgewiesen werden konnte.

Der Beweis, dass es sich um Gonococcen handelte, beruht auf folgenden Momenten:

1. Die in den Gerinnseln vorgefundenen Bacterien hatten die Form von rundlichen Diplococcen, meist deutlich Semmelform. Coccen von Traubenformen wurden nicht beobachtet.

2. Ein grosser Theil dieser Diplococcen lag in charakteristischer Weise innerhalb der Zellen.

3. Sie wurden durch die Gram'sche Methode regelmässig entfärbt.

4. Auch durch Alkohol, ebenso durch Lavendelöl wurden sie auffallend leicht entfärbt.

Es fehlt allerdings die Züchtung der Reincultur und die Prüfung der Infectiosität auf der Harnröhrenschleimhaut. Von diesem letzteren Beweise kann um so eher Abstand genommen werden, als die Beweiskraft analoger Versuche überhaupt noch nicht allseitig anerkannt ist. Und auch die Darstellung in Reincultur kann nicht als wesentlicher Mangel bezeichnet werden, da die obigen Merkmale bestimmt genug sind, so dass ein Zweifel über die Natur der vorgefundenen Diplococcen nicht bestehen kann. Das Vorkommen, resp. die Ansiedelung der Gonococcen auf dem Endocardium ist eine gewiss bemerkenswerthe Thatsache, indessen kann sie doch insofern nicht überraschen, als wir nunmehr wissen, dass das Blutserum ein sehr geeigneter Boden für das Gedeihen dieser Pilze ist. Dass ein Transport der Gonococcenzellen in Lymphe und Blut leicht geschehen kann, ist fast selbstverständlich, so dass es also bisher nur an dem thatsächlichen Beweise dieser Thatsache fehlte.