XXXI.

Aus dem pharmakologischen Institut der Universität Greifswald.

Zur Kenntniss der Bildung von Cuminsäure aus Cymol. II.

Von

Prof. Dr. Hugo Schulz.

Beim Niederschreiben des im vorigen Heft S. 360—364 mitgetheilten Artikels über die Bildung von Cuminsäure aus Cymol war mir eine Thatsache unbekannt geblieben, auf die ich in dankenswerther Weise durch meinen Freund, Prof. Anschütz in Bonn, aufmerksam gemacht worden bin. In den Berichten der Deutschen chemischen Gesellschaft¹⁾ findet sich nämlich bereits eine Angabe von M. Nencki, dass Cymol, mit Natriumhydroxyd und Luft geschüttelt, Cuminsäure liefere. Ausführlicheres theilt Nencki mit im Journal für praktische Chemie²⁾: „Nach brieflicher Mittheilung von Prof. Radziszewski liefert Benzol, mit Natriumhydroxyd und Luft geschüttelt, reines Phenol. — — — Die interessanteste Beobachtung betrifft das Camphercymol, das, mit Natronhydrat oder Tetramethylammoniumoxydhydrat an der Luft geschüttelt, zu Cuminsäure oxydirt wird. Die Identität der Säure mit der aus Cuminaldehyd erhaltenen wurde durch Analysen der freien Säure, des Baryumsalzes und den Schmelzpunkt bestätigt. Die Oxydation — — vollzog sich demnach hier genau so wie im Thierkörper.“

Das Verhältniss liegt demgemäss so, dass Radziszewski zuerst die merkwürdige Oxydation des Cymols zu Cuminsäure bei Anwesenheit freien Alkalis constatirte und Nencki auf die Analogie dieses Vorgangs mit den im Thierkörper sich abspielenden Processen hinwies. Durch meine Untersuchungen ist dann ferner festgestellt, dass auch an Kohlensäure gebundenes Alkali das Cymol in gleicher Weise zu beeinflussen im Stande ist, sowie, dass bei diesem Oxydationsvorgang der Einwirkung des Lichtes eine ganz wesentliche Rolle zufällt.

1) XIV. Bd. S. 1144. 2) 1881. XXIII. Bd. S. 96.