des letzteren mit Barytwasser im Rohr wurde er als symmetrischer Dimethylharnstoff erkannt.

Theobromin in gleicher Weise mit Chromsäuremischung behandelt, gibt die dem Cholestrophan homologe Monomethylparabansäure, die durch Alkalien wieder glatt in Oxalsäure und Monomethylharnstoff gespalten wird. Die Ausbeute an Methylparabansäure beträgt ca. 39 %.

Da sich die Homologie von Caffein und Theobromin in diesen beiden Parabansäuren wieder findet, so ist zu erwarten, dass der Rest bei beiden Basen in Form derselben Oxydationsproducte auftritt.

Die Verfasser beabsichtigen darüber nach Fortsetzung ihrer Arbeit zu berichten.

Ueber die Trennung der verschiedenen Aethyläther der Pyrogallussäure haben P. Weselsky und R. Benedikt*) gelegentlich einer Arbeit über die Einwirkung der salpetrigen Säure auf Pyrogallussäureäther Mittheilungen gemacht, auf welche hier nur hingewiesen werden kann.

2. Quantitative Bestimmung organischer Körper.

b. Bestimmung näherer Bestandtheile.

Zur Bestimmung des Nicotins. J. Skalweit**) hat seine Erfahrungen über die Bestimmung des Nicotins veröffentlicht. Ich theile die nicht sehr lange Originalabhandlung hier ihrem ganzen Umfange nach wörtlich mit, weil dieselbe bereits eine in diesem Hefte (p. 514ff.) enthaltene Entgegnung hervorgerufen hat, welche die Kenntniss der Skalweit'schen Abhandlung voraussetzt.

Skalweit schreibt:

»Infolge einer grösseren Arbeit, welche ich in Gemeinschaft mit Herrn E. Wenderoth, dem Erfinder eines Apparates zur Entfernung des Nicotins aus schlecht fermentirten Tabaken, unternommen, hatte ich in den letzten Jahren sehr häufig Gelegenheit, Nicotinbestimmungen auszuführen und ausführen zu lassen. Die Anzahl dieser Analysen beläuft sich auf mehrere hunderte, und die Erfahrungen, welche dabei gesammelt wurden, sind so vielseitig, dass es angebracht erscheint, schon vor Erscheinen der oben erwähnten grösseren Arbeit in den »Annalen«,

*) Monatsh. f. Chem. 2, 212.

**) Repertorium d. analytischen Chemie 1, 165; vom Verfasser eingesandt.

an dieser Stelle über die angewandten analytischen Methoden und deren Brauchbarkeit kurz zu referiren.

Der erste, welcher das Nicotin quantitativ im Tabak zu bestimmen unternahm, war Th. Schloesing, im Jahre 1846, (Ann. de Chim. et de Phys. **19**, 230). Seine Methode (p. 238 ff.) besteht darin, das Nicotin mittelst Ammoniaks frei zu machen und in Aether aufzunehmen, den Aether durch Erhitzen von Ammoniak zu befreien, und den Rückstand mit Normalschwefelsäure zu titriren.

Zu diesem Zwecke werden 10 g des fein gepulverten Tabaks lufttrocken in eine 20 mm weite Röhre derart eingetragen, dass nach jedem eingetragenen Löffelchen Tabak ein Tropfen Ammoniakflüssigkeit eingegossen, und diese Röhre einerseits mit einem Liebig'schen Kühler und andererseits mit einem seitlich tubulirten Kölbchen in Verbindung gebracht wird. Das letztere Kölbchen, von einem Inhalt von ca. 150 bis 200 cc, verbindet man, nach der Beschickung mit ca. 30 cc Aether, an seiner Halsöffnung mit der anderen (höher liegenden) Seite des Liebig'schen Kühlers, und erwärmt. Der Aether steigt so in den Kühler, condensirt sich daselbst, tröpfelt auf den mit Ammoniak befeuchteten Tabak, fliesst davon mit Nicotin und Ammoniak beschwert wieder ab in das Kölbchen, und macht denselben Weg von neuem, indem er stets neue Mengen Nicotin in das Kölbchen nimmt, bis die gesammte Menge des Nicotins sich als ätherische Lösung mit etwas Ammoniak im Kölbchen befindet. In 2—4 Stunden soll die Auslaugung des Tabaks beendet sein. Man überzeugt sich davon durch Probe-nahme einiger Tropfen der ablaufenden Aetherlösung auf einem Uhrglas, und Verdunsten derselben in mässiger Wärme. Verbreitet sich hierbei nicht der geringste Geruch nach Nicotin, so ist die Auslaugung beendet.

Man entfernt nun die mit Tabak gefüllte Röhre, und bringt statt derselben eine Vorlage an den Kühler. Wird jetzt weiter erhitzt, so gehen zunächst stark ammoniakalische Aetherdämpfe über — allein bald ist der übergelende Aether vollkommen neutral, und es befindet sich im Rückstand nur noch Nicotin und kein Ammoniak. Ist dieser Punkt erreicht, giesst man in eine Porzellanschale ab, wäscht mit Aether aus, lässt an freier Luft verdunsten und titrirt mit Lackmuspapierstreifen als Indicator.

Die Schloesing'sche Methode wird auch heute noch in den neuesten Lehrbüchern und Handbüchern als die beste empfohlen, und wenn auch andere Vorschläge in der Literatur sich vorfinden, so schien

es doch zunächst nothwendig, diese Methode anzuwenden und zugleich auf ihre Brauchbarkeit zu prüfen.

Es ist mir nach längerer Erfahrung nicht möglich, in das allgemeine Lob über die Brauchbarkeit derselben einzustimmen. Zunächst ist es eine sehr schwierige Aufgabe, in einer harzigen, schmierigen Masse, wie man sie als Tabaksauszug nach dem Verdunsten des Aethers erhält, den Sättigungspunkt mit Lackmuspapier auch nur einigermaassen zuverlässig zu bestimmen — dann aber ist auch der Punkt, wann die Auslaugung vollständig erfolgt ist, nie genau zu treffen. Selbst nach drei- bis viertägigem Ausziehen (täglich zwölf Stunden lang) werden am vierten, resp. fünften Tage noch deutlich gefärbte Lösungen erhalten, namentlich wenn nach dem Stehen in der Nacht einige Tropfen Ammoniak zu dem Tabak hinzugefügt waren, ehe der Apparat wieder in Betrieb gesetzt wurde. Der erste Uebelstand hat mich bewogen, die Schloesing'sche Methode zu modificiren und stets die gewonnenen Auszüge nicht direct zu titriren, sondern mit Kalilauge zu destilliren. Man hat hierbei jedoch wohl zu bedenken, dass bei Anwendung wässerigen Ammoniaks zur Befeuchtung des Tabaks stets Ammoniaksalze aus dem Tabak in Lösung gehen, und dass diese einen verhängnissvollen Einfluss auf die Genauigkeit der Analyse ausüben müssen, selbst wenn sie nur in geringer Menge vorhanden sein sollten. Das Aequivalent des Nicotins ist nämlich etwa zehnmal so hoch als das des Ammoniaks, und jedes Zehntel-Procent von letzterem erhöht das Resultat um ebensoviel ganze Procente an Nicotin. Um seiner Bestimmung daher einigermaassen sicher zu sein, ist es stets erforderlich, das Destillat nach der Bestimmung einzudampfen, mit 90procentigem Alkohol auszuziehen, und den Rückstand nach dem Lösen in Wasser auf Schwefelsäure, resp. Ammoniumsulfat zu untersuchen.

Eine solche Prüfung ist jedoch umständlich und macht es wünschenswerth, statt des wässerigen Ammoniaks eine andere Base zur Tabakzersetzung einzuführen, wodurch die Isolirung von Ammonsalzen weniger wahrscheinlich wird. Es wurde daher mit Kalilauge in wässriger und in alkoholischer Lösung operirt, und sind dabei zwar viel weniger ammoniakhaltige, allein nie ganz ammoniakfreie Destillate erzielt, so dass es auch hier stets erforderlich wurde, das Destillat einzudampfen und in schwefelsaures Ammoniak und Nicotinsulfat zu zerlegen.

Die besten Resultate wurden erhalten, wenn der Tabak sogleich nach dem Trocknen noch warm mit einer concentrirten alkoholischen

Kalilauge angefeuchtet und sofort mit Aether übergossen wurde. Es waren dann nur so geringe Spuren von Ammoniak im Destillat nachzuweisen, dass dieselben ohne Bedenken vernachlässigt werden konnten.

Statt des Ausziehens mit Aether in einer Schloesing'schen Röhre und doppelt tubulirtem Kolben, statt dessen ich mit bestem Erfolg ein gewöhnliches Fractionirkölbchen anwandte, habe ich auch die Fettextractionsapparate nach Soxhlet und nach Tollens erprobt, kann aber nicht sagen, dass sie vor der einfachen Schloesing'schen Anordnung irgend welchen Vorzug verdienen. Ebenso wenig ist der Schiel'sche Apparat, aus zwei Flaschen bestehend, die abwechselnd in laues und kaltes Wasser gestellt werden, als handlich und zeiter sparend zu empfehlen. Hat man einmal das directe Titriren aufgegeben und sich dazu entschlossen, die erhaltenen Extracte stets zu destilliren, so tritt sehr bald die Frage an den Analytiker, in welcher Weise dies am geeignetsten auszuführen ist.

Die Gefahr der Zersetzung des Nicotins durch Kalilauge in höherer Temperatur ist zweifellos vorhanden, und mag daraus die in verschiedenen Laboratorien eingeführte und auch von mir versuchte Methode der Destillation mit Wasserdampf im Wasserdampfstrom hergeleitet sein. Man unterhält zu diesem Zwecke einen grossen Kolben mit destillirtem Wasser in heftigem Kochen, und leitet die Dämpfe auf den Boden eines kleineren Kolbens, in welchem sich der alkoholische Nicotinextract befindet. Die aus dem letzteren sich dabei entwickelnden Dämpfe werden in einen Kühler geleitet und aufgefangen. Nimmt die Menge des Wassers im kleinen Kolben zu sehr zu, so erwärmt man denselben mittelst einer kleinen Flamme und setzt die Destillation so lange fort, als noch alkoholische (soll heissen alkalische) Reaction auftritt.

Ich will hier jedermann ausdrücklich vor der Anwendung dieser Methode warnen. Sie lässt stets im Stiche und ist ganz unzuverlässig. Auch ist sie wegen der grossen Menge Destillat, die bei ihrer Anwendung erhalten wird, höchst unpraktisch, da dieser Umstand nicht das scharfe Umschlagen der Lackmusreaction zu erkennen gestattet. Auch ist die Gefahr der Zersetzung von Nicotin durch Kalilauge viel geringer, als durch gespannte Wasserdämpfe.*) Man hat nur dafür

*) Ich werde an einer anderen Stelle zeigen, dass Nicotin durch gespannte Wasserdämpfe von circa zwei Atmosphären schon bei 110° C. in zwei Körper zersetzt wird, von denen einer Ammoniak, ein zweiter Kohlensäure ist.

Sorge zu tragen, dass die Concentration der Kalilauge nicht zu weit getrieben wird, und die Temperatur nicht zu hoch steigt.

Jedenfalls erhält man gut übereinstimmende Zahlen, sowie man sich gewöhnt hat, mit gleichen Quantitäten Kalilauge von demselben specifischen Gewichte zu arbeiten, und niemals die colossalen Abweichungen wie bei der Wasserdampfdestillation. Ueberhaupt scheinen mir die Hauptfehlerquellen nicht auf dem Theile der Nicotinbestimmung zu liegen, welcher sich mit der Destillation des fertigen Extractes befasst. Denn ich habe wiederholt bei Analysen von fertigen Tabakslaugen, in denen die Bestimmung des Ammoniaks gleichzeitig mit der des Nicotins vorgenommen werden musste, und wo eine besondere Auslaugung und Präparation nicht erforderlich war, gefunden, dass die erhaltenen Zahlen fast immer von Anfang an gut stimmten und bei vergleichenden Analysen kaum $\frac{1}{10}$ % grosse Abweichungen ergaben. Bedeutend grössere Abweichungen erhält man jedoch, wenn erst ein Auszug aus dem Tabak gemacht werden muss, und nach einer der in den Lehrbüchern beschriebenen allgemein üblichen Methoden verfahren wird. Diese Abweichungen sind nur dadurch zu erklären, dass die Behandlung mit Aether nicht lange genug erfolgt ist, und kalter Aether nur äusserst langsam auf Tabak wirkt.

Ein ungleich besseres Mittel ist 98procentiger Aethylalkohol; derselbe löst in kurzer Zeit die Nicotinsulfate namentlich in der Wärme, und kann ich allen Analytikern, denen es auf genaue Resultate ankommt, denselben zur Nicotinanalyse sehr empfehlen. Meine Methode ist nunmehr kurz folgende:

Der zu untersuchende Tabak wird bei 50° C. auf einem regulirten Luftbade getrocknet, fein gepulvert, gesiebt und der Rückstand nach abermaliger Pulverung und Siebung zum Ganzen gemischt, so dass eine gleichmässige, lufttrockene Durchschnittsprobe nach der Beendigung der Operation als feines Pulver vorliegt. Dasselbe wird in eine luftdicht geschlossene Flasche gebracht, in einer kleinen Probe der Feuchtigkeitsgehalt bei 100° ermittelt, und dieser auf der Flasche notirt. Von der so vorgerichteten Substanz wiegt man 20,25 g ab, befeuchtet mit 10 cc Normalschwefelsäure (1 cc = 0,049 g H_2SO_4), spült dieselben mit 200 cc 98procentigem Alkohol in einen Kolben und kocht zwei Stunden am Rückflusskühler, lässt erkalten, giesst in einen 250 cc fassenden Messkolben, spült mit absolutem Alkohol nach, füllt bis zur Marke auf und schüttelt mehrere mal gut durch. Nach sechs bis zwölf Stunden ist die über dem Tabak stehende Lösung klar.

Man pipettirt 100 cc heraus und bringt dieselben in einen Kolben mit doppelt durchbohrtem Kork. Durch eine Bohrung desselben ist ein Trichterrohr mit feiner Spitze bis auf den Boden des Kolbens eingeführt, die andere enthält nur ein unter dem Kork abschneidendes Rohr, welches mit dem Kühler verbunden wird.

Man destillirt die Hauptmenge des Alkohols ab, giesst nach dem Erkalten durch das Trichterrohr 30 cc einer mässig verdünnten Kalilauge von 1,159 (die Kalilauge der Pharmacopöe wird zur Herstellung dieser Lauge mit dem gleichen Volum Wasser verdünnt) zum Rückstand, und destillirt auf dem Sandbad bei mässiger Flamme, bis die übergehenden Tropfen auf Lackmuspapier keine Reaction zeigen. Nach der Titration mit $\frac{1}{10}$ Normalschwefelsäure hat man nur nöthig, die gefundenen Cubikcentimeter mit 2 zu multipliciren und durch 10 zu dividiren, um die Procente Nicotin des untersuchten Tabaks zu erhalten. *)<

Zur Bestimmung des Stärkemehl- und Trockensubstanzgehaltes der Kartoffeln. M. Märcker**) hat im Verein mit P. Behrend und A. Morgen durch eine sehr grosse Reihe von Versuchen die Beziehungen zwischen dem specifischen Gewichte der Kartoffeln und ihrem Gehalt an Trockensubstanz und Stärkemehl neuerdings genau festgestellt.

Es hat sich dabei gezeigt, dass der aus dem specifischen Gewicht ermittelte Stärkemehlgehalt durchschnittlich um $\pm 0,5\%$ von dem auf chemischem Wege (durch Verzuckerung des Stärkemehls und Bestimmung des gebildeten Zuckers) gefundenen abweicht, doch kamen auch Abweichungen von $\pm 1\%$, ja in einzelnen Fällen selbst von $\pm 2\%$ vor. Wenn also auch die Ermittlung des Stärkemehl- und Trockensubstanzgehaltes der Kartoffeln aus dem specifischen Gewicht für wissenschaftliche Zwecke nicht genau genug ist, so wird sie doch für den praktischen Gebrauch, insbesondere zur raschen Feststellung des Handelswerthes von Kartoffeln ihren Werth behalten.

Ich theile deshalb nachstehend die von Märcker aufgestellte Tabelle mit, welche für die zwischen 1,08 und 1,159 liegenden Gewichte den entsprechenden Procentgehalt an Trockensubstanz und Stärkemehl angibt. Bezüglich des sonstigen reichen Inhaltes der Originalabhandlung aber muss ich auf diese selbst verweisen.

*) Durch Eindampfen des neutralisirten Destillats und Aufnehmen desselben in 98procentigem Alkohol, überzeugt man sich von der Abwesenheit des schwefelsauren Ammoniaks.

**) Landwirtschaftliche Versuchsstationen 25, 107 ff.