C. Aus dem Alpen.

Genf. Breite N. 40° 12', Länge östl. Gr. 6° 10', Höhe 1334'.

	Mittel	S-A + IV 2	Max. + Min. 2	VI + II + X 3	VII + II + 2. IX 4
Januar	30,81	−0,13	−0,54	−0,18	−0,16
Juli	64,16	+0,59	+0,43	0	−0,81

St-Bernhard-Hospital.

Breite N. 45° 50', Länge östl. Gr. 6° 6', Höhe 8108'.

	Mittel	S-A + IV 2	Max. + Min. 2	VI + II + X 3	VII + II + 2. IX 4
Januar	13,41	+0,14	−0,31	+0,02	−0,02
Juli	42,84	+0,61	−0,18	0	−0,31

In Beziehung auf jene für Indien so charakteristischen Resultate, welche meine Isothermen, auf 208 Stationen gegründet, ergaben, sei hier nur bemerkt, dass wohl nirgends die Form der Isothermen mehr wechselt, als in Indien; auch liegt Assam und das Panjab bereits ausserhalb der Regionen, für welche der Frühling die heisse Jahreszeit ist. Aber in Assam ist die Ursache davon, dass die Regenzeit bereits im Frühjahr beginnt, im Panjab, wo überhaupt der Sommer zu den absoluten Extremen der Hitze gehört, wird er dadurch die heisseste Jahreszeit, weil der Charakter einer eigentlichen Regenzeit bereits verschwunden ist.

Die Untersuchungen über das Verhältniss der Stundenmittel zu jenem des Tages hatte unter Anderem gezeigt, dass gerade die Stunden 6, 7, 8 des Morgens für mittlere und hohe Breiten weit bedeutenderen Veränderungen ihres relativen Werthes ausgesetzt sind, als die späteren; ich erwähne dies besonders, um damit die Bemerkung zu verbinden, dass gerade die Wahl von 6 oder 7 Uhr für die telegraphisch zusammengestellten Temperaturberichte die unpassendste ist; sie ist z. B. für die südlichen Orte fast stets nahe dem Minimum, für die nördlichen je nach der Jahreszeit 2 bis 3 Stunden früher oder später. Sollte nur eine Stunde gewählt werden, aus Gründen der Beschränkung, wodurch allerdings auch die Allgemeinheit der Mittheilung erleichtert wird, so ist 9 Uhr des Morgens etwa die am wenigsten schwankende, die zugleich am nächsten dem Mittel des Tages entspricht. Am meisten wünschenswerth blieben allerdings die Extreme und ein gut begründetes Tagesmittel; dies allein würde auch erlauben, die Mittheilungen in Beziehung auf die etwa zu erwartenden Veränderungen mit einiger Wahrscheinlichkeit zu combiniren.

H. v. Schlagintweit.

Das Scalenträdchen — Revolving scale — Molette métrique.

Von Herrn Hermann von Schlagintweit.

Die vielfache Veranlassung, die sich uns bot, die Längen krummer Linien in Plänen und Karten an geographischen Gegenständen, als Flüssen, Routen etc. zu messen, oder, was mir für die Beurtheilung der Veränderlichkeit *) vieler Phänomene besonders wichtig wurde, die Curven durch den Ausdruck ihrer Länge in geraden Linien zu vergleichen, hat mich auf die Construction eines kleinen Instrumentes geführt, dessen ich mich bereits seit längerer Zeit vielfach bediente. Seine Einfachheit liess mich erwarten, dass vielleicht das Instrument in England oder Frankreich schon angefertigt sei, und ich verschob es daher, mein kleines Messinstrument zu beschreiben, bis es jüngst in der Pariser Akademie von General Morin und in der „British Association“ von Herrn Lockyer **) als „neu und durch seine Form und geringen Dimensionen praktisch nützlich“ vorgelegt wurde. †)

*) Siehe Results of a scientific Mission to India and High Asia; vol. IV, Meteorolog.

**) Comptes rendus, tome LVII, séance 1863 Août 17. Les Mondes, vol. II, 3 livr. British Assoc. Newcastle, Sept. 1863.

†) Die erste Anwendung eines Rädchens war jene in Elliot's Perambulator oder Opisometer, wobei aber statt der Theilung des Rades die Fortbewegung längs einer Schraube und das Wiedezurückdrehen auf einem Maassstabe angewendet wird.

Das Instrument, welches ich Scalenträdchen (Revolving scale, Molette métrique) zu nennen vorschlage, ist ein getheiltes Rädchen, dreht sich um eine Achse und hat zur Führung entweder einen kleinen Stiel oder eine nach Art der Carabinerhaken gekrümmte Feder, wodurch es mit Bequemlichkeit an einer Uhrkette etc. angebracht werden kann. Am oberen Ende des Stieles können zugleich noch kleinere Theile als die Scaleneinheiten der Peripherie-Theilung angegeben sein, um damit Reste, die sich bei der zu messenden Linie ergeben, genauer zu bestimmen, als es durch Schätzung geschehen kann.

Die Construction des Rädchens ist folgende:

Ein flacher Cylinder, dessen Umfang der zu Grunde liegenden Maasseinheit gleichgemacht ist, wird durch radienförmig eingetriebene Stahlspitzen, die nur wenig vorzustehen nöthig haben, getheilt. Durch Fortrollen über eine gerade oder krumme Linie kann er dann unmittelbar als Maass für dieselbe gebraucht werden; überdies ist die Linie durch die Marken, welche das Instrument in der Form von feinen Punkten hinterlässt, ihrer ganzen Länge nach getheilt. Auch zur raschen Herstellung grösserer Längenmaasse lässt sich das Scalenträdchen leicht anwenden, indem man es längs einem Lineale über einen Papierstreifen fortführt.

Die Haupttheile und ihre Unterabtheilungen sind durch doppelte und einfache Spitzen unterschieden.

Auf jedem Rädchen ist der Anfang der Theilung durch einen breiten Strich, der mit der 0 verbunden ist, bezeichnet, und diese ist als eine volle dunkle Ellipse noch besonders deutlich hervorgehoben. Dies beschleunigt wesentlich die Anwendung beim Messen, indem man bis nahe dem Ende der zu messenden Linie nicht alle einzelnen Theile, sondern nur die ganzen Umdrehungen zu zählen braucht. Auch kann dem Nullpunkte gegenüber ein Stift im Rädchen angebracht sein, der bei jeder ganzen Umdrehung an eine schwache Feder anschlägt, wodurch dieselbe zugleich hörbar wird.

Die Anwendung ist, wie ich glaube beifügen zu dürfen, sehr leicht und mit Präcision auszuführen. Schon der kleine Widerstand beim Eindrücken der Spitzen erlaubt bei dem Zählen der Theile, sie nicht nur zu sehen, sondern auch zu fühlen, und durch die eingetragenen Punkte wird zugleich controllirt, ob man, indem man das Rädchen darüber wegführte, genau der Linie gefolgt war. Zugleich ist dadurch die ganze Linie getheilt, was nicht nur für die Länge von Wegen oder Flüssen auf Karten, sondern auch bei der Untersuchung vieler Curven als Anhaltspunkte in dem ersten Entwurfe mathematischer Formeln von Interesse ist.

H. von Schlagintweit.

Meridian-Beobachtungen von Planeten auf der Sternwarte zu Kremsmünster im Jahre 1862.

Mitgetheilt von Herrn Prof. *Resthuber*, Abt und Director der Sternwarte.

1862		M. Z. Kremsm.	Eunomia. (Astron. Nachr. <i>N</i> 1349.)		Geoc. Decl.		(R—B)	Parall.
			AR	(R—B)				
Febr.	28	9 ^h 34 ^m 26 ^s .04	$\alpha = 8^h 8^m 2^s.48$	$d\alpha = +0^{\circ}70'$	$\delta = 14^{\circ} 0' 49''.05$	$d\delta = -11''.78$		2''58
März	2	9 25 42,15	$\alpha = 8^h 7^m 10^s.26$	$\alpha = +0,57$	$\delta = 13^{\circ} 59' 55,43$	$d\delta = -9,42$		2,55
	5	9 12 48,91	$\alpha = 8^h 6^m 4^s.54$	$\alpha = +0,53$	$\delta = 13^{\circ} 58' 23,42$	$d\delta = -8,00$		2,51
Metis.								
März	5	9 ^h 36 ^m 29 ^s .43	$\alpha = 8^h 29^m 48^s.95$		$\delta = 27^{\circ} 43' 24''.78$			2,10
	8	9 24 4,11	$\alpha = 8^h 29^m 11^s.26$		$\delta = 27^{\circ} 37' 58,45$			2,06
Psyche. (Astr. Nachr. <i>N</i> 1349.)								
März	8	10 ^h 58 ^m 55 ^s .50	$\alpha = 10^h 4^m 18^s.23$	$d\alpha = -17^s.74$	$\delta = 12^{\circ} 11' 21''.80$	$d\delta = +64''.16$		2''23
Thalia. (Astr. Nachr. <i>N</i> 1349.)								
März	2	11 ^h 35 ^m 46 ^s .80	$\alpha = 10^h 37^m 39^s.56$	$d\alpha = -7^s.59$	$\delta = 29^{\circ} 19' 5''.46$	$d\delta = +45''.75$		2''45
	8	11 27 0,63	$\alpha = 10^h 32^m 27^s.98$	$\alpha = -7,38$	$\delta = 29^{\circ} 26' 52,43$	$d\delta = +45,21$		2,38
	10	11 17 33,20	$\alpha = 10^h 30^m 52^s.10$	$\alpha = -7,33$	$\delta = 29^{\circ} 26' 37,58$	$d\delta = +48,02$		2,36
	11	11 12 51,20	$\alpha = 10^h 30^m 5^s.91$	$\alpha = -7,23$	$\delta = 29^{\circ} 25' 59,67$	$d\delta = +49,10$		2,35
	15	10 54 17,12	$\alpha = 10^h 27^m 14^s.97$	$\alpha = -6,84$	$\delta = 29^{\circ} 20' 13,35$	$d\delta = +47,14$		2,32
	16	10 49 42,47	$\alpha = 10^h 26^m 36^s.12$	$\alpha = -6,90$	$\delta = 29^{\circ} 17' 58,82$	$d\delta = +45,68$		2,31
	23	10 18 26,27	$\alpha = 10^h 22^m 50^s.65$	$\alpha = -6,52$	$\delta = 28^{\circ} 53' 33,25$	$d\delta = +44,58$		2,27
Amphitrite. (Berliner Jahrbuch für 1864.)								
März	15	12 ^h 21 ^m 28 ^s .30	$\alpha = 11^h 54^m 40^s.48$	$d\alpha = +0^{\circ}22'$	$\delta = +0^{\circ} 25' 8''.61$	$d\delta = +10''.14$		3''85
	31	11 3 55,76	$\alpha = 11^h 40^m 0^s.03$	$\alpha = +0,16$	$\delta = +1^{\circ} 21' 0,52$	$d\delta = +9,14$		3,73
April	2	10 54 24,25	$\alpha = 11^h 38^m 20^s.05$	$\alpha = +0,18$	$\delta = +1^{\circ} 27' 6,69$	$d\delta = +10,15$		3,70
Jupiter. (Berliner Jahrbuch für 1862.)								
März	15	12 ^h 0 ^m 39 ^s .40	$\alpha = 11^h 33^m 48^s.16$	$d\alpha = -0^{\circ}84'$	$\delta = +4^{\circ} 30' 38''.34$	$d\delta = +6''.28$		1''33
	16	11 56 15,02	$\alpha = 11^h 33^m 19^s.58$	$\alpha = -0,76$	$\delta = 4^{\circ} 33' 45,54$	$d\delta = +4,06$		1,33
	23	11 25 27,31	$\alpha = 11^h 30^m 2^s.70$	$\alpha = -0,79$	$\delta = 4^{\circ} 54' 48,78$	$d\delta = +4,62$		1,31
	31	10 50 27,63	$\alpha = 11^h 26^m 29^s.66$	$\alpha = -0,89$	$\delta = 5^{\circ} 17' 7,62$	$d\delta = +4,80$		1,29
April	2	10 41 45,74	$\alpha = 11^h 25^m 39^s.47$	$\alpha = -0,90$	$\delta = 5^{\circ} 22' 18,13$	$d\delta = +4,85$		1,29
	11	10 2 57,49	$\alpha = 11^h 22^m 13^s.84$	$\alpha = -0,79$	$\delta = 5^{\circ} 43' 4,66$	$d\delta = +4,62$		1,26
	25	9 3 59,06	$\alpha = 11^h 18^m 17^s.41$	$\alpha = -0,74$	$\delta = 6^{\circ} 5' 41,10$	$d\delta = +3,78$		1,22
	26	8 59 50,43	$\alpha = 11^h 18^m 4^s.71$	$\alpha = -0,84$	$\delta = 6^{\circ} 6' 49,35$	$d\delta = +4,64$		1,21
	30	8 43 23,53	$\alpha = 11^h 17^m 21^s.32$	$\alpha = -0,88$	$\delta = 6^{\circ} 10' 32,98$	$d\delta = +5,59$		1,20
Mai	2	8 35 14,04	$\alpha = 11^h 17^m 3^s.61$	$\alpha = -0,95$	$\delta = 6^{\circ} 12' 0,12$	$d\delta = +4,86$		1,19