En comparant les éléments pour 1870 Juin 10,0 avec ceux que Mr. *Villarceau* a calculés pour 1857 Déc. 25, nous verrons que les perturbations produites par Jupiter, Saturne et Mars les ont affectés des quantités suivantes:

$$\begin{aligned}\delta\omega &= -4^{\circ}32'24''21 \\ \delta\theta &= -2\ 11\ 38,20 \\ \delta\phi &= +1\ 43\ 15,40 \\ \delta\eta &= -1\ 52\ 38,72 \\ \delta n &= -15''81942 \\ \delta(\varepsilon-\omega) &= +10\ 10\ 29,41\end{aligned}$$

Les corrections δn et $\delta(\varepsilon-\omega)$ sont celles qui ont produit les plus grands changements dans la position de la Comète. La première aura pour résultat de porter de 6,37993 à 6,56671 années sidérales ou plutôt d'augmenter de 68,225 jours solaires moyens la durée de la révolution, la seconde d'avancer le retour de la Comète au périhélie, de telle sorte que, par l'effet de ces deux corrections le passage au périhélie aura lieu le 22 Septembre 1870, tandis que, sans les perturbations, il aurait eu lieu le 1^{er} Septembre de la même année.

A son prochain passage au périhélie, la Comète se trouvera dans de plus grandes chances de visibilité qu'à celui de 1857. On voit en effet, à l'inspection du tableau suivant:

Dates.	AR☌—AR☉	D. ☌	$\frac{1}{r^2 \Delta^2}$
1870 Janvier 11	19 ^h 23 ^m	— 3° 44'	0,013
31	18 23	— 3 48	0,019
Février 20	17 27	— 2 57	0,030
Mars 12	16 31	— 1 4	0,048
Avril 1	15 31	+ 1 59	0,082
21	14 20	+ 6 2	0,140
Mai 11	12 56	+10 22	0,234
31	11 18	+13 19	0,358
Juin 20	9 38	+13 14	0,491
Juillet 10	8 8	+ 9 38	0,617
30	7 0	+ 3 13	0,739
Août 19	6 15	— 5 4	0,848
Sept. 8	5 53	—14 7	0,897
28	5 50	—22 11	0,836
Oct. 18	6 1	—27 2	0,659

Dates.	AR☌—AR☉	D. ☌	$\frac{1}{r^2 \Delta^2}$
1870 Nov. 7	6 ^h 9 ^m	—27° 27'	0,449
27	6 4	—24 19	0,278
Déc. 17	5 40	—19 18	0,167

que la comète, qui en 1857 ne s'est pas écartée de la direction du soleil de plus de 100° viendra en opposition en Mai 1857 et qu'à cette époque son éclat sera à peu près égal à celui qu'elle possédait en Novembre 1857 (0,353), moment où il était à son maximum et qu'au mois de Septembre la visibilité deviendra quatre fois plus grande encore.

En terminant, nous rappellerons que ces conclusions ont été tirées de calculs faits dans l'hypothèse que la valeur de l'indéterminée $\delta\varepsilon$ est égale zéro. Mais cette indéterminée devant être comprise entre $-14''$ et $+22''$ et pouvant avoir pour valeur l'une ou l'autre de ces deux limites, les éléments ci-dessus présentent, d'après l'aveu de Mr. *Villarceau*, une certaine indétermination provenant de la grandeur des perturbations produites par Jupiter de 1859 à 1862, époque à laquelle cette planète n'était éloignée de la comète que des 0,3 de la distance moyenne de la Terre au soleil et où, par conséquent, une faible altération de la distance provenant de l'indétermination des éléments devait produire quelques différences dans les perturbations.

Il est donc à craindre que l'erreur commise dans le calcul des perturbations (en supposant $\delta\varepsilon = 0$) affecte nos éléments au point de rendre trop difficile la recherche de la Comète. Il conviendrait donc de faire de nouveaux calculs des perturbations pour l'intervalle compris entre 1859 et 1862, en attribuant dans ces calculs à $\delta\varepsilon$ ses deux valeurs limites. Nous entreprendrons ce travail aussitôt que le temps dont nous pouvons disposer nous le permettra, et nous espérons l'achever assez tôt pour pouvoir donner trois éphémérides des positions de la Comète pour l'époque de sa réapparition en 1870.

Paris, 1866 Oct. 26.

Gustave Leveau.

Ephemeride für die Opposition der Feronia (72) im Jahr 1866.

Von Herrn Prof. C. H. F. Peters.

12 ^h m. Zt. Berlin.	α (72)		δ (72)		log Δ	Aberr.-Zt.
1866 Dec. 2	6 ^h 24 ^m 24 ^s 24	—54 ^s 20	+15° 57' 15 ^{''} 9	—125 ^{''} 1	0,185016	12 ^m 35 ^s 1
3	23 30,04	55,60	55 10,8	121,4	0,183755	32,9
4	22 34,44	56,91	53 9,4	117,8	0,182562	30,8
5	21 37,53	58,17	51 11,6	114,0	0,181439	28,9
6	20 39,36	59,35	49 17,6	110,3	0,180387	27,1
7	19 40,01	60,47	47 27,3	106,4	0,179408	25,4
8	6 18 39,54	—61,51	+15 45 40,9	—102,6	0,178503	12 23,8

12 ^h m. Zt. Berlin.	α (72)		δ (72)		log Δ	Aberr.-Zt.
1866 Dec. 9	6 ^h 17 ^m 38 ^s 03	-61° 51'	+15° 43' 58" 3	-102" 6	0,177674	12 ^m 22" 4
10	16 35,56	62,67	42 19,6	98,7	0,176923	21,1
11	15 32,20	63,36	40 44,9	94,7	0,176249	20,0
12	14 28,03	64,17	39 14,1	90,8	0,175654	19,0
13	13 23,13	64,90	37 47,3	86,8	0,175139	18,1
14	12 17,58	65,55	36 24,5	82,8	0,174705	17,4
15	11 11,47	66,11	35 5,7	78,8	0,174353	16,8
16	10 4,88	66,59	33 51,1	76,4	0,174082	16,3
17	8 57,89	66,99	32 40,6	70,5	0,173894	16,0
18	7 50,59	67,30	31 34,2	66,4	0,173789	15,8
19	6 43,06	67,53	30 32,0	62,2	0,173767	15,8
20	5 35,37	67,69	29 34,0	58,0	0,173829	15,9
21	4 27,62	67,75	28 40,2	53,8	0,173973	16,1
♂ 22	3 19,88	67,74	27 50,6	49,6	0,174201	16,5
23	2 12,24	67,64	27 5,4	45,2	0,174512	17,0
24	6 1 4,78	67,46	26 24,4	41,0	0,174906	17,7
25	5 59 57,58	67,20	25 47,7	36,7	0,175383	18,5
26	58 50,73	66,85	25 15,3	32,4	0,175942	19,5
27	57 44,31	66,42	24 47,3	28,0	0,176583	20,6
28	56 38,40	65,91	24 23,6	23,7	0,177305	21,8
29	55 33,08	65,32	24 4,3	19,3	0,178108	23,2
30	54 28,42	64,66	23 49,3	15,0	0,178991	24,7
31	53 24,51	63,91	23 38,7	10,6	0,179953	26,3
1867 Jan. 1	52 21,43	63,08	23 32,5	6,2	0,180993	28,1
2	51 19,26	62,17	23 30,7	1,8	0,182109	30,0
3	50 18,06	61,20	23 33,2	+ 2,5	0,183302	32,1
4	49 17,92	60,14	23 40,1	6,9	0,184569	34,3
5	48 18,91	59,01	23 51,3	11,2	0,185909	36,6
6	47 21,09	57,82	24 6,9	15,6	0,187320	39,1
7	46 24,53	56,56	24 26,8	19,9	0,188801	41,7
8	45 29,29	55,24	24 51,0	24,2	0,190351	44,4
9	44 35,42	53,87	25 19,5	28,5	0,191967	47,3
10	43 42,98	52,44	25 52,3	32,8	0,193647	50,2
11	5 42 52,05	-50,93	+15 26 29,3	- 37,0	0,195389	12 53,3

(72) ♂ ☉ Dec. 22 3^h 44^m 56^s. Lichtstärke = 0,60. Grösse = 12^m 4.

Diese Ephemeride ist mit den folgenden, aus der Gesamtheit der bisherigen Erscheinungen sich ergebenden Elementen beobachtet:

Epoche: 1870 Jan. 0,0 mittl. Zt. Berlin.

$M_0 = 93^{\circ} 23' 59'' 59$

$\pi = 307\ 58\ 10,39$

$\Omega = 207\ 48\ 31,74$

$i = 5\ 23\ 52,94$

$\phi = 6\ 52\ 45,94$

$\mu = 1040'' 14680$

log $a = 0,3552747$.

osculirend für 1861 Juni 17.

Hamilton College Observatory,

im October 1866.

C. H. F. Peters.

Preisverzeichniss der astronomischen und physikalischen Werkstätte.

Von Dr. Meyerstein, Universitäts- Instrumenten- und Maschinen- Inspector in Göttingen.

(Fortsetzung von № 1616 der Astr. Nachr.)

22. Aequatorialinstrument. Durchmesser des Stundenkreises 15 Zoll, dessen Nonien 4 Zeitsecunden angeben; Durchmesser des Declinationskreises 24 Zoll und mittelst der Nonien in 2 Secunden getheilt. Oeffnung des Objectivs

48 Linien, Brennweite 60 Zoll. Ausser den verschiedenen Ocularen sind dem Instrumente beigegeben: ein Kreis und ein Repetitions-Micrometer, 1 Sonnenglas und Libellen. 2500