- Fig. 10—13. Erste und zweite Richtungstheilung bei erstgebärenden Strenuus-Weibchen und Signatus-Weibchen.
- Fig. 14—16. Mehrgebärende Strenuus-Weibchen. Auflösung der homogenen Doppelfadenschlinge in ein System von chromatischen Doppelwinkeln und feinen, schwach färbbaren Doppelfäden. Fig. 16a—d (Zeiss, Oc. 18, hom. Imm. 3mm, Vergr. 1500). Bildung der Vierergruppen durch Metalyse.
- Fig. 17. (Zeiss, Obj. A, Oc. 5, Vergr. 130.) Frontalschnitt durch den Geschlechtsapparat eines erstgebärenden Strenuus-Weibchens. Sämmtliche (zweite) Richtungsspindeln liegen central und sind in einer Richtung orientirt.
- Fig. 18. (Zeiss, Obj. A, Oc. 5, Vergr. 130.) Winter-Eizellengruppe von *Sida crystallina*. Eiz Eizelle, Nz Nährzellen. Persistirender Hauptnucleolus.
- Fig. 19. Keimbläschen eines direkt vor dem Austreten befindlichen Wintereies von *Moina paradoxa*. Zahlreiche Nebennucleolen, Bildung von Vierergruppen.
- Fig. 20 und 21. Lamellibranchiaten-Typus des Keimbläschens (nach Flemming). a. (Flemming: Nebentheil des H.): Hauptnucleolus. b. (Flemming: Haupttheil des H.) und c. (Flemming: Nebennucleolen): Nebennucleolen.
- Fig. 22. Echinodermen-Typus des Keimbläschens (nach O. Hertwig).
- Fig. 23. Jüngerer Ovarialei eines Seeigels mit chromatischen Doppelfäden und kappenförmig geschrumpftem Hauptnucleolos.
- Fig. 24. Vertebraten-Typus des Keimbläschens, Frosch-Ei (nach O. Hertwig).

Untersuchungen über die Petrificirung der Muskulatur.

Von

Dr. **Otto M. Reis**,
Kgl. Oberbergamt, München.

Hierzu Tafel XXIX, XXX und XXXI.

Zur Einleitung.

In einer monographischen Bearbeitung des Skelets der *Coelacanthinen*, einer fossilen, in mesozoischen und palaeo-

zoischen Ablagerungen auftretenden und seit Ende der Kreideperiode ausgestorbenen Familie der „Crossopterygier“ (in *Palaeontographica*, Band XXXV, 1887; vgl. auch v. Zittel, *Handbuch der Palaeontologie* S. 120, Bd. III. Heft 1) hatte der Verfasser Gelegenheit, auch über die Erhaltungsmöglichkeit der Muskulatur in fossilem Zustande Einiges zu veröffentlichen. — Es zeigen nämlich fast sämtliche im palaeont. Museum in München vorhandenen Exemplare dieser in den Juraschiefern von Solnhofen verbreiteten Familie diphyocerker Ganoidfische, zwischen den zusammengedrückten Schuppen der beiderseitigen Flanken eine feste steinartige Masse, die durch charakteristisch geknickte, sogleich auffällig an die Ligamentinscriptionen der Rumpfmuskulatur (*Myocommata*) erinnernde Furchen abgetheilt sind (vgl. *Pal.* Bd. XXXV Taf. 2. Fig. 5). — Diese Gesteinsmasse ist weisslich, im Querbruch elfenbeinartig, im Längsbruch grobfaserig, wie auch die Oberfläche faserig gestreift erscheint.

Die erwähnten Massen sind am vorderen Rücken am stärksten, weniger auf den Flanken; längs der Chorda und entsprechend dem Verlauf der Seitenlinie sind sie in eine dorsale und ventrale Hälfte auseinandergepresst. Nach dem Schwanz zu und auf der ventralen Hälfte des Rumpfes nach der Bauchkante zu nehmen sie an Dicke ab, wobei sie sich in auseinanderstehende kleiner werdende Fetzen auflösen und endlich nur einen schwachen, weisslichen Anflug auf der meist unrein gelblich gefärbten Innenfläche der Schuppen bilden.

Wenn so das Ganze den Eindruck versteinter (verkalkter) Rumpfmuskulatur macht, wobei die weisslichen Massen dem verkalkten Fleisch, und die erwähnten Furchen den Lücken der verwesenen faserigen Bindegewebe zu vergleichen wären, so liefert die mikroskopische Untersuchung in überraschender Weise die Bestätigung dieses Anscheins.

Bei einem Schliff in der Fläche der Versteinerungsmasse und parallel der Körperaxe erscheinen (vgl. unten Taf. XXIX, Fig. 4 und *Palaeontographica* Bd. XXXV, Taf. II, Fig. 9) eine Anzahl gleichbreiter, dicht aneinander liegender, wohl getrennter Längsbänder, welche in der Richtung der oberflächlichen, makroskopisch zu bemerkenden Faserung liegen. Dieselben zeigen u. d. M. eine reizend feine, dichte und ziemlich scharfe Querstreifung, in sehr kleinen gleichmässigen Abständen der Streifen und

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 8.

Fig. 7.

Fig. 9.

Fig. 10.

Fig. 11.

Fig. 12.

Fig. 13.

Fig. 14.

weiterhin ebenso häufig erkennbar eine mehr oder weniger ausgeprägte, regelmässige und unregelmässige Längsstreifung — also das Bild ächter Muskelfasern mit einer Nachahmung der Primitivfibrillen und Querscheibchen.

Auf den ersten Anschein könnte diese Thatsache den volksthümlichen Begriff einer rechten „Versteinerung“ rechtfertigen, als einer Umwandlung organischer Substanz in anorganische; dies ist natürlich nur scheinbar und wir können hier nur einen räumlichen Ersatz der organischen Materie durch Kalksubstanz, eine Art Pseudomorphose annehmen; dieselbe kam dadurch zu Stande, dass durch irgend welche Ursachen, welche wir unten eingehend erörtern werden, das Kalksalze enthaltende Wasser beim Durchdringen des Fleisches den Kalk in gewissen wechselnden Dichteverhältnissen, die mit der histologischen Struktur d. i. dem Wechsel der verschieden lichtbrechenden organischen Substanzen übereinstimmen, direkt oder indirekt (durch Vermittelung von der Muskulatur selbst angehörigen anorganischen Salze) abgelagerte, so dass schliesslich nach der Ausweisung der organischen Bestandtheile annähernd derselbe optische Effekt erzielt wurde, wie bei dem unverkalkten abgetödteten Muskel.

In diesem Sinne hatte ich mir zuerst diese isolirte Erscheinung zurecht gelegt, wenn es mir auch bewusst blieb, dass hiermit keine eigentliche Erklärung gegeben, sondern nur die Nothwendigkeit des Vorgangs deductiv geschlossen war, deren zufälliges physiologisches und chemisches Agens ich überhaupt ausser den Grenzen der Empirie in dem Geheimniss längst vergangener Erdperioden verschlossen glaubte. In dieser Beziehung hat den Verfasser, wie aus den Schlusskapiteln hervorgehen wird, die Zeit und weiteres Studium hierher beziehbarer Litteratur eines Besseren belehrt.

Etwas erschüttert wurde allerdings schon früher diese Ansicht durch die schon makroskopisch deutliche Erscheinung verkalkter Muskulatur noch bei anderen Fischen des lithographischen Schiefers (deren mikroskopische Untersuchung ich damals verschieben musste) und weiter durch eine Abbildung, die Kner¹⁾ von „gewissen Abdrücken der Rumpfmuskulatur“ bei einem sehr alten Fischtypus: *Acanthodes* (Perm v. Lebach) gab, welche

1) Sitzber. d. k. k. Ak. d. Wiss. Math.-natw. Cl. Bd. 57. 1868.

denen von *Undina* vollständig gleichen. — Es war also die Sache keine vereinzelte, von einer ganz einzigen Combination der Umstände verursachte, sondern bei weit auseinanderstehenden Formen weit auseinanderliegender Zeitperioden eine gemeinsame, wodurch auch die Annahme einer gesetzmässigen, allgemeinen Erscheinung nahegelegt schien, deren Ursachen man zu ergründen hoffen konnte.

Während des Drucks oben erwähnter Abhandlung zeigte ich meine Präparate dem jetzt verstorbenen Herrn Adj. C. Schwager (Pal. Inst. München) und dies leider etwas zu spät, so dass keine Anmerkung mehr angefügt werden konnte; derselbe erinnerte sich nämlich bei Querschliffen durch fossile Fischschuppen ganz Aehnliches gesehen, es aber wegen jedes Anhaltspunktes der Deutung unbemerkt gelassen zu haben. In der That zeigte sein Querschliff durch eine *Thrissops*-Schuppe eine an deren Unterseite anhängende schwache Gesteinsmasse mit den bei den *Coelacanthinen* (*Undina*) auftretenden mikroskopischen Erscheinungen, wenn auch nicht in so grosser Deutlichkeit. Die sofortige Wiederaufnahme der abgebrochenen mikroskopischen Untersuchung ergab nun auch die Thatsache der verkalkten Muskulatur bei den verschiedensten Gattungen der Plagiostomen, Holocephalen, Ganoiden und Teleostier.

Herr Conr. Schwager machte mich weiter auch auf die jurassischen *dibranchiaten*, *chondrophoren Cephalopoden* aufmerksam, welche, aus den gleichen Ablagerungen stammend, gewissermaassen eine körperliche Erhaltung zeigen, die einer Verkalkung des Muskelmantels zu entsprechen schien. Farbe, Bruch, Dichte und äussere Streifung der Verkalkungsmasse entsprechen vollkommen der erwähnten Erscheinung bei *Undina*; mikroskopische Präparate, die wir durch die Substanz anfertigten, zeigten eine ähnliche Bänderung, welche, was besonders zu erwähnen ist, fast die gleiche Breite wie die Muskelfasern der lebenden Cephalopoden besitzen. Eine Querstreifung war nicht zu verlangen, da dieselbe auch bei den lebenden Vertretern fehlt.

Da die Bearbeitung dieser Cephalopoden die älteste streng wissenschaftliche Palaeontologie sehr beschäftigte, war es nöthig, die ältere Speziallitteratur über diesen Gegenstand zu befragen; bei der augenfälligen, makroskopischen Erhaltung des Muskel-

mantels kann es kein Wunder nehmen, dass eine Deutung schon frühe versucht wurde und sich hieran eine kurze — und ganz vergessene Diskussion knüpfte.

Die ersten und ausführlichen Beschreibungen dieser in Juraablagerungen sehr verbreiteten und meist in ihrem Körperruiss erhaltenen, phragmophoren und chondrophoren Cephalopoden (Dibranchiata, siehe v. Zittel, Handb. der Palaeontologie Bd. I S. 494) finden sich bei D'Orbigny und v. Münster¹⁾. Den Stand der Auffassung von der Art der Erhaltung derselben bezeichnet v. Münster mit den Worten: „Der Mantelsack des Thieres ist in eine weisse, kreideartige Masse verwandelt, deren Oberfläche durch sehr feine Streifen quervergingelt ist“. Eine nähere Deutung versucht v. Münster nicht. Dagegen findet sich hierüber folgende merkwürdige Stelle bei Richard Owen²⁾ in einer „Beschreibung gewisser Belemniten, die mit einem grossen Theil ihres Weichkörpers erhalten sind“. Im Anschluss an die oben angeführte Beobachtung v. Münster's bemerkt Owen: „Der muskulöse Mantel scheint eine Umwandlung in Adipocire (Leichenwachs, Fettwachs) erlitten zu haben, so dass er fest-brüchig und spröde wurde und dem Schichtendruck nicht nachgab. Der Verlauf der Muskelfasern ist deutlich sichtbar, sie sind transvers und circular. Ich brachte ein Stückchen des Muskelgewebes unter das Mikroskop und es gelang mir mit einem Tropfen verdünnter Essigsäure die die Massen zusammensetzenden Fasern in ihrer Trennung von einander deutlich zu machen. Die scharfe Querstreifung, die bei lebenden Muskeln zu sehen ist, ist zwar im fossilen Zustande verschwunden und es konnte nur eine dunkle Granulation bemerkt werden.“

Owen vergleicht dies nicht ganz vollkommene Bild bei 600facher Vergrösserung mit dem Bilde der Muskulatur des lebenden *Onychoteuthis*, wobei, wie wir auch schon oben erwähnten, die vollständig gleiche Breite der fossilen Streifen und der recenten Fasern auffällt. So einfach vorausgesehen und deduziert die Aussage Owen's war, „dass jene Streifen den Muskelfasern selbst entsprächen“, so wenig hat sie mit ihrer ver-

1) Beiträge zur Petrefaktenkunde, 1843—1846, Heft I, V, VI, VII.

2) Philosophical Transactions, 1844, p. 65—85.

muthungsweisen Vergleichung mit dem Leichenwachs Anklang gefunden.

Die einzige direkte Berücksichtigung fanden sie bei Quenstedt (Die Cephalopoden, 1849, S. 487) gelegentlich der Einleitung zu dem Capitel der „nackten“ Cephalopoden: „Nach Owen's Meinung wurde die Muskelsubstanz (wohl nur das Fett zwischen den Muskeln) in sprödes Fettwachs (Adipocire) verwandelt und konnte auf diese Weise Reste hinterlassen; da diese jedoch in Säuren unter Brausen sich lösen und nur einen geringen bituminösen Rückstand lassen, so scheint nicht das Adipocire, sondern die Kalksalze im Mantel der Thiere die Ursache der Erhaltung gewesen zu sein. Auch wäre es sehr auffällig, wenn nur von nackten Cephalopoden solche Bildungen vorkommen sollten, und von anderen fetten Thieren, wie Fischen oder Sauriern keine Spur; während der Reichthum von Kalksalzen im Mantel wohl Analogieen mit Muschelthieren darböten. — Analysen werden die Sache entscheiden.“

In Quenstedt's Petrefaktenkunde S. 506 (1885) heisst es: „Der zähe Mantel musste viel Kalktheile enthalten, die sich bei der Verwesung niederschlugen und ein Bild von der organischen Form zurückliessen.“ An anderer Stelle: „Die Muskelsubstanz ist in weissgraue Kalkmasse verwandelt.“

Der ersten Aeusserung nach ist die Erscheinung nichts als ein Niederschlag oder lokaler Absatz der hypothetisch (!) zwischen den Fasern des Mantels befindlichen Kalksalze, welche ein negatives Bild der wirklichen Faserung erzeugen. Abgesehen von dieser Annahme spricht aber auch der histologische Befund direkt dagegen, da auch nach Owen's Abbildungen die Breite der recenten mit der der fossilen Fasern ganz übereinstimmt.

Da so Quenstedt die Erklärung Owen's zerstört und selbst eine Erklärung liefert, zu welcher er erst eine unbewiesene Annahme aus der zu erklärenden und zu beweisenden Tatsache folgert, da ferner die Strukturmerkmale bei Cephalopoden nicht so eklatant sind, dass die Erscheinung zugleich ohne Erklärung einleuchtend ist, so blieb sie späteren Autoren gänzlich unentschieden und anfechtbar.

H. L. Bronn, der in der „Geschichte der Natur“ (II, S. 647 1843) die Annahme Owen's referirend unter den „Veränderungen organischer Ueberreste“ anführt, spricht später in der

Lethaea¹⁾ folgende Ansicht über die Erscheinung aus. „Die im Mantel vorhandenen Muskellagen hinterlassen im zarteren Gestein oft quergestreifte Eindrücke, wie aus nebeneinander liegenden Zwirnsfäden, wovon sich einer zuweilen in zwei auflöst oder anastomosirt.“

In v. Zittel's Handbuch der Palaeontologie Bd. II wird zwar bei *Geoteuthis* (S. 518) die „gestreifte mit Kalksalzen imprägnirte Muskelsubstanz“ erwähnt; bei *Ostracoteuthis* und *Belemnoteuthis* (S. 513) heisst es dagegen, dass ihre Haut eine kreibige, quergestreifte Kalksubstanz absondere; von *Plesiototeuthis*, der im lithogr. Schiefer häufig gefunden wird und dessen versteinerte Muskulatur für unsere Untersuchungen das hauptsächlichste Material lieferte, werden nur kurz (S. 519) die „Abdrücke des ganzen Thieres“ erwähnt.

Alles dieses ist geeignet darzuthun, wie wenig beweisende Kraft die von Owen mitgetheilte Erscheinung gerade bei den Cephalopodenmuskeln hatte, so dass an eine positive Umwandlung und Umsetzung innerhalb des Körpers der Muskelfaser niemand glauben mochte. Gerade dieser Punkt war aber in dem Erklärungsversuch Owen's enthalten, indem man damals allgemeiner als heute annahm, dass Adipocire aus einer Umwandlung der Muskelfaser selbst in Fett und Fettsäure unter Bindung von Kalk entstehe.

Owen's Beobachtung war also im Einzelnen weder anerkannt, noch im Allgemeinen verwerthbar, so dass sie fast in Vergessenheit versank und einer Ausgrabung bedurfte. Die That- sache der Fossilisation der Muskulatur war daher für den Verfasser bei der Publikation der „Osteologie der Coelacanthinen“ noch ein einzig dastehendes Curiosum, das zwar mit dem genügenden Ernst gewürdigt, jedoch ohne Erwähnung der älteren mikroskopischen Untersuchungen Owen's an Cephalopoden verkündet wurde.

Die unzweifelhafte That- sache, wie sie sich bei *Undina* feststellen liess, befestigt aber die Auffassung der Erscheinung bei den Cephalopoden vollständig, worauf ich schon in Mittheilungen der Gesellschaft für Morphologie und Physiologie in München 1889 näher eingegangen bin.

1) Leth. geognostica 1851--52, Bd. II, S. 381.

Im Anschluss an diese Untersuchungen hat nun auch in-
zwischen Dr. Eb. Fraas bei einem *Geoteuthis* aus dem
Lias Schwabens die Deutung der Muskulatur bei Cephalopoden
von einer anderen Seite beleuchtet¹⁾ und befestigt, worauf wir in
dem betreffenden Abschnitt näher eingehen werden.

Die fossile Muskulatur ist nicht nur von Fischen und Ce-
phalopoden zweifellos festgestellt, ich kann nun auch hinzufügen
von Reptilien und Würmern (Anneliden).

Was die Reptilien betrifft, so fand ich die Muskulatur bei
Anguisosaurus (vgl. unten) in voller Deutlichkeit. Hierbei muss
ich erwähnen, dass Dr. Eb. Fraas in Stuttgart gleichzeitig mit
meiner Untersuchung über *Undina* bei Gelegenheit der Be-
schreibung einer Finne von *Ichthyosaurus* wichtige Angaben
über die fossile Erhaltung von Weichtheilen gemacht hat (vgl.
Württemb. Jahresh. für vaterl. Naturkunde 1888. S. 292—296). Fraas
erwähnt hier nach Owen's Vorgänge (*A Description of some of
the soft parts, with the Integument of the Hind-fin of Ichthyosaurus*,
Trans. Geol. Soc. Lond. 1841) makroskopische Fleisch-
massen und in Ergänzung besonders die Erhaltung von einer
„durch das Ausfaulen der Muskulatur in zarte Streifenfalten ge-
legten Haut“. Weiter wird angegeben, dass die Mikrostruktur
der Muskulatur zerstört und durch feinen körnigen Kalk ersetzt
sei. Da Dr. Fraas mir seine Präparate gelegentlich ge-
zeigt hat, ist es mir möglich, sowohl hierüber, als auch über
die Beziehungen der angeblichen Erhaltung von Epidermis, Cutis
und deren Pigment und des fraglichen Vorhandenseins von ver-
horntem Pflasterepithel des *Stratum corneum* — zu unserer Fos-
silation der Muskulatur in dem unten folgenden Capitel über
ihr Auftreten bei Reptilien einiges mitzutheilen.

Alle diese Erscheinungen lassen sich unter einem Gesichts-
punkt betrachten; da nämlich die Versteinerungsmasse ein „Phos-
phorit“ ist — dem Gesichtspunkt der „Phosphoritisirung“ gewisser
Eiweisssubstanzen; wir können von einem *Myo-* oder *Zoophos-*
phorit sprechen und wir werden im letzten Capitel darlegen,
welche Ausdehnung diese Erscheinung hat.

Ich darf hier nicht versäumen, auch auf eine Darstellung

1) Jahreshefte des Vereins für vaterl. Naturkunde in Württemb.
1889, S. 217.

der Möglichkeit noch einer anderen Art der Erhaltung thierischer Substanzen aufmerksam zu machen, welche Oberbergdirektor Dr. v. G ü m b e l durch mikroskopische Untersuchung wahrscheinlich gemacht hat — den Zoocarbonit (vgl. Sitzber. bayer. Ak. d. Wiss. II Cl. 1883. 1. Taf. III, Fig. 50 a u. b). Die Erscheinung wird daselbst folgendermaassen charakterisirt: „Dass auch thierische Stoffe sich in eine förmliche Kohle umbilden können, beweist die Umwandlung von Fischresten in Glanzkohle, die man in verschiedenen Bildungen der Carbon-, Postcarbon- und Lias-Schichten beobachtet hat. Dieser Zoocarbonit tritt denn auch zuweilen in zwei schmalen aber regelmässigen Flötzen auf, namentlich in der Lebacher Stufe, z. B. Münster-Appel in der Rheinpfalz. Die glänzend schwarze würfelförmig brechende Kohle umschliesst zahlreiche in ihrer Form und am Schmelz kenntliche Schuppen und ganze Fischkörper, erscheint im Uebrigen dicht und texturlos. — Nach der Behandlung mit der Bleichflüssigkeit zeigt sich eine höchst charakteristische Streifung mit eigenthümlichen narbenartigen Butzen und dazwischenziehenden dunkeln Adern wie von Gefässen herrührend“.

Auf andere hierher gehörige Bemerkungen und Beobachtungen früherer Autoren, wie Kner, Quenstedt, Hermann von Meyer, Traquair, Ehlers und Vetter, die nur die makroskopische Erscheinung berühren, werde ich im speziellen Theil an betreffender Stelle kurz eingehen. In letzterem werden die einzelnen Arten, an welchen die Beobachtungen gemacht wurden, getrennt behandelt, da ich glaube, dass hierdurch bei der genauen Beschreibung der spezifischen Eigenheiten der Verkalkung, besonders der Art der Uebergänge von typischer Strukturhaltung zu strukturloser Verkalkung der Kernpunkt der Erklärung von selbst hervorspringen wird. Eine Zusammenfassung der makroskopischen und mikroskopischen Erscheinungen wird dann schematisch und summarisch verfahren dasjenige hervorheben, was im letzten Kapitel zu einer vorläufigen Erklärung als Material dienen kann. Bei dieser Art der Abhandlung konnten auch mit der Deutung der Muskulatur zusammenhängende zweifelhafte Punkte der palaeontologischen Morphologie (vgl. die Frage der Hautbedeckung der jurass. Holocephalen, desgl. von *Callopterus* und *Agassizia*) in übersichtlicher Weise besprochen werden, worauf ich den Systematiker aufmerksam mache; des-

gleichen auf die kurze Begründung der Wiederherstellung der Plagiostomen-Gattung *Aellopus*.

Die Untersuchungen schliessen sich alle an das Material des palaeontologischen Instituts in München an und wurden im Jahre 1888 mit den mikroskopischen Präparaten fertig gestellt. Eine kurze Darstellung derselben habe ich schon in den Sitzungsber. der Gesellsch. für Morphologie und Physiologie in München 1889 gegeben. In den vorliegenden Blättern wird ausserdem noch eine unter den Begriff des „Myophosphorits“ fallende Fossilisation des flüssigen Inhaltes des Tintenbeutels der Tintenfische und der Zellen des hyalinen Knorpels bei Elasmobranchiern festgestellt, während ich die Annahme einer Phosphoritirung der Cutis oder der Nervensubstanz noch für zweifelhaft halte.

Es erübrigt mir nur noch, Herrn Prof. v. Zittel für die Ueberlassung des Materials, Herrn Prof. v. Voit und Prof. R. Hertwig, sowie Herrn A. Schwager (kgl. Oberbergamt in München) für vielfachen Rath und Belehrung meinen Dank auszusprechen.

I. Beschreibung der Erscheinung bei fossilen Fischen.

Wir beginnen zunächst mit den Elasmobranchiern und beziehen uns im Folgenden zur Orientirung über die einzelnen fossilen Gattungen und Arten auf v. Zittel's Handbuch der Palaeontologie, Bd. III, S. 65—272 (Fische), Bd. III, S. 451 u. 598 (Reptilien), Bd. II, S. 491—521 (Cephalopoden), Bd. I, S. 565—570 (Anneliden).

1. Plagiostomen.

Notidanus.

An dem in v. Zittel's Handbuch l. c. S. 66 angeführten Exemplare von *Notidanus Münsteri* Ag. aus den Solnhofen Schiefer befindet sich längs der Wirbelsäule, in einiger Entfernung von ihr dorsal und ventral in einer scheinbar dem Körper entsprechenden Umrisslinie abbrechend, und anschliessend an die wohl erhaltenen Kalkknorpeltheile des Cranium- und Visceralskelets eine schwache Anhäufung fast schneeweisser, blätteriger

Massen, die im Gegensatz zu der graulichen Kalk-Gesteinsmatrix stehen, sich leicht von derselben, als von einem etwas heterogenen Material ablösen und bei der Ablösung auf der Aussenseite die Chagrinkörnchen des Hautskelets zeigen; sie entsprechen so augenscheinlich dem Körperinnern.

Kleinere Stückchen dieses Petrefakts sind eigenthümlich porös und kleben an der Zunge. Die reine Oberfläche ist fein- bis grobgestreift, der Bruch ist in der Fläche längsfaserig und schalig, quer dazu aber ganz dicht. Die Dicke ist (die beiden auf zwei Gesteinsplatten vertheilten Reste zusammengekommen) etwa 0,01 bis 0,015 m.

U. d. M. lassen sich vor allem in einer ziemlich gleichmässig hellen, schwach körneligen Grundmasse breitere Bänder erkennen, welche stellenweise ganz verschwinden; die Bänderung geschieht durch unregelmässig auftretende, aber hier und da gleichmässig von einander entfernte, spaltenartige, dunkle Linien. Innerhalb der Bänder tritt nun entweder eine feine, mit der Bänderung parallele Längslinirung auf oder auch eine Längsreihung sehr feiner, als dunkle Körnchen erscheinender Unterbrechungen der Masse, welche häufig oder meistens fast unmerklich in der Richtung der erwähnten Bänder und Streifen verlängert sind; Körnchenreihen und Streifen gehen überhaupt in einander über. Senkrecht hierzu tritt nun eine zweite Anordnung von in der Quere der Streifen sehr schwach verlängerten, in sehr gleichmässigen und schmalen Abständen stehender Körnchen auf, so dass entweder eine feine dunkle Kreuzstreifung resultirt oder auch eine kreuzweise Reihung von dunkeln Körnchen, welche zwar nicht zu scharf ist, aber doch dem Eindruck vollständiger Regelmässigkeit sehr nahe kommt (Taf. XXIX, Fig. 10).

Am auffälligsten ist die Längsreihung, über welche wie ein Schleier die Queranordnung ausgebreitet ist. In regellos eingestreuten Stellen wird die Masse vollständig hell und ist fast in ganzer Tiefe ohne Körnchen. An anderen Punkten der Präparate finden sich in solcher gleichmässig hellen Grundmasse starke Anhäufungen der dunkeln Körnchen; sie sind hier nach einer Richtung besonders verlängert, spindelförmig und in ihren Längsaxen meist untereinander parallel, was die Richtung der verschwundenen Längsbänder andeutet. In solchen Spindeln scheinen die Körnchen in einander zu zerfliessen, wie auch die Anhäufun-

gen unter sich in zwei aufeinander senkrechten Richtungen sich vereinigen; es erscheinen dann Bildungen, welche an unregelmässige Dendriten regulär krystallisirender Mineralien erinnern.

Die erwähnten dunkeln Körnchen sind nun nicht Einschlüsse eines anders gefärbten fremden Materials; wenn sie dunkel im Gesichtsfeld erscheinen, werden sie beim Niederschrauben des Tubus zu central erglänzenden Punkten; es sind also Hohlräume in der sonst einheitlichen Masse, welche auch durch flüssigen Canadabalsam ausgefüllt werden und daher beim Decken der Präparate oft verschwinden. Da nun diese Bildung in der ganz amorphen Körperausfüllung keine mineralische sein kann, so muss sie in irgend einer Weise von den im Körperinnern befindlichen Geweben beeinflusst worden sein. Da es nun keine Gewebsart giebt, welche in dieser Weise und in solcher mikroskopischen Feinheit aufeinander senkrechte Faserungsrichtungen innerhalb deutlicher Bänder zeigt, weiter kein Gewebe, welches im Anschluss an das innere Skelet dorsal und ventral der Wirbelsäule unter der Haut in solcher Masse auftritt, wie die Muskulatur, so können die wohl angedeuteten Bänder mit ihrer dichten, kreuzweise abgetheilten inneren Faserung des Versteinerungsmaterials nur durch die Muskelfasern und ihre Fibrillen verursacht sein, wofür wir im Folgenden noch andere mikroskopische Beweise bringen können. Der Querschnitt (Taf. XXX, Fig. 4) zeigt, dass die Längsbänderung dem Längsschnitt körperlicher Säulen von biconvexem Umriss zu verdanken ist; er erinnert ausserordentlich an die Querschnittsfelderung der Muskelbündel.

Wir können daher unbedenklich diese Verkalkungsart den bei *Undina* mit typischer Muskelstruktur von mir beobachteten Verkalkungen gleichstellen und müssen die allerdings merklichen Unterschiede auf Rechnung einer möglichen zufälligen Metamorphose oder einer gesetzmässigen Veränderlichkeit überhaupt setzen. Diese Gesichtspunkte im Einzelnen zu verfolgen, erscheint von besonderer Wichtigkeit für die Erklärung der Erscheinung.

Die vorhandene Versteinerungsmasse entspricht nach den oben angegebenen Maassen nur einem Bruchtheil der Fleischmasse und kann in ihrem Volum auf höchstens $\frac{1}{5}$ der anzunehmenden Muskulatur geschätzt werden.

Acrodus (vgl. v. Zittel l. c. S. 46, Fig. 72, Exemplar der Münchener Staatssamml.).

Auch hier sind makroskopisch unter dem Schuppenkleid starke Wülste längs der Wirbelsäule bemerkbar, welche nur der Muskulatur angehören können. Das einzige Exemplar war aber zu schonen und konnte nicht zur mikroskopischen Untersuchung herangezogen werden. Desgleichen

Palaeoseyllium (vgl. v. Zittel l. c. S. 79).

Auch hier zeigen sich ganz ähnliche Wülste weisslich gelber Massen, welche auf verkalkte Muskulatur zurückzuführen sind.

Squatina alifera v. Münster (s. v. Zittel l. c. S. 92 Fig. 105 und Quenstedt, Petrefaktenkunde, S. 286).

Diese noch jetzt lebende Gattung ist auch in den Jura-schiefern von Eichstädt und Nusplingen vertreten.

In der oben citirten Abbildung eines Münchener Original-exemplars ist die ganze weisslich gehaltene Partie des Rumpfes freigelegt von der Bedeckung der eng gedrängten Zähne der Chagrinhaut. Man sieht so auf die Rippen und eine ganz weisse Zwischenfüllmasse, welche eine quer zu den Rippen verlaufende Streifung und Andeutungen der Myocommata zeigt. Sie hat makroskopisch alle Kennzeichen der bei *Notidanus* beschriebenen Muskelmassen und ist unter den ihr eingedrückten Hautschüppchen auch an den Kiemenbögen bis zu den Kiefern bemerkbar. Auch Quenstedt erwähnt die Füllmasse bei der Beschreibung des Querbruchs eines Körpers von *Squatina* von Nusplingen (l. c. Taf. 22, S. 286): „Der Wirbelkörper . . . ist nach aussen von einer weissen Masse bedeckt, worin braune Stacheln und Schuppen zerstreut liegen (also: eingedrückt! Der Verf.). Dieselben gehören offenbar nicht mehr zum Wirbel, so eng sie sich auch daran schliessen, sondern zur Haut, welche sich zu beiden Seiten als ein schmaler Streif voller Schuppenreste fortsetzt.“

Der Dünnschliff zeigt nun die schönste Erhaltung der Mikrostruktur der Muskeln. Vor allem ausgezeichnet ist innerhalb der mehr weniger scharf getrennten Längsbänder die Längsstreifung, welche sowohl scharf liniirt, als fein und gröber gekörnelt auftritt; hier und

da zeigen sich blasige Erweiterungen der gröberen Körnelung, die schwach mit fremdem Material infiltrirt erscheinen. Oefters bestehen die Längsstreifen nur aus Reihen auseinander stehender Körnchen; sie stehen wechselnd in grösserer Dichte nebeneinander, als auch in weiteren Zwischenräumen auseinander, im ersteren Falle bilden sie manchmal ein leichtes Gefirre von mehr weniger lichtbrechenden Linien (Taf. XXIX, Fig. 1).

Dieser Längsstreifung ist sehr oft eine sehr feine flimmerige Querstreifung zugesellt, die platzweise dichtgedrängt auftritt und mit der Längsstreifung das feinste Kreuzkorn hervorruft, wie wir ein solches bei *Notidanus* ausführlich erwähnt haben. Es bildet hier das Auftreten des Kreuzkorns zugleich neben und in allen Uebergängen zu typischer Struktur eine Sicherung der Deutung der Muskulatur bei *Notidanus*; wir werden Gleiches fast in allen folgenden Fällen zu erwähnen haben.

An den dünnsten Stellen des Präparates zeigt sich aber ohne jede Längsstreifung eine wunderbar zarte Querstreifung, wie ich sie schon *Palaeontographica* XXXV, S. 34—36, Taf. II, Fig. 9 bei *Undina* festgestellt habe und die dort als der sicherste Beweis angeführt wurde, dass hierin eine vollständige, anorganische Nachbildung der mikroskopischen Struktur der Muskeln vorliege.

Es verlaufen nun mit allen Uebergängen und Anschlüssen diese die deutlichste Muskelstruktur zeigenden Stellen in gleichmässig helle oder auch fein und unregelmässig granulierte Felder, in welchen nur sporadisch eingestreut eine Quer- oder Längsstreifung zu bemerken ist. Selbst bei fehlender Bänderung beweist dies den organisch untrennbaren Zusammenhang der strukturlosen und strukturführenden Stellen, kurz die Einheit der Abstammung der Versteinerungsmasse.

Spathobatis mirabilis Wagn. (v. Zittel l. c. S. 102, F. 117).

Diese an den lebenden *Rhinobatis* sich eng anschliessende Gattung besitzt auch in den von mir untersuchten Exemplaren unter der Chagrinhaut die weisslichen, kreideartigen Massen. U. d. M. zeigen sich neben spärlicher Längsstreifung und einem sehr feinen Kreuzkorn, überwiegend sehr gleichmässig gekörnelte, sonst strukturlose Flächen. Das Kreuzkorn ist häufig grob und

es finden sich auch spindelförmige Anhäufungen dentritisch communicirender Körnchen, deren Längsaxen der Faserung und Bänderung entsprechen.

Selbst an den unregelmässig gekörnelten Stellen sieht man beim Auf- und Niederschrauben d. M. deutlich die vorwiegende Längsanordnung der dunkeln Körnchen.

Aellopus elongatus Münt. em. Reis.

Das Originalexemplar des Grafen von Münster, an welchem die Untersuchung über die vorkommenden Gewebeformen vorgenommen wurden, um ein Urtheil über etwaige vitale oder posthume Verkalkungen zu erlangen, wurde von A. Wagner (Denkschrift der bayer. Akad. d. Wissenschaften) als vermuthliches Schwanzstück von *Squatina spec.* erklärt. Die Afterflosse und I. Dorsalis sollte fehlen, während ein am vorderen Ende des Fossils befindlicher, ventral gewendeter Flossenlappen als Bauchflosse erklärt wurde. Letztere hat aber einen Tragegürtel, der nur als Schultergürtel und nicht als Becken gedeutet werden kann, ebenso wie Flossenlappen und -Skelet dieser generellen Diagnose entgegenstehen. Weiterhin liegen hinter ihr sowohl die theilweise zerstörten knorpeligen Reste einer I. Dors., der Ventralis mit Beckengürtelresten, als auch Reste einer recht schwachen Analis. Für unsere Anschauung spricht weiterhin noch das Verhalten der Wirbel resp. Doppelwirbel; unter den ca. 110 Wirbeln sind ca. 47 einfache Wirbel, die der Bauchhöhle oder hauptsächlich dem Raum zwischen den beiden paarigen Flossen entsprechen müssen. Darauf folgen ca. 16 Doppelwirbel, die unter den Resten der II. Dors. beginnen, sich aber nach hinten wieder vereinfachen. Die Analis beginnt wenigstens unter dem 10. Doppelwirbel. Die I. Dors. beginnt etwa unter dem 25. Wirbel, 22 Segmente vor dem 1. Doppelwirbel. Bei *Squatina* beginnt aber die I. Dors. hinter dem Abschluss der Leibeshöhle über dem 12.—13. Halbwirbel; die II. Dors. folgt noch weiter nach hinten. Es kann also die hinterste Dorsalis, unter welcher bei *Aellopus* die Halbwirbel beginnen, unmöglich die hintere Flosse einer *Squatina* sein.

Dasselbe, was hierbei gegen die Zuordnung von *Aellopus elongatus* zu *Squatina* spricht, gilt noch mehr in Bezug auf *Spathobatis*, unter dessen Synonymen *Aellopus* bei

v. Zittel aufgeführt wird (Handbuch, I. c., S. 103). Bei dieser Gattung sind die erwähnten Unterschiede noch entschiedener, wozu noch nennenswerthe Verschiedenheiten in dem Umriss der Flossen, in der Entwicklung des Chagrins dorsal von der fraglichen Bauchflosse hinzutreten.

Das in Rede stehende Fossil ist daher kein Platt-Hai; der sicher bilateral compresse Körper ist vielmehr im Lateralprofil zu sehen und stimmt in der Lagerung mit der gewöhnlichen von *Thyellina*, *Pristiurus* und *Palaeoscyllium*, von welchen Gattungen er aber durch namhafte Unterschiede generell getrennt ist. *Palaeoscyllium* ist bei viel geringerer Körperlänge durch die grössere Zahl der Wirbel, das Fehlen der Doppelwirbel(?) durch starke Verkalkung sämtlicher Radialreihen der unpaaren Flossen ohne Verschmelzung der Basalia (*Mustelus*), andere Form und Stellung der Flossen schon oberflächlich leicht von *Aellopus* zu unterscheiden¹⁾.

Agassiz stellte den Fisch von Anfang an zu *Galeus* und findet auch Aehnlichkeit in der Wirbelbildung mit *Carcharias*; hierher kann er aber nur in gewisser Beschränkung gerechnet werden.

Aellopus Wagneri Ag. stellt Wagner zu *Notidanus*; es ist möglich, dass er nur das Schwanzstück eines grösseren Exemplars von *A. elongatus* ist.

Beiden Exemplaren fehlt leider der Kopf; nur an dem erst-erwähnten finden sich vor dem von mir als Schultergürtel gedeuteten Knorpelgürtel ein Paar Knorpelreste, die ich für Kiemenbogentheile ansehe, deren Breite, Form und Art der Verkalkung, sowie deren Struktur ganz besonders an gleiche Theile erinnern, welche mit dem als *Sphenodus longidens* Ag. (Solnhofen) bezeichneten, höchst charakteristischen, Lamnidenartigen Gebiss vorkommen. Auch die vorhandenen ersten Wirbel schliessen die Möglichkeit einer engeren Beziehung von *Sphenodus* und *Aellopus* nicht aus. Ein dereinstiger günstiger Fund kann allerdings erst die Frage entscheiden.

1) Bei *Palaeoscyllium* liegen von der II. Dorsalis bis zum Schwanz ca. 110, dagegen bei *Aellopus* bei viel grösserer Länge nur ca. 85 Segmente; der Beginn der II. Dorsalis liegt bei ersterem 30 Segmente hinter dem Beginn der ersten, bei *Aellopus* ca. 22 etc., etc.

Ich bin hauptsächlich deswegen im Vorhergehenden so umfassend auf die Gattungsfrage eingegangen, weil die Struktur der erhaltenen Muskulatur an keine der Gattungen sich anreihen lässt, zu denen *Aellopus* als Synonym bisher gestellt wurde.

Da mich meine Erfahrung belehrt hat, dass bei Verschiedenheiten der Muskelschliffe bei einer Gattung doch sich stets charakteristische Uebergänge erkennen lassen und zwei verschiedene Bilder nie unvermittelt auftreten, *Aellopus* aber in der Struktur der Muskulatur solche Uebergänge zu *Squatina* und *Spathobatis* nicht zeigt, sondern ganz isolirte Eigenheiten besitzt, so zeigt sich hierdurch, dass die Art der Muskelverkalkung als ein unterstützendes Begleitmoment der Gattungsdiagnose bei Gelegenheit herangezogen werden kann.

U. d. M. erkennt man eine gleichmässig helle Grundmasse, in welcher nur einzelne Partien krenzweiser Körnelung eingestreut sind. Ausserdem bemerkt man längere gröbere Faserzüge, welche in kurzen schlauchähnlichen Abschnitten unregelmässig eingeschnürt oder auch von einander abgelöst sind; dieselben treten sowohl in grösseren Abständen von einander auf, als auch enger parallel neben einander gelegt. Sie erscheinen bei hoher Einstellung dunkel, bei tieferer verschwinden sie als eine dichte Anhäufung heller Körnchen in der hellen gleichmässigen Grundmasse.

An die Beschreibung der plagiostomen Elasmobranchier haben wir noch zwei Beobachtungen von Kner und Traquair hinzuzufügen, welche den makroskopischen Momenten Rechnung tragen und von denen die Darstellung Traquair's in ihrer logischen Einfachheit die einzig richtige Deutung aufstellt.

Kner berichtet in seiner Bearbeitung Lebacher *Acanthodinen* (Sitz.-Ber. d. Wiener Akad. der Wiss., Bd. 57, I, S. 199): „Zwei Gegenplatten sind besonders bemerkenswerth wegen der unter der Haut durchschimmernden Abdrücke der seitlichen grossen Rumpfmuskeln; die Lagerung der Muskelbündel ist genau dieselbe, wie bei lebenden Fischen. Diese grossen Muskelschichten bilden mit zwei schiefen Längsreihen kleinerer Muskelbündel, deren die obere längs des Rückens, die untere des Bauchs verläuft, deutliche Zickzacklinien.“ . . .

„Die zwischen den beiden mittleren oder Hauptreihen dieser Muskelschichten befindliche Trennungsfurche, in der sie fast unter rechtem Winkel aufeinander stossen, läuft längs der Seite des Rumpfes, wo über ihr die obere Seitenlinie hinläuft. Sogar die Sehnen zwischen den einzelnen Muskelbündeln sind theilweise im Abdruck zu erkennen.“

Diese Darstellung, so genau sie ist, leidet wie die oben mitgetheilten Aeusserungen Bronns (Leth. geogn. II) über den Cephalopodenmantel, an der unklaren Vorstellung von dem, was abgedrückt und was körperlich vorhanden ist. Nach der von Schlotterbeck gezeichneten guten Abbildung liegt die Erscheinung aber genau so wie bei Coelacanthinen (*Undina*). Es sind auch hier die Myomere körperlich erhalten, die Sehnen nicht, sondern durch Furchen angedeutet.

Bei weitem in klarerer Weise stellt Traquair seine Beobachtung dar. Bei der Beschreibung des Rumpfes eines neuen Hypodontiden: *Ctenacanthus costellatus* (vgl. v. Zittel, Handb. der Pal. III S. 66) aus der Kohlenformation Englands erwähnt er Folgendes: „... man sieht weiter Massen von schmutzig gelblich-weissem Material, augenscheinlich innerhalb des Chagrins gelegen. U. d. L. zeigt die Oberfläche Fasern, welche hauptsächlich parallel der Körperaxe verlaufen; weiter sind sie durch untereinander parallele, schief gerichtete Septa durchschnitten. So sind zum Beispiel hinter dem Schultergürtel sechs solcher Septa zu sehen und ebenso zwischen den beiden Rückenstacheln nahe der Rückenkante, wo sie auch in der Nähe des zweiten Stachels einen Zickzackverlauf zeigen. Könnten diese Massen wohl fossilisirte Rumpfmuskulatur des Fisches darstellen? Es ist gewiss hierfür von höchstem Interesse, dass mein Freund, Mr. Peach in denselben Ablagerungen im Innern der Schenkelglieder fossiler Skorpione Muskelfasern entdeckt hat.“ (Traquair, On *Ctenacanthus costellatus* Geol. Mag., Dec. III, Vol. I, S. 2).

2. Holocephalen.

Ischyodus (Taf. XXIX, Fig. 2).

Dies ist die der lebenden *Chimaera* am nächsten stehende, verbreitetste Holocephalengattung der jurassischen Ablagerungen.

Die letzten eingehendsten Bearbeitungen derselben finden sich in v. Zittel's Handbuch der Pal., S. 108—110 und in Palaeontographica Bd. XXXIV, Riess: „Ueber einige fossile Chimaeren-Reste im Münch. Pal. Museum“.

An fast allen Exemplaren ist Kopf und Körper in deutlichem Umriss erhalten, welcher bei den schon erwähnten Haien von der Ausdehnung der Chagrinhaut, unterstützt durch die versteinerte Muskulatur, bestimmt wurde.

Die lebenden Holocephalen besitzen kein Chagrinintegument. Riess giebt aber bei *Ischyodus Quenstedti* und *I. avita* ein solches an, welches also als erste Ursache einer im Gestein abgedrückten Umrisslinie des Thierkörpers zu betrachten wäre. Er giebt auch ein mikroskopisches Bild durch diese Chagrinkörner (und zwar solcher vom Kopf), welche zwar einen concentrisch lamellösen Aufbau, aber weder Pulpa noch Dentinröhrchen zeigen. Hierzu muss ich bemerken, dass der lamellöse Aufbau nach meinen Schliffen ausserordentlich unregelmässig, wellig faserig ist und durchaus nicht den kompakten, man möchte sagen „eisernen“ Eindruck von Dentinlamellen macht; vielmehr wird man sogleich an verkalktes Bindegewebe erinnert. Dabei ist es auffällig, dass die von Riess angegebenen localen Reste dieser Chagrinhaut sich nur auf Stellen beschränken, wo Knorpel vorkommt: Craniaalknorpel, Unterkieferknorpel (= „der um den Unterkieferzahn herumgeschlagenen Chagrinhaut“), Schultergürtelknorpel und Tragknorpel der I. Dorsalis (= „Chagrin neben oder hinter der ausgehöhlten Ansatzstelle des Rückenstachels“) und würde dies schon indirekt auf die Kalkprismen des Elasmobranchierknorpels hinweisen. Umgekehrt zeigt die Untersuchung von anderen Knorpeltheilen mit Prismenverkalkung den eigenthümlichen lamellös-faserigen, concentrischen Aufbau, wobei ich gleich bemerken muss, dass in überwiegender Mehrzahl der Fälle in fossilem Zustand die eingeschlossenen Knorpelzellen gänzlich verschwunden sind. Bei der Untersuchung der Prismen von *Xenacanthus*, *Notidanus*, *Aellopus*, *Squatina*, *Spathobatis*, *Ischyodus*, *Chimaeropsis* habe ich nur bei vereinzelt Prismen von *Squatina* und *Aellopus* noch schlecht erhaltene Knorpelzellräume beobachtet. Sonst verhalten sich die Prismen alle so wie die von Riess bei *Ischyodus* gefundenen „Chagrinkörner“. Wir werden auf die Erscheinung

des Verschwindens der Knorpelzellräume und des Hervortretens des cubisch-lamellösen Aufbaus der Kalkprismen im letzten Kapitel noch eingehender zurückkommen. — Uns interessirt hier vorderhand nur die Thatsache, dass die Haut von *Ischyodus* vollständig nackt ist, der Umriss des Kopfes durch Kalkknorpel und der deutlich abgesetzte Umriss des Rumpfes nur durch die verkalkte Muskulatur dargestellt wird.

Besser als die Beobachtung von Riess ist eine viel ältere von Quenstedt, Petrefaktenkunde 1852, S. 292, über das später nach München gekommene Exemplar von *Ischyodus Quenstedti* Wagn.; er berichtet, dass „unter der (vermeintlichen!) Chagrinhaut sich eine dicke steinmarkähnliche Masse befinde, die statt der weichen Fleischtheile zurückgeblieben sei“!

An dem Rumpf des Originalexemplars von *Isch. avita* in v. Zittel's Handbuch l. c. Fig. 123 sind an einzelnen Stellen in der Versteinerungsmasse deutlich die *Myocommata* zu beobachten. Hier ist sogar der Zwischenraum zwischen Kopf und Schultergürtel damit erfüllt und ist besonders die dorsale und ventrale Grenzlinie durch die Verkalkung der Opercularmuskulatur und der vor dem Schultergürtel liegenden dorsalen und ventralen Längsmuskulatur (*Coraco-Arenalis*) deutlich ausgeprägt; am Kopfe sind desgleichen vor dem Auge unterhalb der Schleimkanäle und ausserhalb des von Riess als Chagrin gedeuteten Cranialknorpels, die Reste des grossen Adductoren in gleicher Ausdehnung wie bei der lebenden *Chimaera* zu bemerken.

Bei ersterwähntem Exemplar, das 1,5 m lang ist, beträgt die Dicke der Versteinerungsmasse bis zu 1 cm, bei letzterwähntem 0,6 m langen, sind dieselben nur bis 2 mm stark.

Das Mikroskop zeigt nun in einer zarten Längsbänderung eine sehr deutliche, gleichmässige, in feinen Längsstreifen geordnete Körnelung, welche bedeutend feiner ist, als bei *Squatina*; neben der Körnelung treten einfache, continuirliche Streifen, seltener spaltenartige Linien auf; häufig ist eine spindelförmige Anhäufung von körneligen Längsstreifen um eine mittlere stärkere Körnerreihe oder einen Spalt zu bemerken. Die Querstreifung tritt sehr schön in zarten blassdunkeln Linien oder sehr schwach gekörnelten Streifen auf und erfüllt continuirlich grössere Felder der Präparate.

Daneben tritt sowohl eine gekreuzte dunkle Strichelung,

als auch Körnelung auf; im ersteren Falle sind die dunkeln Streifen continuirlich, im letzteren die hellen. Hier und da sieht man, dass dunkle Körner schlauchartig in der Querrichtung verlängert sind und dann in die Längsrichtung rechtwinkelig umbiegen. Auch hier sind rings von Struktur-zeigenden Flächen umschlossene, durch keine Bänderung abgetheilte, strukturlose, aber gleichmässig gekörnelte Felder anzuführen.

Nimmt man *Chimaera* zum Muster, so wird die erhaltene Muskelmasse etwa $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{4}$ des ursprünglich anzunehmenden Fleisches betragen.

Chimaeropsis paradoxa v. Zittel l. c. S. 113, Fig. 126 und Riess l. c. S. 21, Taf. II und III (Palaeontogr. Bd. XXXIV).

Auch bei dieser Gattung erwähnt Riess, dass die ganze Körperoberfläche und der Kopf mit Chagrin bedeckt sei. Das Original exemplar ist in Körper- und Kopfumrissen ziemlich erhalten. Zum Unterschied von dem ganz nackten *Ischyodus* (und *Chimaera*) findet sich aber hier wirklich eine Chagrinbedeckung und zwar nur hinter dem Schultergürtel. Vor demselben und am Kopf finden sich nur sechs isolirte kleinere Hautplatten und keine Schuppen mehr. Was daher Riess hier als Chagrin erwähnt, ist in Knollen verkalkter Cranial- und Kieferknorpel, deren Struktur sich genau verhält, wie die vermeintlichen Schuppen von *Ischyodus*; die ächten Schuppen von *Chimaeropsis* zeigen deutlich Pulpa, Dentin und verkalkte Basalplatte.

Verkalkte Muskulatur findet sich nun hier, wo sie allein angetroffen werden kann, im Rumpf unter dem Chagrin, am Kopf ausserhalb d. h. auf dem Knorpel; die Muskelreste an letzterem gehören ihrer Lage nach dem Unterkieferadduktoren an. Die im Rumpf befindlichen Theile haben eine Dicke von 0,005 bis 0,007 m. Im Längsbruch zeigen sie auch hier makroskopisch eine grobe, aber dichte Faserung und u. d. M. erscheint die feinste Muskelstruktur. Bei schwacher Längsbänderung zeigen sich spärliche Längsstreifen; dagegen treten grosse Felder schwach körneliger, fast continuirlicher Querstreifung auf, meist in zitterigen Linien und dicht gedrängt. Daneben beobachtet

man auch Kreuzreihen gleicher und ungleicher Körnchen, spindelartige Spalten- und Körneranhäufungen, grosse gleichmässig, aber ungeordnet gekörnelte bis fast helle Felder in allmäligen Uebergängen (Taf. XXIX, Fig. 3 u. 8).

Taf. XXX, Fig. 6 zeigt einen etwas schief durch ein Muskelbündel gelegten Querschliff bei starker Vergrösserung ohne die Körnelung.

3. Ganoiden.

Undina penicillata Mnstr. (vgl. v. Zittel, Hdb. l. c. S. 171).

Unter den Crossopterygiern sind bis jetzt nur die Coelacanthinen (*Undina*) bekannt, welche die Muskelverkalkung, aber auch makroskopisch und mikroskopisch in hervorragender Schönheit zeigen. Zu der in Bd. XXXV der *Palaeontographica* und Eingangs dieses Textes gegebenen Schilderung sei noch erwähnt, dass sowohl die dunkeln Längs- und Querstreifen, die meist continuirlich, aber doch in zitterigen Linien erscheinen, sich auch in gleichmässige und ungleichmässige Körnerreihen auflösen können; Felder oder Bänder mit Querstreifen oder solche mit Längsstreifen sind vorwiegend von einander getrennt. Felder mit regelmässiger körneliger Kreuzstreifung, bei welchen Fasertrennungslinien nur hier und da als kurze Spalten auftreten, fehlen nicht. Oft zeigt sich aber auch bei höherer Einstellung in derselben Faser an derselben Stelle eine Längskörnelung, wo bei tieferer eine quere Anordnung auftritt (Taf. XXIX, Fig. 4).

Die Erscheinung tritt hier nur an der Rumpfmuskulatur, nie, wie ich an zahlreichen Exemplaren beobachten konnte, an der der paarigen und unpaarigen Extremitäten oder der des Kopfes auf. Die Mächtigkeit der Versteinerungsmasse beträgt im Maximalauftreten 0,004—0,005 m.

Taf. XXX, Fig. 5 stellt den Querschliff durch mehrere Muskelbündel dar, welche unmittelbar von den Schuppen bedeckt werden. Es zeigen sich hier inmitten der gekörnelten Faserquerschnitte ganz helle (also im Längsschliff strukturfreie) Querschnitte. Während die gekörnelten Felderchen einen weniger scharf begrenzten aber ringsum regelmässigeren Umriss haben, zeigen sich die hellen

einseitig doch schärfer umgrenzt und bilden grosse zellige Räume zwischen einander, als ob sie durch Contraction von einander gezerzt wären. Dass diese Bildung nur zwei verschiedene Zustände der Fasern bedeuten, scheint zweifellos aus den Uebergängen hervorzugehen. Bemerkenswerth ist, dass nach der Aussenwand des Körpers zu die Fasern heller und ihre Querschnitte kleiner werden. Desgleichen zeigt sich zwischen den einzelnen Bündeln nach dem Spalt zu, welcher der verwesenen Intermuskularsehne entspricht, sowohl eine scharfe Erhellung als auch eine Verschmelzung der einzelnen Fasern; dies ist bei den hellen Fasern überhaupt der Fall, dass sie an einzelnen Stellen ihres Umfangs untrennbar mit einander verschmolzen sind, an den andern aber von den Nachbarfasern durch grössere Zwischenlücken getrennt werden (vgl. auch Taf. 30, Fig. 3).

Unter den *Lepidosteiden* des lithographischen Schiefers zeigen die zum Theil grossen und riesenhaften *Sphaerodonten* (s. v. Zittel l. c. S. 207) fast nichts von der Erscheinung; dagegen die *Saurodonten* (s. v. Zittel S. 112) fast sämtlich, von welchen ich besonders *Pholidophorus* Taf. XXIX, Fig. 9 hervorhebe. Er zeigt eine reizende, in Quer- und Längsreihen geordnete Körnelung; die Körnchen sind ziemlich gleichmässig; kleine Ansammlungen derselben sind local in einer gleichmässig hellen Grundmasse eingestreut.

Ebenso häufig ist die Erscheinung bei dem *Rhynchodontiden* *Aspidorhynchus*, seltener bei *Belonostomus* (vgl. v. Zittel l. c. S. 116). Bei einem Exemplar der ersteren Gattung zeigt sich zwischen den Schuppen in der Bauchgegend aufgeschlossen eine 0,006 m dicke kreidige Masse, welche dünn geschliffen das Bild Fig. 13, Taf. XXIX zeigt. Neben einzelnen mit Punktreihen oder Streifen gekennzeichneten Muskelfasern finden sich scheinbar durcheinander gewirrte kürzere Stücke mit deutlich wellig körneliger Streifung, welche sowohl feiner als gröber auftritt; dies sind hauptsächlich schief durchschnittenen Fasern. An einem zweiten Schliff zeigt sich ein starkes Kreuzkorn, dagegen ist keine eigentliche Querstreifung sichtbar.

Unter den *Pycnodontiden* habe ich keine einzige Gattung mit fossilisirter Muskulatur angetroffen. Bei den ebenso auf Molluskennahrung angewiesenen „*sphaerodonten*“ *Lepidosteiden*

den konnte ich, wie erwähnt, ebenso wenig die Versteinerungsercheinung nachweisen.

Die Amiaden, fast durchgängig Vertebraten-fressende Raubfische zeigen fast allgemein die petrificirte Muskulatur, deren Einzelbeschreibung wieder lohnend ist.

Caturus furcatus Agass. (v. Zittel l. c. S. 227).

Bei den zahlreichen Exemplaren dieses Fisches, welche das Münch. Pal. Institut besitzt, zeigt sich zwar die fossile Muskulatur in sehr wechselndem Auftreten, dagegen auch gerade hier in einer fast constanten Grösse des Maximums desselben. Die Dicke beträgt einseitig im Max. 1,5 mm. Hier ist auch die Muskulatur der unpaaren Flossen in starken Wülsten längs der distalen Enden der Flossenträger erhalten; sogar Theile der Kaumuskeln lassen sich erkennen.

Die Farbe des Versteinerungsmaterials ist meistens ausnehmend weiss, wie fossiles Elfenbein oder gebleichte Knochen; das mikroskopische Bild (Taf. XXIX, Fig. 12) ist ein ausserordentlich wechselndes und es tritt die Längs- und Querstreifung in gleich deutlicher Weise auf, wenn sie auch meist auf verschiedene Felder vertheilt sind. Sehr scharfe, spaltenartige Streifen treten unregelmässig in einem dichten Gedränge mit feinen, eng und gleichmässig auf die Breite einer Faser vertheilten, zart-dunkeln Streifchen auf. Die Fasern selbst sind besonders bei vorhandener Querstreifung ausserordentlich deutlich getrennt. — Statt einfacher Streifen sind auch in Körnchen aufgelöste, grob granulirte Reihen vorhanden; stellenweise häufen sich die Granulationen und bilden mit querangeordneten Körnchen dunkle Butzen mit Kreuzkorn. Es verschwinden aber auch die Fasertrennungslinien und dann zeigen sich weite Felder mit gleichmässiger Körnelung, in welchen auch stellenweise eine vereinzelte Längs- und Querstreifung, schliesslich auch eine ordnungslose Punktirung zu erkennen ist. Die eine dieser Formen geht in die andere über, und wenn selbst inmitten heller Flächen einzelne Felderchen mit Kreuzstrichelung zu bemerken sind, so sind ihre Componenten doch fast immer parallel oder nahezu parallel mit einander; ein Beweis für die Einheit der Versteinerungsmasse.

Die Querstreifung ist an den verschiedenen Präparaten

wechselnd; wo sie auftritt, ist sie sehr regelmässig, erfüllt entweder die ganze Breite der Fasern oder tritt nur in der Mitte auf; oft zeigt sich eine wellige Biegung oder auch eine einfache Concavität, welche in vielen benachbarten Fasern gleichsinnig ist. Die dunkeln und hellen Streifen sind in den Fällen schönster Deutlichkeit nahezu gleich breit, wenngleich die helleren stets etwas breiter erscheinen.

Die hellen Streifen sind durchaus continuirlich; die dunkleren aber sind nicht homogen; in ihrer Fortsetzung finden, besonders bei den Längsstreifen, auch die gröberen Unterbrechungen der Substanz statt, wobei sich grosse Poren oder gar schwachblasige Erweiterungen zeigen. In der Fortsetzung der dunklen Streifung treten auch scharfe Spalten auf; die dunklen Streifen werden auch hier wie bei *Notidanus* durch die Infiltration mit leichtflüssigem Canadabalsam stellenweise ganz unsichtbar.

Hypsocormus insignis Wagn. (s. v. Zittel l. c. S. 225).

Die zwischen den Schuppen und dem Skelet befindlichen, gelblichen bis weisslichen Massen sind brüchig-faserig und zeigen unter dem Mikroskop Taf. XXIX, Fig. 11 ziemlich die gleichen Erscheinungen, wie sie von *Caturus* beschrieben sind. Die durchschnittlich denen von *Caturus* gleich breiten Fasern zeigen ganz besonders schön die an Stärke ab- und zunehmenden dunkeln Körnerreihen, welche bei tieferer Einstellung sich sämmtlich erhellen; daneben zeigen sich auch scharfgezogene, aber zart dunkle Streifchen bis zur äussersten Feinheit. Die Querstreifung ist zart und schleierartig. Beide Arten sind felderweise von einander getrennt. Der Querschnitt zeigt sowohl regelmässige Felderung als auch Bilder, wie wir sie von *Undina* beschrieben haben.

Sauropsis longimanus Ag. (s. v. Zittel l. c. S. 276).

Ein Querbruch durch den Körper zeigt zwischen den Schuppen eine $2\frac{1}{2}$ mm dicke weissliche, sehr harte Masse, welche die Anhangsgebilde der hier noch knorpeligen Wirbelsäule umgiebt. Der Durchschnitt der Neurapophyse liegt genau in der Mitte der Masse, die Durchschnitte der Rippen sind der Mediane mehr genähert als den

Schuppen. Die Masse liegt also überwiegend an der Stelle, wo Muskulatur sich vorfindet. U. d. M. ist eine gleichmässige Körnelung Taf. XXIX, Fig. 5 in sonst heller Grundmasse zu beobachten; häufig zeigt sich in derselben eine vorwiegende Längsanordnung und stellenweise eine schwächer ausgesprochene, dazu senkrechte Querreihung.

Callopterus Agassizi Thiollière (v. Zittel l. c. S. 230).

Der Körper dieser im lithographischen Schiefer nicht sehr häufigen grossen Fische (bis 1 m lang) ist in den vorliegenden Exemplaren dem Umriss nach scharf vom Gestein abgehoben. Nach den verschiedenen Autoren soll er einmal nackt, ein andermal „wahrscheinlich mit sehr dünnen Schuppen bedeckt sein“.

Nach meinen Untersuchungen ist der Körper nackt bis auf den oberen und zum Theil unteren Schwanzlappen; wie man das auch von Chondrostiern kennt, dass bei der Reduktion des Schuppenkleides sich im oberen Schwanzlappen die Schuppen am längsten und in ihrer primitivsten Form erhalten.

Die Ansicht, dass der übrige Körper mit sehr zarten Schuppen bedeckt sein soll, rührt von der feinstreifigen Oberfläche der erhaltenen Muskulatur her, welche auch sehr scharf den Körperumriss darstellt (vgl. Taf. XXX, Fig. 1, in $\frac{2}{3}$ nat. Gr.).

Die Dicke der erhaltenen Substanz beträgt einerseits 2,5—2 mm; es ist eine fast continuirliche, fein gestreifte Masse, deren Streifung hauptsächlich parallel der Körperaxe und untergeordnet den Spinalfortsätzen verläuft (vgl. Fig. 1, Taf. XXX). Die Myomere der linken Seite sind fast bis zur Rückenkante abgehoben und man sieht auf die mediale Fläche der Myomere der rechten Seite, welche unter den Dornfortsätzen hinzieht. Unter den vorderen Wirbeln machen sich die nach hinten aufsteigenden Furchen der Intermuskularsepten schwach bemerkbar; man sieht hier zwar keine tiefen Furchen, wie bei Coelacanthinen, doch erkennt man die hintere Ueberschiebungsgrenze, längs welcher die hintersten dünnen, sich zerfasernden Theile eines Myomers sich auf das vorne kompaktere darauffolgende Myomer auflagern.

Das mikroskopische Bild ist ein äusserst liebliches. Man sieht Taf. XXIX, Fig. 7 sowohl auf weite Felder schönster Querstreifung fast ohne jede Fasertrennung, welche nur dadurch

zu erkennen ist, dass sehr häufig die Querstreifung weithin in einem Sinne concav liniert ist und so jedesmal mit einer neuen Einbiegung eine andere Faser beginnt; oft werden die continuirlichen Streifen nach der Fasertrennung zu in kleine Körnchen aufgelöst. Die Längsstreifen fehlen hier in der sonst zu beobachtenden Deutlichkeit; es ziehen nur senkrecht zu der so scharfen Querstreifung mehr oder weniger breite, schwachdunkle, kaum in Körnchen aufzulösende, nicht scharf begrenzte, schattenartige Streifen über die Präparate.

Die Querstreifen sind bei aller Schärfe nur selten continuirlich; sehr eng gereichte dunkle Stäbchen und Punkte machen den Eindruck dunkler Linien, die mit unsicherer, zitternder Hand gezogen sind. Die Streifen stehen sehr dicht. Spindelförmige Spalten und Körneranhäufungen sind selten. Der Querschleiff zeigt hier die unregelmässig polygonal-rundliche Felderung ungleichmässiger Faserquerschnitte, wie wir sie von *Undina* und *Hypsocormus* erwähnt haben, natürlich seltener, doch ist sie trotz der Regelmässigkeit der Erhaltung der Fasern auch hier zu beobachten.

Agassizia titania Wagner (s. Zittel l. c. S. 226).

Von diesem interessanten, bis zu 2 m langen Fisch aus dem lithographischen Schiefer existirt ein Exemplar in der Dresdener und zwei in der Münchener Sammlung. Auf das erstere hat B. Vetter (Mittheil. aus dem kgl. geol.-min.-prähist. Museum in Dresden 1881) das neue Genus *Agassizia* wohl begründet.

Bezüglich des Schuppenkleides bemerkt der Autor Folgendes; erstens lange und ausnahmsweise schmale Schuppen, zweitens an anderen Stellen eine Skulptur dieser Schuppen, die ihm hier einen zweifelhaften und unsicheren Umriss zu haben scheinen, in „zahlreichen, ziemlich stark vorragenden, gerade oder sanft geschwungenen Leisten“; „diese Leisten, welche am Hinterrand wahrscheinlich in feine Spitzen oder Zacken auslaufen, scheinen sich aber sehr leicht von ihrer Unterlage abzulösen, denn überall findet man sie in Gestalt mehr oder weniger durch einander gewirrter, verbogener oder geknickter Fasern oder Streifen, oft auch büschelförmig gruppiert auf der Oberfläche zerstreut, so dass es auf den ersten Blick aus-

sieht, als ob das Thier ein aus kurzen groben filzigen Haaren bestehendes Fell besessen hätte“. „Das Schuppenkleid hat sich nur noch zwischen den Rippen und Dornfortsätzen erhalten. Von der Seitenlinie ist keine Spur zu sehen, dagegen macht sich von der Gegend der Rückenflosse an längs den distalen Enden der oberen und unteren Dornfortsätze in kürzeren Strecken auch längs der Chorda je eine Reihe eigenthümlicher senkrechter oder schwach nach vorne convexer flacher Wülste bemerkbar (an Zahl den Körpersegmenten genau entsprechend), auf deren Wölbung fast stets longitudinal, also auf der Längsdimension des Wulstes senkrecht verlaufende Schuppen zu erkennen sind. Es ist dies um so auffallender, als wie gesagt, die Schuppen sonst gerade an den von innen vorgetriebenen Stellen fehlen (auf den Rippen), weshalb man auch hier nicht daran denken kann, die Wülste als Folge von krampfhafter Zusammenziehung kurzer Muskelbündel anzusehen.“

Diese ausgezeichneten Beobachtungen, die den Forscher der Lösung so nahe brachten, zu der ihm aber der Schlüssel fehlte, würden, auch wenn ich das Original nicht gesehen hätte, mir keinen Zweifel gestatten, dass der oberflächliche Filz der vermeintlichen Schuppen und das segmentale wulstige Auftreten derselben der Muskelverkalkung angehören. Auch die Münchener Exemplare zeigen dieselbe deutlich und lassen keine Zweifel aufkommen.

U. d. M. zeigt sich in sehr dünnen Schliffen das feinste Kreuzkorn mit stellenweise deutlicherem Hervortreten der Längsstreifung und Bänderung mit gleichbleibender Breite; sonst tritt überall eine äusserst gleichmässige Granulirung auf. Der Querschnitt zeigt öfter ein schöneres Bild der eigentlichen Faserung, indem hier die Fasertrennungslinien eine Felderung ovaler Querschnitte hervorrufen.

Einer weiteren Erscheinung muss ich hier gedenken; eines der Münchener Original Exemplare zeigt eine unmittelbar hinter dem Kopf beginnende, deutlich von den oberen Dornfortsätzen an mehreren Stellen überlagerte, sich nach hinten etwas verjüngende stabartige Einlagerung von wirklicher Versteinerungsmasse; obere und untere Grenzlinie sind sehr scharf ausgeprägt und durchaus regelmässig. Das Skelet ist nicht ganz ungestört, doch lässt sich der Stab bis ungefähr zum Ende der Leibeshöhle ver-

folgen. Quer- und Längsschliffe zeigen eine deutlich regelmässige Faserung und feinste Granulirung der Masse, es ist keine Frage, dass hier eine Gewebeversteinerung vorliegt. Da ein Querschliff senkrecht zur Längsrichtung des Stabes stellenweise eine zu dieser senkrechte Faserung ergibt, so wäre die Möglichkeit vorhanden, dass hier eine bilateral zusammengedrückte, theilweise circuläre oder auch radiale Faserung vorliegt. Da die Struktur nicht ganz typische Muskelstruktur ist, so könnte sie vielleicht einem anderen nahe verwandten und ähnlich gefügten Gewebe angehören und es würde diesen histologischen Daten nicht widersprechen, wenn man nach dem morphologischen Befund den Stab als petrificirtes Rückenmark erklärte; durchaus unzweideutig ist diese Annahme nicht, wohl aber ausserordentlich wahrscheinlich. Die Versteinerungsmasse hat stellenweise eine Dicke von 5 mm; sie zeigt rein muscheligen Bruch und hat eine feine weisse Farbe.

Eurycormus insignis Wagner (s. v. Zittel l. c. S. 231).

Der in allen zur Untersuchung vorgelegenen Exemplaren mit den Schuppen erhaltene kleine Fisch zeigt an den meisten Bruchstellen zwischen denselben eine 3—3 $\frac{1}{4}$ mm dicke weisse Masse, durch welche Fig. 1 Taf. XXXI einen Querschliff darstellt.

Es ist der Schliff fast senkrecht zu der Körperaxe gelegt, so dass zwei hinter einander liegende Rippenpaare in einem nur wenig nach vorne und ventralwärts schiefen Durchschnitt getroffen wurden und so über einander liegen. Aussen erkennt man die Durchschnitte sich überschiebender Flankenschuppen. An beiden Seiten im Innern erkennt man längliche Felder mit einer inneren mosaikartigen, unregelmässig rundlich-polygonalen Kleinfelderung. Diese Theilfelderchen sind durch unregelmässige, nicht sehr schmale, dunkle Linien von einander getrennt und zeigen innerhalb (besonders unten links im Präparat) eine sehr schöne gleichmässige Punktirung, welche sich beim Auf- und Niederschrauben des Tubus als die optischen Endpunkte längerer, dunkler, spaltenartiger Linien zu erkennen geben. Wir haben hier Querschnitte durch sehr regelmässig erhaltene, wenig gedrückte Muskelbündel vor uns, innerhalb deren die kleineren hellen

Mosaikfelderchen den Querschnitten der Fasern entsprechen, deren Punktirung und kurze Liniirung den mehr quer, bezw. mehr schief getroffenen dunkelen Längsstreifen zuzuschreiben ist. Zwischen diesen reinen Querschnitten durch Muskelbündel treten auch schiefe Längsschnitte durch dieselben auf; sie zeigen neben gröberen, spaltenartigen Linien eine sehr feine gleichmässige Liniirung mit nur schwacher Körnelung. Doch finden sich auch Körnerreihen, wie bei *Hypsocormus* und stellenweise ist eine feine Querstreifung zu bemerken.

Diese längs und quer getroffenen Muskellagen liegen hauptsächlich zwischen den Schuppen und Rippen; doch ist auch noch der Streifen zwischen den Rippen der Muskelverkalkung angehörig und es ist die Grenze zwischen lateralen Hälften optisch nicht zu erkennen (vgl. *Callopterus* und *Sauropsis*). Aus den verschiedensten Stellen des Präparats geht hervor, dass auch diese mediane, an mehreren Stellen strukturlose, an andern dunkelbutzige Masse der Versteinerung des Fleisches zuzuschreiben ist.

Es wird dies dadurch zu erklären sein, dass nach der Fäulniss der der Leibeshöhle angehörigen Organe, doch noch nicht die festen sehnigen Verbindungen der Rippen mit der Wirbelsäule aufgelöst waren und die noch weiche plastische Muskelmasse sich durch ihr eignes Gewicht auf der Innenseite der Rippen sammelte. Zu bemerken ist noch, dass zwischen den beträchtlich entfernten Schuppen eine der Versteinerungsmasse der Muskulatur ganz gleiche Füllmasse gelagert ist. Es zeigt diese Masse scheinbare Strukturstreifen, die an einigen Stellen deutlich dem Unterrand der Schuppenquerschnitte nahezu parallel laufen. Man könnte hierbei vielleicht an Verkalkungen der untersten vital nicht verknöcherten Lagen der Cutis denken. Doch ist diese Bestimmung einstweilen viel zu gewagt und bedarf es weiterer eingehender Untersuchungen zur Ermittlung untrüglicherer Kennzeichen.

Megalurus altivelis Wagner (s. v. Zittel l. c. S. 233).

Bei diesem, der lebenden *Amia calva* nächstverwandten Fisch (von Sohnhofen) ist die Erscheinung wegen der Dünnhheit der Schuppen schon von aussen durch letztere hindurch zu

beobachten. Die Streifung ist eine äusserst feine; die Versteinerungsmasse selbst hat eine Dicke von 1,5—2 mm.

U. d. M. zeigt dieselbe eine scharfe Längsspaltung in deutlich getrennte Fasern, welche sowohl eine feine, zart granulirte Längs- und Querstreifung zeigen, als auch eine regelmässige Anordnung gleichmässiger Körnchen in den jenen entsprechenden Richtungen; seltener ist eine ganz grobe Granulirung innerhalb der Fasern zu bemerken, welche gelegentlich in langen Reihen grösserer Körner auftritt. Auch sah ich hier mehrmals, was sonst nicht zu beobachten ist, dass (statt der feineren dichtgedrängten Querstreifen) in grösseren, jedoch ziemlich gleichmässigen Abständen, Querreihen grösserer blasiger Poren auftreten, wie es bei der Längsstreifung sehr häufig ist. Die Struktur ähnelt sonst ausserordentlich derjenigen von *Hypsocormus*, *Caturus* und *Eurycormus*.

Taf. XXX, Fig. 2 stellt den Querschliiff durch einen randlichen Theil eines Muskelbündels dar, in welchem eine äussere Zone sich leicht von einer inneren unterscheidet. Die Querschnitte durch die Muskelfasern in letzterem Abschnitt sind eng und dicht punktirt, die Trennungslinien nicht durch Furchen, sondern durch glashelle Substanz angedeutet. In ganz gleicher Weise tritt dies wie am Rande der Fasern, so auch am Rande ganzer Muskelbündel auf, dass die Substanz der Fibrillen ringsum zu einer glashellen Masse verschmolzen ist, welche mit der randlichen der Gegenfasern oder Gegenbündel ebenso einheitlich verbunden ist und nur seltener die Furchen der verschwundenen bindegewebigen Trennungswände noch erhalten zeigt (vgl. Fig. 5, Taf. XXX). Der äussere Theil des Querschnittes zeigt nun im Gegensatz hierzu, wie bei *Undina* oben beschrieben, grosse zellige Lücken zwischen den einzelnen Fasern, die einseitig und stellenweise ganz mit einander verschmolzen sind; zugleich sind die Fasern fast ganz glasighell, zeigen fast keine Struktur, wie auch ihr Querschnitt ein unregelmässiger ist. Auch im Längsschliiff zeigen dergleichen Fasern fast keine Struktur, unregelmässige (meist geringere) Breite und zerbröckeln ausserordentlich leicht; das Bild macht den Eindruck von einseitig verschmolzenen und anderseitig durch Kontraktion scheinbar auseinander gezerzten Fasern.

4. Teleostier. (Vgl. v. Zittel, Bd. III, S. 272.)

Unter allen Vertretern derselben aus den verschiedensten Ablagerungen zeigen die jurassischen *Thrissops* und *Leptolepis* noch am deutlichsten die verkalkte Muskulatur; sie bildet eine dünne, 0,5—1,0 mm dicke Lage zwischen den Schuppen, welche man nur zur Ansicht bringen kann, wenn man die Schuppen beiderseits abschleift. U. d. M. zeigt sich eine durch scharfe Spalten abgetheilte Masse, in welcher an einzelnen Stellen deutliche Quer- und Längsstreifung erhalten ist.

II. Reptilien.

(Vgl. v. Zittel, l. c. Bd. III, S. 589—591 und S. 451—473.)

Von den dieser Classe von Wirbelthieren zugehörigen Vertretern habe ich makroskopisch der Muskelverkalkung vergleichbare Massen nur bei *Anguisosaurus Goldfussi* Mnstr. (Lith. Schiefer) untersucht. Von diesen bemerkte schon Hermann v. Meyer (Beiträge zur Petrefaktenkunde Deutschlands Bd. I. S. 56): „Der Raum innerhalb der Grenze des Skelets ist mit einer etwas weisseren, zarteren Masse, als die der Schieferplatte ausgefüllt. Sie vertritt, wie ich dies auch bei anderen Sauriern gefunden habe, den weichen Körpertheil des Thieres.“

U. d. M. zeigt diese Masse eine zarte Längsstreifung oder Kreuzkörnelung und stellenweise auch eine Querstreifung, kurz typische Muskelstruktur, welche aber zu besonderen Bemerkungen keine Veranlassung giebt.

Gleichzeitig mit meiner mikroskopischen Entdeckung der Muskelstruktur bei *Coelacanthinen* hat sich auch Dr. E. Fraas in Stuttgart mit der histologischen Untersuchung der in einer augenfälligen Versteinerungsmasse erhaltenen Weichtheile einer Flosse von *Ichthyosaurus* (wie solche schon Buckland und Owen veröffentlicht haben) beschäftigt. Er kommt zu der histologischen Unterscheidung einer Epidermis, Cutis und einer subcutanen Muskelmasse. Von Letzterer sagt Fraas (Jahresh. für vaterländ. Naturkunde in Württemberg 1888, S. 293): „Die helle, durchsichtige und ungefärbte Masse im innern Theil der Falte mag von der Fleischsubstanz herrühren, jetzt besteht aber die

Materie nur noch aus feinem körnigen Kalk, welcher die Fleischsubstanz infiltrirt und dadurch deren Struktur zerstört hat.“ — Es ist möglich, dass diese Masse der Muskelverkalkung angehört und zwar schliesse ich dies aus Folgendem. Fraas glaubt „mit Sicherheit“ in zwei randlich gelegenen, hellen und dunkeln Schichten seiner Präparate eine Cutis und Epidermis annehmen zu dürfen, von denen die gefärbte Lage die Cutis repräsentire, deren Färbung „in der That von Pigmentzellen“ herrühre, die bei einem Flächenschliff in langen, gleich breiten Bändern angeordnet sind. „Auf der Cutis lagert die pigmentfreie Epidermis. In der subcutanen Muskelschicht . . . zeigen . . . sich deutlich die Conturen der zahlreichen Canäle, welche sie durchsetzen und welche ihr einen grobmaschigen Habitus verleihen.“ Fraas vergleicht dies mit dem subcutanen Gewebe der Schwarte der See-säugethiere. Schliesslich erwähnt Fraas verhornte Epidermisgebilde mit einem Maschennetz, welches den „Zellwandungen des verhornten Pflasterepithels der Stratum corneum“ entsprechen soll.

Da Herr Dr. Fraas mir freundlicher Weise seine Präparate einmal gezeigt hat, so kann ich mir über dieselben ein Urtheil erlauben; ich bin mit keiner dieser Deutungen einverstanden. Die in „Reihen geordneten Pigmentzellen der Cutis“ halte ich für einen Längsschnitt durch die Muskelsubstanz, deren Fasern etwas infiltrirt sind (l. c., Taf. VII. Fig. 3); Fig. 2 halte ich nicht für Querschnitte durch die gefältelte Haut, sondern für Querschnitte durch gröbere Muskelbündel und was Fig. 4 betrifft (verhorntes Pflasterepithel), so kann ich auch nur sagen, dass ich ganz ähnliche Bilder bei Querschnitten durch Muskelbündel von *Megalurus*, *Eurycormus*, *Notidanus*, *Chimaeropsis* und *Undina* erhalten habe (vgl. Fig. 2—6 Taf. XXX). Die mit diesen continuirlich verbundene, helle, innere Kalkmasse, welche ohne Struktur ist, wird daher wohl auch der Muskelverkalkung zuzuschreiben sein. Die äusserliche Verschiedenheit dieser einzelnen Bilder zeigt sich genau ebenso innerhalb des einheitlichen Muskelgewebes bei Fischen als eine Verschiedenheit innerhalb der weiten Grenzen der Variabilität der Versteinerungsart der Muskulatur und es kann nach meinen Erfahrungen allein hierauf eine Unterscheidung von Epidermis, Cutis und subcutanem Gewebe nicht aufgestellt werden. Wir müssen daher Fraas widersprechen,

wenn er meint, die Muskelstruktur sei durch die Kalkinfiltration zerstört und sehen die erhaltene Struktur eben in dem, was er Epidermis, Hornschuppen und pigmentirte Cutis nennt (vgl. unten letztes Capitel).

In der paläontologischen Staats-Sammlung in München ist nun auch eine wunderbar erhaltene Schwanzflosse von *Ichthyosaurus* ausgestellt, wo aber petrificirte Muskulatur nur längs des abgekrümmten Theiles der Wirbelsäule zu bemerken ist; der übrige Umriß der Flosse ist gebildet durch einen ganz schwachen, vom Gestein nicht zu trennenden Niederschlag, in welchem zahlreiche Kalkspathknöllchen ankrystallisirt sind, die offenbar dem Niederschlag angehören. Auch diese Erscheinung muss nach unsern jetzigen Erfahrungen nicht einer Cutiserhaltung zugeschrieben werden, sondern kann ebensowohl von undifferenzirtem Bindegewebe zwischen den beiderseitigen Cutislagen abgeleitet werden, wie solches in gallertiger Consistenz mit eingestreuten elastischen Fasern die Axenebene der Flossenlappen der Knorpelfische bildet und besonders stark in der *Caudalis ventralis* entwickelt ist.

Zur mikroskopischen Untersuchung sind leider an dem genannten Exemplar in München die Niederschläge von Versteinerungsmaterial viel zu schwach.

Da vor Kurzem ein vollständig erhaltener *Ichthyosaurus* mit wohl petrificirten Weichtheilen vom Stuttgarter Hof-Naturalien-Cabinet erworben worden ist (vgl. Jahrbuch für Mineralogie 1892. II. S. 88), so wird demnächst eine eingehende Bearbeitung der Histologie der erhaltenen Theile zu erwarten sein; nach der vorläufigen Mittheilung über diesen Fund scheint Fraas an der Deutung der Hornsubstanz festzuhalten.

III. Cephalopoden.

Ueber die makroskopische Erscheinung der Verkalkung des Mantels derselben haben wir schon in der Einleitung Einiges gesagt und wer in v. Münster, Beiträge zur Petrefaktenkunde Deutschlands, Heft VII. 1846 und in v. Quenstedt: Cephalopoden die schönen Tafeln ansieht, erhält sofort den Eindruck, dass die fossilen Ueberreste die vollständige, körperliche Wiedergabe der muskulösen Theile des Weichkörpers darstellen.

Von den Belemniten (vgl. v. Zittel l. c. 495) scheint

nur der von Huxley beschriebene *Belemnites Bruguierianus* Moll. (vgl. v. Zittel, I. Bd. S. 498) mit deutlichem Körperabdruck auch Muskelverkalkungen besessen zu haben.

Von *Belemnoteuthiden* (vgl. v. Zittel l. c. S. 510) theilt dieselbe, wie Eingangs erwähnt wurde, Owen mit, wobei auch die vorzügliche Erhaltung anderer Theile, z. B. der Augen (wahrscheinlich nur der äquatorial verdickten Augenknorpel) zur Darstellung kam.

Die jurassischen *Chondrophoren*, besonders die Vertreter im lithographischen Schiefer (*Trachyteuthis*, *Geoteuthis*, *Leptoteuthis*, *Plesiototeuthis*, vergl. v. Zittel, l. c. Bd. II, S. 515) zeigen nun die verkalkte Muskulatur in ganz besonders schöner Erhaltung und man möchte sagen, fast ausnahmslos.

U. d. M. zeigt die Versteinerungsmasse (vgl. Taf. XXIX Fig. 6 u. 14) entweder ganz helle Bänder von bedeutend geringerer Breite als bei den Fischen oder auch fein gestreifte Bänder, wie häufig die glatten Muskeln niederer Thiere längsgestreift erscheinen. Diese Längsstreifung ist oft sehr fein körnelig entwickelt, besonders an Stellen, wo auch die Grenzen der einzelnen Muskelbänder nur sporadisch auftauchen, wobei letztere gewöhnlich spindelförmig zu- und abnehmen. Einzelne Felder mit diesen Unterschieden sind, wie bei den Fischen, sowohl in Uebergängen da, als sehr scharf getrennt. Wie bei den Fischen finden sich auch Felder mit gleichmässiger Längskörnelung und gleichmässiger ordnungsloser Körnelung, sowie eingestreute Butzen ganz grober Längskörnelung.

Die Richtung der Muskelstreifen ist im Mantel grösstentheils rings (oder quer), doch in verschiedenen Lagen nicht ganz gleich; an einzelnen Stellen beobachtete ich auch eine normale Kreuzung der Fasern, wobei doch die Hauptmasse der Fasern eine Richtung zeigte.

Auch hier liegen nur ausserordentlich geringe Anzeichen einer mechanischen Verwirrung der Fasern vor. Die Versteinerungsmasse scheint im Maximum einen etwas bedeutenderen Bruchtheil der gesammten Muskulatur darzustellen, als er bei Fischen zu verkalken pflegt.

Wenn nun eine Querstreifung innerhalb der Faser nicht zu verlangen ist, weil eine solche auch bei den lebenden Vertretern in der Muskulatur des Mantels nicht beobachtet ist, so zeigen

schon die mitgetheilten Thatsachen in allem eine solche Gleichheit mit der bei den Fischen festgestellten Erscheinung, dass an der Deutung wohl nicht mehr zu zweifeln ist; dass also nicht mehr nur an eine äusserliche Aehnlichkeit gedacht werden kann, sondern in der That das Bild der einzelnen Muskelfasern in allen Einzelheiten im fossilen Zustande dem der lebenden Fasern entspricht.

Im Anschluss an diese Resultate ¹⁾ hat nun Dr. Eb. Fraas ein sehr schön erhaltenes Exemplar von *Geoteuthis* aus dem Lias von Württemberg histologisch untersucht. Zu den schon besprochenen allgemeineren Kennzeichen der Muskulatur hat er noch zwei weitere hinzugefügt, welche die Anordnung des Muskelgewebes betreffen. Im Vergleich mit Schnitten von lebenden Exemplaren hat er eine gefachartige Durchkreuzung der Ringmuskulatur durch mehr radiale Faserstränge, und im Arm hat er ebenfalls eine ähnliche doppelte Anordnung der Faserung festgestellt, welche, wie ich in Bronn²⁾ III, 2. S. 1362 finde, auch bei den lebenden Dibranchiaten zu beobachten ist, dass nämlich nach der Peripherie der Arme hin zwischen den Längsmuskeln in regelmässiger Anordnung Radialfasern auftreten. In den Armen von *Geoteuthis* zeigte sich auch das von R. Owen von Armmuskeln des *Onychoteuthis* abgebildete (vgl. auch Bronn l. c. S. 1364) Verhalten des Faserinhaltes, nach welchem sich die Granulirungen zu rundlichen und eckigen Massen gruppieren und dadurch das Aussehen von Querstreifen hervorbringen.

Es sind dies werthvolle Beiträge zu unserer Deutung der Bildung bei dibranchiaten Cephalopoden, welche so lange in steriler Unsicherheit sich befand und deren Befestigung, wie wir unten sehen werden, zur Erklärung der Erscheinung an und für sich von grossem Werth sein wird.

Von den skeletlosen Octopoden ist *Acanthoteuthis* (vergl. v. Zittel, l. c. Bd. II, S. 520) öfters mit erhaltener Muskulatur im lith. Schiefer gefunden worden; das mikroskopische Bild giebt zu eingehenderen Bemerkungen keinen Anlass; besonders wohl erhalten ist die Muskulatur der Arme.

Was die Erhaltung des Tintenbeutels bei den fossilen

1) Vergl. Sitzungsber. der Gesellsch. für Morphol. u. Physiologie in München 1889.

2) Bronn, Classen und Ordnungen d. Th.

dibranchiaten Decapoden betrifft, so ist bekannt, dass bei den Vertretern in den Schichten des oberen Lias von Schwaben, Franken und England die Tintenbeutel ausserordentlich oft noch mit den Schalen, oft auch isolirt vorkommen. Ihre Erhaltung ist hier nicht an das Auftreten der fossilen Muskulatur geknüpft und es hat auch die schwarze Substanz ihre färbenden Eigenschaften nicht verloren; sie lässt sich zur Bereitung von Tusche verwenden (vgl. unten S. 560). Nicht so verhält es sich mit den Tintenbeuteln der Chondrophoren des lithographischen Schiefers. Hier ist zwar stets eine körperliche Erhaltung gleich zu erkennen, welche der vorher angeführten vollständig entspricht, aber die Substanz, welche das Innere des Beutels erfüllt, ist nicht schwarz, sondern bräunlich weiss. Schleift man die schwarze Substanz aus den Liasschiefern, so erhält man keine durchsichtigen Präparate; erst wenn sie mehrere Tage in der für Kohle angewendeten Bleichflüssigkeit liegen, werden sie bräunlichgelb und erweisen sich als homogene hautartige Lappen, welche im bewegten Wasser flottiren. Die Erfüllung der Tintenbeutel im lithogr. Schiefer besteht aber aus unregelmässigen kugeligen Knöllchen (0,001—0,01 m diam.) von erdiger Beschaffenheit; sie lassen sich leicht zur Durchsichtigkeit schleifen.

U. d. M. zeigen sie Taf. XXXI Fig. 2 eine ausserordentlich gleichmässige Körnelung ohne bestimmte Anordnung im Innern; jedoch finden sich tropfenartig eingestreut rein kugelige, hier und da cylindrisch auslaufende Zusammenballungen dieser Körnchen, welche in grösserer Kleinheit in unregelmässigen Längszügen angehäuft sind¹⁾. Randlich sind die grössten, wie die kleinsten dieser Knollen durch eine schmale periphere Zone von Streifen abgeschlossen, die der Muskelversteinerung sehr ähnlich sieht. Die Masse ist vollständig amorph und verhält sich in einfachem, wie im polarisirten Licht ganz, wie strukturlose Muskelversteinerung. Man muss sie für eine Verkalkung des Inhaltes des Tintenbeutels halten (vgl. unten S. 560).

1) In jeder Beziehung gleiche Kügelchen fand ich in den Hohlräumen der Havers'schen Canäle der Dermalgebilde verschiedener fossilen Fische, in besonders starker Anhäufung bei *Saurichthys*; sie sind hier offenbar Petrificierungsprodukte der Blutflüssigkeit (vgl. unten).

IV. Würmer (Anneliden).

(Vgl. v. Zittel, l. c. Bd. I, S. 565—570).

Die wenigen, ganz sicheren Ueberreste derselben befinden sich hauptsächlich in den lithographischen Schiefen (Eunicites, Fam. Nereiden). Sie sind gewöhnlich angedeutet 1) durch die Kiefer am Kopf und 2) durch die beiderseits erhaltenen, langen Reihen von parapodialen Borsten. Dabei findet sich stets noch eine weisse Kalkmasse, welche die Körperwindungen begleitet und denselben einen deutlichen Umriss verleiht. Von dieser Masse, welche wir schon makroskopisch ohne Zögern als verkalkte Muskulatur erklären können, bemerkt der Monograph der Wurmreste des lithographischen Schiefers Ehlers (Palaeontographica Bd. XVII. S. 145) Folgendes: Am günstigsten für die Erkennung sind die Fälle, wo die Reste des Körpers auf dünnen weissen Platten erhalten sind; dann treten die Stütznadeln in grösster Schärfe hervor. Diese papierdünnen Platten bestehen aus einem äusserst feinkörnigen Kalk, der offenbar in feinsten Schlammung sich um den Körper niederschlug. . . . Wahrscheinlich sind es chemische Vorgänge, welche beim Zergutgehen der thierischen Gewebe, das Ausscheiden eines solch' feinen Kalkschlammes hervorgerufen haben. . . . Meist greifen diese feinen körnigen Ausscheidungen wenig über den Körperabdruck hinaus!“

Unter „Körperabdruck“ ist hier wirklich nur ein Eindruck im Gestein zu verstehen, welcher wohl durch eine schwache Umwallung des Körpers mit Kalkschlamm entstanden ist; er entspricht natürlich nicht genau dem „Körperumriss“, welcher später durch Zusammendrückung der verkalkten Muskulatur hervorgebracht wurde. An einem Exemplar des pal. Museums in München ist sogar die Segmentirung des Hautmuskelschlauches deutlich zu erkennen; Ehlers deutet die Erscheinung unrichtig als Erhaltung der Reste der Chitindecken, welche in der Mitte eines jeden Segmentes am stärksten seien. Am stärksten ist stets die Muskulatur des Kopfes mit dem stets hervorgestülpten Rüssel erhalten, sie zeigt deutliche Faserung.

U. d. M. zeigen diese schon makroskopisch als Muskelverkalkung deutlichen, fast papierdünnen Kalklagen, auch ohne angeschliffen zu werden, in Glycerin oder Canadabalsam eine

ausserordentlich feine Faserung, welche die makroskopische Deutung stützt. Es ist also ein Niederschlag innerhalb des Körpers und nicht, wie Ehlers meint, um denselben und kann nur dem Hautmuskelschlauch und der Kopfmuskulatur entsprechen.

Die Erscheinung ist bei vielen Exemplaren durchaus dieselbe und die Masse der Verkalkung entspricht im Verhältniss zum Hautmuskelschlauch nicht ganz, aber ungefähr dem Maximum der verkalkten Muskulatur bei Fischen und Cephalopoden.

Wenn man dies bedenkt, so hat man auch ein Normalmass der bei Würmern möglichen Verkalkung und es lässt sich hieraus auch ein Schluss auf andere als Wurmreste bezeichnete Körper ziehen, wie *Hirudella*, *Legnódesmus* und *Lumbricaria*. Diese ihrer Gestalt nach zu den Hirudineen und Lumbriciden gerechneten Reste sind massive, lang-wurstförmige Körper von einer anorganischen Masse, welche bei *Hirudella* meist spiegelglatt ist, also die bei *Eunicites* sehr deutliche Muskelfaserung entbehren. Münster erwähnt (Beiträge zur Petrefaktenkunde Bd. V), dass *Hirudella* bei der Fossilisation, wie die meisten Sepienarten, eine braune, dem Tischlerleim ähnliche Masse zurückgelassen habe. Wenn nun die Versteinerungsmasse, welche diejenige der Euniciten um das zehnfache weit übertrifft, dem Hautmuskelschlauch entsprechen (die Masse ist mikroskopisch ohne Struktur und einheitlich) soll, so müsste es einem ungleich grösseren Thiere angehört haben. Eine solche Concentration der versteinernen Masse ist aber ebenso wenig denkbar, als es wahrscheinlich ist, dass sie bei einem Zusammenschnurren auf einen viel kleineren Raum ihre Gestalt beibehält. Es fällt also sonach jeder Grund, diese Körper nach ihrer wurmartigen Gestalt mit Würmern zu vergleichen. Die einzige Deutung, die erlaubt ist, ist nur, dass sie in eben der massiven, wurstförmigen Gestalt geschaffen wurden, als in welcher sie vorliegen; man kann daher nur an Koprolithen denken und zwar bei *Hirudella* an die von Geschöpfen, deren Nahrung knochentragende Lebewesen sind, und welche eine sehr vollkommene breite Auflösung der Knochen derselben im Magen und Enddarm erwirkten — also wohl Vertebraten selbst. Bei *Lumbricaria* werden es Geschöpfe sein, deren Nahrung mehr kleinere Wesen mit Skeleten von kohlensaurem Kalk, als solchen von phosphorsauren Salzen bilden, wie Krebse und Würmer (z. Th.).

V. Zusammenfassung der makroskopischen Erscheinungen.

Bei den Fischen befindet sich die verkalkte Fleischmasse bei vorhandenem Schuppenkleide da, wo sie einzig gefunden werden kann, zwischen den beiden mehr, weniger bilateral zusammengedrückten Hälften desselben. Bei dickschuppigen Ganoiden kommt sie seltener unmittelbar zur Anschauung und nur, wenn eine Flanke ganz abgehoben oder defekt ist. Bei recht dünnschuppigen vermag sie, wie dies nur bei fossilem Material denkbar ist, sogar öfters bis in ihre Einzelheiten durch die Schuppen hindurch beobachtet werden (*Undina*, *Caturus*, *Megalurus*). Bei nackten Fischen (dem jurass. *Holocephalus* *Ischyodus* und dem *Teleostomen Callopterus*), sowie bei den nackten Cephalopoden und Würmern tritt sie, wenn vorhanden, natürlich direkt zur Anschauung und bestimmt mehr oder weniger scharf begrenzt den Körperrumriss.

Was die Fische betrifft, so bilden natürlich bei den nackten wie auch bei dünn beschuppten Gattungen das erste freierkennliche Kriterium der verkalkten Muskulatur die (wegen der Ueberschiebung der Myomere) seltener in tiefen Furchen deutlichen, aber doch mit der Lupe als fein-linienartige Unterbrechungen des Versteinerungsmaterials erkennbaren *Myocommata* und die vorwiegend quer zu denselben verlaufende Streifung (Faserung) der Oberfläche desselben. Seltener ist die Muskulatur im Kiemen- und Kieferskelet, noch seltener in dem der unpaaren Flossen, ganz vereinzelt und schwach in dem der paarigen Flossen erhalten. Von den nackten Reptilien gilt natürlich das Gleiche; hier ist die Muskulatur von Körper und Extremitäten bekannt. Bei den Cephalopoden ist es die ununterbrochene, quer zur Körperaxe verlaufende Streifung, die häufige Dichotomieen zeigt. Auf der Ventralseite liegende Thiere zeigen, wenn ein Schulp vorhanden, denselben natürlich frei. Hier ist nicht nur der Muskelmantel, sondern es sind auch stellenweise, wenn auch selten, die Armmuskeln verkalkt.

Das Aussehen der verkalkten Muskulatur ist das eines sehr feinen dichten Kalks oder Phosphorits; es ist zum Theil kreidig-weiss, häufiger gelblich-weiss und oberflächlich hellbräunlich; es unterscheidet sich in den lithographischen Schieferen in der Farbe sehr wohl von den graulichen Beimischungen der weisslich-gelb-

lichen Schichtgesteine. Der Bruch der Massen ist im Allgemeinen der des Phosphorits, zeigt aber auch häufig seine zoogene Entstehung in einer faserigen oder blätterigen Flächenspaltung; quer ist er stets muschelrig oder elfenbeinartig. Dies schliesst ein, dass die Massen dicht und nicht grob porös sind, wenn auch ihre fein poröse Struktur sich in capillarem Aufsaugen von Flüssigkeiten sehr intensiv und bei den mikroskopischen Präparaten störend zu erkennen giebt. Ihr Gefüge ist selten hart, doch erlangt es bei bestimmten Gattungen Kalkhärte; es ist dasselbe aber sehr gleichförmig und der Einschluss von Fremdkörpern ist sowohl der Natur ihrer Entstehung als der Auffindung nach eine Unmöglichkeit.

Die Dicke der erhaltenen Kalkmuskelmassen ist natürlich sehr wechselnd; wenn man bedenkt, was in der Zusammenfassung der mikroskopischen Erscheinungen betont wird, dass die ganze Kalkmasse räumlich ganz und gar nur den eng aneinandergelagerten Muskelfasern entspricht und nur die Zwischenräume der sehnigen Bindegewebe verschwinden, vielleicht ein unmerkliches Zusammensinken innerhalb der Fasern durch den Verlust des z. B. bei Fischen sehr beträchtlichen Wassergehalts und bei Cephalopoden an leimgebender Substanz stattfindet, so kann man die vorhandene Versteinerungsmasse unbedenklich einer annähernd gleichen Muskelmasse des lebenden Thieres gleichstellen.

Zur Schätzung des in der Versteinerung wirklich erhaltenen Theiles der Muskulatur des verwesten fossilen Thieres ist man natürlich auf ein Circa angewiesen, da man nur wenige jurassische Fischgattungen unmittelbar mit lebenden vergleichen kann (Ischyodus und Chimaera, Megalurus und Amia, Notidanus, Squatina und Spathobatis). Bei solchen aber ist jedenfalls stets nur ein Bruchtheil erhalten, ein wechselndes Maximum von höchstens $\frac{1}{2}$ — $\frac{1}{3}$ einer den Körperverhältnissen und der Verwandtschaft nach geschätzten, hypothetischen Fleischmasse.

Dieses Maximum schwankt bei den einzelnen Gattungen nur wenig und behält ausserdem innerhalb derselben bemerkenswerther Weise eine ziemlich gleichbleibende Grösse. Dasselbe gilt für Cephalopoden und Würmer (Anneliden), zu deren Vergleich man die den fossilen Vertretern ausserordentlich nahe verwandten Loliginiden resp. Euniciden (und Nereiden) herbeiziehen muss. Bei Cephalopoden ist das Verhältniss der versteinerten

Masse durchschnittlich höher als bei Fischen und beträgt etwa $\frac{1}{2}$ — $\frac{2}{3}$ der anzunehmenden Muskelmasse des Mantels. Zu betonen habe ich noch, dass nicht alle Uebergänge von fehlender Fossilisation bis zu dem Maximum bei den einzelnen Vertretern vorhanden sind, dass vielmehr nur schwache Verkalkungen recht selten sind, dass sie, wenn sie aber überhaupt auftreten, dann gleich in einem dem erwähnten Maximum näher liegenden Stadium zu bemerken sind. Schon allein dieser Punkt legt nahe, dass es keine einfachen Kalkausfüllungen des Körperhohlraums verwesender Fische sein können, was hier als verkalkte Muskulatur gedeutet wird. Solche Kalkausfüllungen sind bei klaffenden Muschelschalen und offenen Schneckengehäusen verständlich, nicht aber bei Fischen, Cephalopoden und Würmern mit nackter Haut oder beweglichem, locker gefügtem und bei der Verwesung zusammensinkendem Schuppenkleid, welches bei der Fäulniss der ebenso durch Weichtheile gebildeten Gelenk- und Befestigungswerkes des inneren Skelets zu gleicher Zeit seiner inneren Stützen beraubt wird; die Entstehung von einigermaßen stärkeren, mit Kalk ausfüllbaren Hohlräumen innerhalb eines Fischkörpers ist überhaupt unmöglich.

Zwar giebt es Fisch-Fossile, die „körperlich“ erhalten scheinen; soweit meine Beobachtungen reichen, ist dies im lithographischen Schiefer aber stets nur einseitig der Fall, und ist es eine Erscheinung, die auch für körperliche Erhaltungszustände ganz heterogener Fälle gilt. Der Körper wurde nämlich dann auf der einen Seite sogleich nach dem Niederfallen rundum mit Schlamm umhüllt und hat sich daher die Körperform als Maske darin erhalten. Später wurde die eine Seite concav nach der convexen Seite (nach unten) eingedrückt und bildete noch eine Stütze der Erhaltung der Letzteren. Das gleiche Princip habe ich für die scheinbar körperliche Erhaltung der mit knöchernen, aber elastischen Schuppenwandungen versehenen Schwimmblase der Coelacanthinen klargestellt, von welcher man auch annahm, dass sie mit Kalk erfüllt sei (vergl. Palaeontogr. Bd. XXXV, 1888, S. 8).

Weder ist hier noch bei der einseitig körperlichen Erhaltung der Ichthyofossilien an eine Kalkausfüllung zu denken, noch spielt bei Letzteren die verkalkte Muskulatur eine Rolle.

Bei solchen Kalkausfüllungen sollte man in erster Linie an

die Leibeshöhle denken, man sollte dann annehmen, dass Wirbeln, Rippen und Schuppen nach Verwesung des Fleisches auf einem solchen der Leibeshöhle entsprechenden medianen Kalkkeirn aufliegen würden. Statt dessen ist das Gegentheil der Fall: die knöchernen Anhänge der Wirbelsäule sind durch diese Kalkmassen von den Schuppen getrennt und median (wenn paarig) einander genähert; die Leibeshöhle ist nur noch hie und da durch die zwischen den häufig deutlich getrennten bilateralen Kalkmassen liegenden Erfüllungen des Darmes („Cololithen“ — aus aufgelösten Knochenresten bestehend) angedeutet.

So kann schon die Art der Auffindung der Kalkmassen ohne Strukturbild ausschlaggebend für ihre Deutung sein. Besonders wichtig ist dies natürlich bei nackten Fischen, Cephalopoden und Anneliden, bei denen auch ganz besonders deutlich hervortritt, dass das die Körperform darstellende Versteinerungsmaterial in der grob mineralischen Struktur sich gänzlich von dem Schichtgestein unterscheidet, keine mineralische Continuität mit ihm hat, sich von ihm wie von etwas Heterogenem leicht abblättert, während es mit den Skelettheilen ausserordentlich eng verwebt und verbunden ist, daher als ein chemisch und mechanisch von der Umgebung wesentlich verschiedenes Niederschlagsmaterial innerhalb des Körpers zu betrachten ist.

Wenn wir also auch schon makroskopisch petrifizierte Muskelsubstanz ganz genau bestimmen können, so sind wir in den Stand gesetzt, auch mikroskopisch über Wandlungen oder gänzliche Veränderungen der Struktur Aussagen machen zu können.

Wie wir später sehen werden, kann auch die chemische Untersuchung die mikroskopische und makroskopische Diagnose unterstützen, wenn auch nicht ganz ersetzen.

Zu erwähnen wäre noch, dass auch schon makroskopisch häufig festgestellt werden kann, dass alle ursprünglich sehnigen Trennungsbildungen vollständig geschwunden sind; so verschmelzen sehr häufig die Trennungslinien der Myocommata, die Fleischmassen der beiderseitigen Leibeswände, sowie die dorsale Medianseide der beiden scharf getrennten Hälften der Rumpfmuskulatur mit einander. Dabei nehmen aber die Skelettheile eine Lage ein, welche so normal ist, dass an einen hierbei stattfindenden

starken Druck nicht gedacht werden kann. Ein wesentlicher Druck konnte erst nach vollständiger Erhärtung eingetreten sein.

Gleiche Annahme erfordert die vorzügliche Erhaltung oberflächlicher Streifung bei nackten Thieren. Bei der schon makroskopisch zu folgernden Plasticität der Masse ist die oberflächliche Streifung in ihrer Erhaltung nur durch eine unverhältnissmässig schnelle Erhärtung der Masse zu erklären, nicht einmal durch einen Vorsprung der Erhärtung, welchen die Versteinerungsmasse vor dem umgebenden Sediment voraus hätte.

Der Mangel der Muskelstreifung kann in Gesellschaft mit andern Ueberlegungen ausschlaggebend sein für die Beurtheilung, ob ein einem Organismus ähnlicher, in seiner Versteinerungsmasse sich vom Gestein ebenso abhebender Körper (vgl. Coprolithische Bildungen oder andere Phosphoritknollen) der Versteinerung der Muskulatur angehöre oder nicht; wir haben diesen Fall bei Besprechung einzelner zu den Anneliden gerechneter Fossilien berücksichtigt.

VI. Das mikroskopische Verhalten.

Die Elementarerscheinung ist hierbei die der oberflächlichen makroskopischen Faserung entsprechende grobe Längsbänderung, welche bei den Reptilien und Fischen noch im Innern die Längs- und Querstreifung zeigt. Bei Cephalopoden und Würmern treten solche feineren Details innerhalb der Fasern nicht oder weniger auf. Im Nachfolgenden werden wir zuerst die Einzelheiten der petrificirten Fischmuskeln behandeln.

Die Quer- und Längsstreifung kommen häufiger in grösseren Feldern von einander getrennt, als vermischt vor, so dass es scheint, das Auftreten der einen Art beschränke in gewissem Maasse das extreme Erscheinen der andern Art der Streifung. Die Querstreifung tritt stets nur in kleineren und grösseren Gruppen von gleichmässig entfernten, in sehr kleinen Abständen dicht gereihten Linien auf; die Längsstreifung zeigt sich ausserdem auch in isolirten, weiter auseinanderstehenden Linien; isolirte Querstreifen sah ich nie.

Was nun die Streifung selbst betrifft, so besteht sie aus einer feinen, helldunkeln Liniirung in einer scheinbar einfachen und mineralisch thatsächlich homogenen Versteinerungsmasse. Diese Linienerscheinung beruht nur auf einem streifenweisen Unter-

schied der Ablagerung des Materials; es ist ein Dichteunterschied und zeigt sich optisch, indem bei tieferer Einstellung die vorher dunkeln Streifen auch hell werden und bei raschem Auf- und Niederschrauben ein ganzes Gefirre wechsellnd sich erhellender und abdunkelnder Linien entsteht. Bei der Anwendung stärkster Vergrösserung erkennt man auch die fein-poröse Struktur der dunkeln Linien in reihenweiser Anhäufung dunkler Punkte.

Dies wird ganz besonders deutlich durch Erscheinungen, die im Uebergange und der Fortsetzung, besonders der Längsstreifen zu beobachten sind; es wird nämlich (fast in jedem Streifen ist dies zu beobachten) strichweise die ganze Breite der Streifen von relativ grösseren, deutlich umgrenzten, diskreten dunkeln Punkten eingenommen, die in den Streifen entweder unregelmässig vertheilt sind oder gleichmässig perlsmurartig aufeinander folgen, wobei sie, oben und unten kleiner werdend, in dem dunkeln Streifen verlaufen; häufig communiciren sie auch zu deutlichen kurzen, schlauchartigen Höhlungen (die hie und da grossblasige Erweiterungen zeigen) oder zu ganzen Spalten, die durch unterbrochene quere Brücken (nach Art von Einschnürungen) die poröse Entstehung deutlich kennzeichnen. Alle diese Bildungen werden bei tieferen Einstellungen ganz hell, sind fast immer ohne jede Art von Infiltration und erweisen sich nur als optisch dunkle Unterbrechungen einer mineralisch sonst durchaus homogenen Grundmasse.

Ganz das Gleiche gilt von der Querstreifung, doch überwiegt hier das Vorkommen der fast continuirlichen dunkeln Streifen; ganz selten erkennt man grössere Poren und perlsmurartige Porenreihen, fast nie spaltenartige Querstriche, wie bei der Längsstreifung.

Für alles Erwähnte und noch zu Erwähnende ist der allmälige Uebergang der einen Form in die andere oder auch das allmälige Verschwinden in gleichmässiger, fast strukturloser Helle als Regel zu betonen.

Ich habe erwähnt, dass beide Extreme der Streifung sich auszuschliessen scheinen, doch giebt es eine gemeinsame Form ihres Auftretens: entweder kreuzen sich die dunkeln Streifen oder Spalten und verursachen eine gleichmässige Auflösung der Masse in helle Körnchen oder es zeigt sich das andere Extrem d. h. dunkele Porenreihen kreuzen sich und es tritt in Folge dessen

eine helle Kreuzstreifung ein. Diese Bilder sind am wenigsten scharf und bilden sie meist die Uebergänge zu ganz gleichmässiger, aber nicht mehr in Linien geordneter Körnelung, von da zu ungleichmässiger Körnelung mit in den Fasern eingestreuten, ganz gleichmässig hellen Felderchen.

Wir haben schon oben das gruppenweise Auftreten der Querstreifung erwähnt mit central grösster Deutlichkeit und allmäligen Uebergängen zu anderer Anordnung oder allmählichem Verschwinden jeder Regelmässigkeit. Aehnliches findet bei den groben Spalten- und Porenreihen in der Längsrichtung statt; um central am stärksten entwickelte schaaren sich schwächere in querer Anordnung mit Communicationen und Porenanhäufungen. Da die Längsstreifung die Queranordnung gewissermaassen beschränkt, so sind diese Anhäufungen nicht breit und nach der oben ausgesprochenen Regel der allmäligen Uebergänge entstehen meist recht regelmässig spindelförmige Gruppen von Längsstreifen und Porenreihen, deren grosse Axe in der Längsrichtung der Fasern liegt (Taf. XXIX, Fig. 8, Fig. 10, Fig. 12). Aehnliche Bildungen habe ich in der Querrichtung nie beobachtet, da ja wie erwähnt, grössere Spalten, Porenreihen und unregelmässige Porenanhäufungen in der Querrichtung der Fasern fehlen oder zu grossen Seltenheiten gehören.

Die spindelförmigen Anhäufungen kommen oft in sonst ganz strukturlosen Fasern vor; die Fasertrennung wäre aber auch allein bei dem Fehlen auch aller Anzeichen von einer Quer- und Längsliniirung Beweis genug für die Entstehung der Versteinerungsmasse. Ja! der Gegensatz der Struktur, die unregelmässigste Körnelung innerhalb der Fasern behält hierfür ihren Werth, besonders wenn sie sich optisch der regelmässigen Körnelung gleichgebildet erweist, d. h. als poröse Unterbrechung der Grundsubstanz und nicht als körnige Einstreuung eines andern fremden Materials erscheint. Mineralogisch wäre ein Vorkommen solcher mikroskopischer wohl abgegrenzter Poren in einer so dichten amorphen Masse in Gesteinen sedimentären Ursprungs, in welcher auch unter polarisirtem Lichte keine Bestandtheile erkennbar sind, ein höchst merkwürdiges unerklärliches Vorkommen. Die poröse Beschaffenheit der Struktur lässt sich auch noch aus anderen Erscheinungen schliessen; so lässt das Durchtränken der Präparate mit feinflüssigem Canadabalsam die Struktur häufig

ganz verschwinden. Deckt man andererseits schon durchsichtige Präparate mit erhitztem Balsam, welcher noch Luftblasen entwickelt, aber nach dem Decken bald erhärtet, so füllt sich oft der ganze Schliff mit Luft und erscheint ganz schwarz; durch erneutes Anschleifen erhellt er sich wieder. Auch Färbungsversuche gelangen; endlich lassen Erscheinungen im polarisirten Licht die feine Porosität der dunkeln Streifen erkennen (s. Cap. VII). Die Erscheinung der Fasertrennungen in strukturloser Masse leitet uns über zu dem Erhaltungszustande, in welchem die Fasertrennungen durch wirkliche spaltenartige Linien ganz aufgehoben sind (die Fasertrennung ist überhaupt nie eine vollkommene, sondern stets durch Stellen unterbrochen, an welchen eine Continuität der Fasern in der Quere stattfindet). Dies ist auch bei der schon makroskopisch zu folgernden Plasticität der Massen durchaus nicht zu verwundern und so entstehen die mannigfaltigsten Bilder. Wir finden grosse Felder mit einfacher Querstreifung, welche noch dadurch ihre Bänderung zu erkennen geben, dass entweder nach dem Rande der Faser zu die Streifung sich in eine Körnelung auflöst, oder die Masse ganz hell wird, oder die Querstreifen der benachbarten Fasern gleichsinnig oder entgegengesetzt convex sind, so dass eine neue Faser mit einer neuen Biegung der Querstreifen beginnt. Oft sind die Streifen auch aber so gerade, dass die Grenze der Fasern schwer zu erkennen ist. Wenn hierzu noch vorwiegende Längsstreifung tritt, dann ist es natürlich ganz unmöglich, Fasertrennungen zu erkennen; weiterhin beobachtet man breite Felder mit dunkeler Kreuzstreifung oder Kreuzkörnelung und eingeschlossenen hellen Feldern; endlich ganz unregelmässig gekörnelte Felder mit spindelförmigen Körneranhäufungen (die oft ein dendritisches Aussehen haben) in beinahe strukturloser, heller, selten zwar ganz homogener Versteinerungsmasse. Es ist natürlich, dass solche Versteinerungsarten, die selbst strukturlos, aber in ihrer continuirlichen Fortsetzung doch Träger eines kleinen Anzeichens der Strukturerhaltung sind, nur unter dem gleichen Gesichtspunkt der Versteinerung der Muskulatur betrachtet werden können. Selbst wenn die Struktur ganz fehlte, würden schon allein gewisse Formen der Auffindung im Zusammenhang mit der mineralogisch-optischen und der chemischen Untersuchung ausschlaggebend für ihre Deutung sein können.

Wir erwähnten schon, dass die Versteinerungsmasse ein „Phosphorit“ ist; chemische und mineralogische Untersuchung hierauf könnten daher im Zusammenhang mit dem makroskopischen Befund die mikroskopische Untersuchung vollständig ersetzen.

Wenn wir nun so auch vom mikroskopischen Standpunkt aus feststellen konnten, dass die strukturlosen Felder keine diffus in der Versteinerungsmasse eingesprengten Parteen sedimentären oder rein mineralischen Ursprungs sein können, sondern ebenfalls nur durch die Verkalkung der Muskulatur abgelagert sind, so ist nun noch als Letztes festzustellen, ob diese strukturlosen Parteen durch Einwirkungen der nach der Fossilisation und während der geologischen Perioden wirkenden chemischen oder mechanischen Kräfte vielleicht ihre Struktur verloren haben könnten.

Derartige chemisch-mineralogischen Prozesse müssten von aussen nach innen vorrücken, wovon nichts zu bemerken ist; ihre Wirkungen könnten auch nicht ungleichmässig, diffus in allen Raumrichtungen eingesprengt sein. Solche Wirkungen würden dann auch die Uebergänge von struktur- in nicht strukturzeigende Parteen nicht stets nach demselben Modus aufführen können, wie die verschiedenen strukturführenden Stellen unter sich in einander übergehen. Solche Prozesse würden sich jedenfalls ebenso in der Erweiterung der Hohlräume als in der ausgleichenden Umsetzung der Substanzen und der Zerstörung der kleinsten Poren ausgedrückt haben; man müsste in der Nachbarschaft der strukturlosen Stellen in den Poren und Spalten der Struktur, sowie in mechanischen Spalten Auskrystallisationen oder Infiltrationen beobachten können, wie sie dem Palaeohistologen bei der Untersuchung von Schuppen, Zähnen und Knochen leider nur zu oft entgegentreten. Alles dies ist nicht vorhanden und die fraglichen continuirlich strukturlosen und strukturführenden Stellen sind stets unter sich in allseitiger substanzieller Continuität. Im Falle metamorphischer Einwirkungen auf hydro-chemischem Wege müsste man verlangen, dass die nicht gestreiften Parteen unter allen Umständen eine andere mineralische Zusammensetzung hätten, als die gestreiften und jedenfalls eine stets wechselnde. Statt dessen erkennt man bei Anwendung von polarisirtem Licht zwischen beiden weder einen Unterschied in der Substanz noch in der minerali-

sehen Struktur, die in allen Fällen eine gleichmässig amorphe ist¹⁾.

Wir finden also in dem Wechsel der Struktur nicht die Einwirkungen von etwaigen nach der Ablagerung, Austrocknung und Erhärtung des Versteinerungsmaterials und der umgebenden sedimentären Schicht eingetretenen hydro-chemischen Metamorphosen.

Hiermit ist zugleich ausgesprochen, dass in dem Bilde der fossilen Substanzen das fixirte Bild der in der Verkalkung begriffenen Substanzen zu sehen ist und dies bis zum letzten Augenblick des Processes, bis zum Ende der den Niederschlag bewirkenden Kräfte. In der verkalkenden organischen Substanz waren also schon strukturelose und strukturzeigende Stellen vorhanden, d. h. die Muskulatur war in allen Stadien der Fäulniss, der verwesenden Auflösung des strukturellen Zerfalls der abgestorbenen Fleischmasse begriffen, welche alle möglichen Uebergänge in einander zeigte und als weiches zerfliessendes Magma auch das theilweise Verschwinden der Fasertrennungen bewirkte. Alle die erwähnten mikroskopischen Bilder liefern auch schlecht conservirte, unter dem Deckglas sich weiter zersetzende mikroskopische Präparate von Muskeln; nur zeigen sich unsere Präparate, abgesehen von Mängeln der Herstellung, in der idealen Reinheit mineralischer, durch die Ewigkeit der geologischen Zeitperioden seit Ende der Juraformation von der Beschmutzung aller organischen Beimengungen der Fäulniss geläuterter Strukturbilder, welche Jedermann in Erstaunen setzen.

Wenn also die mikroskopische Erhaltung des Versteinerungsmaterials das Bild der verwesenden Muskulatur mineralogischen Gesichtspunkten nach darstellen muss, so kommt diesen deduktiven Schlüssen auch die Thatsache entgegen, dass Muskulatur in verschiedensten Zuständen der Zersetzung in der That diesem Bild vollständig entspricht. Wir erkennen in diesem Bild nicht nur den Zerfall der abgetödteten Faser in Querscheibchen und Längsfibrillen, sondern auch weitere Formen der Zersetzung, besonders die der Fibrillen in perlschnurartige Körnerreihen und end-

1) Kleinere, nicht unwichtige Ausnahmen, welche aber auf die vorliegende Frage durchaus keinen Bezug haben, werden im nächsten Capitel besprochen werden.

lich das allmälliche Aufzehren dieses körnigen Zerfalls der Fasern von der faulenden Zwischensubstanz aus, welche den weniger differenzirten Theil der Faser ausmacht; (am längsten widerstehen der Zersetzung die Fibrillen selbst).

Man muss also die dunkle Streifung in jeder Form der differenzirten in Quer- und Längsrichtung angeordneten Fibrillensubstanz gleichstellen; die helle Masse, die als Träger der Streifung erscheint, der einfachen Zwischensubstanz.

Da nun die dunkle Streifung einem Dichteunterschied entspricht und nur dem Vorhandensein kleinster und grösserer Poren zu verdanken ist, so ist daraus zu schliessen, dass eben nur die in der Zersetzung begriffene Zwischensubstanz gleichmässig und dicht verkalkt ist; der Vorgang der Struktur-erhaltung ist dann natürlich einfach der, dass die Fibrillensubstanz in jeglicher Anordnung von dieser verkalkenden Substanz in grösserer Dichte umschlossen wurde, und von weiterer Fäulniss auflängere Zeiten hin bewahrt bis zu einer gewissen Festigung der umgebenden Niederschlagsmasse so lange verharrte, bis endlich die eingeschlossenen Fasertheilchen im Verlaufe der geologischen Zeiträume in eben derselben Weise und in eben demselben Maasse sich verflüchtigten, als Unmengen von in die Erdschichten eingeschlossenen Theilchen organischer Substanzen spurlos aus denselben verschwinden¹⁾.

Wenn es also die der vollständigen Fäulniss entgegengehende oder in ihr begriffene Masse der Zwischensubstanz ist, die verkalkt und in deren Fäulniss die Fibrillen allmählich herein-

1) Wir werden unten wahrscheinlich machen, dass nicht nur die fibrilläre Substanz von der Verkalkung umschlossen wurde, sondern dass in die ganze die Zwischensubstanz räumlich ersetzende anorganische Masse durch den Verkalkungsprocess selbst organische Materie in ähnlicher Weise und ähnlicher Modification einbezogen werden musste, in welchen sie bei allen organischen Verkalkungen als deren „Gerüstsubstanz“ aus dem der Verkalkung ausgesetzten Protoplasma eliminiert wird. Solche Gerüstsubstanzen, so verschiedentlich sie auch seien, haben alle eine grössere Widerstandsfähigkeit gegen Zersetzung, als das Zelleneiweiss selbst; nur dadurch endlich kann die oben gerühmte ideale Ungestörtheit des foss. Muskelbildes erklärt werden.

gezogen werden, so ist nicht zu verlangen, dass überall bei Muskelverkalkungen von Individuen einer Art die Struktur dieselbe ist, dass ein Individuum sie genau in der Weise zeigt, wie das andere; vielmehr ist es natürlich, dass sie bei dem einen vorhanden ist, bei dem anderen nicht und dass zwischen diesen beiden Extremen die Verkalkungsmasse in den verschiedensten Stadien der Erhaltung der Struktur auftreten kann.

Diese Schärfe des Resultats konnte natürlich das mikroskopische Bild der Muskulatur der Cephalopoden und Würmer nicht bieten, wenn auch bei ersteren starke Spuren einer continuirlichen und zart-körnigen Längsstreifung und schwache Anzeichen einer queren Anordnung auf gleiche Ursachen einer nicht sehr entschieden ausgesprochenen Struktur der lebenden Muskelfasern hinweisen. Die Verkalkung ergreift hier in bedeutend umfassenderem Maasse die ganze Muskelfaser. Die Unterschiede und Uebergänge der Erhaltung derselben zeigen auch hier, dass die Verkalkung in verschiedenen Stadien der Fäulniss stattfand.

Der Querschnitt durch die Muskelbündel, welcher auch schon die cubische Ausdehnung der einzelnen Fasern zeigt, lässt beim Zerfliessen der Fasern auch nur gleichmässig granulirte Felder erkennen, in welchen man natürlich vergeblich nach einer Längs- und Queranordnung sucht. Doch tritt auch eine andere Erscheinung zu Tage. Sind die Faserquerschnitte gleichmässig granulirt, so sind auch da, wo die Trennungslinien überhaupt deutlich sind, die Felderquerschnitte regelmässig polygonal-rundlich. Meist sind aber die Fasern im Querschnitt spitz-oval; ihre Abplattung zeigt sich stets in der Richtung von aussen nach innen, ist also durch den Druck der Lagerung bedingt.

In Uebereinstimmung hiermit wurde oben das Verschwinden der Fasertrennungslinien als ein Beweis des zerfliessungsfähigen Zustandes der versteinernden Masse erklärt, welche durch den Druck ihrer Lage beim Ausfaulen der bindegewebigen Mittel alle Trennungslinien aufhebt.

Fast bei jedem Querschnitt tritt nun auch platzweise eine Felderung auf, in welcher die einzelnen Faserquerschnitte fast ganz hell sind (in ihrer ganzen Masse also aus Versteinerungsmaterial bestehen), und dadurch einen unregelmässig drei- oder viereckigen Umriss erhalten, dass zwischen den einzelnen Fasern

grössere unregelmässige zellig-eckige Lücken entstehen, zwischen welchen die Fasern noch untereinander zusammenhängen. Da der Raum, den die Fasern in diesem Zustande einnehmen, wie sich aus mehreren genauen Vergleichen ergab, nicht grösser oder geringer als der der eng aneinander geschlossenen Strukturfasern ist, so ergibt sich, dass mit dem Verlust der Struktur unter Umständen eine einseitige Contraction oder Verringerung der cubischen Ausdehnung der Fasern stattfand.

Ich fasse dies in Consequenz unserer obigen Auseinandersetzung dahin auf, dass an diesen Stellen die Fäulniss die ganze Faser mit den meisten Primitivfibrillen früh ergriffen hat und so sehr rasch grössere Abschnitte der randlichen Faser schon über denjenigen Zustand der Fäulniss hinausgeschritten waren, in welchem den vorhandenen organischen Produkten noch eine Verkalkung stattfinden konnte, daher randlich Lücken und innerlich eine massive, glasige Verkalkung eintreten musste¹⁾.

Auch in der Erhaltung dieser ziemlich grossen Lücken ist eine früh eingetretene bedeutende Druckfestigkeit der verkalkten Fasern ausgesprochen (s. oben).

VII. Verhalten bei gekreuzten Nicols.

Wir erwähnten schon bei dem Beweise, dass die strukturfreien Stellen gegenüber den strukturführenden keiner mineralischen Metamorphose zu verdanken wären, dass beide sich optisch gleich verhalten. Die Versteinerungsmasse ist überwiegend amorph und im Grossen und Ganzen homogen. Zwischen gekreuzten Nicols ist sie dunkel und zwar in der Regel, ohne eine Spur einer Aenderung in Beziehung auf den Unterschied vorhandener oder fehlender Struktur zu zeigen. Die schönste Längs- und Querstreifung, die am schärfsten ausgeprägte Körnelung verschwindet fast stets bei gekreuzten Nicols in der dunkeln Grundmasse. Die Versteinerungssubstanz ist also an den strukturlosen Stellen in derselben Zusammensetzung niedergeschlagen, wie in den regelmässig gestreiften Feldern.

1) Auf diesen Zustand der Muskulaturerhaltung möchte ich das Strukturbild zurückführen, welche Fraas (l. c. Fig. 4) bei *Ichthyosaurus* als „verhorntes Pflasterepithel des Stratum corneum“ beschreibt.

Diese Erscheinung muss auch noch als zweiter nachträglicher Beweis angeführt werden, dass die dunkle Streifung nur in einer Unterbrechung der Substanz beruht und nicht auf einer völligen Aenderung derselben.

Diese Thatsache muss auch für den selteneren und isolirten Fall gelten, dass sich wirklich Substanzunterschiede innerhalb der Masse geltend machen. Es kommt nämlich vor, dass einzelne Längsstreifen sich unter $\times$ Nic. erhellen (*Caturus*, *Squatina*, *Aspidorhynchus*, *Megalurus*); desgleichen ganze Faserbänder, soweit sie Struktur zeigen. Dieser sporadischen Erscheinung tritt nun die weitere Erscheinung zur Seite, dass innerhalb einzelner Fasern (mehr nach dem Rande oder an dem Rande gelegen) lange Züge sich grell erhellender, unregelmässig begrenzter Butzen kleinkrystallinischer Ausscheidungen vorfinden und zwar an Stellen, wo mit der stärksten Vergrösserung bei einfachem Licht keine Spur Struktur zu erkennen ist, sich vielmehr eine unregelmässige, gegen die übrige homogene Masse sich etwas abhebende Consistenz bemerkbar macht. Diese Butzen treten auch meist zerstreut in der Versteinerungsmasse auf, ohne sich um die Richtungslinien der Faserung in ihrem ganz unregelmässigen Umriss zu kümmern; am allerwenigsten entsprechen sie den Unterschieden zwischen den ungleich grösseren Feldern von Struktur und keine Struktur zeigender Masse.

Bei *Ischyodus* und *Chimaeropsis* fand ich diese anisotrope Masse in grösserer Verbreitung als irgendwo; sie löst sich bei starker Vergrösserung besonders am Rande dieser Butzen in kleine lamellöse Plättchen von spitz-ovalem, nicht ganz unregelmässigem Umriss auf, deren Interferenzfarben sich in Zonen nach dem Umriss richten. Bei *Ischyodus* kommen daneben wirkliche isolirte Kryställchen vor, welche sich als Kalkspath erweisen.

Mein College, Dr. Thüraich (München) bestimmte die schlanken Kryställchen als eine Combination lang entwickelter Säulen mit einer spitzen Skalenoöder, welches durch ein Rhomboöder abgestumpft ist. Es treten Verwachungsgruppen von vier und mehr Individuen nach R und $-\frac{1}{2}$ R auf. Die durchschnittliche Grösse ist 0,05—0,01 mm; in den Verwachungsgruppen sind einzelne 0,13 mm lang¹⁾.

1) Auch nach der ausgeführten mikrochemischen Reaktion bestehen die Krystalle aus Kalkspath.

Es ist nun kein Zweifel, dass diese Kryställchen, welche ich stets nur in Gesellschaft von mehreren, (neben *Ischyodus* auch bei *Caturus* und *Leptoteuthis*), beobachtet habe, mineralisch identisch sind mit dem in kleinen Butzen auftretenden feinkrystallinischen Material, welches wir oben erwähnt haben und welches viel häufiger und verbreiteter ist, als wohlentwickelte isolirte Kryställchen.

Neben diesen Butzen tritt zwischen $\times$ Nic. noch eine andere Erscheinung zu Tage; bei *Ischyodus* und *Chimaeropsis* treten nämlich, besonders an dem Rande der krystallinischen Butzen angehäuft, kleine dunkle bezw. helle Kreuzchen auf, deren helle Arme zum Theil lebhaft, zum Theil schwach bläulichweiss erhellt sind. Bei *Ischyodus* erfüllen sie auch in Fläche und Tiefe, mehr und weniger dicht gedrängt, grössere Räume der Versteinerungsmasse und verschwinden isolirt und auch mit schwachem Schimmer (bei grösserer Anhäufung) in die Dunkelheit der amorphen Grundsubstanz. Bei einfachem Lichte zeigen diese Stellen auch eine Körnelung oder feinknollige Einlagerung, deren Theilchen kugelig-polygonal zusammenstossen, ein unregelmässig-haufenweises Auftreten haben und in die übrigens homogene Masse verschwinden; die Knöllchen haben einen Durchmesser von 0,01—0,02 mm, sind also wie die Kreuzchen ausserordentlich klein. Mit der Struktur haben sie bei *Ischyodus* nichts zu thun, da diese noch viel zarter ist und die hellen Kreuzchen hauptsächlich im Anschluss und zwischen den zerstreuten Individuen der feinkrystallinischen Butzen vorkommen, an Stellen also, wo die Struktur ganz fehlt.

Bei *Chimaeropsis* finden sich dieselben Körperchen hauptsächlich am Aussenrand der Muskulatur unterhalb der Chagrinzähne und ebenso im Anschluss an die erwähnten feinkrystallinischen Butzen. Hier sah ich auch in der That einmal die Querstreifen der Muskelfasern in gleicher Weise stark erhellt. Offenbar ist das von noch viel kleineren eingestreuten Körnchen, von der Art der in Rede stehenden Erscheinung verursacht¹⁾.

Auf dies ist auch theilweise die schwache Erhellung von

1) Vielleicht (!) ist hierauf zurückzuführen, dass die Muskelstränge bei *Geoteuthis* nach E. Fraas unter polarisirtem Lichte stark doppelbrechend sind (vgl. Württemb. Jahresb. 1889).

Fibrillen und Fasern zurückzuführen, welche wir oben als eine sporadisch auftretende Erscheinung erwähnt haben und welche stets in Fällen auftritt, wo in der Nähe die krystallinischen Ausscheidungen mit grösseren hellen Kreuzchen zu bemerken sind. Sporadisch kommen auch letztere, zwar nicht häufig, aber fast überall vor.

Diese dunkeln Kreuzchen mit hellen Sektoren bei Anwendung gekreuzter Nic. Prismen sind nun die Anzeichen der Struktur der „Sphaerolithe“, von concentrisch schaligen Concretionen mit radialfaseriger Anordnung kleinster Krystalle (vgl. die Cocolithe). Die optische Erscheinung ist im kleinen genau dieselbe, wie bei den oben erwähnten gruppenförmig strahligen Verwachsungen der grösseren Kalkspathkryställchen; da nun die Sphaerolithe sich stets an die erwähnten Butzen von mikritischen Kalkspathausscheidungen in der versteinerten Muskulatur anschliessen, so ist die Wahrscheinlichkeit ausserordentlich gross, dass sie selbst überwiegend aus kohlensaurem Kalk bestehen. Ich schreibe „überwiegend“, denn es ist die Ansicht sehr wohl ebenso zu begründen, dass diese Sphaerolithe aus Apatit bestehen könnten; der sphärische Bau dieser kleinsten Knöllchen könnte ebenso, wie beim Kalkspath die Bildung des dunkeln Kreuzes bei $\times$ Nic. erzeugen. So unterscheiden sich in Bezug auf das schwarze Kreuz Foraminiferenschalen, welche blos aus kohlensaurem Kalk bestehen und senkrechte Durchschnitte durch Vaso-dentinkanäle von Vertebratenzähnen, welche überwiegend aus phosphorsaurem Kalk mit Fluorcalcium bestehen, durchaus nicht von einander. Dies könnte man sehr wohl auf die Concretionen in der Versteinerungsmasse anwenden und das gesellige Vorkommen mit kleinkrystallinischen Kalkspathausscheidungen wäre nur als ein Anzeichen aufzufassen, dass hier ein Streben nach krystallinischer Ausscheidung vorgelegen hat, welches auch die überwiegend amorphe phosphoritische Versteinerungsmasse erfasst hat, freilich mit der Beschränkung, welche die organische Grundsubstanz ihr auferlegte (vgl. unten Capitel IX). (In allen sphärisch-radialfaserigen Bildungen, welche ein schwarzes Kreuz zeigen, liegen ja, wie bekannt, Krystallisationsprocesse vor.)

Interessant ist hierfür das allmälige Verschwinden der Sphaerolithe in die Versteinerungsmasse, besonders, wie ich bei *Ischyodus* und *Chimaeropsis* feststellen konnte, ihr über-

wiegendes Vorkommen an der Oberfläche derselben. Wir können hierin einen Uebergang oder wenigstens eine Aufeinanderfolge von mikrokrySTALLINISCHEN, mikritisch-sphaerolithischen und ganz amorphen Ausscheidungen erkennen, wobei allerdings das festzuhalten ist, dass Letztere auch der Träger der Ersteren bleibt; diese Folge fände von aussen nach innen statt und es kann diese Thatsache bei der Erklärung der Versteinerung von Wichtigkeit sein.

Ich kann hier gleich, um den Zusammenhang der erwähnten Bildungen näher zu illustriren, daran erinnern, dass organische Flüssigkeiten im vitalen Process ganz ähnliche Gebilde erzeugen. Sphaerolithisch ist die Struktur ausserordentlich vieler in den Gehörsäckchen eingeschlossener Otholithe, welche zum Theil sehr klein sind, aber auch bedeutende Grösse, wie bei den Fischen bekannt, erreichen (vgl. hier anschliessend die Cocco lithen).

Bei vielen anderen niederen Thieren und besonders bei höheren Wirbeltieren finden sich dagegen einfache Krystalle von kohlensaurem Kalk, welche ähnlichen Wechsel in der Grösse, ähnliche fast gleiche Krystallform und Verwachsungen zeigen, wie die in der versteinerten Muskulatur beobachteten Krystalle¹⁾.

Die verschiedenen Differenzirungen in der Versteinerungsmaterie und deren Formen haben also durchaus keine Beziehung zur Struktur, weder zu den feinen Einzelheiten derselben, noch zu den Unterschieden zwischen strukturführenden und strukturfreien Partien.

Von allen erwähnten Erhellungen der Substanz zwischen $\times$ Nic. habe ich diejenigen ausgeschlossen, welche auf andere Ursachen als substantielle Unterschiede zurückzuführen sind. Eine weitere matte Erhellung der Strukturstreifen findet häufig statt; diese ist aber auf die unvollkommene Auslöschung zu rechnen, welche Spalten im Allgemeinen häufig zeigen. Dieselbe ist aber auch ein Beweis, dass die Strukturlinien Unterbrechungen der Substanz entsprechen. Diese Erhellungen verschwinden auch in den Fällen, wo durch Infiltration mit feinflüssigem Canadabalsam

1) Letztere zeigen auch ein feinkörniges, fast unrein zu nennendes Gefüge, welches nicht durch mineralische Metamorphose, sondern nur durch den späteren Verlust einer reichlich eingeschlossenen organischen Grundlage erklärt werden kann (vgl. letztes Capitel).

die Hohlräume der Poren ausgefüllt werden und bei gewöhnlichem Licht die Strukturanzeichen verschwinden.

VIII. Die chemische Zusammensetzung der Versteinerungsmasse.

Nachdem wir im Vorhergehenden das allgemeine mikroskopische Verhalten und den aus diesem nothwendig zu folgernden Vorgang der Fossilisation besprochen haben, müssen wir jetzt nach den Ursachen des mineralischen Niederschlags fragen. Da derselbe nur in der sich zersetzenden Zwischensubstanz stattfindet, muss wohl der Zersetzungsprocess selbst als Beihelfer des Niederschlags in Betracht gezogen werden. Hierbei kann nun zuerst die allgemeine Zersetzung der todtten organischen Substanz, die Fäulniss in Frage kommen oder auch spezielle ausnahmsweise Vorgänge. Richard Owen hat so in seiner oben (S. 496) citirten Abhandlung die Erhaltung des Muskelmantels der Cephalopoden auf Adipocire (Leichenwachsbildung) zurückzuführen versucht, welche Bildung auf fettiger Zersetzung der Muskelsubstanz selbst nach der Meinung einer grossen Anzahl von Physiologen beruhen soll. Es ist diese Frage allerdings nicht entschieden und die andere Behauptung ebenso weit verbreitet, dass diese Fettwachsbildung nicht aus der Muskelsubstanz selbst abzuleiten sei, sondern von dem Fett zwischen den Muskeln und den Fasern des Fleisches, wofür auch viele bemerkenswerthe Gründe sprechen. Die Entscheidung der Frage stellt wegen ausserordentlicher Schwierigkeiten der Untersuchung immer noch aus.

Das Moment, welches Owen besonders zu seiner Annahme veranlasste, ist die öfters grosse Härte des Leichenwachses, welche der chemischen Zusammensetzung entspricht. Die aus der Zersetzung des Fettes entstehenden Fettsäuren binden, je älter die Bildung ist, je mehr Kalk, was zu der merkwürdigen Erhärtung und der Dauerfestigkeit derselben beiträgt (vgl. nächstes Capitel).

Die etwaige Beziehung unserer Fossilisationserscheinung zu solchen Bildungen kann natürlich nur die chemische Untersuchung entscheiden. Herr A. Schwager vom kgl. Oberbergamt in München hatte die Freundlichkeit, dieselbe vorzunehmen. Es sind drei Proben, von einem Selachier „*Notidanus*“, von einem der jüngsten Ganoiden „*Callopterus*“ und einem Cephalopoden „*Lep-*

toteuthis“, alle drei aus dem Solnhoferschiefer verwendet worden. Zum Vergleich stelle ich an den Schluss zwei aus v. Gümbel: Die fränkische Alb S. 126 entnommene, von A. Schwager ausgeführte Analysen von Gesteinen hinzu, welche sowohl die durchschnittliche Zusammensetzung fränkischer Jurakalke repräsentiren können, als auch den Schichten, welche die erwähnten Petrefakten führen, angehören; es ist No. V der Solnhoferschiefer Lithographirstein III. Qual. und No. VI Dachplatten-Kalk von Kelheim.

	Noti- danus	Lepto- teuthis	Callop- terus	Solnhoferschiefer	
	Sp. G. 2,915	Sp. G. 2,905	Sp. G. 2,922	No. V	No. VI
CaO	50,27	52,49	51,75	53,50	54,12
MgO	0,24	0,37	0,18	0,73	0,50
K ₂ O	0,31	0,66	0,82	0,21	0,20
Na ₂ O	1,61	1,33	1,76	0,13	0,18
P ₂ O ₅	33,58	33,65	33,85	Spur	0,05
CO ₂	5,39	5,39	5,80	42,84	42,64
SO ₃	2,12	2,29	2,06	—	—
Fl	3,06	3,76	2,62	—	—
SiO ₂	—	—	—	1,25	0,84
Al ₂ O ₃	—	—	—	0,66	0,60
Mn ₂ O ₃	—	—	—	Spur	Spur
Fe ₂ O ₃	—	—	—	0,15	0,12
Glühverl. (H ₂ O + NH ₄ + Org) — CO ₂ . . .	4,18	4,15	2,12	0,82	0,67
Summe . . .	100,76	104,09	100,96	100,29	99,92

Die ungefähr festgestellte Zusammensetzung der Versteinierungsmasse (Notidanus) ist daher folgende: H₂O + NH₄ + Org. 4,18; CaSO₄ 3,60; CaCO₃ 12,25; CaFl₂ 6,28; Ca₃(PO₄)₂ 69,04; Mg₃(PO₄)₂ 0,52; K₃PO₄ 0,46; Na₃PO₄ 2,82 = 99,15, welche Berechnung 33,27% P₂O₅ erfordert. Schwefelsäure grösstentheils an Ca; NH₄ in deutlichen Spuren. — Alkalien, nicht schwefelsaure; H₂O jedenfalls chemisch gebunden. Hingegen stellt sich das Schichtgestein folgendermaassen:

No. V. CaCO₃ 98,5 MgCO₃ 1,5.

No. VI. CaCO₃ 98,85 MgCO₃ 1,15.

Zur Interpretation des chemischen und mineralischen Verhaltens der Versteinierungsmasse habe ich nun auf Folgendes aufmerksam zu machen.

Vergleicht man Versteinerungsmasse und Schichtgestein, so fällt vor allen Dingen auf, dass bei nahezu gleichem Gehalt an Kalk doch das Verhältniss von Phosphorsäure und Kohlensäure ein reziprokes ist; bei der Versteinerungsmasse wenig Kohlensäure und überwiegend Phosphorsäure, bei dem Schichtgestein bedeutend mehr Kohlensäure und vollständiges Fehlen des letzteren; ebenso fehlt dem Schichtgestein der merkwürdige Fluorgehalt; die chemische Zusammensetzung des Schiefers stimmt im Allgemeinen mit der des Meeresschlammes. Der Charakter des Sediments tritt im Schichtgestein durch das Vorhandensein von Thonerde und Kieselsäure hervor, welche in der Versteinerungsmasse mit den Eisen- und Manganinfiltrationen vollständig fehlen. Auf diese Thatsache haben wir schon bei der Besprechung des makroskopischen und mikroskopischen Befundes aufmerksam gemacht.

Was nun die Versteinerungsmasse für sich betrifft, so ist vor allem auffallend, dass sie in allen drei Fällen bei so ausserordentlich verschiedenen Thiertypen, die gleichen Bestandtheile in nahezu gleichen Zahlenverhältnissen aufweist, dass sie also ein Mineral von einer gewissen chemischen Constanz ist.

Lassen wir vor allem und vor der Hand den kohlen-sauren Kalk ausser Betracht, welchen wir schon mikroskopisch als krystallinisch eingesprengten Gemengtheil nachgewiesen haben, so lässt sich aus den übrigen, mikroskopisch ein einheitliches Mineral bildenden Gemengtheilen als Grundverbindung phosphorsaurer Kalk mit Fluorcalcium herauschälen; dasselbe hat eine weite Verbreitung und allseitig grosse Bedeutung und ist krystallisirt als Apatit und derb als Phosphorit bekannt. Die theoretische Zusammensetzung des Apatits ist Kalk = 55,54, Phosphorsäure = 42,26, Fluor = 3,79, während sich das Verhältniss bei Leptoteuthis resp. auf 52,49, 33,65 und 3,7 stellt. Die Differenzen gleichen sich noch etwas aus, wenn man bedenkt, dass in die Verbindung noch andere Salze hineingezogen sind, wie Kali, Natron und Ammoniak. Auch der Gyps ist mikroskopisch nicht nachweisbar und es ist nicht wahrscheinlich, dass er der Versteinerungsmasse nur fein vertheilt beigemischt wäre, ohne ähnlich wie der Kalkspath, wenigstens am Aussenrand, in seinen charakteristischen Formen auskrystallisirt zu sein.

Es ist daher sicher anzunehmen, dass wenn diese Bei-

mengungen nicht wären, wir auch in den Zahlenverhältnissen eine grössere Annäherung an reineren Phosphorit erkennen konnten.

Auch Magnesia und Ammoniak müssen chemisch gebunden sein, da sie sich sonst wohl, ähnlich wie kohlensaurer Kalk als Struvit ausgeschieden haben würden, welcher fast aus allen Lösungen entsteht, in welchen Magnesia mit Orthophosphorsäure und Ammoniak zusammentrifft, eine Verbindung, welche im Guano und faulendem Harn (u. fossilem Mist) entsteht und sich auch in den Fäcalien und den Darmconcretionen findet.

Wir haben also blos den kohlensauen Kalk eingesprengt in grösseren, wohl entwickelten Kryställchen, in klein krystallinischen Butzen mit den ihnen vergesellschafteten Sphaerolithen, welche in die Versteinerungsmasse, den Zoophosphorit einzeln eingelagert, sich von aussen nach innen zu verlieren. Innerlich ist der kohlensaure Kalk jedenfalls auch der Verbindung molekular beigemischt.

Es ist nun die Frage, woher die Componenten dieser Verbindung stammen. Die erste Möglichkeit wäre, ihre Herkunft aus dem Meerwasser abzuleiten und ihre Ablagerung in der Muskulatur auf Umstände zurückzuführen, welche z. B. Apatit und Phosphorit auf dem Wege der Segregation aus Gesteinen in dessen Spalten krystallinisch abgesetzt hätten.

Wenn überhaupt eine solche Annahme hier gestattet ist, so ist vor allem zu bemerken, dass dies an und für sich ein ausserordentlich langsamer Process ist. In diesem Falle wäre das Meerwasser der Träger der Salze, welches zwar die hier in Betracht kommenden Stoffe enthält und enthalten kann, aber nur in so äusserst geringen Mengen, dass ein solcher Process jedenfalls nur sehr langsam vor sich gehen könnte. Jeder Verbrauch eines Salzes durch Niederschlag erhält bei der geringen Vertheilung derselben seinen Ersatz nur sehr allmählich aus immer grösserer Ferne, welcher Ersatz für die verschiedenen Componenten auch jedenfalls verschiedene Zeit in Anspruch nimmt (vgl. letztes Capitel).

Wenn sich daher die Bildung eines einheitlichen, noch dazu „amorphen“ Minerals auf diesem Wege als unmöglich herausstellt, so kann bei der Dauer, die ein solcher Niederschlag in Anspruch nähme, nicht mehr an Erhaltung der Muskelstruktur gedacht werden.

Da wir so die Herkunft aller Salze der Verbindung aus

dem Meereswasser kurzweg leugnen müssen, so bleibt nur eine Erklärung übrig, dass dieselben aus dem Bereich des Körpers selbst kommen. Dabei würden wir durch den phosphorsauren Kalk und das Fluorcalcium hauptsächlich an die Salze des Skelets erinnert. Die Zusammensetzung der Versteinerungsmasse ist ähnlich derjenigen der Knochensubstanz; auch der Kalkknorpel und das Dentinhautskelet der Elasmobranchier könnten hier in Betracht kommen. Doch machen schon hier die nackten Holocephalen und die bei ihnen mit der Verkalkung des Fleisches in gar keinem Verhältniss stehenden, schwachen Erhärtungen des Innenskelets eine warnende Ausnahme.

Noch wichtigere Momente gegen die Betheiligung der Salze des Skelets an der Bildung des Versteinerungsmittels bieten die Cephalopoden. Bei den mehr Sepien-artigen Formen tritt die Erscheinung seltener auf; der Schulp der Sepia besteht aber mit 85% aus kohlensaurem, mit nur Spuren von phosphorsaurem Kalk. Bei den fossilen Loliginiden endlich tritt die Muskelverkalkung viel häufiger auf und ihr Hornschulp ist fast ohne Betheiligung anorganischer Bestandtheile erhalten.

Schliesslich wären die anneliden Würmer zu erwähnen, deren ganzes kalkführendes Skelet aus den beiden Kiefern besteht. — Es erhellt hieraus, dass das Skelet durchaus nicht in Betracht zu ziehen ist, wie auch hier zu bemerken ist, dass seine Auflösung viel zu langsam von Statten gehen würde, und dass indessen die Muskelstruktur nicht mehr hätte erhalten bleiben können.

Wir würden sodann auf andere Gewebscomplexe und Organe des Körpers mit stetigem Gehalt an phosphorsauren Salzen verweisen. Hier ist in erster Linie die Muskulatur selbst zu erwähnen, dann das Gefäss- und Nervensystem und ich kann erwähnen, dass Dr. E. Fraas auf meine Mittheilung hin, dass die Versteinerungsmasse hauptsächlich aus phosphorsaurem Kalk bestehe, in: Jahreshefte f. vaterl. Naturk. in Württemberg S. 232 folgendes annimmt: „Es ist die in der Muskelsubstanz und Lymphe enthaltene Phosphorsäure im Stande, unter günstigen Umständen eine Menge des im Wasser gelösten kohlensauren Kalkes zu binden und als phosphorsauren Kalk in der Muskelmasse niederzuschlagen, wodurch weder die Form noch das Strukturbild der Muskelzelle alterirt zu werden braucht.“ Die Sache liegt indessen nicht so

einfach und Fraas fühlt selbst, dass „damit noch keine vollständige Erklärung gegeben sei.“ In der That, wenn es blos die Phosphorsäure ist, welche den Kalk niederschlägt, warum treten keine umfassenderen unzweideutigen Petrificirungen des Nervensystems und des Gehirns ein, wo ja die Aschenbestandtheile nahezu die gleichen sind, wie in der Muskulatur; warum sollten nicht auch die Züge des Gefässsystems, deren flüssiger Inhalt ganz ähnliche Salze enthält (wenn auch in bedeutend geringerer Menge), sich noch in grösserer Ausdehnung erhalten haben. Man sieht, dass für die starke Verkalkung der Muskulatur besondere Umstände vorliegen müssen, und dass der einfache Gehalt an den in Betracht kommenden Salzen nicht genügt, einen der Versteinerungsmasse vergleichbaren Niederschlag zu erzeugen. Ich war selbst früher der Meinung, dass die Salze „hauptsächlich“ aus den Muskeln und dem Blut stammen müssten, machte aber schon auf andre „gewaltige Einwanderungen“ aufmerksam, von denen die auffälligste die des Fluorcalciums sei (vgl. Mitth. d. Ges. für Morph. u. Phys. in München 1889). Treten wir nun der Sache einmal näher, so finden wir, dass die Aschen je in den verschiedenen Geweben verschiedener Classen der Wirbelthiere ziemlich gleich bleiben. Die Muskulatur enthält bei Vertebraten hauptsächlich phosphorsaures Kali, bei den Fischen insbesondere aber überwiegend Erdphosphate und zwar stellt sich das Verhältniss ungefähr so, dass auf

1 Th. Fleisch — 0,04 bis 0,07 Asche — 0,0176 bis 0,0308 Erdphosphate treffen; die übrigen Theile der Asche: ClNa und Schwefelsäure können wir hier ausser Acht lassen.

Im Blut der höheren Vertebraten finden wir auf 1000 Theile Blutzellen 2,108 phosphors. Kali und 0,218 phosphors. Erden, im Plasma 0,443 phosphors. Natron und 0,550 phosphors. Erden.

In der Lymphe kommen auf 1000 Theile 0,02 phosphors. Kali und 0,26 phosphors. Erden.

Was das Nervensystem betrifft, so sind im Gehirn und Rückenmark die Aschenmengen der getrockneten Substanz gleich denen der Muskulatur. Die einzelnen Bestandtheile der Asche (vgl. Gorup-Besanez, Chemie der Gewebe, S. 636) sind fast genau dieselben, wie ja überhaupt Nerven- und Muskelsubstanz die engste Verwandtschaft mit einander haben. (Die Gleichheit der Aschen lässt hierbei schliessen, dass dieselben keine wesent-

lichen Funktionen haben, sondern, dass sie aus der Circulationsflüssigkeit in den Mengen in die verschiedenen Gewebe übergeführt werden, in welchen sie den vorhandenen Lösungsverhältnissen nach aufgenommen werden können.)

Auch dies würde dafür sprechen, dass für das Nervensystem Verkalkungen eintreten könnten, wenn sie in der Muskulatur vorhanden sind¹⁾; wir dürfen also auf die im Nervensystem vorhandenen Salze nicht zu sehr rechnen.

Wenn wir aber trotzdem diese Annahme machen wollen, so könnten wir als höchstes Maass der verfügbaren anorganischen Salze die doppelte Aschenmenge der Muskulatur annehmen, also auf 1 Theil Fleisch 0,08 bis 0,14 löslicher phosphorsaurer Salze.

Dass diese geringen Mengen nicht allein ausreichen, um entweder, wie Fraas meint, durch einfachen Salzaustausch mit den im Meereswasser gelösten Bestandtheilen oder wie wir von Anfang an annahmen, durch Vermittelung eines organischen Zwischenstadiums eine Verkalkungslage von dem spez. Gewicht 2,9, welche fast $\frac{1}{2}$ der gesamten Muskulatur betragen kann, niederzuschlagen, liegt auf der Hand. Die Verkalkungslage hat im Durchschnitt bei Ganoidfischen die Dicke des Panzers eines *Polypterus* und zeigt bei Schätzung der verhältnissmässigen Menge von organischer und anorganischer Substanz jedenfalls so viel phosphorsauren Kalk, als das Aussen- und Innenskelet zusammengenommen!

Solche Salzmenngen werden zwar im Verlauf längerer Zeiträume in ganz allmähigem Vorgange in den skeletbildenden Geweben abgelagert, finden sich aber nicht in äquivalenter Menge in allen übrigen gewebigen Organsystemen zu gleicher Zeit. Dies geht ungefähr daraus hervor, dass bei Säugethieren, welche in diesem Falle als Muster dienen können, zur Zeit einer embryonalen Bildung des Skelets bei ungenügender Salzernährung des Mutterthieres die in den übrigen weichen Geweben gelösten phosphorsauren Salze selbst bei allmählicher Concentration nicht ausreichen, so dass in bedenklich pathologischer Resorption auch der feste Salzgehalt des Skelets des Mutterthieres angegriffen werden

1) Meine obige Deutung der Erhaltung des Rückenmarks bei *Agassizia* ist nicht ausser jeden Zweifel gestellt und wage ich hierauf keine Schlüsse zu bauen.

muss. Führt man diesen Vergleich mutatis mutandis nach allen Seiten aus, so giebt er auch eine Schätzung dafür, dass selbst der doppelte Aschengehalt der Muskulatur die zu fordernde Menge der Versteinerungsmasse nicht erklären kann. Hierbei ist noch die eigentlich unmögliche Praemisse an die Spitze gestellt, dass der ganze Salzgehalt unverkürzt von der Muskulatur aufgenommen würde, während ihn sicher das Meereswasser eher verringert, als concentrirt erhält.

Daraus geht hervor, dass noch ganz andere Faktoren herbeigezogen werden müssen, als die in allen weichen Geweben im vitalen Prozess verwendeten anorganischen Salze.

Dies Resultat wird gestützt durch das Verhalten der Cephalopoden und Anelliden.

Ihre Muskulatur enthält nur sehr wenig phosphorsaures Kali (vgl. Valenciennes und Fremy, Journ. de Pharm. et d. Chim. 3. Sér. XXVIII. 401). Ihr Blut enthält auf 1 Theil ca. 0,0075 phosphorsauren Kalk und Kupfer. Wenn das Nervensystem überhaupt in Betracht gezogen werden darf, so ist zu bemerken, dass es hier in viel geringerem Maasse im Verhältniss zur Muskulatur entwickelt ist, als bei den Fischen. Noch mehr gilt dies von den Würmern, wenn wir hier, was gewiss berechtigt ist, ähnliche Aschenverhältnisse der Muskulatur, wie bei den Cephalopoden und des Blutes, wie die bekannten von Cephalopoden und Crustaceen annehmen.

Wenn man im Allgemeinen nothwendigerweise vornehmlich jene Elemente und Salze im Circulations-, Nerven- und Muskelsystem antreffen, welche im Skelet abgelagert werden, so ist es auch sehr verständlich, dass bei den Cephalopoden und Würmern in diesen Systemen sich wenig oder auch keine Phosphorsäure finden soll. (Dass sich z. B. bei Cephalopoden Salze im Blut finden, welche nicht im Skelet abgelagert werden, aber sonst skeletbildend sind, ist kein Beweis dagegen, weil solche Salze die dem Organismus weder schaden noch nützen, aus den Verdauungsorganen sehr wohl in das Gefässsystem gelangen können; dies wäre bei den nackten Cephalopoden der Fall vgl. unten).

Wenn nun, wie dargestellt, verfügbare phosphorsaure Salze bei den Cephalopoden und Würmern noch in viel geringerem Verhältniss in den weichen Organen sich gelöst vorfinden, als bei den Vertebraten, wenn aber bei ihnen in ganz gleichem, bei Cephalo-

poden in noch bedeutenderem Maximalverhältniss die Muskulatur verkalkt, so stützt dies unsere oben ausgesprochene Ansicht, dass die im Körpergewebe vorhandenen und verwendeten Salze einen nur wenig wesentlichen Beitrag zur Versteinerungsmasse geliefert haben können.

Das Gleiche beweist das Vorhandensein des zugleich mit den übrigen phosphorsauren Salzen in 6—7 % amorph niedergeschlagenen Fluorecalciums bei Fischen und Cephalopoden, wenn man bedenkt, in welcher geringen Menge es bei den Vertebraten im Knochen, Zahnbein und Schmelz vorkommt und im Cephalopodengerüst überhaupt nicht bekannt ist.

Dies leitet uns wohl zu dem letzten Ausweg. Das einzige Organ im Innern des Körpers, welches noch gelegentlich phosphorsaure Salze und dabei auch Fluorecalcium enthält, ist — der Magen (und Darm) und zwar in dem Speisebrei bei solchen Raubthieren, welche sich von grösseren und kleineren Wirbelthieren oder deren Ueberresten nähren. Nun sind fast alle oben behandelten, die Muskelversteinerung typisch zeigenden Gattungen vertebratenfressende und knochenverdauende Raubthiere.

Gehen wir die einzelnen Formen durch, so wissen wir, dass in der That die pelagischen Ichthyosaurier sich von Vertebraten nähren; ihre Koprolithen enthalten ausser einer feineren, amorphen phosphoritischen Masse auch viele Knochenreste und Schuppen. — Die nächstverwandten der Hatteria — Homocosauros und Anguisosaurus — zeigen desgleichen phosphoritische Darmerfüllungen.

Bemerkenswerth erscheint mir, dass die im lithographischen Schiefer vorkommenden Schildkröten zu den Küstenschildkröten gehören, welche sich von Pflanzen und Mollusken nähren und auch (soweit meine Beobachtungen reichen) keine Spuren von petrificirter Muskulatur zeigen.

Bei den Pterosauriern des lithographischen Schiefers habe ich nur an einem Exemplar Reste der Halsmuskulatur, an einem anderen Reste der Rumpfmuskulatur entdeckt; die Reste sind schwach und bilden die Pterosaurier eine gewisse Ausnahme von der erwähnten Regel, da sie sich jedenfalls auch von Fischen genährt haben. Ueberhaupt ist die Erscheinung bei Reptilien nur in untergeordneterem Auftreten zu erwähnen.

Sämmtliche oben erwähnte Elasmobranchier sind knochenverdauende Raubfische, auch die Holocephalen, welche kleine Muscheln und kleine Fische trotz ihrer Kauzähne unzertümmert in ihrem Magen enthalten.

Gehen wir nun über zu den Ganoiden des lithographischen Schiefers, so sind nicht nur die Coelacanthinen unter den Crossopterygiern, sondern auch unter den Lepidosteiden die Saurodontiden und Rhynchodontiden, unter den Amiaden die Mikrolepidoti, Cyclolepidoti und Halecomorphi und endlich die Thrisopininen als Raubfische bekannt, deren Magen kleinere Fische enthält, deren Darm mit einfachem oder Spiralklappen-Enddarm meist feinkörnige, aus einem feinen Brei erhärtete Erfüllungen (Cololithen und Coprolithen) zeigt. Diese Ueberreste sind ohne Knochenfragmente und stellen einen der Muskelversteinerungsmasse sehr ähnlich zusammengesetzten Phosphorit dar, ein Beweis für die vollständige Auflösung der im Magen vorhandenen Knochenreste.

Merkwürdig ist nun, dass unter den Lepidosteiden die grossen „sphaerodonten“ *Lepidotus*-Arten, deren Nahrung mehr in Mollusken bestand, ohne Muskelversteinerung sind. Dasselbe gilt für die ganz gleich organisirten *Pycnodontiden*, bei welchen ich auch niemals die sonst so häufigen Skelete kleinerer Fische im Bauch beobachtete.

Von den Cephalopoden im Allgemeinen zeigen die fossilen Nautiliden und Ammonitiden, die mehr littoralen Aufenthalt am Grunde des Meeres liebten und sich (nach *Nautilus* zu urtheilen) mehr von Krebsen und Mollusken (mehr von den auf dem Meeresboden kriechenden Geschöpfen) nährten, niemals etwas von der Muskelversteinerung. Dagegen zeigen von den Dibranchiaten die Phragmophoren (*Loligo*-artige Verwandte von *Sepiola*), Sepiophoren und Chondrophoren, welche mehr das hohe Meer lieben, bessere Schwimmer sind, feste Reisszähne haben, sowohl überwiegend die versteinerte Muskulatur, als auch phosphoritische Darm-(Magen-)Ausfüllungen mit Fischschuppen und Knochen; auch die pelagischen Arten der lebenden Dibranchiaten nähren sich mehr von kleineren Fischen.

Dieser Gegensatz zwischen den äussern schaalentragenden Nautiliden und Ammonitiden und den dibranchiaten nackten Cephalopoden (mit innerem Stützskelet zur Ermöglichung rascherer

Bewegung bei räuberischen Anlagen) wirft vielleicht auch ein Licht auf die Thatsache, dass von Lamellibranchiaten und Gastropoden ebenso wenig, wie von den Brachiopoden etwas der Muskelverkalkung der erwähnten Thiere Aehnliches trotz des ausserordentlich eingehenden paläontologischen Studiums derselben bekannt ist.

Was nun die Würmer betrifft, so ist bezeichnend, dass die die Muskulatur zeigende einzige Gattung des lithogr. Schiefers zu der Gruppe der raubenden, freilebenden Anneliden gehört und in einer fast stets vorhandenen Erfüllung des Darmes mit Kalkspath die Anwesenheit von andren festen Stoffen im Speisebrei anzeigt. Die Ernährungsweise dieser Würmer ist jedenfalls eine den Loliginiden und Sepien ähnliche gewesen und wenn sie nicht ganze Vertebratenzwerge verschlucken konnten, so haben sie sich vielleicht an deren getödteten Reste gehalten und konnten so jedenfalls wie bei den fossilen Dibranchiaten ersichtlich, auch Schuppen und Knochen von ihnen an Grösse weit überlegenen Fischen bei ihrer wenig wählerischen Fressbegier in Fragmenten in den Mageninhalt dieser niederen Würmer gelangen. Dagegen ist es bemerkenswerth, dass von den in allen Arten von Erdschichten aller Zeiten häufigen fossilen Serpulen mit ihrer dicken Kalkschale keine makroskopische Erscheinung bis jetzt bekannt geworden ist, welche auf eine Petrificirung der Weichtheile schliessen lässt.

Wir hätten also in der fast gleichen oder ähnlichen Lebens- und Ernährungsweise dieser sonst höchst verschiedenen Thiertypen, in dem stets in deren Därmen vorhandenen Speisebrei, dessen phosphoritische Beschaffenheit aus den durch die Magensäure aufgelösten Knochen herstammt, eine verhältnissmässig bedeutende und gleichmässige Quelle der phosphorsauren Salze und besonders des Fluorcalciums. Diese Quelle ergänzt den erstens viel zu geringen, zweitens an Quantität wie an Qualität bei den verschiedenen Typen höchst ungleichmässigen Gehalt der Muskulatur etc. an phosphorsauren Salzen, drittens bildet sie den einzig möglichen Ausgangspunkt der verhältnissmässig enorm grossen Mengen von Fluorcalcium und dessen Ansammlung in einem Zeitraum, der der Erhaltung der hinfalligen Fleischsubstanz entsprechen muss.

Die hier angeführten Thatsachen, dass die in der Musku-

latur etc. enthaltenen anorganischen Salze nicht die Ursache des Niederschlags von phosphorsaurem Kalk in der Muskelmasse sein können, wird noch durch eine weitere Fossilisation gestützt. Wir haben oben erwähnt, dass die Tintenbeutelhöhlungen der chondrophoren Cephalopoden des lithogr. Schiefers von unregelmässig-kugeligen Knollen verschiedener Grösse dicht erfüllt sind, die aus einer erdigen Substanz von der mittleren Härte der Versteinerungsmasse der Muskeln bestehen, in einfachem Licht ein einfach körniges Gefüge zeigen, wie die Verkalkung der strukturlosen (ursprünglich flüssig-zersetzten) Muskelmasse, im polarisirten Licht desgleichen, wie die Muskelversteinerung, vollständig dunkel werden.

Es verhält sich diese Masse aber auch chemisch wie die Muskelversteinerung; eine nur auf wenig Substanz beruhende, aber für unsern Vergleich vollständig ausreichende Analyse enthielt nach Herrn A. Schwager (0,0404 gr — spez. Gew. 2,934):

	in %
Plesio- theutis { 0,0027 Glühverl. b. schwach. Glühn ($H_2O + Org$)	6,68 Org + H_2O
{ 0,0019 Glühverl. b. starkem Glühn (CO_2)	4,70 CO_2
{ 0,0191 CaO	47,27 CaO
{ 0,0134 P_2O_5	33,16 P_2O_5
{ 0,0007 SiO_2	1,73 SiO_2
{ 0,0005 Al_2O_3	1,23 Al_2O_3
{ 0,0003 Fe_2O_3	0,74 Fe_2O_3
{ 0,0007 SO_3	1,73 SO_3
{ Mg, Alk und Fl	Mg, Alk u. Fl.

Wir haben also in dieser Versteinerungsmasse, wie schon auch das spez. Gewicht angiebt, fast dieselbe Menge phosphorsauren Kalkes, wie in der Muskelversteinerung und es ist derselbe dem mikroskopischen Befunde nach genau in derselben Weise niedergeschlagen wie in der letzteren. Wir haben also hier zweifellos eine Fossilisation des flüssigen Inhaltes des Tintenbeutels.

Betrachten wir nun die Erhaltung dieses flüssigen Inhaltes in den Lias-Schichten, so haben wir schon erwähnt, dass die schwarze Füllung vollständig die Eigenschaften des getrockneten Tintensaftes der lebenden Decapoden behalten hat; E. Fraas (l. c. 1889 S. 221), giebt an, dass die schwarze Substanz beim Glühen mit Entwicklung eines bituminösen Geruchs fast vollständig verbrannte, also ausschliesslich organisch sei; dies be-

weist auch unser Versuch mit der Bleichflüssigkeit an Dünn-schliffen der schwarzen Substanz. Herr A. Schwager fand hierbei das spez. Gewicht 1,440—1,480 und eine Aschenmenge von 0,0049 gr auf 0,1319 gr Substanz = 3,71 %; die nähere Zusammensetzung der Asche zeigen folgende Zahlen: 23,47 P_2O_5 ; 14,28 CO_2 ; 28,57 CaO; 8,18 Al_2O_3 ; 14,28 Fe_2O_3 ; 8,18 SiO_2 in %. — Vergleicht man hiermit die Analyse der Flüssigkeit bei lebenden Vertretern, so finden sich 19,56 Asche¹⁾ auf 78,00 Theile des schwarzen Farbstoffs organischer Natur und einen schleimartigen Stoff. Wir können also von den Tintenbeuteln der Lias-Schichten annehmen, dass sie den organisch fast unveränderten, nur eingetrockneten Tintensaft darstellen und müssen uns über die ausserordentliche Erhaltung der organischen Substanz wundern. Vergleicht man aber diese Zusammensetzung mit der Tintenbeutel-erfüllung der *Plesioteuthis* aus dem lithographischen Schiefer, welche, wie auch Fraas von seinem *Geoteuthis Zitteli* angiebt, aus einzelnen ungleichen rundlichen Knollen (der zusammengezogenen Tintensubstanz) besteht, so erkennen wir den gewaltigen Unterschied der Fossilisation durch Eintrocknung und solcher durch Phosphoritisirung der organischen Flüssigkeit.

Wir erkennen erstens einen Verlust an den ursprünglich in der Flüssigkeit gelösten Salzen und weiterhin den Beginn eines Niederschlags von Salzen, welche in den Tintenbeuteln aus dem lithogr. Schiefer als Fossilisationsmaterial der ganzen Tintenflüssigkeit auftritt. Vorausgesetzt ist hierbei die ganz unbedenkliche Annahme der verhältnissmässigen und durchschnittlichen Vergleichbarkeit des Volums der Tintenbeutel-erfüllungen, seien sie nun phosphoritisirt oder nicht; desgleichen die Annahme der Gleichheit des Aschengehalts der Tintenflüssigkeit der ausserordentlich nahe verwandten lebenden und fossilen Gattungen.

Zu betonen haben wir hierbei, dass 1) die Phosphoritisirung eingetreten ist an einer organischen Substanz in flüssigem Zustande; 2) dass ursächlich mit der Versteinerung verbunden eine Zersetzung dieser Flüssigkeit, d. i. eine Zerstörung des Farbstoffes, welcher in anderen Fällen eine ausserordentliche Widerstandsfähigkeit besitzt, stattgefunden hat; 3) dass die org. Substanz in die Versteinerungsmasse in einer Form eingeschlossen

1) Bestehend aus $MgCO_3$, $CaCO_3$, $ClNa$ und Na_2SO_4 .

wurde (als Gerüstsubstanz des anorganischen Niederschlags), welche der endlichen Zersetzung leichter anheim fiel, wie der Farbstoff selbst; 4) dass die Qualität und Quantität der durch den Versteinerungsprocess niedergeschlagenen Salze in gar keiner Beziehung zu der ursprünglich in vitalem Process in der organischen Gewebeflüssigkeit vorhandenen Asche steht, dass man also, wie wir auch oben bei der Muskulatur ausführlich auseinandersetzen, auf ganz andere Quellen dieses phosphoritischen Niederschlags zurückgreifen muss.

IX. Die Ursachen der Petrificirung.

Nachdem wir im vorigen Kapitel alle Punkte in Erwägung gezogen haben, welche für die Bildungsweise des Myophosphorits vom chemisch-mineralogischen Gesichtspunkte zu erwähnen wichtig schienen, wollen wir im Nachfolgenden auch die möglichen Vorgänge in dem organischen Bereich betrachten, in welchem die Phosphoritisirung vor sich gegangen ist.

Nachdem festgestellt ist, dass ein einfacher Niederschlag in einem Austausch der Elemente von anorganischen Salzen innerhalb des Körpers und von solchen aussserhalb in Form eines einfachen chemischen Experiments nicht stattgefunden haben kann, sondern dass eine höchst seltsame Concentration aller im Körper (den Geweben und dem Darminhalt) enthaltenen Salze mit wahrscheinlich nur schwacher Betheiligung der im Meereswasser gelösten Bestandtheile zu bemerken ist, welche in verhältnissmässig kurzem Zeitraum stattfinden musste, nach dem ist keine andere Möglichkeit vorhanden, als dass ein spezieller Zustand der organischen Masse nach dem Tode die Ursache dieser Concentration der anorganischen Stoffe und zugleich der Phosphoritisirung selbst d. h. der concentrirenden Auflösung und Reduktion in einen nicht löslichen Zustand gewesen ist¹⁾.

1) Der constante Gehalt der verschiedenen Gewebe an löslichen anorganischen Salzen beruht ja wohl auch auf gewissen Zuständen der organischen Flüssigkeiten. Hierbei dürfte der Wassergehalt eine nebensächliche Rolle spielen und es werden hier wohl die verschiedenen sauren Zersetzungsprodukte der Lebensthätigkeit hauptsächlich mitwirken. So erlangen die nahe verwandten und in ihrer Thätigkeit

Das wichtigste Moment hierbei ist, Zersetzungszustände zu betrachten, welche rasche Kalkniederschläge ermöglichen und zugleich bis zur Beendigung derselben sowohl die Erhaltung der Struktur sichern, als auch den Verbleib der im Fleisch oder Körper gelösten Salze.

Hier tritt uns zuerst eine Verkalkung entgegen, auf welche Owen (vgl. Einleitung) zur Erklärung der Mantelerhaltung bei Cephalopoden zurückgriff, das Leichenwachs (Adipocire). Bestrickend ist hierbei zuerst, dass diese Bildung von sehr vielen bedeutenden Forschern auf Zersetzungsvorgänge innerhalb der Muskulatur zurückgeführt wird. Kratter (Studien über Adipocire, Zeitschrift für Biologie, Bd. XVI) hat Leichenwachs auch mikroskopisch untersucht und dasselbe hypothetisch in Muskel-, Haut-, Fettgewebe- und Knochen-Adipocire unterschieden. In Muskel-adipocire glaubte er den allmählichen Uebergang der Muskelfasern in Fett und Fettsäure beobachten zu können, fand thatsächlich in der Masse die, wie es ihm schien, der fettigen Zersetzung am längsten widerstehenden Fibrillen der anisotropen Substanz. Lehmann (Sitz.-Ber. d. phys.-med. Gesellschaft, Würzburg 1888, S. 1) hat sich nach dem chemischen Befund künstlich erzeugten Leichenwachses für die Entstehung desselben aus dem Eiweiss der Muskelsubstanz ausgesprochen und ausserdem festgestellt, dass die Fettsäuren durch Kalk gesättigt sind. Diese Thatsache ist schon verschiedentlich früher ausgesprochen worden und hat besonders schon Wetherill (Journal f. prakt. Chemie, Bd. 68) bei subfossilem Leichenwachs von *Bison americanus* die umfassende

so ähnlichen Nerven und Muskeln ausserordentlich gleichartige Aschenmengen; hier und in solchen Gewebeflüssigkeiten, wie in Blut und Lymphe finden sich die Salze in löslicher Form. Bei Geweben, welche der Lebens-, Willens- und Ernährungsthätigkeit entfernter entwickelt sind, deren Zellen in Bezug auf jene mehr ruhende Zellen sind, ernährt werden müssen und Stützgewebe abgeben, können die Aschenmengen auch in unlöslicher Form abgelagert werden. Diese Einkerkung der Zellen beweist einen Rückgang der Lebensthätigkeit derselben, wobei wieder nur regressive Zersetzungen des Protoplasmas eine Rolle spielen können, wie mit pathologischen Umbildungen sehr häufig Kalkausscheidungen verbunden sind. Im obigen Kapitel soll nun auseinandergesetzt werden, dass man die Frage der Phosphoritisirung der Muskulatur sehr wohl von diesem Gesichtspunkt aus behandeln kann.

Bindung von Kalk durch Fettsäuren dargestellt. Wenn diese Thatsachen richtig sind, so hätten wir in der Bildung von Leichenwachs eine Kalkfassung, welche in der Zwischensubstanz der Primitivfibrillen stattfände und die letzteren umhüllte. Man könnte schliesslich denken, dass diese Bildung auch die Bestandtheile der Muskelasche vor der Lösung verschliesse und im Fossilisationsprozess endlich ein Austausch der Säuren stattgefunden habe, d. i. die organische Säure durch eine anorganische ersetzt worden wäre. Diese Auffassung hat mich auch kurze Zeit beschäftigt, wenn sie mir auch einen wichtigen Punkt nicht zu erklären vermochte, die ausserordentlich starke Concentration der Phosphorsäure und des Fluorcalciums. Bei näherem Studium der Literatur über Adipocire stiess mir ein weiterer Punkt auf, welchen auch Prof. Voit in München für sehr wichtig hielt, dass nämlich, wenn Adipocire aus der Muskelsubstanz entstände, dies doch so langsam vor sich ginge, dass keine Spur der im Körper vorhandenen Salze mehr verfügbar sein könne. Lehmann's Adipocirungsversuch von 135 Gramm Fleisch unter stetiger Erneuerung des Wassers (zur Verlangsamung der Zersetzung) beanspruchte wenigstens 7 Monate zur Vollendung. Bedenkt man noch, dass auf dem Grunde des Meeres derartige Processe in noch viel langsamerem Tempo vor sich gehen müssen, die Lösungsverhältnisse für die im Körper gelösten anorganischen Bestandtheile aber jedenfalls die gleichen, ja viel bessere sind, so ist dieser Grund nicht zu unterschätzen und bestimmt er uns, noch andere Möglichkeiten für die Phosphoritisirung der Muskulatur in Betracht zu ziehen, als die des Zwischenstadiums von Leichenwachs, welches auch an und für sich chemische Schwierigkeiten bietet. Zudem ist es bis heute noch unerwiesen, ob wirklich Adipocire aus dem Fleisch selbst entstehen könne; die Kratter'schen Resultate haben durch Zillner (Eulenburg's Vierteljahrsschr. N. F. XLII) entschiedenen Widerspruch erfahren; Zillner hat wahrscheinlich zu machen versucht, dass die von ihm nachgewiesene Wanderung des Fetts in der Leiche vollkommen alle Leichenwachsfunde erkläre.

Wie dem nun sei, so lassen wir die einfache Ueberlegung ausschlaggebend sein, dass, wenn bei dem Wechsel von strukturführenden und eingeschlossenen strukturlosen Stellen unserer Versteinerungsmasse, die letzteren den vollständig verseiften Particeen

der Muskulatur entsprächen, dann nothwendig Volumveränderungen stattfinden müssten, welche sich in Faserbiegungen und Zerreissungen kund geben sollten, und dass weiter bei dem endlich zu verlangenden Umsatz von Fettsäure und Phosphorsäure (wenn nicht überhaupt die die Struktur verursachenden Streifen zerstört würden), weitere Volumveränderungen eintreten müssten und bei dem auf dem Körper lastenden Schlamm- oder Gesteinsdruck die ganze Versteinerungsmasse eher in eine Mineralbreccie verwandelt sein würde, als sie das getreue Urbild abgetödteter, faulender Muskulatur in einem so reinen, durchaus von sekundären Ereignissen unberührten, mineralisch unzersetzten Material erhalten könnte.

Mit dieser Betrachtung wenden wir uns von Owens Adipocire¹⁾ zu einem anderen Erklärungsversuch, der besonders letzterem Umstande Rechnung trägt, dass nämlich durch die Phosphoritisirung keine Volumveränderungen der erhärtenden organischen Materie stattfindet, wie dies bei vielen Verkalkungen in Weichtheilen vorgebildeter Skeletttheile (ich erinnere hier nur an die Verkalkung des hyalinen Knorpels) im organischen Process zu sein pflegt.

Unter den Untersuchungen, welche den Vorgang von Kalkniederschlägen in Eiweisssubstanzen oder in deren Derivaten besonders zum Gegenstand haben, sind uns vor Allem und einzig die Experimente von Harting wichtig (Verhandlungen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Amsterdam 1873: *Recherches de Morphologie synthétique sur la production arti-*

1) Herr Dr. Eb. Fraas hat in einer freundschaftlich beabsichtigten, aber nicht autorisirten Mittheilung über einzelne Punkte meines Untersuchungsganges (vgl. Jahrb. für vaterl. Natf. Württemb. 1889, S. 232) angegeben, ich suche die Erklärung in der Bildung von Leichenwachs, er glaube aber für seine Person, dass die Muskelsubstanz selbst chemisch mitgewirkt habe. Ersteres beruht auf einem Missverständniss meiner mündlichen Mittheilungen, Letzteres war von Anfang meine Meinung und schliesst einen Rechtfertigungsversuch von Owen's Annahme von Adipocire von vorneherein ein. Schliesslich darf ich meinen Freund daran erinnern, dass uns beide die chemische Untersuchung von Herrn A. Schwager darauf führte, dass die Muskelsubstanz d. h. ihre Asche chemisch bei der Versteinerung mitwirken könne und nicht umgekehrt diese Annahme erst durch die chemische Untersuchung bestätigt wurde. Uebrigens kann, wie oben auseinandergesetzt, die Asche von Muskel und Lymphe nur in geringem Umfange sich an der Fossilisation betheiligt haben.

ficielle de quelques formations calcaires organiques)¹⁾. Harting weist nach, dass organische Flüssigkeiten thierischen Ursprungs Niederschläge von schwer löslichen oder unlöslichen Kalksalzen im Status nascendi beeinflussen, bestimmte und für gewisse Combinationen eigenthümliche Formen anzunehmen. Wie die Krystalle nothwendig aus einem flüssigen Stadium entstehen und hier das Lösungswasser auf ihre Formen einen eigenen Einfluss ausübt, so entstehen aus Lösungen organischer Flüssigkeiten bei der Erzeugung unlöslicher Ausscheidungen Krystalloidgebilde mit Einschlüssen organischer Materie, welche erstens wechselnde, aber für einzelne Fälle bestimmte Formen annehmen und zweitens die organische Materie als Gerüstsubstanz dieser Formen in einem ganz eigenthümlichen Aggregatzustand einschliessen. Dieser Aggregatzustand ist für das flüssige thierische Eiweiss merkwürdiger Weise ungefähr der des „Conchyolin“, der Gerüstsubstanz der Molluskenschalen.

Harting hat die Versuche an Eiweiss vom Hühner-Ei, an Gelatine, an Mischungen beider, an Blut, Galle, am Schleim von *Arion rufus*, an der Schirmsubstanz von *Aurelia aurita* etc. gemacht und findet, dass sich bei sehr langsamen Niederschlägen von Calciumcarbonat (aus Chlorealcium und Natriumcarbonat) in den organischen Flüssigkeiten krustenartige Ansammlungen von kugeligen Concretionen bilden, welche er Calcosphaerite nennt und deren organisches Gerüst als Calcoglobulin bezeichnet wird. Diese Calcosphaerite zeigen je nach den organischen Flüssigkeiten wechselnde Gestalt und wechselnde Verbindung unter einander; sie haben radial faserigen, concentrisch lamellösen Bau.

Neben den Calcosphaeriten entstanden auch ganz dünne Lamellen ohne fibrilläre Struktur, wenn auch in reichlichen Fältelungen und Zuwachsstreifungen. Diese Lamellen oder strukturlosen Häute entstanden aber nur bei Anwesenheit eines Phosphates. Kalkphosphat kann also in eiweisshaltigen Flüssigkeiten aus einer Combination gelöster Salze in statu nascendi sich mit dem Eiweiss verbinden, die Verbindung bleibt aber amorph.

Dass hier der flüssige Zustand der Eiweisssubstanzen eine wichtige Rolle spielt, wird dadurch bewiesen, dass differenzirte Gewebe-

1) Vgl. auch Steinmann: Ueber Schalen- und Kalksteinbildung in Ber. d. naturf. Gesellschaft zu Freiburg in Br., Bd. IV, Heft 5.

formen, wie Osseïn, Sehnensubstanz, hyaliner Knorpel oder geronnenes Eiweiss, Blutgerinnsel etc. keine Calcosphaerite etc. bilden; dies ist begreiflich wegen der Nothwendigkeit der vollständigen und gleichmässigen Vertheilung der gelösten Salze, welche bei dem Niederschlag ein chitinöses Eiweissgerüst einschliessen, das nach der Entkalkung dieselbe Form behält, wie der Calcosphaerit selbst (man vergl. Knochen vor und nach der Entkalkung).

Weiterhin ist es die flüssige Form von Eiweiss, die schnell dem Fäulnisprocess verfällt und sehr wahrscheinlich (vgl. Steinmann, Ueber Schalen- und Kalksteinbildung, Berichte d. naturf. Ges. Freiburg i. B., Bd. IV, Heft 5) spielen bei dem Kalkniederschlag Fäulnisprodukte eine wichtige Rolle.

Harting legt diese Versuche im Princip allen Kalkablagerungen der Skelet- und Schalenbildung zu Grunde. In der That, wenn man die Elemente der Letzteren betrachtet, wird man nur beistimmen können und es muss ein gewisser, der Fäulnis verwandter Zersetzungszustand der lebenden Eiweisssubstanz als die Ursache der unlöslichen Niederschläge von kohlensaurem, phosphorsaurem Kalk und Magnesia, Fluorcalcium etc. aus den in den Zellen gelösten Salzen betrachtet werden¹⁾.

Der gleiche Process, glaube ich, darf auch der Phosphoritisirung der Muskulatur zu Grunde gelegt werden. Wir haben in der Asche der Muskulatur, in der Erfüllung des Magens etc. die phosphorsauren Salze und Kalksalze im Meereswasser gelöst; wir haben weiterhin einen Niederschlag in der faulenden flüssigen Zwischensubstanz der Muskulatur anzunehmen, welcher die bei dem Eintritt des Todes coagulierte Fibrillensubstanz einschloss (vgl. S. 541 unten) und jedenfalls bis zu einem gewissen Grade seiner Erhärtung conservierte. Diese eingeschlossenen organischen Reste faulten dann erst (vgl. auch S. 568) nach Festigung der umgebenden Substanz und letztere zeigt nun in Poren, Lücken, Spalten, streifenweise geordneten Dichteunterschieden der anorganischen Masse die ursprüngliche Vertheilung der eingeschlossenen und von der beginnenden Fäulnis, welche eben den Kalk-

1) So entstehen in vielen pathologischen Processen Concretionen von $\frac{2}{3}$ gesättigten phosphorsaurem Kalk, welche sich in ihrem mineralischen Verhalten von einzelnen Kammern von Foraminiferen nicht unterscheiden. Fast alle übrigen organischen Verkalkungen lassen sich als Modificationen solcher Bildungen auffassen.

niederschlag erzeugte oder demselben in gewisser Weise ursächlich vorausging, abgeschlossenen, mehr oder weniger wohl erhaltenen Fibrillensubstanz.

Wir haben oben auf die Thatsache einer der Verkalkung vorausgehenden Zersetzung ausführlich aufmerksam gemacht; wir haben nachgewiesen, dass typische strukturführende Muskelmasse in allen möglichen Uebergängen in ein- und angeschlossenes strukturfrees Steinmaterial übergeht, dass letzteres ebenso der Verkalkung der Muskulatur angehört, aber schon vor Eintritt der Verkalkung die Struktur verloren haben musste. Da sich nun die strukturführende Versteinerungsmasse in Nichts von der strukturfreen unterscheidet, als in Dichteverhältnissen der Substanz mit linear eingestreuten, sehr kleinen Poren, welche den Fibrillen entsprechen, so ist auch hier zu bestimmen, dass die Verkalkung der ersteren ebenso erst nach einer gewissen Zersetzung der Zwischensubstanz der Fibrillen eingetreten sein konnte. Hiermit ist die Uebereinstimmung mit den Harting'schen Experimenten gegeben, dass die Verkalkung in der sich zersetzenden flüssigen Eiweisssubstanz stattfindet und zugleich die in coagulirtem Zustande befindliche Fibrillensubstanz an der Verkalkung nicht theilnimmt. Diese ist also per se in die Versteinerung eingeschlossen; nun ist noch die Frage, wie sich die der Versteinerungsmasse räumlich entsprechende organische Substanz zu dieser verhält. Wollte man einen schrittweise stattfindenden Ersatz der organischen Substanz durch die anorganische und eine endliche räumliche Verdrängung der ersteren durch letztere annehmen, so wäre zu verlangen, dass (da die Abführung der Zersetzungsprodukte von allen Seiten der eng aneinander liegenden Fasern stattfinden muss) selbst bei Annahme des allmählichsten und leisesten Entwicklungsganges der Fäulniss und Zersetzung der ganzen organischen Substanz der Fasern dies grosse Störungen der Muskelstruktur und des Bildes der Muskelbündel verursachen müsste. Da alles Aufsteigen gasartiger und aller Austausch flüssiger Zersetzungsprodukte eine gewisse Ansammlung und Spannung derselben verlangt, so müsste bei dem Transport solcher aus dem Innern der Fasern vor allem eine höchst unregelmässige Verzerrung der Struktur derselben zu bemerken sein; weiter müssten solche Störungen in erhöhtem Maasse zwischen den einzelnen Fasern bei dem Transport aus den Muskel-

bündeln nach den sehnigen Hüllen derselben stattfinden; desgleichen an den Grenzen der einzelnen Bündel selbst, da an diesen Stellen die erst nach der Verkalkung vollständig ausfaulenden Sehnenwände nothwendig sehr starke Stauungen hervorbringen müssen; endlich an der Oberfläche der Haut, wo die Cutis mit ihren Verkalkungen ausserordentlich retardirend wirken muss. Von irgend welchen Störungen dieser Art ist aber das Muskelbild vollständig frei; es giebt schwache Contraktionslücken zwischen den Fasern, aber durchaus keine Anzeichen von Expansionen, welche als Störungen des Querscheibchen-Fibrillen- und Faserverlaufs oder als Auseinanderzerrungen der grösseren Bündel wirkten. Das reine, ungestörte Bild der im ersten Beginn sich ersetzender Muskulatur befindlichen Versteinerungsmasse verlangt daher, dass weitere substantielle Transporte und stärkere chemische Umsetzungen in dieser weichen organischen Masse bei der Petrificierung selbst nicht mehr stattgefunden haben können; es musste daher der grösste Theil der eiweissartigen Zwischensubstanz in die Verkalkung eingeschlossen worden sein. Hier treten wieder die Harting'schen Experimente zum Verständniss ein; es ist festgestellt, dass bei diesen künstlichen Verkalkungen ebenso, wie bei den organischen, stets eine eigenthümliche Eiweisssubstanz aus der den Kalkniederschlag erzeugenden organischen Flüssigkeit mit der Verkalkung eliminirt wird. Wenn eine solche Gerüstsubstanz nicht mit der Kalkmasse der fossilen Muskulatur festgehalten wäre, wenn also letztere nur wie Schlamm in der faulenden Materie suspendirt gewesen wäre, so wäre ja die Wahrscheinlichkeit vorhanden, dass derselbe von den Bewegungen der faulenden Flüssigkeit in wechselnder Weise wieder fortgeführt wurde. Nur durch die engste Verbindung des Kalks mit einer aus der Zwischensubstanz eliminirten Gerüstsubstanz ist auch die frühe Solidificierung zu erklären, welche die Form und Struktur der Fasern gegen alle spätere Einwirkung bewahrte. Diese organische Gerüstsubstanz verschwand später ebenso wie die fibrillären Einschlüsse und andere organisirte Gerüstsubstanzen.

Dieses Alles beweist, dass in der That solche jenen von

Harting künstlich erzeugten Niederschlägen nächstverwandte Processe hier vorliegen; dies wollen wir im Folgenden noch durch besondere Ausnahmeerscheinungen näher ausführen. Vor allen Dingen müssen wir hier der schon oben erwähnten, bei *Ischyodus* und *Chimaeropsis* besonders häufig beobachteten sphärolithischen Bildungen gedenken. Sie haben zwar durchweg nur die Grösse der allerkleinsten von Harting beobachteten Calcosphaeriten, aber diese Kleinheit leitet eben über zu dem sonst durchaus amorphen Niederschlag, welchen Harting in Lamellen bei Anwesenheit von phosphorsauren Salzen aus der organischen Lösung erhielt. Man wird nicht leicht vollkommenere Vergleiche erwarten können.

Um das Zurückgreifen auf die Harting'schen Experimente noch weiter gerechtfertigt erscheinen zu lassen, muss ich hier noch auf eine andere Fossilisationserscheinung, welche aber nicht in der Muskulatur stattfindet, aufmerksam machen. Wir haben oben bei *Ischyodus* und *Chimaeropsis* erwähnt, dass in den Kalkprismen des hyalinen Knorpels der fossilen Elasmobranchier fast durchweg und zwar von Vertretern aus den verschiedensten Ablagerungen (*Xenacanthus* aus der permischen Kohle von Nürschan und den Elasmobranchiern aus den jurassischen Solnhofen Schiefer) die Zellräume vollständig verschwunden seien, das Prisma nichts mehr von der strahligen Struktur zeige, sondern nur die bei Prismen lebender Knorpelfische ganz stellenweise deutliche periphere Streifung, welche aber fossil als unregelmässig concentrische Faserung sehr deutlich in der sonst homogenen Masse auftrate. Diese Metamorphose ist um so räthselhafter, als Skelet-Theile mit der continuirlichen Verkalkung faserigen Bindegewebsknorpels (Wirbel, Genital- und sexuelle Stirnfortsätze) an denselben Exemplaren die Zellräume in typischer Erhaltung und auch keine weiteren Spuren der Metamorphose zeigen; sie sind erhalten, wie stets die Knochen und Dentingebilde erhalten sind, bei welchen sich eine Fossilisationsmetamorphose auch in gänzlich verschiedener Weise zeigt.

Ich halte daher die Metamorphose in den Prismen hyalinen Knorpels für eine Metamorphose, welche sich unmittelbar an die Fäulniss des Knorpels anschliesst und zwar können wir auch hier die Harting'schen Versuche zum Paradigma nehmen. Harting hat ausser den flüssigen Eiweisssubstanzen auch här-

tere, wie Sehnen, Ossëin und Knorpel seinen Versuchen unterzogen und fand, dass Calcosphaeritenbildung nur in den Zellen hyalinen Knorpels stattfindet und sich noch schwach über die Grenzen der Zellen fortsetzen könne. Denken wir uns diesen Process in den Kalkprismen vorgehen, so wird sich in den Zellräumen ein Niederschlag bilden, welcher chemisch ein dem Knorpelkalk ähnliches Verhalten zeigt. Wenn das Lösungsmittel die Kalkprismen durchsetzt, wird es mit eben solchen Salzen zu den Zellen gelangen, als die Prismen enthalten; die Möglichkeit der endlichen Bildung einer homogenen Masse ohne Zellräume und mit den oben erwähnten Zeichen innerer Umsetzung ist daher sehr nahegelegt. Dass sich nun Selachierwirbel und andere Verkalkungen von Bindegewebsknorpel, so wie Dentin und Knochenskelettheile in fossilem Zustande nicht ebenso verhalten, liegt wahrscheinlich nur an der schwächeren Imbibitionsfähigkeit dieser Substanzen. Dieselben verkalken im vitalen Process direkt, während die Prismen in dem hyalinen Knorpel erst nach Bildung der hyalinen Substanz durch nachfolgende Auflösung derselben stattfinden kann. Hierbei ist nicht zu übersehen, dass die Grundsubstanz dieser beiden Knorpel sich auch zoochemisch unterscheidet, die der hyalinen ist Chondrogen, die des Faserknorpels ist Collagen. Es ist natürlich, dass bei dem hyalinen Knorpel die in die Verkalkung einbezogene organische Gerüstsubstanz in einem ganz anderen Verhältniss zur anorganischen Verfestigung steht, als bei den Bindegewebsknorpeln. Kalkprismen sind weicher und leichter permeabel, als irgend eine Verkalkungsform bei Vertebraten. Die nach dem Tode sich zersetzende Gerüstsubstanz bildet die Zuleitung der Lösungsmittel zu den Zellen und die Zellen sind die Punkte phosphorischen Niederschlags, zu welchen wahrscheinlich die Umsetzung des anorganischen Materials die Salze selbst lieferte. Hierdurch wird das fossile Prisma fast homogen, zeigt sehr schön die Zuwachsstreifung, die bei lebendem Material nicht hervortritt und wird im Uebrigen fossil stets härter als rezent; fossile Prismenknorpel zeigen oft homogenen, muscheligen Bruch und Steinhärte, ohne körniges Gefüge.

Herr A. Schwager hatte die Freundlichkeit, einen solchen Knorpel (*Ischyodus*) zu untersuchen. Ausser den Alkalien, welche letzteren bei der fossilen Muskulatur auf die im lebenden Muskel enthaltenen Salze hinweisen, ist die chemische Zusammen-

setzung fast die gleiche, wie die des Myophosphorits (54,62 CaO, 34,51 P₂O₅; 5,31 CO₂; 0,54 MgO; 1,61 SO₃; 0,69 Fe₂O₃; 2,42 Org + H₂O = 99,70)¹⁾.

Wenn so die Umstände der Verkalkung der Muskulatur etc., d. h. sowohl die Zustände der verschiedenen organischen Grundsubstanzen als des erfolgenden anorganischen Niederschlags auf die Experimente Hartings passen, so gilt dies auch von der Zeit, in welcher ein solcher Niederschlag erfolgt. Wie diese nur wenige Wochen in Anspruch nehmen, so muss dies auch für die Erscheinung der Fossilisation gelten, welche zu einer Zeit stattfand, in welcher die Muskelstruktur sich meist noch ganz erhalten hat. Es mussten aber auch zu dieser Zeit schon alle Salze oder annähernd der grösste Theil verfügbar gewesen sein, auf der einen Seite lösliche kohlensaure und phosphorsaure Salze (Alkalien), welche ganz nach dem Schema der Harting'schen Versuche mit löslichen Calciumsalzen kohlensauen und phosphorsauren Kalk liefern mussten.

Zu den in der Muskulatur selbst vorhandenen löslichen phosphorsauren Salzen treten, wie auseinandergesetzt, solche aus dem von den Magensäuren gelösten Knochenbrei; in letzterem löste Salzsäure den gesättigt-phosphorsauren Kalk der Knochenerde in $\frac{1}{3}$ gesättigt-phosphorsauren Kalk unter Bildung von CaCl₂ (vgl. Gmelin-Kraut, Anorg. Chem. II. 1. S. 370), welche sich später in der Muskulatur unter dem Einfluss der faulenden organischen Substanz wieder vereinigen können. Es ist dies sehr wichtig,

1) Bei vital nicht verkalktem hyalinen Knorpel würden die calcosphaeritischen Bildungen der einzelnen Zellen bei vollständiger Fäulniss des Knorpels entweder wieder ausgeschwemmt, oder sie könnten sich auch an Ort und Stelle ansammeln. Derartiges ist nun allerdings nicht festzustellen und es liegt auch die erstere Wahrscheinlichkeit näher. Was aber bei den Knorpelzellen möglich ist, das sollte von wenig faserig umgewandelten Bindegewebszellen wohl auch gelten; es ist daher nicht unmöglich, dass der schwache, an Eisenoxyd- und Kalkspathknöllchen reiche Niederschlag, welcher den Umriss der Schwanzflosse von Ichthyosaurus erhalten hat (vgl. Reptilien) der inneren bindegewebigen Erfüllung derselben zu verdanken ist. — Ob die berühmten Medusenabdrücke des lithogr. Schiefers unter Beihülfe solcher Kalkniederschläge entstanden sind, ist mir sehr fraglich, obwohl Harting auch mit der Schirmsubstanz von *Aurelia aurita* experimentirte und Calcosphaerite entstanden.

denn wenn wir phosphorsaure Salze und Fluorcalcium in grösserer Menge in der Nähe der in den ersten Zersetzungszuständen befindlichen Muskulatur verfügbar annehmen müssen, so gilt dies auch für Chlorcalcium, welches bei viel grösserer Löslichkeit, als der des schwefelsauren Kalks, welcher auch im Meerwasser vorkommt, hier zuerst in Betracht kommen muss (vgl. Hartings Versuche mit kohlen- und phosphors. Alk. und Chlorcalcium).

Die Annahme, dass das aus den Knochen gelöste ungesättigte phosphorsaure Salz sich in der Muskulatur unter dem Einfluss der bei der Fäulniss derselben entstehenden organischen Produkte wieder mit Chlorcalcium verbinde, scheint ihre Parallele darin zu haben, dass sich dasselbe auch erst im Enddarm wieder, vielleicht unter dem Einfluss fortschreitender Verdauung (in Begleitung der aus den Darmanhängen stammenden Secretionen) zu den in unlöslicher Form erhaltenen Coprolithen oder Cololithen verdichtet. So weit nämlich meine Beobachtungen an fossilen Fischen reichen, erscheint der Magen derselben nur durch Skeletttheile, aber nicht durch knochenbreiartige Massen erfüllt¹⁾. — Leider liegen keine sicheren Daten über den Verdauungsgang der Knochen im Magen und besonders im Darm vor; doch wird nur durch obige Darstellung die Möglichkeit der Vergleichung der Muskelfossilisation mit den Harting'schen Experimenten auch den äusseren Umständen nach geschaffen, nach dem dieselbe dem mikroskopischen Befund nach so gut wie sicher sich dargestellt hat.

1) Es lässt sich Aehnliches auch vielleicht aus dem geologischen Auftreten der Coprolithen schliessen. Erwägt man, dass jedes Individuum der unzähligen räuberischen Vertebraten nur ein Skelet hinterlässt, während es unzählige Individuen vertilgt hat, deren Skelete in seinen Excrementen repräsentirt sind, so versteht man, warum immerhin nur ein geringer Bruchtheil der für die Entwicklung der Arten nothwendig zu erfordernden Individuenzahl als Skelete in den Erdschichten erhalten sein können. Dies stimmt mit den thatsächlichen Verhältnissen; damit stimmt aber nicht das Vorkommen von Coprolithen; sie sind auch nicht im geringsten Verhältniss zu der hypothetisch zu erfordernden Individuenzahl als in dem Magen grösserer Raubthiere zu Knochenbrei verwandelten Skelete in den Erdschichten vorhanden. Hieran ist wohl weniger ihre Consistenz schuld, als wahrscheinlich hauptsächlich der Umstand, dass die phosphorsauren Salze häufig in löslicher Form den Körper verlassen. Daher sind Excremente als Hauptquelle der im Meerwasser gelösten Mengen phosphorsauren Kalks, Fluorcalciums und Chlorcalciums anzusehen (vgl. unten S. 576—580).

Nachdem so erklärt ist, warum Muskel- (und [?] Nerven-) system posthum verkalken können, warum im Muskelsystem aber die fibrilläre Substanz hierbei nicht verkalkt, warum im hyalinen Knorpel nur die Zellen verkalken können und daher deren Zellräume im fossilen Zustand in den Kalkprismen verschwinden, warum weiterhin kein Muskelschlauch, keine Fasern, keine Sehnen, kurz kein differenzirtes Bindegewebe im Anschluss an die Muskulatur posthum verkalkt, können wir auch ein Urtheil über die Wahrscheinlichkeit posthumer Verkalkung in anderen Geweben abgeben.

Dies ist besonders wichtig, weil Dr. E. Fraas zu derselben Zeit, als ich meine, die Thatsache der Muskelverkalkung beweisenden Untersuchungen bei *Undina* veröffentlichte, bei *Ichthyosaurus* gerade behauptete, dass die Muskelstruktur durch die Kalkinfiltration zerstört sei, dagegen die Cutis mit ihren Pigmentzellen und die Epidermis mit Horngeweben noch petrificirt vorliege. Wir haben nun oben schon dargelegt, dass die diese histologische Diagnose stützenden mikroskopischen Erscheinungen nur auf Längs- und Querschnitte von mit Eisenverbindungen infiltrirter Muskelverkalkung zurückzuführen seien und es fragt sich nur noch, ob Cutis- und Epidermoidgewebe nach der Theorie unserer Verkalkung in phosphoritisirtem Zustande erhalten sein können. Bei den Fischen haben wir keine sicheren Spuren der Erhaltung der Cutis in petrificirter Umwandlung; wir haben zwar bei *Eurycormus* erwähnt, dass anscheinend Zeichen einer solchen vorliegen, doch sind dieselben zu unsicher. Ausser diesem Falle scheinbarer Cutiserhaltung wurde nie Aehnliches beobachtet. Man könnte nun einwenden, dass bei den beschuppten Fischen und besonders dickschuppigen Ganoiden so wesentliche Theile der Cutis in den Schuppen vital verkalkt seien, dass ein Nachweis posthum verkalkter Cutis gar nicht möglich sei. Hiergegen sprechen nun besonders der Ganoide *Callopterus* und der Holocephale *Ischyodus*. Ersterer hat nur in der oberen Schwanzspitze dicke Schuppen, der übrige Körper ist ohne solche und die Muskulatur ist in Masse und Struktur vorzüglich erhalten; dagegen fehlt jede Spur einer Cutisverkalkung. Das Gleiche gilt für den nackten *Ischyodus*, welcher der lebenden *Chimaera* so ausserordentlich nahe steht. Bei den lebenden Holocephalen ist die Cutis reich pig-

mentirt, sehr feinfaserig, dicht und widerstandsfähig. Wenn die Cutis in gleichem Maasse wie Muskeln verkalken könnte, so müsste sie an diesen in ihrer Muskulatur untersuchten Exemplaren zu finden sein. Sie fehlt aber sowohl am Körper, als am Kopf; die Schleimcanäle des Rumpfes mit ihren in der Cutis liegenden faserknorpeligen Halbringen sind in die Muskulatur eingedrückt, die Schleimcanäle des Rostrums liegen ordnungsgemäss weit vor dem verkalkten Knorpelceranium nackt auf dem sedimentären Kalk; die Muskelverkalkung reicht bis in die vordersten Fasern des Adductor mandibularis und doch ist keine Spur der die grossen Kalkringe tragenden, zähen Cutis gerade in diesem wichtigen Abschnitt in verkalktem Zustande vorhanden.

Ein Erklärungsprinzip für die posthume Phosphoritisirung kann also auf einer Verkalkung von differenzirtem Bindegewebe nicht fassen und unser Erklärungsversuch lässt auch eine solche im Allgemeinen gar nicht zu.

Es könnte auch nach unseren obigen Auseinandersetzungen eine Verkalkung der Cutis (sowie aller Sehnen und Häute) nur möglich sein für die zwischen den Bindegewebsfibrillen liegenden undifferenzirten Theile der Mesodermzellen. Wir haben oben etwas Aehnliches für die Zellen des verkalkten hyalinen Knorpels dargestellt, welches aber für den fossilen Bindegewebsknorpel nicht gilt. Die Zellen verkalkten Bindegewebsknorpels verkalken nicht posthum und wir haben die Ursache auf die Verschiedenheit der organischen Gerüstsubstanz (Knorpelleim und Knochenleim) und seine Fäulniss zurückgeführt. Dieselben Hinderungsgründe gelten vielleicht auch für die unverkalkten Bindegewebe, welche alle Knochenleim enthalten, darunter auch die Cutis. Und wenn ihre Zellen verkalken könnten, so könnten sie wegen des Ueberwiegens der Fibrillen (vgl. Muskelfibrillen) in gewöhnlichem Zustande keine continuirliche Lage erzeugen.

Was nun die „Epidermisverkalkung“ betrifft, so ist sie gleichbedeutend mit einer Möglichkeit der Hornverkalkung. Hier kann es sich natürlich nicht um eine Verkalkung des Zelleninhaltes handeln, sondern um eine solche der verhornten Zellwände. Die Möglichkeit einer Verkalkung der Hornsubstanz könnte aber nur auf den Nachweis einer Verflüssigung derselben bei der Fäulniss aufgebaut werden. Es ist aber bekannt, dass das Horngewebe in feuchtem Zustande unfähig ist zu faulen (vgl. Schlossberger

a. a. O. S. 287). Die wunderbare Erhaltung der Federabdrücke bei *Archaeopteryx* aus dem lithographischen Schiefer bestätigt diese Widerstandsfähigkeit.

Jedenfalls erhält sich Hornsubstanz in unerweichtem Zustande weit über den Zeitpunkt hinaus, wo die Muskulatur längst verkalkt sein musste und überhaupt bis zu einem Zeitpunkt, wo die äusseren Bedingungen einer Verkalkung, bei einer verhältnissmässig vorgeschrittenen Austrocknung der umgebenden Schlamm-masse auf das Vorhandensein der die Versteinerung verursachenden Salze in löslicher Form und in genügender Concentration längst zu existiren aufgehört haben. Dies gilt wenigstens für Federn (*Archaeopteryx* etc.), wobei allerdings der Kieselsäuregehalt in der Erhaltung der Form mitgewirkt haben dürfte. Gewöhnliche Hornschuppen und -platten zerfallen früher faserig-schalig, kleinblättrig und zerschleissen sich in ihre kleinsten zelligen Componenten, ehe sie in einen weichen Zustand zur Aufnahme von Kalksalzen übergehen; sie können sich also auch aus diesem Grunde nicht in continuirlicher Lage phosphoritisirt erhalten haben. Weiter ist nicht anzunehmen, dass die von dem gewöhnlichen Zustande des thierischen Protoplasmas so abweichend differenzirte Hornsubstanz bei der Fäulniss wieder in jenen Zustand zurückkehrt, in welchem die mesodermalen Stützgewebe nicht zurückkehren und daher nicht verkalken, wie die viel weniger differenzirte Muskelsubstanz es thut; es ist unwahrscheinlich, dass sie also wieder in einen Zustand gelangen, in welchem sie Salze aufnehmen und mit eigenthümlicher organischer Gerüstsubstanz niederschlagen können, wie das lebende Protoplasma im organischen Process. — Hierbei werden bei niederen Thieren zugleich mit der Bildung der chitin- und conchyolinartigen Gerüstsubstanzen die calcosphäritischen Bildungen abgelagert, bei den Vertebraten zugleich bei der Bildung des Dentins, von Bindegewebsverkalkungen und Knochen mit dem Glutin die lamellös-globulöse Ablagerung der phosphorsauren Salze verknüpft oder es tritt wie bei der Verkalkung des hyalinen Knorpels erst eine Auflösung der hyalinen Substanz ein und in den aufgelösten Partien die Ablagerung von sphäritischen Kalkkrümeln. Eine ähnliche Annahme lässt sich poshtum für die Hornsubstanz nicht machen und es ist hierfür bezeichnend, dass die Sphenodontiden im lithographischen Schiefer

fer, wo die Bedingungen zur Phosphoritisirung der Hornsubstanz gewiss gegeben wären, keine Spur der Erhaltung der Hornschuppen aufweisen (ich will hier die Chelonier des lithographischen Schiefers nicht anführen, weil dieselben auch keine Muskelverkalkung zeigen). Eine solche Annahme ist aber nothwendig, nachdem festgestellt ist, dass nur gering differenzirte Eiweisssubstanzen bei ihrer freien Zersetzung nach kurzer Zeit aus gelösten Salzen Kalkniederschläge bilden, welche den Grundtypen der Kalkabsätze im vitalen Process gleichen und nachdem wir nachweisen konnten, dass dieselben, besonders die sphärolithischen Calcosphaeren bei der Phosphoritisirung der Muskulatur thatsächlich auftreten.

Es scheint also für die etwaige posthume Verkalkung thierischer Gewebe folgende Regel zu gelten: eine Petrificirung der Eiweisssubstanzen findet nur statt in den Theilen, welche im Leben eine möglichst wenig differenzirte Form des Protoplasmas bewahrt haben; sie findet nicht oder seltener statt in allen differenzirten Zellsubstanzen, am wenigsten in solchen, welche schon im vitalen Prozess Neigung zu Verkalkungen zeigen; hierher gehören die Hornhaut, Cutis, alle Sehnen und Häute, hyaliner Knorpel (exclus. dessen Zellen) und Bindegewebsknorpel¹⁾. Alle Drüsen und drüsenartigen Anhänge des Darms mit ihrem Bindegewebsgerüst, ihrer reichen Gefässverzweigung und ihren specificirten Zellen (vielleicht wegen der physiol. Differenzirung derselben) haben sich nicht erhalten. Die erst erwähnten Gewebe sind die Muskulatur und wahrscheinlich das Nervensystem; in ersterer ist es auch die in der Todesstarre fibrillär gerinnende anisotrope Substanz, welche nicht verkalkt.

Dieser Verkalkung thierischen Gewebes steht nun eine zweite pflanzlichen Ursprungs zur Seite, welche von hohem Interesse ist, die Phosphoritisirung bei fossilen Hölzern. Holz aus dem Grünsand der Insel Wight zeigt bei einem sp. Gew. von

1) Ich meine hier natürlich unverkalkt oder unverknöchert gebliebene, vollständig entwickelte Gewebe. Bindegewebe mit weniger differenzirter Zwischensubstanz mögen ebenso verkalken können, wie die Muskulatur; für die geschichtete Cutis gewöhnlicher Differenzirung, besonders nackter Thiere würde eine Verkalkung nach unserer Theorie nicht eintreten können; doch liessen sich Ausnahmefälle und besondere Zustände des Integuments denken, welche eine solche nicht ausschliessen.

2,75, 41,21 CaO, 1,07 MgO, 34,07 P₂O₅, Fl 4,17, H₂O 11,77, SO₃ 7,08. Spuren org. Subst.; foss. Holz aus dem Grünsand der Bukowina hat: 67,5 Ca³(PO₄)², 9,3 CaFl, 13,5 CaCO₃, 3,26 CaSO₄ und Wasser, org. Subst. etc. Ganz ähnlich sind Hölzer der Apatitsandsteine der russischen Kreideformation zusammengesetzt (z. B. No 4: J. Roth, chem. Geol. S. 610) 52,01 CaO, 0,42 MgO, 92,84 P₂O₅, (Fluor nicht bestimmt)¹⁾ 1,55 SO₃, CO₂ 6,86 etc.). Wiederum zeigt phosphoritisirtes Holz aus der Kreide von Islettes, Dep. de la Meuse 50,47 CaO, 0,62 MgO, 36,57 P₂O₅, 3,31 Fl, 0,35 SO₃, 2,42 CO₂, Eisenoxyd, Wasser etc.

Die grosse Gleichheit der Analysen dieser von den verschiedensten und sehr weit auseinander liegenden Fundpunkten stammenden phosphorisirten Hölzer untereinander und ausserdem mit der Zusammensetzung des Myophosphorits beweist, wie mir scheint, dass hier ein gesetzmässiger Niederschlag vorliegt, der mit der Fäulniss der Holzsubstanz in Zusammenhang steht und sich hierbei ähnliche Absätze bilden können, wie bei der Muskulatur. Nur ist hier der Unterschied, dass die Ablagerung in den Fasern des differenzirtesten Pflanzengewebes eintritt und nicht in den undifferenzirten parenchymatösen Theilen. Ausserdem ist der gewaltige weitere Unterschied zu betonen, dass sich die Holzsubstanz unter Wasser nur äusserst langsam und unvollkommen zersetzt; wir müssten also in dessen Phosphoritisirung einen ausserordentlich allmählichen Vorgang erkennen, dessen Zeiträume auch hinreichen würden, aus der Umgebung des Wassers die Salze im faulenden Holze zu sammeln und niederzuschlagen.

Wir haben auch hier die Frage ins Auge zu fassen, woher der phosphorsaure Kalk, besonders aber das Fluorcalcium stammen; dass beide zu keinem noch so kleinen Theil aus dem Holze selbst stammen, ist natürlich. Nun kommen in den Grünsandablagerungen der Kreide nicht nur solche phosphorisirte Hölzer vor, sondern auch Skeletreste von Thieren (Schalen, Schwamm-skelete), deren Inneres mit Phosphorit erfüllt sind, desgleichen Steinkerne phosphoritischer Zusammensetzung, Knochen und Coprolithe. Im unteren Lias finden sich ebenso solche Lager, ein Vorkommen von D'Avallon wurde von Deschamps (Comptes

1) Bei einem fossilen Holz von Uschakowka (Kursk) 4,75 (vgl. Roth, Chem. Geologie, Bd. II, S. 610, No. 3).

rendus 49. 1859. S. 136) analysirt und es fand sich in solchen Steinkernen 32,14 % P_2O_5 , 2,73 H_2O und org. Subst., sodann Eisenoxyd, MgO , KaO , NaO , CaO , Fl , CO_2 und SO_3 , ausserdem Thonerde und Kieselsäure als Verunreinigungen. Sowohl die Menge der Phosphorsäure als die Anwesenheit der übrigen Salze stimmt mit unseren Vergleichspunkten (des Myo- und Xylophosphorits) vollkommen.

Auch im oberen Lias kommen solche Phosphoritbildungen vor, welche sowohl Schalen erfüllen, als auch knollig-traubige Umhüllungen um dieselben bilden. v. Gümbel hat (Sitzungber. der bayer. Akad. d. Wiss. II. Cl. 1864. S. 325) im Anschluss an bayerische Vorkommen, deren Bildung als eine Geoden-artige erklärt; die Concentration der phosphorsauren Salze habe innerhalb des weichflüssigen Grundschlammes stattgefunden; der Kern der Knollen enthalte dann die Hauptmasse des phosphorsauren Salzes, nach der Peripherie reichert sich das sedimentäre Material an und bildet einen mehr oder weniger allmählichen Uebergang in das Schichtgestein.

Da diese Geoden stets thierische Skeletüberreste enthalten, so ist es wohl nicht zweifelhaft, dass die organische Substanz in irgend einer Weise bei ihrer Bildung mitgewirkt hat.

Das Vorkommen solcher Phosphoritknollen ist nun durchaus kein zu häufiges und merkwürdigerweise an gewisse Horizonte und in diesen an Localitäten geknüpft; wir müssen also besondere Umstände ihrer Bildung annehmen, es muss erstens das Wasser besonders geeignet gewesen sein, Phosphorsäure d. h. ihre Salze zu lösen oder gelöst zu halten, andererseits muss auch besondere Gelegenheit zu ihrer Aufnahme in das Wasser vorhanden gewesen sein.

Wir haben nun oben S. 572 Anm. besonders darauf aufmerksam gemacht, dass ein ausserordentlich grosser Theil der zu Grunde gegangenen Geschöpfe, besonders von Vertebraten, in den Excrementen der fleischfressenden Raubthiere repräsentirt sein müsse, dass aber eine dem entsprechende Menge von in fossilem Zustand erhaltenen Excrementen (Coprolithen) auch nicht im entferntesten Maasse vorhanden seien. Sie sind also entweder in theils weichem Zustande zerstäubt worden, theils wurden phosphorsaure etc. Salze in löslichem Zustande ausgeschieden. Die merkwürdigsten Zusammenschwemmungen ganz anderer Ueber-

reste auf dem Meeresgrund lassen nun sehr wohl annehmen, dass auch derartige Ueberbleibsel local angehäuft und durch besondere Zustände des Wassers in Lösung gehalten wurden.

Von allen Lösungsmitteln des phosphorsauren Kalkes käme hier als elementarstes die Kohlensäure in Betracht; es ist nun klar, dass sich da phosphorsaurer Kalk in löslicher Form anhäufen wird, wo zu einem allgemeinen Kohlensäure-Gehalt noch besondere Quellen auftreten, wie dies faulende Thierleichen sind, welche nicht nur eine Sphäre von CO_2 um sich sammeln, sondern auch, wie man dies beobachten kann, eine Hülle schleimigen Magmas fauliger, vom Körper abgelöster Substanzen. Soweit Letztere nun nicht differenzirte Gewebe sind, sondern Zersetzungsprodukte undifferenzirter Eiweisssubstanzen, soweit ist die Annahme sicher gerechtfertigt, dass sie in ähnlicher Weise die löslichen Salze in unlösliche Form überführen, wie es die Harting'schen Versuche und der Myophosphorit zeigen. Selbst hier aber, wo wir den Typus eines allmählichen Niederschlags aus der Umgebung der faulenden Cadaver vor uns hätten, müssen wir noch ausserordentliche Umstände annehmen, besonders aber auf die wichtigste Quelle phosphorsaurer Salze und des Fluorcalciums zurückgreifen, auf die Coprolithe mit der aufgelösten Knochenerde¹⁾. Auch hier kommen, wie in dem Myophosphorit und den Coprolithen der Vertebraten-fressenden Raubthiere auch die accen-

1) Ein recentes Beispiel solcher sich an organische Ueberreste anschliessenden Phosphoritbildung ist der Sombrophosphorit (vergl. Sandberger, Jahrb. für Min. 1864, S. 631); es ist die Phosphoritisirung eines gehobenen Korallenriffs (mit phosphoritischen Pseudomorphosen nach *Solenastrea*, mit Steinkernen von *Cypraea*, *Cardita*, *Cytherea*, *Lucina* etc.) von einer dies Riff bedeckenden Guanodecke aus. Hier spielt wohl die organische Substanz keine Rolle und ist die Bildung nur rein mineralisch; indessen ist sie wichtig wegen der Herkunft der phosphorsauren Salze. Der Phosphorit tritt auch hier in Spalten und Hohlräumen als dünne Kruste mit traubiger Oberfläche und strahliger Struktur auf. Aehnlich ist das Auftreten des Phosphorits in den Säugethier-reichen Juraspalten von Quercy, wo nach freundlicher Mittheilung von Dr. Max Schlosser in München die Säugethierreste ganz verschiedener Zeitperioden des Tertiär zusammen vorkommen. Dass auch hier aufgelöste Excremente bei der Bildung dieses Phosphorits eine hauptsächliche Quelle bilden, erscheint sehr wahrscheinlich. Ein Vergleich der Bildung dieser Knochenansammlungen mit denen in den diluvialen Höhlen ist nach Dr. Schlosser naheliegend.

sorischen Gemengtheile vor, welche auch wichtige Aschenbestandtheile der Exeremente nicht knochenfressender Säugethiere sind (Kali, Natron, Kalk, Magnesia, Eisenoxyd, Schwefelsäure und Kohlensäure). Wir können daher den Unterschied in der Bildung des Myophosphorits und der des Geoden- und Steinkernphosphorits nur darin suchen, dass bei ersterem kurz nach dem Tode bei dem ersten Auftreten der Fäulniss der undifferenzirten Eiweisssubstanzen schon die genügende Menge von den im Phosphorit gefundenen Substanzen innerhalb des Körpers in löslicher Form vorhanden war, während bei dem Geodenphosphorit dieselbe sich erst allmählich aus der Nähe, aus weiter und weiterer Ferne sammeln mussten, während welcher Zeit sich die Formen der Gewebe und des Weichkörpers ganz auflösten, im Begriffe vollständiger Vertheilung in schleimiger Masse sich befanden und eine Hülle um den Körper bildeten.

Was nun die phosphoritisirten Hölzer betrifft, so muss deren Entstehung noch ein viel langsamerer Process gewesen sein und hier sind im höchsten Maasse die Bedingungen einer allmählichen Concentration aus der Umgebung vorhanden; wir können aber auch hier die Phosphoritquelle mit allen accessorischen Gemengtheilen, wie sie in dem Xylophosphorit auftreten, nur in aufgelösten Knochen-Exerementen suchen. Was nun die Möglichkeit der Erzeugung des Niederschlags der gelösten Bestandtheile von Seiten der organischen Substanz, hier der Cellulose betrifft, so hat Hermann (vgl. Bronn, Geschichte der Natur II, Seite 327) dargestellt, dass Holzfaser unter Mitwirkung von Luft, Wasser und Wärme durch Aufnahme von Sauerstoff und Stickstoff unter Verlust von Kohlensäure und Wasser sich in eine proteinartige Substanz (Nitrolin) umwandelt, welche sich auch ähnlich wie thierisches Protein weiter zersetzt, die Struktur des Holzes aber bewahre. Es wäre nun nicht unmöglich, dass von hier aus die Phosphoritisirung in ganz allmählichem Fortschreiten stattfand und ihr Process dem des Myophosphorits ganz analog verlief. Dieser Process könnte dann überall stattfinden, wo in der Nähe von Holz faulende thierische Substanzen, weiter sich zertheilende und sich auflösende Exeremente sich befänden.

Wenn wir so sehen, in welcher verschiedenen Weise sich Phosphorit im Anschluss an faulende organische Substanzen niederschlagen kann und dies offenbar ohne jede ursächliche Betheiligung

von den in der org. Substanz gelösten anorganischen Bestandtheilen im Geoden- und Holzphosphorit stattfindet, wenn wir weiter von der Bildung des Myophosphorits aus schliessen konnten, dass die Hauptmasse der Salze aus dem Darminhalt stammen müsse, so ist am Schlusse dieser Betrachtungen die Ansicht nicht von der Hand zu weisen, dass der eigne, Phosphorsäure führende Aschengehalt der phosphoritisirten Muskelgewebe gar nicht die eigentliche Ursache des Niederschlags gewesen sein möchte; es müsste derselbe sonst stetiger erfolgen, und besonders häufig sein in einer dem Aschengehalt entsprechenden Menge; statt dessen tritt, wenn der Niederschlag vorhanden ist, derselbe fast nur in dem einem Maximum näher liegenden Stadium auf. Es ist also von Anfang an eine Menge phosphorsaurer Salze eingewandert und mit ihnen das Fluorcalcium, Chlorcalcium etc. Hierdurch wird weiterhin nahegelegt, dass wahrscheinlich das Fluorcalcium, welches in allen Knochenbildungen bei Vertebraten ein stetiger und wichtiger Begleiter ist, auch hier eine wichtige Rolle spielt. Wir erwähnten nach Harting, dass die Kalkniederschläge in sich zersetzendem Eiweiss eine ganz andere Form erhalten, wenn phosphorsaure Salze sich in der Lösung befinden; wird sich nicht noch manches ändern, wenn dieselben im Uebergewicht sind und gar Fluorcalcium als integrierender Gemengtheil hinzutritt?

Wenn bei den Harting'schen Experimenten in der Abwesenheit von phosphorsauren Salzen Lamellen entstehen, welche sich über das Niveau der eiweisshaltigen Flüssigkeit erheben, so ist bei der Anwesenheit derselben der Niederschlag amorph und findet in der Flüssigkeit statt. Vielleicht bewirkt bei grösserer Menge von phosphorsauren Salzen ein beigefügtes Fluorcalcium, dass der Niederschlag, selbst wenn er fein faserig-krystallin ist, innerhalb der organischen Flüssigkeit sich derart an die Form derselben hält, dass er deren Grenzen genau innehält (hiermit hängt vielleicht auch die ausserordentliche Kleinheit der Calcosphaerite des Myophosphorits zusammen); da mit dem Niederschlag immer eine organische Gerüstsubstanz aus dem faulenden Eiweiss eliminiert wird, so ist die Erhaltung so feiner Strukturverhältnisse immerhin ein Wunder, man sollte hierbei kleinste Zerrungen und Umgestaltungen durch Expansionen (vgl. S. 568) erwarten; dies ist nur möglich, wenn die Verbindung von anorganischem Niederschlag und eingeschlossener organischer Materie

kein Streben nach eigner morphologischer Gestaltung hat. Da nun allein bei kohlensaurem und phosphorsaurem Kalk derartige eigenthümliche morphologische Bildungen in der Verbindung eintreten, so ist es sehr wahrscheinlich, dass das Fluorcalcium hierbei eine gewisse retardirende Wirkung ausübt. Vielleicht, dass es dieselbe Wirkung auch bei der Knochenbildung der Vertebraten hat und sich hierdurch die Kalkablagerung genau in den Grenzen der organischen Substanz hält. Vielleicht ist nur hierdurch die immerhin sehr merkwürdige, fast launige Bildung des Myophosphorits vor allen andern Geweben zu erklären, wobei auch ganz spezifische Eigenschaften des Muskeleiweiss mitgewirkt haben müssen.

Es war nicht unser Bestreben, im Vorhergehenden eine abgeschlossene Erklärung für die Petrificirung der Muskulatur zu geben¹⁾, sondern sie auf ein Urphänomen der Kalkablagerung in Eiweisssubstanzen zurückzuführen, welches zugleich für das Verständniss der Verkalkungen im vitalen Process von Bedeutung ist. Es war hierbei nothwendig, sehr in's Einzelne zu gehen, das Wesentliche vom Nebensächlichen zu trennen, damit bei einer so wichtigen allgemeinen Frage das Material für deren Lösung, so weit es die Palaeontologie zu bieten vermag, in möglichst durchgearbeiteter Form vorliege. Vielleicht regen auch diese Blätter zu einer experimentellen Prüfung meiner obigen Ausführungen an, welche mir selbst nicht gelungen ist. Es wäre interessant und scheint nach der weiten Verbreitung dieser Fossilisations-Erscheinung nicht unmöglich, denselben künstlich herzustellen; gelänge dies nach dem Harting'schen Schema unter Anwendung der anorganischen Produkte der Verdauung der Knochen, so würde dies nicht nur für unsere Theorie beweisend sein, sondern könnte möglicher Weise auch über die Rolle des Fluorcalciums einen Anschluss gewähren, weiter, welche chemische Beschaffenheit die künstliche Gerüstsubstanz hierbei besitzt (ob sie leim-, chitin- oder conchyolinartig ist), in welcher Weise dieselbe auf die Form der anorganischen Ausscheidung zurückwirkt, unter welchen Zeitumständen sie amorph oder faserig-

1) Eine vollständige Erklärung wird erst erfolgen können, wenn die chemischen Vorgänge bei den Harting'schen Versuchen bis in's Einzelne experimentell dargestellt sind.

krystallin auftritt, welche Fragen für das Verständniss der organischen Verkalkungen von hoher Wichtigkeit sind.

Tafel-Erklärung.

Tafel XXIX.

- Fig. 1. Längsschliff durch Muskelfasern von *Squatina alifera* (170 diam).
 Fig. 2. Längsschliff d. d. M. von *Ischyodus avita* (140 diam).
 Fig. 3. Längsschliff d. d. M. von *Chimaeropsis paradoxa* (vgl. Fig. 8) (80 diam).
 Fig. 4. Längsschliff d. d. M. von *Undina penicillata* (180 diam).
 Fig. 5. Längsschliff d. d. M. von *Sauropsis*.
 Fig. 6. a) Längsschliff d. d. M. von *Plesioteuthis* (100 diam).
 b) Querschliff.
 Fig. 7. Längsschliff d. d. M. von *Callopterus* (200 diam) (vgl. Taf. XXX, Fig. 1).
 Fig. 8. Längsschliff d. d. M. von *Chimaeropsis paradoxa* (100 diam).
 Fig. 9. Längsschliff d. d. M. von *Pholidophorus*.
 Fig. 10. Längsschliff d. d. M. von *Notidanus eximius* (70 diam).
 Fig. 11. Längsschliff d. d. M. von *Hypsocormus* (200 diam).
 Fig. 12. Längsschliff d. d. M. von *Caturus furcatus* (160 diam).
 Fig. 13. Längsschliff d. d. M. von *Aspidorhynchus*.
 Fig. 14. Längsschliff d. d. M. von *Trachyteuthis* (100 diam).

Tafel XXX.

- Fig. 1. Ansicht der vorderen Rückenmuskeln von *Callopterus* zwischen der Dorsalkante und den Neurapophysen. Die Rumpfmuskeln der linken Seite sind, soweit die Dornfortsätze reichen, abgehoben; man sieht also auf die mediale Fläche der rechten Seite des Myomere. In jedem Segment erkennt man eine nach hinten und oben aufsteigende Ueberschiebungsgrenze; in den oberen Partien ist der verschiedene Faserverlauf vollständig ungestört erhalten und kann zur Erklärung des Querschliffs Taf. XXXI, Fig. 1 (*Eurycormus*) dienen. ($\frac{2}{3}$ natürlicher Grösse.)
 Fig. 2. Aeusserer Rand eines Muskelbündels von *Megalurus* im Querschnitt; innere Zone mit punktierten, in heller Randsubstanz verschmolzenen Faserquerschnitten; äussere Zone mit fast glashellen Faserquerschnitten, einseitig verschmolzen, mit grossen zelligen Reliktenhöhlräumen (150 diam).

Fig. 3. 140malige Vergrößerung einer Stelle von Fig. 5.

Fig. 4. Querschnitt durch abgeplattete Fasern von *Notidanus* (ca. 65 diam).

Fig. 5. Querschnitt durch drei Muskelbündel von *Undina* mit punktierten und glashellen Fasern (vgl. Fig. 3 mit 140maliger Vergrößerung); am Oberrand des Präparates ist die Schuppenbedeckung erhalten (ca. 40 diam).

Fig. 6. Schiefer Querschnitt durch Muskelfasern von *Chimaeropsis* (ca. 400 diam).

Tafel XXXI.

Fig. 1. Sagittaler Querschnitt durch zwei hintereinander liegende Rippenpaare der Abdominalregion von *Eurycornus*; die untere Portion ist etwas distaler durchschnitten. Zu beiden Seiten Reste der sich überschneidenden Schuppen des Integuments. Zur Erklärung der Längs- und Querschnitte der Muskelbündel vgl. Taf. XXX, Fig. 1; (ca. 45 diam).

Fig. 2. Schliff durch ein Knöllchen, der Tintenbeutelgefüllung eines *Plesiotenthis* aus dem lithogr. Schiefer von Solnhofen; ein Sector 100 mal vergrößert.

Berichtigungen.

In der Arbeit von A. S. Dogiel, d. Arch. Bd. 41, S. 62 ff. sind folgende Druckfehler zu verbessern:

Seite 71, Zeile 11 muss Fig. 7b wegfallen.

„ 71, „ 16 „ „ 7 „

„ 71, „ 19 statt Fig. 7c zu lesen Fig. 8c.

„ 71, „ 25 einzuschalten: Fig. 7b.

„ 82, „ 18 lies Nervenzellen statt Nerven.

„ 82, „ 19 „ Neurone statt Neurome.