Furfurol und Benzaldehyd rufen mit Leichtigkeit eine schön violette Färbung hervor.

Zimmtaldehyd, Furfuracrolein und Furfurcrotonaldehyd geben zuerst eine intensiv gelbe Färbung, die bald in Violett-roth übergeht.

Salicylaldehyd gibt eine schön rothviolette Färbung.

Bei Cuminaldehyd tritt dieselbe erst nach einigem Schütteln auf. Ameisensäure zeigt keine Reaction.

Aceton gibt nach einigem Schütteln schon in geringer Menge eine violettrothe Farbe; dagegen rufen Acetophenon und Benzophenon dieselbe nicht hervor.

Von Zuckerarten wurden Traubenzucker, Lävulose, Laktose und Rohrzucker geprüft, alle gaben keine Färbung.

Von Alkoholen gaben Methyl- und Aethylalkohol nach einigem Schütteln schwache Violettfärbung, Propyl- und Isopropylalkohol eine kaum mehr wahrnehmbare Färbung. Die Alkohole mit höherem Kohlenstoffgehalt, die Glykole, die Phenole, sowie das Chinon zeigten keine Einwirkung auf das Reagens.

Es ergibt sich daraus, dass die Reaction für die Aldehyde im allgemeinen charakteristisch ist, dass aber auch noch einige andere, einfach zusammengesetzte, den Aldehyden nahestehende Verbindungen der Fettreihe ebenfalls die Färbung hervorrufen.

Ueber die Aldehydreaction mit ammoniakalischer Silberlösung hat B. Tollens*) in mehreren Abhandlungen folgende Mittheilungen gemacht. Die Empfindlichkeit der Reaction (Reduction des Silbers) wird durch die Gegenwart eines fixen Alkalis gesteigert und zwar empfiehlt sich zum Nachweis von Aldehyden folgende Mischung am meisten:

Man löse 3 g salpetersaures Silberoxyd in 30 g Ammoniak von 0,923 spec. Gew., ferner 3 g Aetznatron in 30 g Wasser, mische die beiden Lösungen und benutze sie nach einigen Tagen.

Das so bereitete Reagens bleibt, in einer Stöpselflasche im Dunkeln aufbewahrt, monatelang bis auf einen geringen, krystallinischen Silberabsatz klar, beim Erwärmen trübt es sich jedoch.

Da E. Salkowski**) darauf aufmerksam gemacht hat, dass sich

*) Ber. d. deutsch. chem. Gesellsch. z. Berlin **14**, 1950; **15**, 1635 und **15**, 1828; vom Verfasser eingesandt.

) Ber. d. deutsch. chem. Gesellsch. z. Berlin **15, 1738.

in dieser Flüssigkeit unter Umständen Knallsilber bilden könne, so theilt Tollens mit, dass nach seinen Erfahrungen eine Bildung von Knallsilber nicht eintritt, wenn die Flüssigkeit vor Verdunstung geschützt ist, rath aber doch der Vorsicht halber lieber beide Bestandtheile getrennt aufzubewahren und erst vor dem Gebrauche zu mischen.

Setzt man zu einer mässig verdünnten Aldehydlösung einige Tropfen dieses Reagens', so entsteht je nach der Natur der Aldehydlösung eine schwarze oder graue Abscheidung, welche mehr oder weniger spiegelt, oder auch ein sehr schön glänzender Silberspiegel; in verdünnter Lösung tritt die Reaction erst nach einiger Zeit ein.

Ueber den Grad der Empfindlichkeit gibt folgende Zusammenstellung ein Bild.

Grad der Verdünnung	Zeit bis zum Beginn der Reaction	Reaction nach Aufbewahrung im Dunkeln
1:10*)	{ fast augenblicklich $\frac{1}{2}$ — $\frac{1}{3}$ Minute 5 Minuten	Spiegel
1:100		Spiegel
1:1000		grau, gelbbrauner Spiegel, bräunlicher Niederschlag
1:10000		brauner Niederschlag, Andeutung von Spiegel
1:100000	folgenden Tag beobachtet	Graue Abscheidung
1:250000	" " "	Gelbgraue Abscheidung
1:500000	" " "	Gelbe Trübung
1:750000	" " "	wenig trübe
1:1000000	" " "	

Als von 250 cc der verdünntesten Flüssigkeit 5 cc abdestillirt wurden, zeigten dieselben beim Versetzen mit dem Reagens schon nach 10 Minuten eine deutliche, nach 30—40 Minuten eine starke Reaction.

Die mit Natron versetzte ammoniakalische Silberlösung wird auch durch andere Substanzen, z. B. Traubenzucker, Milchzucker etc., nicht aber durch Ameisensäure oder Rohrzucker**), in der Kälte reducirt.

Der Verfasser hat auch Versuche angestellt die Reaction zur quantitativen Aldehydbestimmung zu verwenden, doch sind dieselben bis jetzt noch nicht zum Abschluss gelangt.

*) Die Zahlen bedeuten cc.

**) Beim Erwärmen wird nach Salkowski (s. o.) auch der Rohrzucker reducirt.