Les Plantes Du Père D'incarville Dans L'herbier Du Muséum D'histoire Naturelle De Paris

M. Franchet

To cite this article: M. Franchet (1882) Les Plantes Du Père D'incarville Dans L'herbier Du Muséum D'histoire Naturelle De Paris, Bulletin de la Société Botanique de France, 29:1, 2-13, DOI: [10.1080/00378941.1882.10828043](https://doi.org/10.1080/00378941.1882.10828043)

To link to this article: <http://dx.doi.org/10.1080/00378941.1882.10828043>

Published online: 08 Jul 2014.

Submit your article to this journal [↗](#)

Article views: 27

View related articles [↗](#)

F. Vigier et Ch. Cloez, *Erigeron canadense*, son emploi en médecine.
Bulletin de la Société des amis des sciences naturelles de Rouen, 1880,
 2^e semestre.

3^e De la part de M. Joseph Vallot :

Quicherat et Daveluy, *Dictionnaire latin-français*.

A. Spiers, *Dictionnaire abrégé anglais-français et français-anglais*.
 Carte de France au 320000^e, 26 feuilles.

4^e De la part de la Société royale de botanique de Belgique :

*Congrès de botanique et d'horticulture tenu à Bruxelles du 23 au
 26 juillet 1880.*

M. Van Tieghem offre à la Société le quatrième fascicule de son
Traité de Botanique, qui contient l'étude morphologique et physio-
 logique de la cellule, ainsi que le commencement de l'étude des
 tissus.

M. Franchet fait la communication suivante :

LES PLANTES DU PÈRE D'INCARVILLE DANS L'HERBIER DU MUSÉUM D'HISTOIRE
 NATURELLE DE PARIS, par M. FRANCHET.

Dans un intéressant travail publié à Shang-haï dans le courant de l'an-
 née 1881, sous le titre de : *Early European Researches into the Flora of
 China*, et dans lequel l'auteur, M. le Dr E. Bretschneider, énumère toutes
 les plantes signalées en Chine par les botanistes européens jusqu'à Linné,
 je trouve cette allégation : « D'Incarville a transmis à Bernard de Jussieu,
 » démonstrateur de botanique à Paris, une collection de plantes sèches pro-
 » venant de Pékin. Je ne puis savoir à quel chiffre s'élève le nombre des
 » espèces. Elles ont été intercalées dans l'herbier du Muséum de Paris,
 » mais sans avoir été l'objet d'un travail régulier. »

Je ne sais à quelle source le Dr Bretschneider a puisé ses rensei-
 gnements, lors de son passage à Paris en 1878 ; mais sans doute il ne
 s'est pas adressé aux galeries de botanique, c'est-à-dire là seulement où
 l'on avait qualité pour le renseigner. S'il peut dire avec raison que les
 plantes du P. d'Incarville n'ont été jusqu'ici l'objet d'aucun travail
 spécial, il n'est pas exact d'ajouter que ces plantes ont été interca-
 lées dans l'herbier général de façon à ne plus permettre même d'en
 donner aujourd'hui le nombre.

La vérité est que les plantes du P. d'Incarville se trouvent aujourd'hui
 au Muséum telles que les généreux héritiers de M. Adr. de Jussieu les ont

offertes en 1857. Les plus intéressantes d'entre elles (149 espèces recueillies presque toutes à Pékin ou dans les montagnes voisines) sont disposées dans 61 feuilles doubles, réunies en herbier spécial et conservées dans l'ordre qui leur a été donné par le collecteur lui-même.

Le reste, au nombre de 144 espèces, provenant toutes de Macao, constitue une deuxième collection maintenue distincte jusqu'ici; 35 des plantes qui la composent en ont cependant été distraites, probablement par A. L. de Jussieu, et placées par lui dans son propre herbier : cet herbier est conservé au Muséum, et, grâce au catalogue qui l'accompagne, il m'a été très facile de retrouver ces plantes.

C'est la liste des espèces recueillies en Chine par le P. d'Incarville que j'ai l'honneur de présenter aujourd'hui à la Société ; cette énumération comblera, j'espère, une lacune dans l'important travail qui vient d'être publié à Shang-hai.

Je dois ici joindre mes regrets à ceux de M. le Dr Bretschneider, et déplorer avec lui l'oubli dans lequel les plantes du P. d'Incarville ont été tenues durant près d'un siècle et demi. C'est à peine en effet si je trouve 25 espèces étudiées et nommées dans ses deux herbiers ; et lorsque parmi elles on voit des types génériques d'un intérêt réel, tels que *Ailantus glandulosa* Desf., *Incarvillea sinensis* A.-L. Juss., *Cedrela sinensis* Adr. Juss., on est en droit de s'étonner que de pareils matériaux n'aient point davantage éveillé la curiosité scientifique de leurs possesseurs. Peut-être faut-il chercher la raison de cette indifférence dans l'exiguïté des échantillons, dont plusieurs pouvaient, au premier coup d'œil, paraître insuffisants pour une détermination rigoureuse.

Quoi qu'il en soit, il n'en est pas moins vrai de dire que les types de la plupart des genres reconnus et décrits par M. de Bunge en 1832 existaient dans une collection française dès 1740, et que c'est au savant jésuite qu'il faut rapporter la découverte des *Orychophragmus*, *Actinidia*, *Xanthoceras*, *Paratropia*, *Myripnois*, *Botryospermum*, etc. C'est lui encore qui fut le premier à recueillir ces rares espèces que la Chine septentrionale est jusqu'ici seule à posséder : *Anemone chinensis* Bunge ; *Corydallis Bungeana* Turcz. ; *Zanthoxylum Avicennæ* Lamk. ; *Indigofera Bungeana* Steud. ; *Deutzia parviflora* et *D. grandiflora* Bunge ; *Oxytropis hirta* Bunge ; *Güldenstädtia multiflora* Bunge ; *Viburnum fragrans* Bunge ; *Myripnois dioica* Bunge (curieuse Mutisiacée asiatique) ; *Androsace saxifragifolia* Bunge ; *Syringa amurensis* Rupr., et *S. villosa* Vahl ; *Andrachne chinensis* Bunge ; *Selaginella mongolica* Rupr., et *S. Stauntoniana* Spring ; etc., etc.

Un des traits caractéristiques des collections du P. d'Incarville, c'est d'y trouver chaque plante pourvue de son étiquette portant mention, soit de son nom vulgaire en français ou quelquefois de son nom latin, soit

plus rarement de son nom chinois. En outre, chose remarquable pour l'époque, la provenance des plantes est indiquée avec exactitude : ainsi, dans le petit herbier particulier, le collecteur a pris le soin de distinguer les plantes prises à Pékin même de celles qui provenaient de la région montagneuse avoisinant la ville. Les plantes de Macao sont aussi parfaitement séparées. Ces diverses indications montrent combien le P. d'Incarville était soigneux de ses collections et quelle confiance on peut avoir dans les renseignements qu'il fournit.

Ce serait ici le lieu de parler des publications du P. d'Incarville. Il est l'auteur d'un curieux travail publié dans les tomes III et IV des *Mémoires de la Société impériale des naturalistes de Moscou*, sous le titre de : *Catalogue alphabétique des plantes et autres objets d'histoire naturelle en usage en Chine, observés par le P. d'Incarville*. Mais je reviendrai plus tard sur ce sujet, à l'occasion de la correspondance échangée avec Bernard de Jussieu.

Dans la liste qui suit, les espèces dont les noms ne sont précédés d'aucun signe ont été intercalées dans l'herbier général, où il sera facile de les retrouver à l'aide de la liste que j'en donne ici ; elles viennent de Macao.

Les espèces précédées du signe = devront être cherchées dans l'herbier des Jussieu, conservé à part dans son intégrité aux galeries de botanique ; elles proviennent également de Macao.

Les espèces précédées du signe † ou †† ont été réunies en herbier particulier par le P. d'Incarville lui-même ; elles sont maintenues sous cette forme dans les archives du laboratoire de botanique. C'est ce petit herbier que j'ai l'honneur de présenter aujourd'hui à la Société, avec l'autorisation spéciale de M. le professeur Bureau.

Le signe simple † indique que la plante a été récoltée à Pékin, d'après cette mention écrite de la main du P. d'Incarville en tête du premier feuillet : « Voilà les plantes de Pékin selon l'ordre que je les ay trouvées. »

Le signe double †† indique que les plantes ont été récoltées dans les montagnes des environs de Pékin.

Dans le petit herbier en question, les folios 1 à 39 contiennent la série des plantes de Pékin ; les folios 40 à 48 renferment les plantes trouvées dans les montagnes aux environs de Pékin ; les folios 49 à 52 appartiennent à la même série, avec cette mention un peu différente : « Les » plantes suivantes m'ont été rapportées par un chasseur qui les a trouvées » dans la montagne » Les neuf derniers folios n'ont pas de numéros ; le P. d'Incarville a inscrit en tête du premier : « Plantes de Macao. »

Les numéros d'ordre qui accompagnent chaque espèce sont ceux qui se trouvent inscrits sur les étiquettes autographes du P. d'Incarville.

Les noms ou observations mis entre guillemets sont également écrits de sa main.

Le signe * placé après un nom d'espèce indique que le collecteur a envoyé en même temps des graines : un certain nombre de ces graines existent encore dans les collections du Muséum ; les autres ont été semées sans doute et sont devenues l'origine des plantes chinoises cultivées dans les jardins depuis plus d'un siècle. Les *Polygonum tinctorium* L., *Calistephus chinensis* Nees, *Gleditschia sinensis* Lamk, et probablement *Sophora japonica*, sont dans ce cas.

- †† *Clematis angustifolia* Jacq. — 11 (fol. 43). « Clematis. »
 †† *Atragene macropetala* Ledeb. — 45 (fol. 49). « Coquelourde. »
 †† *Thalictrum petaloideum* L. — 49 (fol. 50).
 † *Anemone chinensis* Bunge. — 14 (fol. 5). « Coquelourde. »
 †† *Ranunculus hydrophilus* Bunge. — 20 (fol. 45). « Voici la petite herbe dont vous souhaitiez avoir et dont les eaux sont couvertes ; vous voyez que ce n'est pas là le Morsus rana, mais un Ranunculus. »

Spécimens en mauvais état de conservation ; néanmoins la direction flabelliforme des divisions de la feuille permet d'appliquer avec une certitude suffisante la dénomination spécifique que j'indique ici.

- † *Ranunculus Cymbalariae* Pursh. — 13 (fol. 5).
 †† *Aquilegia* sp. 52 (fol. 51). « Aquilegia. »

La plante est presque complètement détruite par les insectes ; quelques débris de fleurs permettent cependant de la rapprocher de l'*A. vulgaris* L., espèce assez répandue aux environs de Pékin sous sa forme *oxysepala*.

- Anemone muricata* L. * 161. — Un rameau sans fleurs.
 †† *Menispermum dahuricum* DC. — 27 (fol. 46).
 = *Cocculus ovalifolius* DC. — 173.
 = *Cocculus ovalifolius* DC. — 194.
 †† *Berberis sinensis* Desf. — 53 (fol. 51).
 †† *Chelidonium majus* L. — 2 (fol. 46). « Chelidonium. »
 †† *Hypocyon erectum* L. — 9 (fol. 42).

Ce nom est écrit de la main de A.-L. de Jussieu ; la plante a été partagée en deux parts, dont l'une se trouve dans l'herbier des Jussieu.

- †† *Dicentra spectabilis* DC. — 21 (fol. 45).
 †† *Corydalis solida* Smith. — 30 (fol. 46). « Aquilegia. »

Forme à segments foliaires petits, oblongs, longuement pétiolés ; une forme analogue existe au Japon.

- † *Corydalis Bungeana* Turcz. — 45 (fol. 19). « Fumeterre. »
 † *Thlaspi Bursa-pastoris* L. — 3 (fol. 1). « Thlaspidium. »
 † *Thlaspi Bursa-pastoris* L. — 42 (fol. 18). « Bursa-pastoris. »
 †† *Dentestemon dentatus* Bunge. — 8 (fol. 42). « Erv. ca. »
Erysimum cheiranthoides L. Macao (herb. d'Incar. v.). — Sans numéro.
Lepidium latifolium L. — Macao (herb. d'Incar. v.). Sans numéro.
 † *Orychophragmus nemorosus* Bunge. — 8 (fol. 2). « Sisymbrium. »

- + *Viola Patrinii* DC. *β. chinensis* Ging. — 16 (fol. 5). « Violette; aucune odeur ici. »
- ++ *Viola pinnata* L. — 35 (fol. 47). « Violette à feuilles découpées. »
- = *Ionidium heterophyllum* Vent. — 109.
- ++ *Polygala sibirica* L. var. *tenuifolia* Regel. — 13 (fol. 43). « Polygala. »
- ++ *Stellaria nemorum* L. — 142. — Forme tétragyne.
- + *Malva silvestris* L. — 69 (fol. 34). « Petite mauve. »
- + *Hibiscus mutabilis* L. * — 93. « Ketmia dont la fleur est blanche le matin et rouge le soir. »
- + *Hibiscus Rosa-sinensis* L. — 190. « Mauves sapathes, nommées ainsi par les Portugais parce qu'ils noircissent les souliers avec la fleur. »
- ++ *Hibiscus ternatus* Cav. — 12 (fol. 43). « Ketmia. »
- + *Urena lobata* L. — 22. « Mauve à graines de Cynoglosse; Malacoides Tourn. »
- + *Sida Abutilon* L. — 55 (fol. 23). « Abutilon. Les Chinois en font des cordes. »
- = *Sida acuta* Burm. — 82. « Ketmia. »
- = *Sida humilis* Willd. — 57. « Mauve Ketmia. »
- = *Holicleteres angustifolia* L. — 181.
- + *Grewia nitida* Juss. — 177. « Espèce de Troëne. »

Echantillon type de l'espèce.

- + *Triumfetta Lappula* L. * — 28. « Aigremoine. »
- = *Corchorus acutangulus* L. — 20 bis.

En mélange avec *Jussiaea villosa*.

- + *Actinidia chinensis* Planchon. — Sans numéro. « Yang-tao. — On mêle l'eau dans laquelle on a fait bouillir ces branches dans la composition du papier pour lui donner du corps. Pour M. Bernard de Jussieu. »
- + *Cardiospermum Halicacabum* L. * — 4. « Les Portugais l'appellent Bonnet-de-prêtre à cause de la figure de la capsule de son fruit. Sa fleur m'a paru singulière. »
- = *Nephelium Litchi* Camb. — 165. « Litchi. »

La plante se trouve dans l'herbier particulier du P. d'Incarville et dans celui des Jussieu ce dernier est l'échantillon type de l'espèce.

- = *Nephelium Longanum* Hook. — 165. « Bil-de-dragon. »

Se trouve dans l'herbier du P. d'Incarville et dans celui des Jussieu.

+ *Mussa exotica* L. — 175.

+ *Mussa monophylla* DC. — 166. « Arbrisseau qui sent la gérofle. »

+ *Atalapha sibirica* L. — 57 (fol. 24). « Geranium. »

+ *Geranium phasianum* Willd. — 20 (fol. 6). « Geranium. »

+ *Erodium cicutaria* L. — 143. « Pain-de-coucou. »

+ *Oxalis corniculata* L. — 5. « Karambolan. » — De la main de A.-L. de Jussieu.

+ *Averrhoa Carambola* L. — 189.

+ *Averrhoa Carambola* L.

- † *Tribulus terrestris* L. — 60 (fol. 26). « Tribule. »
 † *Ruta angustifolia* L. — 8. « Rue. Je ne l'ay vue que dans les jardins. »

Un rameau sans fleurs.

- = *Zanthoxylon Avicennae* DC. — 179.
 † *Xanthoxylon serotifolia* Bunge. — 15 (fol. 5). « Je ne connais point celle cy; elle a un fruit comme une amande. Les Chinois mangent ce fruit. Je n'ai pu en avoir. »
 † *Allantus glandulosa* Desf. — 28 (fol. 10). « Cet arbre ressemble au Frêne, mais la fleur ny le fruit ne conviennent point au Frêne; son fruit ressemble plus tost à l'Érable. »
 = *Brucea sumatrana* Roxb. — 13. « Espèce de troëne. »
 = *Melia Azedarach* L. — 171. « Alisier. »

Une seule feuille, sans fleurs ni fruits.

- † *Cedrela sinensis* Adr. de Jussieu. — 29 (fol. 11).
 = *Mangifera indica* L. — 164. « Manguier. »
 = *Rhus succedanea* L. — 169. « L'arbre du vernis, je n'en ay vu ny la fleur ny le fruit. »
 † *Rhus Cotinus* L. (en fruits). — 31 (fol. 47). « Fustet. »
 †† *Rhus Cotinus* L. (fl. mâles). — 16 (fol. 44).
 = *Sagerella theezans* Brongt. — 79.
 †† *Sophora flavescens* Ait. — 47 (fol. 50).
 = *Orotalaria albidia* Heyne. — 25.
 = *Indigofera hirsuta* L. — 59. « Lotier. »
 †† *Indigofera Bungeana* Steud. — 24 (fol. 45).
 † *Mellilotus parviflora* L. — 72 (fol. 35). « Mirlotot. »
 † *Caragana frutescens* DC. — 6 (fol. 2). « Arreste-bœuf. »
 = *Glycyrrhiza echinata* L. — 122.
 = *Tephrosia purpurea* Pers. — 127.
 = *Alysicarpus vaginalis* DC. — 74. « Lotier. »
 † *Güldenstädtia pauciflora* Fisch. — 17 (fol. 5). « Astragale à feuilles de Tragacantha. »
 † *Güldenstädtia multiflora* Bunge. — 11 (fol. 4). « Astragale. »
 †† *Güldenstädtia multiflora* Bunge. — 32 (fol. 47). « Astragale. »
 †† *Oxytropis hirta* Bunge. — 40 (fol. 48).
 = *Desmodium gangeticum* L. — 24. « Lotier. »
 = *Desmodium polycarpum* DC. — 64. « Lotier. »
 = *Desmodium pulchellum* Benth. — 180. « Lotier. »
 = *Desmodium latifolium* DC. — 106.
 = *Desmodium triquetrum* DC. — 21. « Lotier. »
 = *Urtica crinita* Desv. — 32.

Herbier du P. d'Incarville et herbier de Jussieu.

- = *Lespedeza trichocarpa* Pers. — 7.
 = *Alysicarpus scorabaeoides* Benth. — 55. « Lotus. »

Cajanus bicolor DC. — 2. « Espèce de Genet. »

Cassia Tora L. — 66.

= *Cassia mimosoides* L. (forma *microphylla*). — 49.

Acacia Farnesiana Willd. — 6. « *Acacia spinosa*. »

Albizia Julibrissin Boiv. — Sans numéro.

Herbier particulier du R. P. d'Incarville.

Tamarindus indica L. — 85. « Tamarin. »

Guilandina Bonducella L. — 104. « Pois dont la gousse est hérissée de piquants. Moukaro, nom portugais. »

†† *Spiraea trilobata* L. — 10 (fol. 42). « Aubépine. »

† *Potentilla chinensis* Ser. — 22 (fol. 7). « Grande Argentine. »

†† *Potentilla fragaroides* L. — 28 (fol. 46). « Quinte-feuille. »

† *Potentilla supina* L. — 10 (fol. 2). « Argentine; *Potentilla*. »

= *Eriobotrya japonica* Lindl. — 182. « Pipa. »

Saxifraga sarmentosa L. — Sans numéro.

Herbier particulier du P. d'Incarville, sans indication de localité.

†† *Deutzia parviflora* Bunge. — 14 (fol. 43).

†† *Deutzia grandiflora* Bunge. — 14 (fol. 52).

† *Lagerstrœmia indica* L. — 30 (fol. 12). « Les Chinois appellent cette fleur : fleur des cent jours, parce que cet arbre porte longtemps des fleurs. »

= *Jussiaea villosa* Lamk. — 20. « Espèce d'Onagre. »

= *Candelia Bbediti* Arnott. — 174. « Chêne trouvé sur les bords de la mer, dans la vase. »

Eugenia Jambos L. — 186. « Jambon. »

= *Syzygium* sp. — 163. « Jambolan. »

Voisin du *S. oblatum* Wall; un rameau sans fleurs ni fruits.

Peltium Gujava L. « Goyavier. »

Coccolinia grandis Cogn. — 193. « Petite Courge en forme de piment. »

†† *Siler divaricatum* Benth. et Hook. — 7 (fol. 42). « Persil de montagne. »

= *Paratropia cantoniensis* Hook., et Arn. (*Aralia heptaphylla* Adr. Juss.). — 192. « Sapatere, nom portugais. »

†† *Sambucus racemosa* L. — 54 (fol. 51). « Branc-ursine. »

† *Viburnum fragrans* Bunge. — 44 (fol. 18). « Paraît un *Frangula*. »

Mussaenda pubescens Ait. — Sans numéro.

Herbier particulier du P. d'Incarville; probablement de Macao.

Ixora stricta Roxb. — 185. « *Trachelium*. »

Psychotria Reevesii Wall. — 167. « Espèce de *Troëne*. »

Pædleria foetida L. — 58.

Oldenlandia paniculata L. — 102. « Petite *Linnaire*. »

Oldenlandia paniculata. — 105 Id.

Morreria stricta L. — 40.

- † *Rubia cordifolia* L. — 33 (fol. 13). « Garence. »
 † *Vernonia cinerea* Less. — 35. « Hieracium. »
 † *Vernonia chinensis* Less. — 60. « Serratula. »
 † *Elephantopus scaber* L.* — 33.
 † *Eupatorium Reevesii* Wall.* — 68. « Eupatoire d'Avicenne. »
 † *Aster altaicus* Wild. — 5 (fol. 2). « Aster. »
 † *Aster integrifolius*; (*Calimeris integrifolia* Turcz.; *Boltonia pекinensis* Hance). — 39 (fol. 16). « Aster alter. »
 † *Conyza aegyptiaca* L. — 61. « Hieracium. »
 † *Inula Britannica* L.; (forma typica). — 75 (fol. 37). « Aster. »
 † *Xanthium strumarium* L. — 78 (fol. 39). « Xanthium. »
 † *Eclipta alba* L.* — 43. « Espèce de Conize ou Tournesol. »
 † *Eclipta alba* L.* — 14.
 † *Wedelia calendulacea* Less.* — 92. « Espèce de Tournesol. Elle en a les graines; trouvée sur les bords de la mer; elle a une bonne odeur. »
 † *Wollastonia biflora* DC.* — 76. « Espèce de petit Soleil ou Tournesol. »
 † *Siegesbeckia orientalis* L.* — 41.
 † *Bidens pilosa* L. — 45. « Bidens. »
 = *Pyrethrum indicum* Cass. — 46.
 † *Artemisia annua* L. — 44. « Aurone. »
 † *Artemisia annua* L. — 52 (fol. 21). « Aurone mâle. »
 †† *Artemisia scoparia* Waldst. et Kit. — 42 (fol. 49).
 † *Artemisia indica* L. — 77 (fol. 38).
 Variété de l'A. *vulgaris* L.
 † *Artemisia Sieversiana* Willd. — 35 (fol. 14). « Absinthium. »
 † *Carpesium abrotanoides* L. — 65. « Conize. »
 † *Gynura pseudochina* DC. — 51. « Hieracium. »
 † *Senecio glabellus* DC. — 27 (fol. 9). « Hieracium pratense. »
 †† *Senecio Kirilowii* (*Cineraria Kirilowii* Turcz. — 4 (fol. 41). « Aster. »
 † *Calcus segetum* (*Cirsium segetum* Bunge). — 23 (fol. 7). « Chardon. »
 †† *Rhaponticum uniorum* DC. — 35 (fol. 47). « Scabieuse à tête d'Artichaut. »
 †† *Myrtilis dioica* Bunge. — 22 (fol. 45).
 †† *Anandria Bellidistrum* DC. — 29 (fol. 46). « Marguerite. »
 † *Lactuca denticulata* Maxim. — 7 (fol. 2). « Hieracium. »
 † *Lactuca denticulata* Maxim. — 18 (fol. 6). « Hieracium. »
 †† *Lactuca versicolor* Maxim. — 19 (fol. 44). « Hieracium. »
 †† *Rhododendron interanthum* Turcz. — 46 (fol. 49). « Auréole fleur. »
 †† *Androsace saxifragæfolia* Bunge. — 23 (fol. 45).
 †† *Lysimachia barystachys* Bunge. — 41 (fol. 48).
 †† *Fraxinus rhynchophylla* Hance. — 15 (fol. 43).
 † *Jasminum Sambac* L. — 76 (fol. 38). « Seringua qui a jusqu'à 3 fleurs l'une dans l'autre et autant de calices. »

- †† *Gentiana squarrosa* Ledeb. — 33 (fol. 47). « *Gentiana*. »
 †† *Syringa villosa* Vahl. — 50 (fol. 50).
 †† *Syringa amurensis* Rupr., var. *pekinensis* Max. — 55 (fol. 52).
Apocynum venetum L. — Sans numéro.

Herbier particulier du P. d'Incarville.

- †† *Periploca septium* Bunge. — 6 (fol. 41). « *Periploca*. »
 † *Vincetoxicum sibiricum* Decaisne. — 21 (fol. 6). « *Apocin*. »
 = *Cynanchum pubescens* Bunge. — 11.

Portion supérieure de tige, sans fleurs ni fruits.

- † *Rehmannia glutinosa* Lib. — 9 (fol. 3). « *Digitale*. »
 † *Incarvillea chinensis*. Adr. Juss. — 68 (fol. 33). « *Bignonia*. »
Convolvulus arvensis L. var. *sagittatus* Ledeb. — 52. « *Convolvulus*. »
 † *Convolvulus arvensis*. — 71 (fol. 34). « *Petit Lizeret*. »
Ipomoea reptans Poir. — 198. « *Convolvulus* nageant sur les eaux. »
Ipomoea sp. — 39.

Voisin de *H. chryseidis* Ker. Les feuilles sont longuement pétiolées, cordiformes, acuminées; les pédoncules dépassent beaucoup les feuilles et portent au sommet 6 à 9 fleurs disposées en cyme ombelliforme. La plante est finement pubérulente. Ne paraît pas avoir été décrit.

- †† *Tournefortia Arguzia* L. — 17 (fol. 44).
 † *Eritrichium pedunculare* Alph. DC. — 1 (fol. 1). « *Petite Pulmonaire*. »
 † *Botrysospermum chinense* Bunge. — 2 (fol. 1). « *Petite Buglosse*. »
 † *Lycium chinense* Mill. — 24 (fol. 7). « *Espèce de Piment*, espèce de *Solanum*; les Chinois en mangent les jeunes tiges. »
 † *Solanum nigrum* L. — 56 (fol. 24). « *Morelle*. »
 † *Solanum septemlobum* Bunge. — 70 (fol. 34). « *Solanum*. »
Solanum Melongena L. — 133. — « *Lycopersicum*. »
 † *Physalis Alkekengi* L. — 62 (fol. 29). « *Alkekengi*. »
Capsicum conoides Mill. — 191.
Herpestis Monniera Humb. et Kunth. — 135. « *Mouron d'eau*. »
Vandellia sp. — 108.

Fragments indéterminables spécifiquement.

Siphonostegia chinensis Benth. — Sans numéro.

Dicliptera cardiocarpa Nees. — 15. « *Espèce d'Origan*. »

Dicliptera cuneata Nees. — 91. « *Espèce de Belle-de-nuit*, mais elle n'a que 2 étamines. »

†† *Vitex incisa* Lamk. — 38 (fol. 48).

†† *Orobanche ammophila* Mey. — 5 (fol. 41).

= *Ocimum Basilicum* L. — 9. « *Basilic*. Je ne lui ai point trouvé de graines. »

Ocimum Basilicum L. — 86. « *Basilic à odeur de gérofle*. »

Ocimum sanctum L. — 107. « *Basilic à odeur de gérofle*. »

- = *Perilla ocimoides* L. — 17. « Espèce de Citronelle à odeur désagréable. »
- † *Perilla ocimoides* L. — 63 (fol. 28). « Je la crois une espèce de Citronelle. Les Chinois nourrissent les oiseaux de sa graine, qui ressemble un peu au chanvre; les oiseaux en sont fort friands. »
- Mentha arvensis* L. — 19. « Espèce de Pouliot. »
- Anisomelos ovata* Br. var. *molissima* Benth. — 80. « *Lamium foetidum*. »
- †† *Salvia miltiorhiza* Bunge. — 39 (fol. 48). « La Sclarée. »
- Scutellaria indica* L. — 10. « Petite Toque. »
- † *Marrubium incisum* Benth. — 43 (fol. 18). « *Cardiaca minor*. »
- † *Leonurus sibiricus* L. — 74 (fol. 36). « *Cardiaca major*. »
- † *Polygonum orientale* L. — 36 (fol. 14). « *Persicaria major*. »
- = *Polygonum chinense* L. — 83. « *Polygonum*. »
- † *Chenopodium viride* L. — 51 (fol. 21). « Arroche. »
- † *Kochia scoparia* Schrad. — 50 (fol. 21). « Belvédère. »
- † *Salsola Kali* L. — 40 (fol. 17). « *Kali spinosum*. »

Forme grêle, à feuilles filiformes très allongées.

- † *Amarantus ascendens* Lois. — 73 (fol. 35). « Blitum. »
- Amarantus ascendens* Lois. — 48. « Arroche. »
- Amarantus melanocollus* L. — 69. « Blitum. »
- Erva lanata* Juss. — 111. « Immortelle en épi. »
- = *Cyathula prostrata* Blume. — 23.
- Alternanthera sessilis* Rob. Br. * — 96.
- Cotela cristata* Moq. * — 63. « *Amaranthoides*. »
- Achyranthes aspera* L. — 67. « Les Portugais l'appellent Pega pega. »
- Cassipouia filiformis* L. — 70. « *Convolvulus*. »
- † *Elaeagnus angustifolia* L. — 26 (fol. 9). « Silikiang, nom chinois. »
- †† *Marthron linifolius* Turcz. — 26 (fol. 46). « Laureola. »

Fragments de tiges et feuilles; sans fleurs.

- † *Euphorbia humifusa* Willd. — 19 (fol. 6). « Titymale. »
- †† *Euphorbia tunulata* Bunge. — 36 (fol. 47). « *Titymale catapuce*. »
- Euphorbia Tirucalli* L. — 97. « Titymale. »
- Euphorbia pilulifera* L. * — 84.
- = *Dalechampia parvifolia* Lamk. — 196.

Quoi qu'en dise Müller (*Prodr.* XV, sectio post., p. 1245, Lamarck l'a établi son *D. parvifolia* sur la plante du *P. d'Incarville*, dont l'étiquette porte cette mention de la main d'A.-L. de Jussieu: « Chine. »

Acalypha pauciflora Horn. — 90. « *Commelina*, à cause de son calice en coquille. »

- † *Acalypha pauciflora* Horn. — 66 (fol. 31). « *Ricinocarpos*. »
- †† *Andrachne chinensis* Bunge. — 25 (fol. 45).
- † *Broussonetia papyrifera* Vent. — 54 (fol. 30). « Meurier singulier. »
- † *Cannabis sativa* L. — 61 (fol. 22). « Chanvre. »
- = *Artocarpus laca* Lamk. — 162. « Jacquier. »

Fatoua pilosa Gaudich. var. *β. subcordata* Bur. — 81.

Pouzolzia indica Gaudich., forma *microphylla*. — 87. « Aurone. »

Ficus erecta Thunb. ex Kämpf. icon. select. 4. — 159. « Arbre du Japon. »

= **Ficus pertusa** L. — 184.

= **Ficus** sp. (*F. pumila* Thunb. affinis). — 170. « Cardamome. »

= 172. « Arbrisseau de la pagode, sans filets. » — **Ficus** sp. (*F. rufescenti* Vahl, affinis).

= **Ficus** sp. (*F. indica* L. affinis). — 188.

Biota orientalis Endl. — 141. « Thuya de Chine. »

Cycas revoluta Thunb. — Sans numéros.

Pris à Macao. Se trouve dans l'herbier particulier du P. d'Incarville et dans celui des Jussieu.

†† **Cypripedium macranthum** Sw. — 51 (fol. 50).

Anemum Zingiber L., de la main d'A. L. de Jussieu; ni fleurs, ni fruits. — 3. « Gingembre. »

Alpinia Galanga Sw. — 99. « Arbre de la Cochinchine. »

Une feuille seulement.

†† **Iris oxypetala** Bunge. — 43 (fol. 49). « Anémone. »

Spécimen très détérioré, à peine déterminable.

† **Pardanthus dichotomus** Ledeb. — 59 (fol. 26). « Espèce de petit Lis. »

†† **Polygonatum** sp. — 48 (fol. 50).

Spécimen presque complètement détruit; appartenant peut-être au **P. officinale** All.

†† **Polygonatum chinense** Kunth. — 1 (fol. 40). « Sigillus Salomonis. »

†† **Asparagus trichophyllus** Bunge. — 18 (fol. 44). « Asparagus. »

Sans fleurs ni fruits.

Asparagus lucidus Lindl.* — 100. « Les Portugais l'appellent Scorzonère. »

†† **Lilium tenuifolium** Fisch. — 44 (fol. 49). « Lis. »

† **Funkia subcordata** Spreng. — 58 (fol. 25). « Lis à feuilles d'Arum. »

† **Commelina communis** L. (*C. polygama* Roth). — 67 (fol. 32). « Commeline. »

Commelina benghalensis L. — 88. « Commeline. »

= **Pothos scandens** L. — 29. « Serait-ce un Troëne ? »

Cyperus Iria L. — Sans numéro.

Herbier particulier du P. d'Incarville.

Cyperus distans L. — 36. « Souchet. »

† **Carex stemophylla** Wahl. — 41 (fol. 18).

Oryza sativa L. — 77. « Riz. »

† **Panicum viride** L. (*Setaria viridis* P. Beauv.). — 32 (fol. 13). « Cauda muris. »

† **Panicum viride** L. (*Setaria viridis* P. B.). — 38 (fol. 15). « Panis. »

† **Panicum viride** L., forma *major*. — 49 (fol. 20). « Panis. »

- † *Panicum glaucum* L. (*Setaria glauca* P. B.). — 53 (fol. 22). « Panis. »
Panicum compositum L. — 62. « Gramen avenaceum. »
Panicum sanguinale L. — 31. « Gramen Dactylon. »
† *Panicum Crus-galli* L. var. *muticum*. — 37 (fol. 15). « Milium syl. vestre. »
† *Panicum millaceum* L. — 47 (fol. 19). « Petit Millet. »
† *Panicum italicum* L. — 46 (fol. 19). « Panis. »
Isachne sp. — 34. « Graminée. »

Portion de panicule; voisin de *Is. australis* Rob. Br.

- † *Paspalum villosum* Thunb. — 64 (fol. 24). « Mil. »
† *Hierochloa dahurica* Trin. — 4 (fol. 1). « Poa. »
Chloris caudata Trin. — Sans numéro.

Herbier particulier du P. d'Incarville.

- † *Poa pilosa* L. — 64 (fol. 27). « Petit Poa. »

Forme à rameaux de la panicule dépourvue de poils à la base; cette forme constitue le *Poa verticillata* Cav.

- † *Poa megastachya* Link. — 31 (fol. 12). « Amourette. »
Poa tenella L. — 132. « Gramen. »
Poa unioloides Retz. — 27. « Amourette. »
Eleusine indica L. — 78. « Gramen Dactylon. »
Dactyloctenium aegyptiacum Willd. — 71. « Pié de poule. »
† *Melica scabrosa* Trin. — 12 (fol. 4). « Gramen avenaceum. »
Bambusa sp. — 89. « Spathe de Bambou. »
Bambusa sp. — 101. « Bambou. »
Apluda nutica L. — 56. « Gramen avenaceum. »
Andropogon Schoenanthus L. — 12. « Gramen avenaceum. »
† *Andropogon Sorghum* Brot. — 48 (fol. 20). « Grand Mil. »
†† *Selaginella mongolica* Rupr. — 3 (fol. 41).
†† *Selaginella Stauntoniana* Spring. — 37 (fol. 47).
Davallia tenuifolia Sw. — 37. « Capillaire Adianthe blanc. »
Adiantum caudatum Hook. — 2. « Capillaire. »
= *Adiantum flabellulatum* L. — 38. « Capillaire de Montpellier. »
Blechnum orientale L. — 98.
= *Pteris semiplanata* L. — 26. « Capillaire dont la graine borde seulement la feuille. »
Asplenium sp. — 114. « Adianthe noir. »
Aspidium molle Sw. — 73. « Fougère. »
Aspidium sp. — 50. « Capillaire. »
Polypodium adnascens Sw. — 42. « Capillaire. »
= *Tenista blechnoides* Sw. (*T. Chinense* Desv. Journ. de bot.) 1, 270. — 115.
La plante de Desvaux n'est certainement qu'une forme à pinnes plus larges du *T. blechnoides* Sw.
Lygodium japonicum Sw. — 75. « Capillaire. »
Angiopteris evecta Hoffm. — 117.