Eléments et observations méridiennes de la Grande Comète (*b*) 1881.

Des observations du 22 Juin 1881, faites à Kiel par le Dr. Peters, et du 28 Juin et 4 Juillet, faites à Napoli par le Prof. Fergola, les assistants de cet Observatoire, Dr. F. Contarino et Dr. F. Angelitti, ont déduit les éléments ci-dessous:

$$\begin{aligned} T &= 1881 \text{ Juin } 16.43773 \text{ t. m. Greenwich} \\ \pi &= 265^{\circ} 12' 4'' \\ \Omega &= 270 \ 58 \ 3 \\ i &= 63 \ 28 \ 52 \end{aligned} \left. \vphantom{\begin{aligned} T \\ \pi \\ \Omega \\ i \end{aligned}} \right\} \text{Equinoxe moyen 1881.0}$$

$$\log q = 9.86566$$

Direct

L'observation du milieu est représentée par

$$C - O \quad d\lambda = + 1'' \quad d\beta = - 7''$$

Les positions de la Comète employées, telles qu'elles résultent des observations réduites à l'équinoxe moyen 1881.0, et corrigées de l'aberration des étoiles fixes, et les positions de la terre réduites à la même époque et corrigées de l'effet de la parallaxe et du mouvement propre de la Comète sont:

t. m. Greenwich, 1881	λ	β	L	log R
Juin 22.47570	84° 20' 31'' 61	+ 17° 10' 40'' 95	271° 34' 59'' 26	0.0071874
» 28.43737	89 46 15.79	+ 39 35 51.82	277 16 13.80	0.0072400
Juillet 4.45673	95 15 35.67	+ 51 56 28.55	283 0 38.49	0.0072291

Les observations suivantes ont été faites par Mr. le Prof. Fergola au cercle méridien de Repsold. Les déclinaisons ont été corrigées seulement de la réfraction.

1881	t. m. Napoli	AR. $\searrow$	$\delta \searrow$
Juin 27	11 ^h 27 ^m 56 ^s 8	5 ^h 52 ^m 36 ^s 62	+ 60° 5' 45'' 97
» 28	11 29 51.7	5 58 28.35	+ 63 3 3.61
» 30	11 35 51.5	6 12 22.25	+ 68 3 49.06
Juillet 1	11 40 4.6	6 20 32.64	+ 70 10 11.50
» 2	11 45 13.6	6 29 39.06	+ 72 2 27.77
» 3	11 51 25.5	6 39 48.50	+ 73 41 53.74
» 4	11 58 40.7	6 51 1.40	+ 75 9 41.39
» 5	12 7 5.7	7 3 24.38	+ 76 26 51.24
» 7	12 27 31.8	7 31 46.99	+ 78 32 45.23

Naples, 9 Juillet 1881.

A. de Gasparis.

Meridian-Beobachtungen und Elemente des Cometen *b* 1881.

Von Herrn *And. Lindstedt*, Observator der Sternwarte zu Dorpat.

Ich beehre mich Ihnen hiermit folgende Beobachtungen des grossen Cometen von Gould für die Astr. Nachr. mitzutheilen.

	$\searrow \alpha$ app.	$\searrow \delta$ app.
1881 Juni 28	5 ^h 58 ^m 15 ^s 57	+ 62° 57' 16'' 3
» 29	6 4 47.51	+ 65 36 43.1
» 30	6 12 6.08	+ 67 59 10.6
Juli 1	6 20 14.94	+ 70 6 5.3

Die Beobachtungen sind von mir am hiesigen Meridiankreise erhalten. Der Comet wurde in der untern Culm. beobachtet und war sehr scharf zu pointiren, so dass ich den Beobachtungen eine grosse Genauigkeit zuschreiben darf. —

Aus den oben mitgetheilten Beobachtungen von Juni 28 und 30 nebst einer Meridianbeobachtung 1881 Juli 2 $\alpha \searrow = 6^h 29^m 19^s 70$ $\delta \searrow = 71^{\circ} 58' 49'' 9$ die ich

Dorpat 1881 Juli 2. und 3.

gestern erhielt, habe ich die folgenden parabolischen Elemente berechnet:

$$\begin{aligned} T &= 1881 \text{ Juni } 16.68013 \\ \pi &= 265^{\circ} 37' 18'' 3 \\ \Omega &= 270 \ 58 \ 55.1 \\ i &= 63 \ 24 \ 19.0 \end{aligned} \left. \vphantom{\begin{aligned} T \\ \pi \\ \Omega \\ i \end{aligned}} \right\} 1881.0$$

$$\log q = 9.867092$$

Darstellung der mittl. Beob. (Beob.—Rechn.)

$$d\lambda = - 0'' 1 \quad d\beta = - 5'' 5.$$

Da die zu Grunde gelegten Beobachtungen wegen des scharf begrenzten sternartigen Kerns sehr genau sind und auf alle kleinen Correctionen Rücksicht genommen worden ist, so könnte man wohl eine grössere Abweichung von der parabolischen Gestalt erwartet haben, wenn der Comet mit dem Bessel'schen von 1807 identisch wäre.

Dr. And. Lindstedt, Observator.