und

$$\Delta a = 4 \frac{M_0}{\pi} \frac{a^2}{r} \left[K\left(\frac{a'}{r}\right) \right]_{r_1}^{r_2}$$

wo Δq , Δe , Δa umgekehrt proportional r sind, wie es auch sein muß. Ist $r_1 > r_2$, so ist

$$K\left(\frac{r_1}{a'}\right) > K\left(\frac{r_2}{a'}\right), \text{ aber } K\left(\frac{a'}{r_1}\right) < K\left(\frac{a'}{r_2}\right)$$

also auch

$$\frac{1}{r_1} K\left(\frac{a'}{r_1}\right) < \frac{1}{r_2} K\left(\frac{a'}{r_2}\right)$$

so daß bei wachsendem Abstände von der Sonne die Störungen im Falle eines inneren Punktes positiv, im Falle eines äußeren Punktes aber negativ sind, während für q das Umgekehrte gilt.

Aus der Tatsache, daß e nur periodischen Störungen unterworfen ist, müssen wir im Hinblick auf die Bewegungsanomalie des Enckeschen Kometen, bestehend in einer säkularen Abnahme der Exzentrizität und ebenso der großen Achse, den Schluß ziehen, daß die Anziehung des Planetoidenringes unter Voraussetzung der Annäherung, die wir oben

untersucht haben, jene Ungleichheit nicht zu erklären vermag; ich habe mich ferner aus den Untersuchungen Backlunds in seinen »Calculs et recherches sur la comète d'Encke« davon überzeugt, daß der Parameter p zwar für eine Revolution bis auf geringe Abweichungen konstant bleibt, daß dies aber für mehrere Revolutionen nicht mehr der Fall ist. Möglich wäre aber noch, daß die Störungen, welche der Enckesche Komet jedesmal bei seinem Durchgange durch eine mehr oder weniger dicht gedrängte Schar von Planetoiden erleidet, eine Erklärung seiner Bewegungsanomalie schaffen könnten; befindet sich doch der Enckesche Komet nur während eines Jahres außerhalb des Bereiches der Planetoiden, während er sich innerhalb 2.3 Jahre durch den Planetoidenring hindurchbewegt, ohne im Aphel die obere Grenze des Abstandes der Planetoiden von der Sonne zu erreichen.

Um schließlich noch den Fall parabolischer Kometen zu erledigen, hat man in die Formeln für Δq und Δe etc.: $e = 1$ und $p = 2q$ zu substituieren, ferner aber statt ΔM die Störung der Perihelzeit ΔT auszuwerten mittels der Relation:

$$\frac{dT}{dw} = - \frac{r^4 M_0 \mathcal{F}}{k \sqrt{2q}} \left(1 - 5 \sin^2 \frac{w}{2} + 8 \sin^4 \frac{w}{2} - \frac{16}{3} \sin^6 \frac{w}{2} \right) = \frac{r^2}{k \sqrt{2q}} \frac{dT}{dt}$$

wo man entweder nach w oder t mechanisch integrieren kann und wo man für $\mathcal{F}$ das eine oder das andere Integral zu setzen hat, je nachdem der Komet sich innerhalb oder außerhalb des Planetoidenringes befindet.

Wien-Ottakring, 1905 März 28.

Alexander Wilkens.

Photometrische Messungen der Sterne R Coronae Bor. und 60.1905 Ophiuchi

am Astronomischen Institut Heidelberg-Königstuhl.

Herr *G. van Biesbroeck*, welcher seit einiger Zeit am hiesigen Institut tätig ist, hat von R Coronae Bor. seither die nachfolgenden photometrischen Messungen erhalten. Das benutzte Instrument ist das am 8-Zöller angebrachte Zöllnersche Photometer und die Beobachtungen sind alle in der üblichen Weise angestellt. Die ersten Tage können nicht den gleichen Grad der Sicherheit beanspruchen als die späteren, da der Beobachter noch nicht lange vorher mit photo-

metrischen Arbeiten begonnen hatte. Doch dürfte die Helligkeitsabnahme im Anfang sicher verbürgt sein. Die benutzten Vergleichsterne sind die von Pickering angegebenen und ihre Helligkeiten den Harvard Annals XXXVII p. 168 entnommen. Hr. van Biesbroeck macht hierbei auf die konstanten Unterschiede zwischen den Helligkeiten aus den Sternen p und q bzw. r , s aufmerksam, indem daraus folgen würde, daß der Stern p etwa 0.2 Größenklassen zu hell angesetzt ist.

R Coronae Borealis.

1905	M. Z. Kgst.	Helligkeit aus						Mittel
		n	o	p	q	r	s	
Mai	11	11 ^h 15 ^m	—	—	10.03	10.23	—	10.13
	23	12 12	—	—	—	—	11.10 ±	11.10 ±
	29	12 29	—	—	—	10.87	10.86	10.86
	30	11 30	—	—	10.14	10.64	10.40	10.48
	31	11 47	—	—	10.11	10.26	—	10.19
Juni	1	11 8	—	—	10.06	10.17	—	10.16
	3	11 30	—	10.14	9.97	10.25	10.31	10.17
	4	12 2	—	10.05	9.86	10.17	10.20	10.08
	8	12 51	—	—	9.61	—	9.99	9.80
	10	11 20	9.70	9.72	9.73	9.91	—	9.76
	12	11 56	9.67	9.58	9.56	9.73	—	9.64
	13	12 18	9.45	9.52	9.47	9.70	—	9.54
	16	12 12	9.41	9.37	9.53	—	—	9.44

Herr Dr. *Moschick* hat im vorigen Jahr den zu unseren Programmsternen (langperiodische) gehörenden Stern mehrfach mit dem gleichen Instrument gemessen bzw. Beobachtungen über seine Helligkeit gemacht. Da diese Beobachtungen jetzt von Interesse sind, so mögen sie hier getrennt von der ganzen demnächst zur Veröffentlichung gelangenden Reihe mitgeteilt werden.

1904 April 27. Bei der schlechten Luftbeschaffenheit, die Sterne 11. Größe nur mit Mühe erkennen ließ, war eine sichere Identifizierung nicht möglich; die beiden nach den Hagenschen Karten in Betracht kommenden Sterne würden ergeben: R Coronae $\approx 10^m7$

1904	M. Z. Kgst.	aus <i>f</i>	aus <i>h</i>	Mittel
Juni 3	12 ^h 25 ^m	6 ^m 02	5 ^m 86	5 ^m 94
11	12 5	6.55	6.72	6.64
19	12 20	6.46	6.66	6.56

1904 Juli 7. Plötzlich auftretende Wolken machen die Messung unmöglich; Variabler ist schwächer geworden, aber immer noch heller als *f*.

f (BD. +28°2475) = 7^m18 (nach Pickering)

h (BD. +28°2469) = 7^m93 (nach Pickering).

Die Messungen waren bei dem großen Glanze des Variablen nicht leicht, zumal da passende Vergleichsterne fehlten. Aus diesem Grunde wurden die Beobachtungen von Juni 11 und Juni 19 wiederholt unter Benutzung verschiedener Diaphragmen ausgeführt, welche die Ablesungen am Intensitätskreise verkleinerten.

Zugleich teile ich einige Messungen mit, welche Herr *van Biesbroeck* von dem Andersonschen Variablen 60.1905 Ophiuchi noch erhalten konnte. Der Stern, den Anderson am 28. März d. J. als 9.8 Größe schätzte (A. N. 4015), ist jetzt für Messungen am 8-Zöller zu schwach geworden. Als Vergleichstern ist nur ein mit *f* bezeichneter Stern benutzt, der auf beigefügter Reproduktion der Toulouser photographi-

schen Karte (+5° Nr. 126, Maßstab nahe 2 mm = 1') gekennzeichnet ist. Die daselbst weiter mit *a* bis *e* bezeichneten Sterne sind von Herrn *van Biesbroeck*, ausgehend von dem Stern BD. +5°3285 als 9^m00, ebenfalls photometrisch bestimmt und zwar *a* = 10.05, *b* = 10.61, *c* = 10.22, *d* = 11.24, *e* = 11.48, *f* = 11.62. Ihre Positionen können leicht der Karte entnommen werden, wie dies bereits für die Sterne *a* bis *c* von Herrn *Ebell* getan wurde. Auf der Kartenskizze befindet sich ein ganz schwaches Sternchen, wohl nahe 13. Gr., südlich vom Variablen, welches die photographische Karte nicht hat.

60.1905 Ophiuchi verglichen mit *f*.

1905	M. Z. Kgst.	Größe
Mai 30	13 ^h 1 ^m	11 ^m 56
Juni 1	12 3	11.68
3	12 21	11.78
4	11 48	11.87
8	13 6	12.06 wolzig
10	11 45	12.03
12	12 5	12.6 ganz unsicher, Grenze der Sichtbarkeit

Astronomisches Institut Heidelberg-Königstuhl, 1905 Juni 17.

W. Valentiner.

Beobachtung von R Coronae Borealis.

R Coronae habe ich am 20. Juni 1905 10^h28^m9 Kgst. abermals aufgenommen. Der Stern ist wieder viel heller geworden. Er ist fast gleich hell mit Hagens Nr. 8, vielleicht eine Spur heller, aber viel schwächer als Hagens Nr. 2. Ich schätze ihn 9^m4.

Astrophys. Institut Königstuhl, 1905 Juni 21.

M. Wolf.

Berichtigung zu Torino Annuario astronomico 1905.

Si rende noto che le posizioni apparenti in α della stella 8 γ Coronae borealis, quali trovansi calcolate nell'Annuario Astronomico per il 1905 del R. Osservatorio di Torino, sono errate per tutto il corso dell'anno. — Probabilmente per la costante besseliana *a* (rispettivamente *c* secondo le notazioni della *Connaissance des Temps*) si è assunto quale logaritmo 8.4025 in luogo di 0.4025.

Carloforte, 28 Giugno 1905.

Dr. Luigi Volta.

Inhalt zu Nr. 4036. *A. Wilkens.* Über die Störungen der Planetoiden und Kometen durch die Anziehung des Planetoidenringes. 49. — *W. Valentiner.* Photometrische Messungen der Sterne R Coronae Bor. und 60.1905 Ophiuchi. 61. — *M. Wolf.* Beobachtung von R Coronae Borealis. 63. — *Luigi Volta.* Berichtigung zu Torino Annuario astronomico 1905. 63.

Geschlossen 1905 Juli 25. Herausgeber: H. Kreutz. Druck von C. Schaidt. Expedition: Kiel, Niemannsweg 103.