ANNALEN

DER

CHEMIE UND PHARMACIE.

CVIII. Bandes erstes Heft.

Ueber die Hyperjodide einiger Tetraammonium- basen;

von *R. Müller*,

Assistenten am chemischen Laboratorium der polytechnischen Schule zu Karlsruhe.

Auf Veranlassung des Herrn Prof. Weltzien habe ich, im Anschlusse an dessen frühere Arbeiten*) über die Hyperjodide der Tetraammoniumbasen des Aethyls und Methyls, einige Hyperjodide dargestellt, welche gleichzeitig mehrere Aetherradiale enthalten.

Herr Dr. Schabus hatte die Güte, das krystallographische und optische Verhalten dieser Verbindungen zu untersuchen.

Trimethyläthylammoniumtrijodid $N \begin{Bmatrix} C^2H^3 \\ C^2H^3 \\ C^2H^3 \\ C^4H^5 \end{Bmatrix} J^3$. — Dieser Kör-

per wurde erhalten durch die Einwirkung von 2 Aequivalenten Jod auf 1 Aeq. Trimethyläthylammoniumjodür in erwärmter alkoholischer Lösung, aus welcher sich derselbe

*) Diese Annalen XCI, 33; XCIX, 103.

beim Erkalten in kleinen Krystallen ausschied. Das Trimethyläthylammoniumtrijodid bildet sehr leicht zerbrechliche, rhombische Prismen von blauvioletter Farbe; dieselben sind in Alkohol ziemlich leicht löslich, von Wasser hingegen werden sie augenblicklich, schon bei gewöhnlicher Temperatur, in grünes Pentajodid und Jodür zerlegt:

Umgekehrt wird beim Zusammenbringen äquivalenter Mengen von Pentajodid und Jodür in *alkoholischer* Lösung das Trijodid wieder gebildet, auf welche Weise letzteres in größerer Menge gewonnen wurde.

Die Verbindung schmilzt bei 64° C. ohne Zersetzung zu einer dunkelvioletten öligen Flüssigkeit.

Die Krystalle sind dunkelbraun, in dünnen Splittern bräunlichgelb gefärbt und etwas dichromatisch; Oberflächenfarbe blauviolett.

I. 0,5450 Grm. Substanz gaben mit PbO, CrO³ verbrannt

0,2504 Grm. CO² und 0,1530 Grm. HO.

II. 0,3278 Grm. Substanz gaben 0,4908 Grm. AgJ.

		Berechnet	Gefunden	
C ¹⁰	60	12,79	12,54	—
H ¹⁴	14	2,98	3,12	—
N	14	2,98	—	—
J ³	381	81,25	—	80,91.

Bei der Bestimmung des Jods in diesen Hyperjodiden wurde die alkoholische Lösung derselben mit Schwefelwasserstoff in das Jodür der betreffenden Verbindung und Jodwasserstoff zersetzt, um beim nachherigen Fällen mit AgO, NO⁵ die Bildung von etwas jodsaurem Silberoxyd zu verhindern, da dieses in geringer Menge in Wasser löslich ist.

Trimethyläthylammoniumpentajodid $N \left\{ \begin{matrix} C^2H^3 \\ C^2H^3 \\ C^2H^3 \\ C^4H^5 \end{matrix} \right\} J^5$ wird erhal-

ten durch die Einwirkung von überschüssigem Jod auf das Jodür oder Trijodid des Trimethyläthylammoniums in erwärmter alkoholischer Lösung, oder, wie oben bereits erwähnt, durch die Einwirkung von Wasser auf das Trijodid.

Die Verbindung krystallisirt in quadratischen metallischglänzenden Blättchen mit prachtvollem grünlichem Lustre.

Das Pinakoid OP , das Prisma $\infty P \infty$ und eine schwach entwickelte Pyramide sind die Formen der Krystalle :

$$OP : P = 141^{\circ}0'$$

$$\text{daraus } a = 0,5726.$$

Die Krystalle sind undurchsichtig, in sehr dünnen Schichten aufpolirt gelblich, in dickeren gelblichbraun gefärbt, die Oberflächenfarbe metallischgrün (grasgrün).

Bei der Untersuchung mit der dichroscopischen Loupe erscheinen dieselben dichromatisch; waren sie einige Zeit der Einwirkung des Lichts ausgesetzt, so wird die Oberfläche dunkelblau gefärbt, der Hauptreflex des ordinären Strahls bleibt fast vollkommen weiß und es ist demselben nun so weniger Grün beigemengt, je länger die Einwirkung des Lichtes gedauert hat. Nach etwa 2 Stunden verschwindet das Grün nahezu vollständig, das Blau des extraordinären Strahles dagegen erscheint dafür um so lebhafter; bei großem Einfallswinkel ist demselben etwas Roth beigemengt.

Der Schmelzpunkt der Verbindung liegt bei $68^{\circ} C$.

I. 0,4030 Grm. Substanz gaben bei der Verbrennung
0,1242 Grm. CO^2 und 0,0152 Grm. HO .

II. 0,4800 Grm. Substanz gaben 0,7796 Grm. AgJ .

			Gefunden	
			I.	II.
C ¹⁰	60	8,30	8,17	—
H ¹⁴	14	1,94	2,34	—
N	14	1,94	—	—
J ⁵	635	87,82	—	87,75.

Trimethylamylammoniumtrijodid $N \left\{ \begin{matrix} C^2 H^3 \\ C^2 H^3 \\ C^{10} H^{11} \end{matrix} \right\} J^3$ wurde durch

längeres Erhitzen von Trimethylamin und Amyljodür in einer zugeschmolzenen Glasröhre im Oelbade bei 160⁰ und nachheriges Behandeln des auf diese Weise erhaltenen Trimethylamylammoniumjodürs mit alkoholischer Jodlösung erhalten.

Die Verbindung krystallisirt in plattgedrückten rhombischen Prismen von dunkelbrauner Farbe und fettigem Ansehen, welche in Alkohol leicht, in Wasser fast gar nicht löslich sind. Das Pulver zeigt eine citrongelbe Farbe. Der Habitus der Krystalle ist meistens säulenförmig, zuweilen durch Vorherrschen von $\infty \bar{P} \infty$ blättchenförmig. Die gewöhnliche Combination besteht aus den Formen $\bar{P} \infty (v)$; $\infty P (M)$; $\infty \bar{P} \infty (p)$ und $\infty \check{P} \infty (Q)$.

Die Neigungswinkel dieser Flächen sind :

$$p : v = 123^{\circ}54'$$

$$v : v' = 112^{\circ}12'$$

$$p : M = 142^{\circ}14'$$

$$M : M' = 104^{\circ}28'$$

$$M : M' = 75^{\circ}32'$$

$$M : Q = 127^{\circ}46'$$

$$p : Q = 90^{\circ} 8'.$$

Da die Krystalle nicht ganz vollkommen ausgebildet waren, so sind die angegebenen Winkel nur Näherungswerthe.

Die Krystalle zeigen Trichroismus; betrachtet man dieselben nämlich so, daß die Lichtstrahlen bei aufrechter Stellung des Krystalles senkrecht zur Fläche *p* durchgelassen werden, so ist der ordinäre Strahl dunkelbraun, fast schwarz, der extraordinäre aber lichtrothbraun, der dritte Farbenton liegt zwischen beiden.

Schmelzpunkt 80° C.

0,1838 Grm. Substanz gaben 0,2529 Grm. AgJ.

		Berechnet	Gefunden
C ¹⁶	96	18,79	—
H ²⁰	20	3,91	—
N	14	2,74	—
J ³	381	74,56	74,38 pC. J
	<hr/>	<hr/>	
	511	100,00.	

Das Pentajodid dieser Verbindung konnte auf gewöhnliche Weise nicht erhalten werden.

Triäthylmethylammoniumtrijodid N $\left\{ \begin{array}{l} \text{C}^4\text{H}^5 \\ \text{C}^4\text{H}^5 \\ \text{C}^4\text{H}^5 \\ \text{C}^2\text{H}^3 \end{array} \right\} \text{J}^3$ wurde auf

ganz analoge Weise, wie die vorhergehenden Verbindungen erhalten.

Das Triäthylmethylammoniumtrijodid krystallisirt in blau-violetten quadratischen Blättchen, welche das Licht mit dunkelrothgelber Farbe durchlassen und in ihrem äußeren Ansehen viel Aehnlichkeit mit Tetramethylammoniumtrijodid haben.

Diese Verbindung besitzt unter den bisher aufgeführten Hyperjodiden den niedrigsten Schmelzpunkt, indem derselbe bei 62° C. gefunden wurde.

0,2522 Grm. Substanz gaben 0,3563 Grm. AgJ.

		Berechnet	Gefunden
C ¹⁴	84	16,90	—
H ¹⁸	18	3,62	—
N	14	2,82	—
J ³	381	76,66	76,38.

Wie das von Prof. Weltzien dargestellte Tetraäthylammoniumtrijodid bildet auch dieser Körper kein Pentajodid.

Zur besseren Uebersicht folgt eine Zusammenstellung der Schmelzpunkte verschiedener Hyperjodide :

Triäthylmethylammoniumtrijodid	$N \left\{ \begin{smallmatrix} (C^4H^5)^3 \\ C^2H^3 \end{smallmatrix} \right\} J^3$	62° C.
Trimethyläthylammoniumtrijodid	$N \left\{ \begin{smallmatrix} (C^2H^3)^3 \\ C^4H^5 \end{smallmatrix} \right\} J^3$	64° „
Trimethyläthylammoniumpentajodid	$N \left\{ \begin{smallmatrix} (C^2H^3)^3 \\ C^4H^5 \end{smallmatrix} \right\} J^5$	68° „
Trimethylamylammoniumtrijodid	$N \left\{ \begin{smallmatrix} (C^2H^3)^3 \\ C^{10}H^{11} \end{smallmatrix} \right\} J^3$	80° „
Tetramethylammoniumtrijodid	$N(C^2H^3)^4 J^3$	110° „
Tetramethylammoniumpentajodid	$N(C^2H^3)^4 J^5$	126° „
Tetraäthylammoniumtrijodid	$N(C^4H^5)^4 J^3$	142° „

Mit metallischem Quecksilber bilden die erwähnten Hyperjodide den von H. Risse in diesen Annalen kürzlich beschriebenen Quecksilberverbindungen ganz analoge Salze.

Auch bei der Einwirkung von Trimercuramin NHg^3 auf Methyljodür, Aethyljodür oder Amyljodür entstehen solche Quecksilberverbindungen, beispielsweise nach dem Schema :

eine Reaction, welche ganz derjenigen von Ammoniak auf Methyljodür, Aethyljodür u. s. w. entspricht.

Als ich Aethyljodür auf ein etwas HgO haltiges Trimercuramin, welches minder heftig explodirte, als das reine, und

von gelber Farbe war, einwirken liefs, erhielt ich gelbe Krystalle einer Quecksilberverbindung, welche sich in Weingeist ziemlich leicht lösten, von Wasser nicht zerlegt wurden, und deren Analyse ich folgen lasse :

0,4838 Grm. Substanz gaben 0,4818 Grm. AgJ und 0,1742 Grm. HgS.

Aus diesen Resultaten ergibt sich die Formel :

		Berechnet	Gefunden
C ¹⁶	96	10,23	—
H ²⁰	20	2,13	—
N	14	1,49	—
Hg ³	300	31,99	31,04
J ⁴	508	54,16	53,80.

Bei dem Versuche, welcher in einer zugeschmolzenen Glasröhre im Oelbade vorgenommen wurde, schied sich zugleich metallisches Quecksilber aus. Als ganz reines Trimercuramin zu dem Versuche verwendet wurde, löste sich dasselbe nach und nach vollständig in Jodäthyl auf, ohne gleichzeitige Abscheidung von metallischem Quecksilber. Eine gröfsere Menge reinen Trimercuramins explodirte indessen in einer kalten Nacht ohne äufsere Veranlassung von selbst und mit furchtbarer Heftigkeit, so dafs die weiteren Versuche mit demselben vorläufig unterbleiben mufsten.

Carlsruhe, im Juli 1858.