von *Schiaparelli* trug ich gleich nach Erkennung des Radiationspunktes, mit Rücksicht auf das S. 192 von dem Radiationspunkte № 76 ($\alpha = 17^\circ$, $\delta = +48^\circ$) Gesagte, kein Be-

denken den Novemberstrom des letzten 27. Novembers mit dem *Biela'schen* Cometen in enge Verbindung zu setzen.

Münster, im December 1872.

Heis.

Schreiben des Herrn Professors *Wittstein* an den Herausgeber.

Sie wollen mir erlauben, dass ich hier ein kleines Versehen berichtige, welches bei der Discussion der Sternschnuppenschwärme und insbesondere desjenigen vom 27. November, der eine so unerwartete und glänzende Bestätigung der *Schiaparelli'schen* Theorie geliefert hat, mehrfach vorgekommen ist. Es darf nämlich in Fällen dieser Art die Abnahme und das Aufhören des Phänomens keineswegs als ein Beweis angesehen werden, dass die Erde aus dem Meteoritenstrom herausgetreten sei, sondern beides ist zunächst und in erster Linie eine Folge der geänderten Stellung des Beobachters gegen den Strom, während der Strom selbst fortdauernd und mit unverminderter Stärke die Erde treffen kann. Denn wenn man ein begrenztes Stück der Erdoberfläche nebst dem darauf ruhenden Theile der Atmosphäre, so weit ein Beobachter solche übersieht, bei der täglichen Rotation verfolgt und den Meteoritenstrom, der die Erde trifft, in allen seinen Theilen als gleich dicht voraussetzt, so muss sogleich klar sein, dass dieses Stück in einer gegebenen Zeit-Einheit von der möglichst grössten Zahl Meteoriten getroffen wird, wenn daselbst zur Zeit der Radiationspunkt der Meteoriten culminirt; dagegen von einer abnehmend um so kleineren Zahl, je weiter der Radiationspunkt sich von dem Meridian entfernt; bis mit dem Eintritt des Radiationspunktes in den Horizont, falls derselbe überhaupt untergeht, das Phänomen vollständig aufhören muss. Die umgekehrte Reihenfolge tritt ein, wenn die Culmination des Radiationspunktes noch bevorsteht, und der Grund dieser Zu- und Abnahme des Phänomens liegt offenbar in der successiven Veränderung des Winkels, unter welchem das betreffende Stück der Erdoberfläche dem ankommenden Strome sich darbietet, ganz in derselben Weise, wie der Grad der Erleuchtung einer Fläche durch parallele Strahlen aus dem Winkel sich bestimmt, unter welchem die Fläche von den Strahlen getroffen wird. Hiernach erhält man leicht, wenn man mit φ die Polhöhe des Beobachters, mit δ die Declination des Radiationspunktes und mit m die Zahl der in einer Minute beobachteten Sternschnuppen zur Zeit des Maximums d. i. der Culmination des Radiationspunktes bezeichnet, die Zahl m' der in einer Minute zu erwartenden Sternschnuppen zur Zeit t vor oder nach der Culmination ausgedrückt durch die Gleichung

$$m' = m \left(1 - \frac{2 \cos \varphi \cos \delta}{\cos (\varphi - \delta)} \sin \left(\frac{t}{2} \right)^2 \right)$$

immer unter der Voraussetzung, dass der Strom constant bleibt und constant die Erde trifft. Auch folgt leicht, dass die Maxima für verschiedene Meridiane nicht in denselben absoluten Augenblick fallen und für verschiedene Parallelkreise im allgemeinen nicht gleich gross werden; ferner dass Beobachtungszahlen verschiedener Beobachter, welche absolut genommen in denselben Augenblick fallen, nicht unmittelbar verglichen werden dürfen; endlich dass es ein Maximum maximorum giebt, und zwar für denjenigen Ort und Augenblick, in welchem ein Beobachter den Radiationspunkt im Zenith hat, und welches, wenn man es durch M bezeichnet, mit dem unter der Polhöhe φ stattfindenden Maximum m durch die Gleichung $M \cos (\varphi - \delta) = m$ zusammenhängt.

Am 27. November fiel die Culmination des Radiationspunktes und damit die grösste Häufigkeit der Sternschnuppen nahe um 9 Uhr Abends; von da an musste also, während der Strom der Meteoriten unverändert fort dauerte und die Erde traf, für den einzelnen Beobachter die Häufigkeit der Sternschnuppen in einer der obigen Formel entsprechenden Weise successive abnehmen. Zu grösserer Anschauung setzen wir einige Zahlen hieher, welche unter der Annahme $\varphi = 52^\circ$ und $\delta = 43^\circ$ aus der Formel hervorgehen und aus welchen man sieht, wie die beträchtliche Abnahme des Phänomens in den Morgenstunden vollkommen durch die Natur der Sache bedingt wird. Nichts desto weniger liegen uns zwei Berichte von namhaften Beobachtern vor (der eine aus der K. V. Z. und der andere aus der A. N.), in denen aus dem Nachlassen der Sternschnuppen in den Morgenstunden übereilt der Schluss gezogen wird, dass die Erde aus dem Strome heraustrete. Richtig wäre es, um Letzteres zu constatiren, gewesen, die Abnahme des Phänomens mit Zahlen wie die umstehenden, welche einen constanten Strom voraussetzen, zu vergleichen oder, falls die Gunst der Witterung dazu nicht ausreichendes Material gab, die Beobachtung am folgenden Abende wieder aufzunehmen. Ein Vorbild findet übrigens dieser Irrthum schon in einem auf der Sternwarte in Rom befolgten Verfahren, wo man die Beobachtung der Sternschnuppen des 10. August v. J., deren Radiationspunkt gegen 6 Uhr Morgens culminirt, schon um 2 Uhr Morgens abbrach, verleitet durch eine scheinbare Abnahme ihrer Häufigkeit, und dadurch den besten Theil der Beobachtung sich entgehen liess.

Scheinbare Häufigkeit der Sternschnuppen für 52° Polhöhe, $m = 1$ gesetzt.

1872 November 27,	5 ^h ,	$m' = 0.772$
	6	0.867
	7	0.939
	8	0.984
	9	1.000
	10	0.984
	11	0.939
	12	0.867
	13	0.772
	14	0.662
	15	0.544
	16	0.426
	17	0.316
	18	0.222
	19	0.150

Es sei gestattet bei dieser Gelegenheit noch auf einen anderen Umstand aufmerksam zu machen, der bei dem Sternschnuppenschwarm am 27. November besonders auffällig hervorgetreten ist, nämlich die grosse Unsicherheit, welche mit der Bestimmung des Radiationspunktes verbunden zu sein scheint. Es liegen uns 8 Angaben verschiedener Beobachter vor, in denen die Rectascension von 22°—43°, die Declination von 37°—50° schwankt, und wenn man auch diejenigen ausschliessen will, welche augenscheinlich

nur auf einer rohen Schätzung beruhen, so bleiben doch noch immer sowohl in AR als in Dec. Schwankungen von mehreren Graden zurück. Offenbar können diese Abweichungen nur zum kleinen Theile ihren Grund in Beobachtungsfehlern haben, müssen vielmehr in der Hauptsache aus der Natur des Gegenstandes erklärt werden. Die Meteoriten, welche einer und derselben Gruppe angehören, bewegen sich in aller Strenge nicht in parallelen Bahnen, sondern diese Bewegungen werden durch die gegenseitigen Anziehungen alterirt, so dass die Gruppe in der That ein System von Körpern darstellt, welche auf die mannigfaltigste Art einander umkreisen. Wenn man also die Bahnen zweier dieser Körper in den wenigen Secunden, wo sie als Sternschnuppen sichtbar sind, auffasst und rückwärts verlängert, so wird der Durchschnitt im allgemeinen nicht den wahren Radiationspunkt, der der Radiationspunkt des Schwerpunkts der Gruppe sein muss, ergeben und ebenso wird im allgemeinen jedes andere Paar einen andern Punkt liefern. Es folgt daraus, dass man viel sorgfältiger, als bisher geschehen zu sein scheint, verfahren und eine grosse Anzahl solcher Paare zusammenfassen muss, um aus der Combinirung derselben, indem man die Abweichung des einzelnen Körpers aus dem Parallelismus mit der Bahn des Schwerpunkts wie eine zufällige auffasst, mit möglichster Zuverlässigkeit auf den wahren Radiationspunkt schliessen zu können.

Hannover, 1872 December 20.

Wittstein.

Ueber den Sternschnuppenfall am 27. November 1872.

Den Sternschnuppenfall am 27. November 1872, konnte ich wegen meines hohen Alters und meiner Kränklichkeit, nur eine sehr kurze Zeit beobachten.

Ich fand die Luft nicht rein zwar ohne eigentlich Wolken, doch aber dunstig. Die Sterne waren mit einem ruhigen matten Lichte sichtbar. Die Sternschnuppen zählte ich nach dem Taschenchronometer und fand von 8½ bis 9 Uhr für die Minute durchschnittlich 40 Sternschnuppen.

Herr Geheimrath *Sinten* theilte mir folgendes schriftlich mit:

„Die ersten Sternschnuppen habe ich um 6 Uhr Abends bemerkt, als ich eine Strasse in der Richtung von Norden nach Süden passirte, ich sahe wenigstens 50 Meteore in der Minute, darunter etwa 10 Procent mit feurigen Schweifen oder in Form von feurigen Kugeln; es war ein fast

ununterbrochenes Aufflammen einzelner Punkte des südlichen Himmels, die Luft ähnlich der nach einem Gewitter, die Sterne matt. Etwa um 8 Uhr bemerkte ich ebenso viele Sternschnuppen im Norden wie im Süden, doch erschienen mir dieselben fast durchgängig kleiner und matter als um 6 Uhr. Von 8½—9½ Uhr von meinem Garten aus, war ein fast ununterbrochener Sternschnuppenfall am ganzen Himmel sichtbar, die grösseren am nördlichen Himmel, wo ich auch wenige in horizontaler, ja in aufsteigender Richtung beobachtete. Das Verhältniss der grössern zu den kleinern, war jedoch nur etwa das, wie um 8 Uhr. Um 11½ Uhr Nachts habe ich am nördlichen Himmel, die Sternschnuppen nochmals beobachtet, sie erschienen mehr im Lichtnebel, nahmen auch an Zahl erheblich ab.“

Heinrich Schwabe.