(Aus dem physiologischen Institut der Universität Leipzig.)

Über das erste positive Nachbild nach kurz- dauernder Reizung des Sehorganes mittels bewegter Lichtquelle.

Von

Dr. med. **Rudolf Dittler**, und Dr. phil. **Josef Eisenmeier**,
Assistent am Institut Privatdozent an der deutschen
Universität zu Prag.

(Mit 4 Textfiguren.)

Nachdem schon Purkinje¹⁾ die einer bewegten glühenden Kohle folgenden Nachbilderscheinungen eingehend beschrieben hatte, wurde die Untersuchung des Erregungsablaufs nach sehr kurz-
dauernder Belichtung des Sehorganes zuerst von Hess²⁾ wieder aufgenommen. Eine ganze Reihe seiner Arbeiten, denen sich Untersuchungen anderer Forscher [Bosscha³⁾, v. Kries⁴⁾, Bidwell⁵⁾ u. a.] anschlossen, beschäftigt sich mit den hierher gehörigen Erscheinungen. Er gelangte darin zu dem Ergebnis, dass nach kurz-
dauernder Netzhautreizung mit bewegter Lichtquelle günstigstenfalls folgende sechs Nachbildphasen zu unterscheiden sind:

1) Purkinje, Beobachtungen und Versuche zur Physiologie der Sinne Bd. 2 S. 110 f. Berlin 1825.

2) Die einschlägigen Arbeiten von Hess finden sich: Pflüger's Arch. Bd. 49 S. 190 (1891); Arch. f. Ophthalm. Bd. 40 S. 259 (1894); Bd. 44 S. 445 (1897); Bd. 51 S. 225 (1900); Zeitschr. f. Psych. u. Physiol. d. Sinnesorgane Bd. 27 S. 1 (1902); Pflüger's Arch. Bd. 95 S. 1 (1903); Bd. 101 S. 226 (1904).

3) Bosscha, Primäre, sekundäre und tertiäre Netzhautbilder nach momentanen Lichteindrücken. Arch. f. Ophthalm. Bd. 40 S. 22. 1894.

4) v. Kries, Zeitschr. f. Psych. u. Physiol. d. Sinnesorgane Bd. 9 S. 81 (1895); Arch. f. Ophthalm. Bd. 42 S. 95 (1896); Zeitschr. f. Psych. u. Physiol. d. Sinnesorgane Bd. 12 S. 1 (1896); Bd. 25 S. 239 (1901); Bd. 29 S. 81 (1902).

5) Bidwell, On the recurrent images following visual impressions. Proc. of the Roy. Soc. June 1894.

1. die primäre Erregung (Phase 1);
2. ein kurzes dunkles Intervall (Phase 2);
3. ein kurzdauerndes, zum Reizlicht im allgemeinen gegenfarbiges Nachbild, heller als die Umgebung (Phase 3);
4. ein längeres dunkles Intervall, dunkler als die Umgebung (Phase 4).
5. ein länger dauerndes, dem Reizlicht gleichgefärbtes, wenig gesättigtes Nachbild, heller als die Umgebung (Phase 5);
6. Ein länger dauerndes dunkles Nachbild, an dem im allgemeinen eine Färbung nicht wahrnehmbar ist (Phase 6). Diese Phase wird meist nicht unmittelbar nach dem Schwinden der Phase 5 deutlich sichtbar, sondern erst eine kurze Zeit später¹⁾.

Auch bei Anwendung farblosen Reizlichtes hat Hess die geschilderten sechs Phasen deutlich gesehen, wobei, wie zu erwarten war, auch die Phasen 3 und 5 einfach farblos hell erschienen. Die Phasen 1, 3 und 5 sind auch hier wieder heller als der Grund, Phase 3 beträchtlich weniger hell als Phase 1, aber viel heller als Phase 5. Die Phasen 2, 4 und 6 erscheinen deutlich dunkler als der Grund, Phase 2 dunkler als Phase 4²⁾.

Bezüglich der Zeitverhältnisse beim Ablauf dieses oszillatorischen Vorganges macht derselbe Autor die Angabe, dass nach raschem Vorbeiführen eines ca. 5—6 mm breiten Papierstreifens, der aus 1—2 m Entfernung vor dunklem Hintergrund von einer 25kerzigen Mattglasglühlampe bestrahlt wird, bei kurz dunkel adaptiertem Auge in der Regel während der ersten Viertel- bis halben Sekunde die Phasen 1, 2 und 3 ablaufen. Etwa am Ende der ersten Sekunde entwickelt sich dann Phase 5 und bleibt etwa 4—5 Sekunden lang sichtbar. In der 9. bis 12. Sekunde wird schliesslich mehr oder weniger deutlich die Phase 6 sichtbar³⁾. Diese Zeitangaben stimmen mit den gelegentlich von anderen Forschern gegebenen im grossen ganzen überein.

1) Hess, Über den Ablauf des Erregungsvorganges nach kurzdauernder Reizung des Sehorganes beim Normalen und beim total Farbenblinden. Arch. f. Ophthalm. Bd. 51 H. 2 S. 229 f. 1900. Vgl. auch Pflüger's Arch. Bd. 95 S. 1. 1903.

2) Hess, Untersuchungen über das Abklingen der Erregung im Sehorgan nach kurzdauernder Reizung. Pflüger's Arch. Bd. 95 S. 15. 1903.

3) Ebenda S. 10.

Den geschilderten Ablauf des Erregungsvorganges bei kurzdauernder Reizung des Sehorganes hat Hess in einer Kurve schematisch dargestellt, in welcher die Abszissenwerte den Zeiten entsprechen und die Höhen der Ordinaten die relativen Helligkeiten der einzelnen Phasen näherungsweise zum Ausdruck bringen ¹⁾. Da wir im folgenden auf diese Verhältnisse noch verschiedentlich zurückzukommen haben, so geben wir des leichteren Verständnisses halber die Hess'sche Kurve in Fig. 1 wieder.

Es ist bekannt, dass schon Purkinje die Phasen 1—4 an einem im Kreis bewegten glühenden Körper genau beobachtet und beschrieben hat ²⁾. Die Phasen 5 und 6 sind zuerst von Hess beschrieben und eingehend studiert worden. Seine unter mannigfach verschiedenen Bedingungen sorgfältig durchgeführten Untersuchungen des Nachbildverlaufs führten ihn zu dem Ergebnis, dass bei Vermeidung aller Fehlerquellen der Ablauf des Erregungsvorganges für die fovealen und extrafovealen Netzhautpartien im wesentlichen derselbe ist. Auch durch den Adaptationszustand des Auges werden nach seinen Angaben keine prinzipiellen Unterschiede bedingt. Nur auf den zeitlichen Ablauf der einzelnen Phasen hat die Adaptation einen bestimmenden Einfluss, und zwar in dem Sinne, dass mit zunehmender Dunkeladaptation (bei gleichbleibender Intensität des Reizlichtes) die Vorgänge im Sehorgan mehr und mehr beschleunigt werden. Denselben Einfluss zeigt (bei gleichem Adap-

Fig. 1. (Aus Hess's, Untersuchungen über das Abklingen usw. Pflüger's Arch. Bd. 95 S. 14. 1903.)

1) Hess, Untersuchungen über das Abklingen der Erregung im Sehorgan nach kurzdauernder Reizung. Pflüger's Arch. Bd. 95 S. 15. 1903.

2) Purkinje, Beobachtungen und Versuche zur Physiologie der Sinne Bd. 2 S. 110 f. Berlin 1825.

tationszustand des Auges) eine Steigerung der Intensität des Reizlichtes ¹⁾).

Bei Gelegenheit einer kleinen, auf Veranlassung von Herrn Geheimrat Hering von uns angestellten Untersuchung, die zunächst lediglich eine Messung der zwischen dem primären Bild und dem ersten positiven Nachbild verfließenden Zeit nach der Hering'schen Methode ²⁾ zur Aufgabe hatte, haben wir die nach kurzdauernder Reizung der Netzhaut mit bewegter Lichtquelle auftretenden Nachbilder erneut einem eingehenden Studium unterworfen und sind in der Lage, die Angaben älterer Autoren in mancher Hinsicht zu berichtigen bzw. zu ergänzen. Im folgenden wollen wir über unsere neuen Erfahrungen berichten, die in der Feststellung zweier neuer, bis jetzt nicht beschriebener Nachbildphasen, einer dunklen und einer hellen, mit dem Reizlicht gleichgefärbten, gipfeln. Diese beiden Phasen sind gerade unter den Bedingungen, unter denen Hering seine „Dreibildmethode“ anwandte, nämlich im hellen Raume, bei Helladaptation des Auges besonders deutlich zu sehen, wie sich denn auch nachweisen liess, dass das „erste positive Nachbild“, dessen zeitlichen Eintritt Hering mittels seiner Methode zu messen imstande ist, mit keinem der bisher beschriebenen Nachbilder identifiziert werden darf, sondern gerade das von uns isolierte neue positive Nachbild darstellt. Damit sei jedoch nicht gesagt, dass man sich, um dieses Bild sichtbar zu machen, für alle Fälle streng an die von Hering gewählten Versuchsbedingungen halten muss. Soweit unsere bisherigen Erfahrungen reichen, ist es auch bei mässiger Dunkeladaptation, d. h. unter Versuchsverhältnissen, die für den Nachweis der bisher bekannten Nachbildphasen erfahrungsgemäss die günstigsten sind, deutlich zu sehen. Es scheint bei der Beobachtung im dunkel adaptierten Auge im wesentlichen nur darauf anzukommen, dass man bei nicht zu grosser Intensität des Reizlichtes mit genügend schmalen leuchtenden Spalten arbeitet und jedesmal die günstigste Geschwindigkeit der Bewegung herausfindet.

Methodisches.

Die Versuche wurden in einem zweifenstrigen, hellen, nach Süden gelegenen Zimmer ausgeführt. Die Versuchsanordnung war

1) Hess, Untersuchungen über den Erregungsvorgang im Sehorgan bei kurz- und länger dauernder Reizung. Pflüger's Arch. Bd. 101 S. 253. 1904.

2) Hering, Eine Methode zur Beobachtung und Zeitbestimmung des ersten positiven Nachbildes kleiner bewegter Objecte. Pflüger's Arch. Bd. 126 S. 604.

in nächster Nähe des einen Fensters aufgebaut. Der Beobachter befand sich, den Rücken dem Fenster zugekehrt, einem planen Schirm aus schwarzem Karton gegenüber, der auf einem Tische senkrecht aufgerichtet stand und beiläufig so gross gewählt war, dass er bei

Fig. 2. Schematische Darstellung der Versuchsanordnung. *a*: von der dem Fenster abgewandten Seite aus, *b*: von oben her gesehen. *B* = Bude; *V* = Vorderwand der Bude (von aussen); *D* = „Deckschirm“, mit einer spaltförmigen Lichtöffnung versehen; dahinter befindet sich der quadratische Ausschnitt der Bude (punktirt angegeben); *S* = der den „Deckschirm“ tragende Sockel; *F* = Führung (Halm des Pfeifengrases); *R*₁ und *R*₂ = die beiden Holzrollen, über die der Gurt (= *G*) läuft; *M* = Übertragung zum Motor; *L* = Luftübertragung; *P* = reflektierender Papierschirm (eventuell Spiegel).

dem während der Versuche eingehaltenen durchschnittlichen Abstand des Auges von 30 cm bei feststehender Gesichtslinie den grössten

Teil des Gesichtsfeldes füllte. In diesem Schirm war geradeaus vor dem beobachtenden Auge ein (auf Fig. 2 *a* punktiert angegebener) kleiner Ausschnitt von ungefähr 4 cm Breite und ebensolcher Höhe angebracht, durch den man, ehe er durch den weiter unten zu beschreibenden beweglichen Schirm verdeckt wurde, auf eine durch das sehr hohe Fenster des Zimmers von diffusem Himmelslicht erhellte ebene weisse Papierfläche (*P* auf Fig. 2 *b*) blickte. Durch entsprechende Einstellung der reflektierenden weissen Papierfläche war Sorge dafür getragen, dass dem Beobachter bei ruhiger Haltung des Kopfes der Ausschnitt in seiner ganzen Ausdehnung gleichmässig hell erschien. Der weisse Papierschirm konnte in seiner Lichtstärke durch Drehungen um eine horizontale und eine vertikale Achse in mässigen Grenzen variiert werden. Je nach Bedarf wurde er auch gelegentlich mit einem beliebig dunklen grauen Schirm vertauscht. Umgekehrt verwendeten wir in einzelnen Fällen, um sehr hohe Lichtintensitäten zu erzielen, statt der reflektierenden Papierfläche einen Spiegel, der eine möglichst homogene Stelle des Himmels spiegelte.

Der „schwarze“ Kartonschirm, vor dem der Beobachter sass, warf, wenn er hell beleuchtet war, natürlich trotz seiner schwarzen Farbe eine nicht unbeträchtliche Menge Licht in das beobachtende Auge. Um ihn für gewisse Fälle vollständiger lichtfrei machen zu können, ergänzten wir ihn dadurch, dass wir eine Decke und zwei Seitenwände an ihn anfügten, zu einer Art „Bude“, die nach hinten (d. h. nach den Fenstern zu) mittels eines dichten, schwarzen Behanges nach Belieben ganz oder teilweise gegen Lichteinfall verschlossen werden konnte. Dadurch war es uns gleichzeitig ermöglicht, irgendwelche störende Aussendungen, wie beispielsweise die Ränder des Ausschnittes, die sonst deutlich hervortraten, gänzlich zum Verschwinden zu bringen. Auch war jetzt das Gesichtsfeld in ganzer Ausdehnung abgedeckt. Die Seitenwände der Bude, die ebenso wie die Decke innerlich mit schwarzem Papier ausgekleidet waren, reichten ungefähr bis zur Tischhöhe nach unten. Der Beobachter befand sich also nur mit dem Oberkörper innerhalb der Bude. Einen vollkommenen Lichtabschluss zu erzielen, lag nicht im Plane unserer Untersuchung.

Zum Versuche wurde der Ausschnitt in der vorderen Wand unserer Bude von aussen her durch einen „Deckschirm“ (*D* auf Figg. 2 *a* und 2 *b*) verdeckt, der ebenfalls aus schwarzem Karton gefertigt war. Seine Grösse übertraf die des Ausschnittes in allen

Dimensionen, besonders in der horizontalen, beträchtlich. Dadurch wurde ein zureichend lichtdichter Abschluss gewährleistet. Die Reizung der Netzhaut führten wir nun in der Weise herbei, dass wir etwa in der Mitte des „Deckschirmes“ eine schmale, senkrechtstehende, spaltförmige Öffnung anbrachten. Wurde der Schirm in horizontaler Richtung vor der Bude bewegt, so wurde diese spaltförmige Öffnung als ein heller, leuchtender Streifen jedesmal für eine gewisse Zeit in dem Ausschnitt der Bude sichtbar, und sein Bild durchwanderte einen Teil der durch einen passend angebrachten Fixierpunkt in ihrer Lage festgehaltenen Netzhaut. Durch die reichlich bemessene Breite des „Deckschirmes“ war dafür gesorgt, dass der Ausschnitt der Bude sowohl vor wie nach dem Vorbeigang des Lichtspaltes vollkommen abgedeckt blieb. Das Auge sah also ausser dem Fixierpunkt (s. u.) und dem bewegten Lichtbilde eine in allen ihren Teilen immer gleichbleibende homogene Fläche.

Wir verwendeten mit Vorliebe Lichtspalten von 0,5 mm Breite, denen bei einem mittleren Abstand des beobachtenden Auges von 30 cm ein Netzhautbild von 0,025 mm Breite entspricht. Damit soll nicht gesagt sein, dass wir die unten beschriebenen Erscheinungen nur unter dieser Voraussetzung sahen. Wir haben uns vielmehr wiederholt davon überzeugt, dass dieselben auch bei Benutzung breiterer und schmälerer Streifen im allgemeinen mit voller Deutlichkeit zu beobachten sind¹⁾. Allerdings darf als Regel gelten, dass die von uns gefundenen Nachbilder leichter zu beobachten sind, wenn (bei den von uns verwendeten Lichtintensitäten und Bewegungsgeschwindigkeiten) der Lichtspalt eine gewisse Breite (etwa 1 mm) nicht übersteigt. Wird er über 1 mm breit gemacht, so dass sein Netzhautbild breiter als 0,05 mm würde, so tritt leicht ein Zusammenfliessen der drei ersten Phasen des Nachbildverlaufes ein. Die Höhe unserer Spalte betrug in der Regel ungefähr 2 cm, diejenige des Netzhautbildes also ungefähr 1 mm. In vereinzelt Fällen, z. B. bei der Untersuchung des Reaktionsverlaufes in rein fovealem Gebiet und bei Feststellung des Einflusses der Spaltgrösse auf die Geschwindigkeit des Auftretens der Nachbilder in den verschiedenen Netzhautgebieten, bedienten wir uns niedrigerer Spalte, deren Höhe etwas weniger als 1 mm betrug. Die Höhe des Netzhautbildes blieb in diesen Fällen also unter 0,05 mm.

1) Vgl. hierzu beispielsweise Tabelle I auf S. 629. Es wurden jedoch auch viel grössere Variationen der Spaltbreite vorgenommen.

Durch Vorsetzen farbiger Gelatinefolien konnten wir dem durch den Spalt einfallenden Licht jede gewünschte Farbe geben. Homogene Lichter erzielten wir auf diese Weise zwar nicht; darauf kam es uns aber auch nicht an. Wir begnügten uns im allgemeinen damit, gut gesättigte Farben zu bekommen. Nur um die Herstellung eines guten spektralen Rots bemühten wir uns besonders und erhielten es durch Kombination eines gelblichen Rots und eines bläulichen Rots in genügender Reinheit. Im übrigen verfügten wir überschwach gelblichrote, orange, goldgelbe, schwach grünlichgelbe, grüne, blaue, violette und purpurne Gelatinefolien.

Als Fixationspunkte brachten wir an verschiedenen Stellen kleine weisse Marken an. Um möglichst verschiedene Netzhautpartien der Untersuchung zu unterwerfen, wechselten wir zwischen den in Fig. 3 in ihrer Lage zum Ausschnitt der Bude schematisch wiedergegebenen Fixationspunkten anfangs regelmässig ab. Da sich in der Reaktion der verschiedenen, hier in Betracht kommenden peripher gelegenen Netzhautpartien kein nennenswerter Unterschied nachweisen liess, so beschränkten wir uns in der Folge meist auf die Untersuchung bei Fixierung der Punkte *b* und *f*. In den Fällen *a* bis *d* waren die zu fixierenden Stellen durch kleine weisse Punkte markiert. Bei *e* bedienten wir uns einer kleinen Spiegelungsvorrichtung, die das Bild eines leuchtenden Punktes in die Ebene des Ausschnittes entwarf. Zur Untersuchung der in der Fovea centralis sich abspielenden Vorgänge setzten wir die Höhe des Querschnittes in der Beobachtungsfläche auf ca. $\frac{3}{4}$ cm herab und richteten das Auge auf die Mitte von vier kleinen, in einem Quadrat von $\frac{3}{4}$ cm Seitenlänge angeordneten Punkten von Leuchtfarbe, zwischen denen der niedere Reizspalt (von ca. 1 mm Höhe) von links nach rechts hindurchpassierte (Fall *f*).

Fast alle Beobachtungen wurden sowohl monokular wie binokular angestellt. Die so erhobenen Befunde stimmten immer vollständig miteinander überein. Der Abstand des Beobachters von der

Ebene, in der der Lichtspalt sich bewegte, betrug, wie schon erwähnt, im Mittel etwa 30 cm.

Um eine möglichst gleichmässige und gegebenenfalls leicht wiederherzustellende Geschwindigkeit der Bewegung unseres Reizlichtes zu erzielen, benutzten wir folgende maschinelle Einrichtung. Wie aus der schematischen Fig. 2 *a* u. *b* zu ersehen ist, war dicht vor der Kammer ein über zwei breite Holzrollen gehender, beiläufig 7,5 cm breiter, in sich zurücklaufender Gurt angebracht. Dieser wurde von einem Motor, der an der einen Rolle angriff, in Bewegung gesetzt. Durch einen fein abstufbaren Widerstand im Motorkreis war es uns möglich, innerhalb genügend weiter Grenzen ganz bestimmte Geschwindigkeiten des Ganges einzustellen. Auf den Gurt wurde der mit einem mässig schweren Sockel mit breiter Basis versehene schwarze „Deckschirm“, der den Lichtspalt trug, einfach aufgesetzt. Durch ein geringes Übergewicht nach vorn wurde er leicht mit ganzer Fläche an die Wand der Bude angedrückt und gab hier hinreichenden Lichtabschluss. Dabei war infolge seines Gewichtes und der Grösse der Berührungsfläche des Sockels mit dem groben Geflecht des Gurtes seine Reibung gegen diesen so gross, dass er unbedingt ohne jede Stockung von ihm mitgenommen wurde. An einer seitlich angebrachten Führung (langer Halm des Pfeifengrases), die der Beobachter während des Versuches sachte durch die Finger gleiten liess, konnte der Deckschirm, wenn der Lichtspalt den Querschnitt der Bude passiert hatte (unter Einschaltung einer beliebig langen Pause), ohne dass der Motor zum Stillstand gebracht werden musste, jedesmal rasch wieder zurückgezogen und der Versuch wiederholt werden.

Unsere Einrichtung bot uns weiterhin die Möglichkeit, die Geschwindigkeit zu bestimmen, mit der sich der Lichtspalt am Deckschirm fortbewegte. Denn seine Geschwindigkeit war uns in der Umdrehungsgeschwindigkeit des Gurtes unmittelbar gegeben. Diese konnten wir aber leicht bestimmen, indem wir die Umdrehungen einer der Rollen mittels eines Exzentrers durch Luftübertragung auf einer berussten Trommel zugleich mit den Marken einer Jacquet'schen Uhr aufschrieben. Eine Verschiebung des Gurtes gegen die Rollenoberfläche kam bei dem grossen gegenseitigen Reibungswiderstand und dem geringen sonstigen Widerstand niemals zur Beobachtung. Die von uns meist verwendeten Geschwindigkeiten der Bewegung des Lichtspaltes liegen zwischen 10 und 15 cm in

der Sekunde. Bei einem Abstand des Auges von durchschnittlich 30 cm ergibt sich daraus eine Wanderungsgeschwindigkeit des Bildes auf der Netzhaut von beiläufig 5—7 mm pro Sekunde. Die Belichtungsdauer jeder einzelnen Netzhautstelle belief sich demnach bei Verwendung eines leuchtenden Spaltes von 0,5 mm Breite auf 0,005 bis 0,0036 Sekunden.

Versuche und Ergebnisse.

I.

Wenn wir in der angegebenen Weise einen vom farblosen Tageslicht beleuchteten Spalt vor dem Auge vorüberführten, so sahen wir bei sehr langsamer Bewegung, fast unmittelbar an ihn anschliessend, aber doch deutlich von ihm abgesetzt, ein etwas minder helles zweites Spaltbild, dem nach einem längeren dunklen Intervall ein weiteres beträchtlich weniger helles positives Nachbild folgte. Bei Verwendung nicht zu geringer Intensitäten des Reizlichtes (also z. B. an sonnigen Tagen) schlossen sich daran noch einmal eine ziemlich lange dunkle Phase und ein helles (positives) Nachbild an, welches letzteres im Vergleich zu den früheren stark verbreitert erschien, aber sehr wenig hell war. Diesem folgte schliesslich wieder eine lange negative Phase, die als dunkle Bahn den von dem Reizlicht durchwanderten Weg bezeichnete. Wurde die Bewegung des Reizspaltes beschleunigt, so erschien uns die ganze Reihe von Erscheinungen, wie sie soeben beschrieben wurde, mehr auseinandergezogen. Dabei wurde zwischen dem primären Bilde des Lichtspaltes und dem ersten ihm folgenden hellen Nachbild ein deutliches dunkles Intervall sichtbar, das bei dem langsamen Gang nur eben angedeutet und deshalb nicht leicht als solches zu erkennen war. Bei Verwendung eines Spaltes von 0,5 mm Breite genügte uns eine Geschwindigkeit der Spaltbewegung von 5 oder 6 cm in der Sekunde vollauf, um die genannten beiden Spaltbilder deutlich durch ein dunkles Intervall voneinander getrennt wahrzunehmen.

Die gegenseitigen Abstände der ersten drei hellen Phasen (die Reizphase selbst mit eingerechnet) waren derart, dass das dunkle Intervall zwischen der ersten und der zweiten zu demjenigen zwischen der zweiten und der dritten sich an Grösse etwa verhielt wie 1:4. Das zweite dem primären Bilde nachlaufende Bild brauchte also, vom Reizmoment an gerechnet, bis zum deutlichen

Sichtbarwerden schätzungsweise fünfmal so viel Zeit wie das erste. Die Breite der ersten drei hellen Phasen war annähernd die gleiche. Sie erschienen meist am oberen und unteren Ende am hellsten. Die vierte helle Phase war, wie schon gesagt, immer viel breiter als die drei anderen, zeigte sich aber noch bedeutend weniger scharf begrenzt. Eine Schätzung der bis zu ihrem Auftreten vergehenden Zeit, wie wir sie vom zweiten und dritten positiven Nachbild gaben, war ihres späten Eintrittes wegen nicht recht möglich. Die zwischen die hellen Phasen ausgeschalteten dunklen Intervalle zeigten sich oben und unten von ihrer helleren Umgebung immer sehr scharf abgesetzt.

Für den Nachbildverlauf bei Verwendung eines bunten Reizlichtes fanden wir im allgemeinen dieselben zeitlichen Verhältnisse der einzelnen Nachbildphasen wie bei farblosem Licht. Von einigen Ausnahmen werden wir noch zu sprechen haben. Die Versuche wurden für Lichter sehr verschiedener Farbe systematisch durchgeführt. Besonders bei abgedunkelter Bude erschien der durch ein oder zwei Lagen gefärbter Gelatinefolie verdeckte Reizspalt, schon wenn er ruhig stand, recht gut gesättigt. Wurde er aber in der angegebenen Weise vor dem Ausschnitt der Bude vorbeibewegt, so erschien er noch bedeutend satter gefärbt.

Je nach der Farbe des Reizlichtes zeigten die hellen Nachbildphasen eine ganz charakteristische Färbung. An den dunklen Intervallen haben wir bei unserer Anordnung nie eine Andeutung von Färbung erkennen können. Das erste helle Nachbild, das von dem primären Bild des Lichtspaltes wieder durch ein deutlich wahrnehmbares dunkles Intervall getrennt war, war immer gleichfarbig mit dem primären Bild. Es war etwas weniger hell, aber dabei doch immer noch recht gesättigt, um so gesättigter, je gesättigter das Reizlicht erschien. Es blieb bei sehr herabgesetzter Intensität des letzteren ebenso deutlich sichtbar wie bei den höchsten Intensitätsgraden. In letzterem Falle wurde es nur viel heller als im ersteren. Manchmal, besonders wenn die Farbe des Reizlichtes sehr ungesättigt erschien, hatte es den Anschein, als wäre dieses erste positive Nachbild viel weisslicher als das primäre Bild. Diese letzte Erscheinung war bei den Lichtern kleiner Wellenlängen am ausgeprägtesten; die übrigen Beobachtungen gelten in vollem Umfang auch für die dem langwelligen Teile des Spektrums angehörenden Farben. Ausdrücklich sei betont, dass wir auch bei fast spektralreinem roten Reiz-

licht, und zwar auch bei sehr starker Herabsetzung der Lichtintensität, mit voller Deutlichkeit (durch ein dunkles Intervall von ihm getrennt) dieses erste positive Nachbild dem primären Bilde folgen sahen. Einigermassen auffallend ist es, dass uns bei gleicher Geschwindigkeit der Bewegung das erwähnte dunkle Intervall bei dem spektralroten, aber auch bei den anderen ausgesprochen ins Rote spielenden Reizlichtern (Purpur, schwach gelbliches Rot und Orange) meist ein wenig schmaler zu sein schien als bei den anderen Farben.

Auf das erste positive (gleichgefärbte) Nachbild folgte ein zweites tiefdunkles Intervall, ungefähr viermal so breit als das erste. Ihm folgte das zweite positive Nachbild mit folgender Färbung:

bei rötlichgelbem Reizlicht erschien es ungesättigt grünlichblau,
„ gelbem Reizlicht erschien es sehr ungesättigt bläulich,
„ grünem „ „ „ schwach violett,
„ blauem „ „ „ deutlich gelb,
„ violetter „ „ „ deutlich grünlichgelb.

Bei orange- und purpurfarbigem Reizlicht mussten wir, um diese Phase überhaupt sichtbar zu machen, die höchste uns zu Gebote stehende Lichtintensität verwenden (gespiegeltes Himmelslicht). Sie erschien uns sodann bei orangefarbenem Reizlicht sehr ungesättigt bläulich, fast farblos hell, und bei purpurnem Reizlicht (schwach grünlich) gelb. Für unser Spektralrot blieb auch bei dieser stärksten Beleuchtung das zweite positive Nachbild immer vollkommen aus. Es konnte weder zentral noch peripher jemals gesehen werden.

Den weiteren Phasen haben wir unsere Aufmerksamkeit nicht besonders zugewendet. Doch finden sich in unseren Protokollen wiederholt Angaben über das Vorhandensein eines langen dritten dunklen Intervalls, über die folgende verhältnismässig lange anhaltende Helligkeit, deren farbiger Charakter dem Reizlicht stets verwandt gefunden wurde, und schliesslich über eine langandauernde abschliessende dunkle Phase.

Die bisher geschilderten Beobachtungen beziehen sich alle auf Versuche, die mit etwa 2 cm hohen Reizspalten angestellt wurden, und haben ihre Gültigkeit für die unter *a* bis *e* angegebenen Bedingungen der Fixierung sowohl mit einem als mit beiden Augen. Eine weitere Versuchsreihe galt nun der Feststellung, ob die durch momentane Belichtung hervorgerufenen Nachbildphasen sich in der

Fovea centralis in ganz gleicher Weise darstellten, wie dies für die verschiedenen peripher gelegenen Gebiete der Netzhaut gefunden war.

Zu diesem Zwecke liessen wir vor dem jetzt verkleinerten Ausschnitt der Beobachtungsfläche, an dem die vier Fixationspunkte (*f*) angebracht waren, den ca. 1 mm hohen Lichtspalt vorbeigehen, dessen Netzhautbild in seiner grössten Dimension höchstensfalls $\frac{1}{20}$ mm betrug. Da für gute zentrale Fixierung gesorgt war, kann durchaus keine Rede davon sein, dass die so für die Fovea festgestellten Verhältnisse des Nachbildverlaufs durch gleichzeitige Reizung irgendwelcher extrafovealer Bezirke vorgetäuscht worden wären. Wir fanden, dass der Ablauf der Erregung an der Stelle des direkten Sehens unter den beschriebenen Bedingungen im wesentlichen ganz die für den längeren Spalt (also für mehr oder weniger indirektes Sehen) gefundenen Erscheinungen bot. Und zwar gilt dies sowohl für farbiges wie für farbloses Reizlicht. Das erste positive Nachbild war wieder unter allen Umständen sichtbar und erschien in der Farbe des Reizlichtes. Das zweite positive Nachbild war, genau wie im indirekten Sehen, nur bei Verwendung rein spektralroten Reizlichtes auch in der Fovea nicht zu konstatieren. Bei allen übrigen farbigen Lichtern war die positive gegenfarbige Phase immer deutlich nachweisbar. Ein foveales Aussetzen eines Nachbildes, das in der Netzhautperipherie zu sehen gewesen war, konnten wir nicht ein einziges Mal beobachten. Für den Ablauf der Erregung nach kurzdauernder Belichtung des Auges bestehen also in den fovealen und extrafovealen Bezirken der Netzhaut keine prinzipiellen Unterschiede. Nur bezüglich der Geschwindigkeit des ganzen Phasenverlaufs fielen uns bei zentraler und peripherer Beobachtung geringfügige Differenzen auf, und zwar in dem Sinne, dass die Erscheinungen im Netzhautzentrum jeweils etwas zurückblieben (vgl. dazu S. 637).

Wir unterliessen es auch nicht, gelegentlich Versuche über den Einfluss der Adaptation des Auges auf das beobachtete Phänomen anzustellen. Gewöhnlich arbeiteten wir bei guter Helladaptation, und die oben mitgeteilten Ergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf Versuche mit helladaptiertem Auge. Selbst wenn sich der Beobachter in der „geschlossenen“ Bude befand, in die, wie erwähnt, von unten her immer mehr oder weniger Licht eindrang, kann von einer erheblichen Änderung des Sehpurpurgeltes der Netzhaut, die

während des Versuches eingetreten wäre, nicht die Rede sein. Dazu war die Beobachtungszeit viel zu kurz.

Versuche, die mit zuvor gut für Dunkel adaptiertem Auge angestellt wurden, überzeugten uns nun davon, dass der Adaptationszustand des Auges keinen nennenswerten Einfluss auf den Ablauf der Erregung hatte. Weder nach längerer ($\frac{1}{2}$ stündiger) noch nach kürzerer ($\frac{1}{4}$ stündiger) Dunkeladaptation konnte eine Änderung der Zahl oder des hier wesentlichen Aussehens der früher konstatierten Phasen beobachtet werden. Es ist selbstverständlich, dass *ceteris paribus* dem dunkel adaptierten Auge schon das Bild des Reizspaltes wesentlich heller und meist auch weisslicher (also ungesättigter) erschien. Dementsprechend war auch das erste positive Nachbild heller und häufig weisslicher als bei helladaptiertem Auge. Einen wesentlichen Unterschied zwischen der Färbung des primären Bildes und des ersten positiven Nachbildes konnten wir nicht konstatieren. In vielen Fällen hatte das zweite positive Nachbild gegen früher im Vergleich mit dem primären Bilde deutlich an Helligkeit eingebüsst. Wir haben es jedoch nie ganz ausbleiben sehen. Mit so protrahierter Dunkeladaptation wie v. Kries¹⁾, der sein Auge 2 Stunden und mehr für Dunkel adaptierte, haben wir nie gearbeitet.

Aus dem bisher Gesagten durften wir zusammenfassend den Schluss ziehen, dass die Erregung der Netzhaut durch sehr kurzdauernde Belichtung wenigstens unter den bei unseren Versuchen erfüllten Bedingungen in noch zahlreicheren, abwechselnd hellen und dunklen Phasen abklinge, als bisher allgemein angenommen wurde. Denn wir konnten sowohl bei Verwendung farblosen wie farbigen Reizlichtes nicht nur sechs, sondern mit Sicherheit acht deutlich voneinander zu scheidende Nachbildphasen feststellen. In übersichtlicher Anordnung stellen sich die von uns beobachteten Erscheinungen folgendermassen dar:

1. das primäre Bild (Phase 1);
2. ein sehr kurzes dunkles Intervall (Phase 2);
3. ein erstes positives (also helles) Nachbild; bei Verwendung farbiger Reizlichter ausgesprochen gleichfarbig. Weniger hell als 1 (Phase 3).

1) v. Kries, Über die Wirkung kurzdauernder Lichtreize auf das Sehorgan. Zeitschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorgane Bd. 12 S. 81 ff. 1896.

E. Pflüger, Archiv für Physiologie. Bd. 126.

4. ein kurzes dunkles Intervall, jedoch länger als 2 (Phase 4)
5. ein zweites positives Nachbild, das bei farbigen Reizlichtern meist deutlich in der Gegenfarbe erscheint. Bedeutend weniger hell als 3 (Phase 5);
6. ein längeres dunkles Intervall (Phase 6);
7. ein drittes langdauerndes positives Nachbild; bei farbigen Lichtern ungesättigt gleichfarbig. Weniger hell als 5 (Phase 7);
8. ein lang anhaltender dunkler Streifen (Phase 8).

II.

Der zweite Teil unserer Untersuchung galt der Feststellung, an welcher Stelle wir die zwei neuen, von uns gefundenen Nachbildphasen in die Reihe der bisher bekannten Nachbilder einzuordnen hätten, d. h. welche beiden der von uns beobachteten acht Nachbildphasen eigentlich als die bisher noch nicht beschriebenen zu betrachten sind.

Aus den Angaben, die über die Färbung des von Hess als Phase 3 bezeichneten positiven Nachbildes in der Literatur zu finden sind, war es zwar als von vornherein höchst wahrscheinlich zu bezeichnen, dass diese früher sogenannte Phase 3 mit unserer Phase 5 zu identifizieren wäre. Für beide wurde bei Verwendung eines farbigen Reizlichtes meist eine zu diesem komplementäre Färbung gefunden. Auch scheint das vollständige Fehlen dieser beiden Bilder bei spektralrotem Reizlicht dafür zu sprechen, dass die fraglichen Phasen als das sogenannte Purkinje'sche Bild anzusehen sind. Für unser neues positives Nachbild würde sich daraus ergeben, dass es (unter Zwischenschaltung einer schmalen dunklen Phase) gleich hinter das primäre Bild zu setzen wäre.

Nun stimmen die Angaben der verschiedenen Forscher über die Färbung des Purkinje'schen Bildes aber doch keineswegs mit der für unsere Zwecke wünschenswerten Bestimmtheit miteinander überein [vgl. die Angaben von Hess¹⁾, v. Kries²⁾ und Mc Dougall³⁾]. Auch bezüglich des Fehlens des genannten Bildes bei Ver-

1) Hess, Graefe's Arch. Bd. 51 S. 225 ff. 1900.

2) v. Kries, Zeitschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorgane Bd. 12 S. 81 ff. 1896.

3) Mc Dougall, The sensations excited etc. Brit. Journ. of Psychol. vol. 1 p. 108.

wendung roten Reizlichtes herrscht nicht bei allen dieselbe Meinung (vgl. dazu S. 62). Wir hielten es daher im Interesse einer richtigen Deutung der von uns gefundenen neuen Nachbildphasen für unerlässlich, dass auch noch auf einem anderen Wege der Nachweis geführt würde, dass unsere Phase 3 mit der von Hess als Phase 3 bezeichneten nichts gemein hat.

Diesen Nachweis glauben wir durch die im folgenden mitgeteilten Messungen der bis zum deutlichen Sichtbarwerden unserer Phase 3 vom Moment der Belichtung an verstreichenden Zeit erbracht zu haben, welche Zeit wir weiterhin als die „Entwicklungszeit“ des ersten positiven Nachbildes bezeichnen wollen.

Unsere Versuchsanordnung gestattete uns eine derartige Zeitmessung in sehr einfacher Weise, wenn wir nach dem Vorgange von Hering¹⁾ an Stelle eines einzigen Reizspaltes an unserem „Deckschirm“ zwei parallel zueinander stehende Spalten anbrachten. Wie Hering in der schon mehrfach genannten Mitteilung ausführt, ist es bei einem gegebenen gegenseitigem Abstand der beiden Spalte sehr leicht möglich, eine Geschwindigkeit der Bewegung zu finden, bei der drei helle Spaltbilder in gleichem Abstände hintereinander herzulaufen scheinen, von denen die beiden ersten den primären Bildern der beiden Reizspalte entsprechen und das dritte, rein subjektive, das erste positive Nachbild des zweiten Spaltbildes darstellt. Das erste positive Nachbild des ersten Spaltbildes kommt, wenigstens unter der Voraussetzung, dass seine Entwicklungszeit der des ersten positiven Nachbildes des zweiten Spaltbildes gleich ist, in diesem Falle gar nicht zu gesonderter Entwicklung, da in dem Augenblicke, in dem es hervortreten würde, das primäre Bild des zweiten Lichtspaltes an derselben Stelle sichtbar wird. Wenn die drei Bilder durch gleiche Intervalle voneinander getrennt sind, so dürfen wir auf Grund des Gesagten also annehmen, dass das von uns als Phase 3 bezeichnete helle Nachbild zu seiner Entwicklung ebensoviel Zeit braucht, als der zweite objektive Lichtspalt an Zeit nötig hat, um beim Vorrücken des „Deckschirmes“ an die Stelle des ersten zu gelangen. Der absolute Wert der Entwicklungszeit des ersten positiven Nachbildes lässt sich dann bei gegebenem Abstand der beiden am „Deckschirm“ ausgeschnittenen Spaltöffnungen aus der für das Zustandekommen des Phänomens günstigsten Ge-

1) Hering, l. c.

schwindigkeit der Spaltbewegung für jeden Fall leicht berechnen.

Liessen wir nun in der auch bei den Einspaltversuchen von uns geübten Weise zwei Spalten am Auge vorübergehen, so beobachteten

Fig. 4. Schematische Darstellung der räumlichen Verteilung der „objektiv bedingten“ primären Bilder (o) und der „rein subjektiven“ ersten positiven Nachbilder (s) bei Reizung der Netzhaut mit zwei einander parallelen bewegten Lichtspalten. Auf das wirkliche Aussehen der einzelnen Bilder (nach Helligkeit, Breite und Art der Konturierung) ist in dieser Figur keine Rücksicht genommen. (Natürl. Grösse.)

wir zunächst bei sehr langsamer Bewegung der Spalte, wie dicht neben jedem der primären Spaltbilder (jedesmal durch ein schmales

dunkles Intervall von ihm getrennt) das erste positive Nachbild erschien (Fig. 4, *I*). Wir sahen also zunächst vier Spaltbilder, die in zwei Gruppen zu je zweien angeordnet hintereinander herliefen. Die späteren Nachbildphasen, die ja viel lichtschwächer sind, traten bei diesen Versuchen mehr oder weniger in den Hintergrund. Jedenfalls störten sie unsere Beobachtungen nie im geringsten. Wir liessen sie im folgenden gänzlich unberücksichtigt.

Beschleunigten wir nun die Bewegung des „Deckschirmes“ allmählich, so glichen sich die gegenseitigen Abstände der vier Spaltbilder zunächst aus (Fig. 4, *II*), um bei noch weiterer Beschleunigung in die Anordnung der Fig. 4, *III* überzugehen. Nun war es durch noch weitere Steigerung der Geschwindigkeit in jedem Falle leicht dahin zu bringen, dass die beiden inneren Spaltbilder miteinander zur Deckung kamen, dass also nur drei durch gleiche Intervalle voneinander getrennte Spaltbilder gesehen wurden (Fig. 4, *IV*).

Wer das Zustandekommen dieses Dreispaltenbildes in der soeben beschriebenen Weise (durch allmähliche Steigerung der zunächst zu klein gewählten Geschwindigkeit) einmal gesehen hat, kann nicht daran zweifeln, dass dasselbe in der Tat auf die oben von uns postulierte Art entsteht, d. h. dass wir mit dieser Methode tatsächlich den zeitlichen Eintritt unseres ersten positiven Nachbildes massen und nicht etwa den des nächstfolgenden (Purkinje'schen). Versuche mit farbigem Reizlicht liessen uns hierüber vollends keinen Zweifel bestehen, da die Färbung des dritten Spaltbildes dem Reizlicht stets gleich gefunden wurde und es ausserdem auf die soeben beschriebene Art jederzeit leicht zu demonstrieren ist, dass es nur das gleichgefärbte erste positive Nachbild des ersten Reizspaltes sein kann, mit dessen Eintrittszeit bei der endgültigen Einstellung der Geschwindigkeit das Erscheinen des primären Bildes des zweiten Reizspaltes zusammenfällt.

Als auffallend darf gelten, dass wir an den drei Spaltbildern in der Regel keine deutliche Helligkeitsdifferenz wahrnehmen konnten. Wenn gelegentlich einmal Unterschiede in der Helligkeit zur Beobachtung kamen, so waren sie derart, dass manchmal das erste der drei Bilder am hellsten erschien, ebenso oft jedoch auch das dritte, von dem vielleicht zu erwarten gewesen wäre, dass es als das einzige rein subjektive am wenigsten hell erschiene. Das zweite Bild trat für uns niemals als das hellste hervor. Auf die merk-

würdige Tatsache, dass das positive Nachbild, das bei Verwendung von zwei Reizspalten als drittes Bild des „Dreispaltenbildes“ auftritt, in diesem Fall so besonders deutlich hervortritt, hat Hering bereits aufmerksam gemacht.

Es muss gleich hier darauf hingewiesen werden, dass das Phänomen der drei mit gleichen! Abständen hintereinander herlaufenden Lichtbilder natürlich nicht nur bei einer einzigen, in ihrer Grösse streng begrenzten Geschwindigkeit der Spaltbewegung auftrat, und dass nicht bei jeder geringfügigen Änderung der einmal als günstig erkannten Geschwindigkeit wieder vier Spaltbilder auftraten. Sobald das erste positive Nachbild des ersten Spaltbildes auch nur in unmittelbare Nähe des primären Bildes des zweiten Spaltes zu liegen kam, schien vielmehr infolge einer gegenseitigen Beeinflussung der einzelnen Netzhautteile, d. h. durch Kontrastwirkung, das erste subjektive Bild ganz zum Verschwinden gebracht werden zu können. Anders sind wenigstens unseres Ermessens die Fälle nicht zu erklären, in denen wohl nur drei Bilder zu sehen waren, die aber nicht gleichen Abstand voneinander hatten, sondern entweder in der auf Fig. 4, *v* oder auf Fig. 4, *vi* schematisch wiedergegebenen Weise angeordnet waren. Wir haben nach dieser Überlegung gehandelt, wenn wir bei unseren Versuchen annahmen, der erstere Fall entspräche einer zu raschen, der letztere einer zu langsamen Bewegung der objektiven Lichtspalte.

Auch wenn wir nur die Fälle in Betracht ziehen, bei denen uns die drei Spaltbilder wirklich gleichweit voneinander entfernt zu liegen schienen, so stimmten die von uns gefundenen Geschwindigkeiten der Spaltbewegung nicht ganz streng miteinander überein, auch wenn die dem Vergleich unterworfenen Versuche möglichst rasch nacheinander angestellt wurden, so dass die Beleuchtungsverhältnisse sich von Versuch zu Versuch kaum geändert haben dürften. Die Methode schliesst eben eine gewisse, wenn auch sehr unwesentliche Fehlerbreite in sich, über die wir trotz der grossen Übung im Beobachten, die wir mit der Zeit erlangten, niemals ganz hinwegkamen. Wenn man bedenkt, dass es sich hier um recht flüchtige Erscheinungen handelt, so ist dies weiter nicht verwunderlich.

Bei unseren Versuchen haben wir in vielen Fällen, um die grösste mögliche Schwankungsbreite zu ermitteln, die durch die Methode bedingt sein konnte, unter denselben äusseren Bedingungen rasch hintereinander den schnellsten und den langsamsten Gang der

Spaltbewegung eingestellt, bei denen wir die drei Bilder noch deutlich durch gleiche Intervalle voneinander getrennt zu sehen glaubten. Man vergleiche hierzu z. B. die Werte 14 und 15, 16 und 17, 23 und 25, 27 und 28, 29 und 31 der Tabelle III. Der grösste Spielraum, der auf diese Weise, allerdings bei möglichster Forcierung nach beiden Seiten, als durch die Methode bedingt ermittelt werden konnte, betrug danach ca. $\frac{1}{100}$ Sekunde. Für die Beurteilung des Wertes unserer ganzen Untersuchung ist aber zu bemerken, dass sich der durch die Methode bedingte Fehler bei den eigentlichen Versuchen, bei denen wir uns immer bemühten, eine gute mittlere Geschwindigkeit einzustellen, sicher bei weitem nie so hoch belaufen hat. Zum mindesten erwies sich, wie aus den später angeführten Versuchstabellen hervorgeht, unsere Methode als fein genug, um uns aus den mit ihr gewonnenen Ergebnissen den sicheren Schluss zu gestatten, dass unser erstes positives Nachbild mit dem bisher als solches bezeichneten (Purkinje'schen) nicht identifiziert werden darf.

Tabelle I.

Nicht sehr heller Tag. Bude halb geschlossen. Fixationsmarke *b*. Spalthöhe = 20 mm.

Laufende Nummer	Beobachter	Entwicklungszeit des I. pos. Nachbildes in Sekunden	Bemerkungen
1	Dittler	0,0387	$b = 1,0 \text{ mm}, d = 7,0 \text{ mm}$
2	"	0,0373	" "
3	"	0,0392	" "
4	"	0,0396	$b = 0,5 \text{ mm}, d = 7,0 \text{ mm}$
5	"	0,0449	" "
6	"	0,0369	" "
7	"	0,0384	" "
8	"	0,0393	" "
9	"	0,0412	" "
10	Eisenmeier	0,0426	" "
11	"	0,0426	" "
12	Dittler	0,0377	" $d = 4,0 \text{ mm}$
13	"	0,0402	" "
14	"	0,0349	" "
15	"	0,0364	" "
16	Eisenmeier	0,0378	" "

Wir prüften die Leistungsfähigkeit unserer Methode des weiteren auch in der Weise, dass wir die Breite (*b*) der im „Deckschirm“ angebrachten Spalte sowie ihren gegenseitigen Abstand (*d*) in mässigen Grenzen variierten. Die bei solchen Versuchen gefundenen Zeit-

werte sind in der Tabelle I¹⁾ zusammengestellt. Die einzelnen Werte stimmten zwar nicht ganz streng miteinander überein; aus den angeführten Beispielen tritt jedoch eben merklich hervor, dass die Hauptschwankungen, die die Werte zeigen, in dem Sinne erfolgen, dass mit wachsender Belichtungsdauer (d. h. bei Verkleinerung des Abstandes der in ihrer Breite unveränderten Spalte oder bei Verbreiterung der Spalte unter Beibehaltung ihres früheren Abstandes) die Reaktionen im Sehorgan beschleunigt werden. So beträgt das Mittel aus den Werten 4 bis 11 0,0407 Sek., das aus den Werten 12 bis 16 berechnete 0,0374 Sek. In analoger Weise hält sich auch das Mittel aus den Werten 1 bis 3 mit 0,0384 unter dem aus den Werten 4 bis 11 berechneten. Gleichzeitig sind die Werte 4 bis 11 offenbar infolge der Verkürzung der Belichtungsdauer durchgehends etwas höher als die bei einem Spaltabstand von 5 mm unter mittleren Beleuchtungsbedingungen gewonnenen (vgl. dazu Tabelle III auf Seite 632).

In einer anderen Reihe von Kontrollversuchen machten wir den Abstand zwischen den beiden Spalten, deren Höhe 20 mm und deren Breite 0,5 mm betrug, 10 mm gross und suchten die Geschwindigkeit der Spaltbewegung so einzustellen, dass wir vier Spaltbilder in eben gleichem gegenseitigen Abstand sahen. Es wechselten in diesem Fall (vgl. dazu die schematische Fig. 4, VII) dann immer eine hellere Phase 1 mit einer etwas weniger hellen Phase 3 ab. Die Werte, die wir auf diese Weise erhielten, finden sich in der Tabelle II. Sie stimmen sowohl mit den sonst gefundenen als auch untereinander sehr gut überein.

In wieder anderen Fällen liessen wir drei Spalten vor dem Auge vorbeigehen, die die auf der Fig. 4, VIII wiedergegebene Anordnung zeigten. Die Geschwindigkeit wurde so eingestellt, dass der dritte Streifen unseres Dreispaltbildes eben in die Verlängerung des höher stehenden dritten objektiven Lichtspaltes fiel. War dies der Fall, so schienen uns auch die drei Bilder des „Dreispaltbildes“ streng den gleichen Abstand untereinander zu haben. Nur empfahl

1) In dieser und den folgenden Tabellen geben wir die Werte für die Entwicklungszeit des ersten positiven Nachbildes, so wie wir sie bei der Rechnung erhielten, mit vier Dezimalen wieder. Wir sind uns dabei wohl bewusst, dass den beiden letzten Dezimalstellen bei der durch die Methode bedingten Fehlerbreite keine weitere Bedeutung zukommt.

Über das erste positive Nachbild nach kurz dauern

es sich bei diesen Versuchen, um Störungen zu vermeiden, die Lichtstärke des dritten, höher stehenden objektiven Lichtspaltes durch Vorsetzen einiger Lagen Pauspapier derjenigen des subjektiven dritten Streifens des Dreispaltenbildes möglichst anzupassen. Auch auf diese Weise erhielten wir für die Entwicklungszeit des ersten positiven Nachbildes Werte zwischen 0,03 und 0,04 Sekunden.

Tabelle II.

Versuche vom 12. Juni 1908. Sonniger Tag. Bude halb geschlossen. Fixierung a bis d . $h = 20$ mm, $b = 0,5$ mm, $d = 10$ mm.

Laufende Nummer	Beobachter	Entwicklungszeit d. I. pos. Nachbildes in Sekunden
1	Dittler	0,0342
2	"	0,0346
3	"	0,0375
4	Eisenmeier	0,0316
5	"	0,0309
6	"	0,0316

Die eigentliche Reihe von Versuchen, auf die sich die wesentlichsten Schlussfolgerungen gründen, die wir aus dem zweiten Teil unserer Untersuchung ziehen können, finden sich in der grossen Tabelle III, nach dem Datum und der jeweiligen Versuchsperson geordnet, zusammengestellt. Ausser dem für die Entwicklungszeit des ersten positiven Nachbildes durch Rechnung ermittelten Wert ist in einer besonderen Rubrik jedesmal ein kurzer Vermerk über die äusseren Versuchsbedingungen, sowie gegebenenfalls eine sonstige kurze Notiz mit eingeführt, die für die Beurteilung des betreffenden Versuchs von Bedeutung ist. Die Versuche wurden ohne Ausnahme mit Reizspalten von 20 mm Höhe, 0,5 mm Breite und einem gegenseitigen Abstand von 5 mm angestellt. Die gegebenen Werte haben für die Fixationsbedingungen a bis e ihre Gültigkeit, und zwar sowohl bei Beobachtung mit einem wie mit beiden Augen. Der Beobachter war für jeden Versuch durch längeren Aufenthalt im Beobachtungszimmer gut für hell adaptiert. Wo nichts Besonderes gesagt ist, wurde als Lichtquelle das von dem weissen Papierschirm auf den Spalt zurückgeworfene farblose Tageslicht benutzt.

Tabelle III.

Reizlicht farblos. Spalte: $h = 20$ mm, $b = 0,5$ mm, $d = 5,0$ mm.
 Fixationspunkte a bis e . Mon- und binokular. Gute Helladaptation.

Laufende Nummer	Be- obach- ter	Datum	Ent- wicklungszeit des I. pos. Nachbildes in Sekunden	Bemerkungen
1	D.	12. April	0,0344	
2	D.	12. "	0,0298	
3	D.	12. "	0,0368	
4	D.	21. "	0,0318	
5	D.	21. "	0,0364	
6	D.	21. "	0,0314	
7	D.	21. "	0,0355	
8	D.	22. "	0,0317	
9	D.	22. "	0,0341	
10	D.	22. "	0,0329	
11	D.	24. "	0,0314	Bude geschlossen
12	D.	24. "	0,0336	Bude geschlossen
13	D.	24. "	0,0332	Bude offen
14	D.	28. "	0,0368	Sonniger Tag, Bude offen, langsamster Gang
15	D.	28. "	0,0329	Sonniger Tag, Bude offen, schnellster Gang
16	D.	28. "	0,0415	Sonniger Tag, Bude offen, langsamster Gang
17	D.	28. "	0,0313	Sonniger Tag, Bude offen, schnellster Gang
18	D.	28. "	0,0383	Sonniger Tag, Bude offen, mittlere Geschwindigkeit
19	D.	28. "	0,0368	Sonniger Tag, Bude offen
20	D.	28. "	0,0360	Sonniger Tag, Bude offen
21	D.	28. "	0,0313	Sonniger Tag, Bude offen
22	D.	28. "	0,0352	Sonniger Tag, Bude offen
23	D.	29. "	0,0407	Trüber Tag, Bude offen, langsamster Gang
24	D.	29. "	0,0368	Trüber Tag, Bude offen, mittlere Geschwindigkeit
25	D.	29. "	0,0313	Trüber Tag, Bude offen, schnellster Gang
26	D.	29. "	0,0329	Trüber Tag, Bude offen
27	D.	29. "	0,0368	Trüber Tag, Bude offen, langsamster Gang
28	D.	29. "	0,0306	Trüber Tag, Bude offen, schnellster Gang
29	D.	30. "	0,0502	Sehr trüber Tag, Bude halb offen, langsamster Gang
30	D.	30. "	0,0455	Sehr trüber Tag, Bude halb offen, mittlere Geschwindigkeit
31	D.	30. "	0,0422	Sehr trüber Tag, Bude halb offen, schnellster Gang
32	D.	30. "	0,0376	Sehr trüber Tag, Bude halb offen, Schirm durch Spiegel ersetzt
33	D.	30. "	0,0407	Sehr trüber Tag, Bude ganz offen
34	D.	30. "	0,0439	Sehr trüber Tag, Bude ganz offen
35	D.	4. Mai	0,0368	Sonniger Tag, Bude offen, mittlere Geschwindigkeit
36	D.	4. "	0,0321	Sonniger Tag, Bude offen, schnellster Gang
37	D.	4. "	0,0375	Sonniger Tag, Bude offen, mittlere Geschwindigkeit
38	D.	4. "	0,0329	Sonniger Tag, Bude offen, „vielleicht etwas zu rasch“
39	D.	4. "	0,0360	Trüber Himmel, Bude geschlossen
40	D.	4. "	0,0418	Trüber Himmel, Bude geschlossen, „etwas langsam“
41	D.	4. "	0,0345	Trüber Himmel, Bude geschlossen, „etwas schnell“
42	D.	4. "	0,0368	Trüber Himmel, Bude geschlossen, mittlere Geschwindigkeit
43	D.	4. "	0,0375	Trüber Himmel, Bude geschlossen, mittlere Geschwindigkeit
44	D.	4. "	0,0407	Trüber Himmel, Bude geschlossen, „etwas langsam“
45	D.	19. "	0,0314	Bedeckter Himmel, Bude geschlossen
46	D.	19. "	0,0392	Bedeckter Himmel, Bude offen
47	D.	21. "	0,0309	Leicht bewölkter Himmel, Bude offen
48	D.	21. "	0,0326	Leicht bewölkter Himmel, Bude geschlossen

Laufende Nummer	Beobachter	Datum	Entwicklungszeit des I. pos. Nachbildes in Sekunden	Bemerkungen
49	D.	21. Mai	0,0328	Leicht bewölkter Himmel, Bude offen
50	D.	22. "	0,0347	Klarer Himmel, Rolladen unten, Bude offen
51	D.	22. "	0,0329	Klarer Himmel, Rolladen unten, Bude offen
52	D.	23. "	0,0440	Ganz trüber Tag, Bude halb offen
53	D.	23. "	0,0405	Ganz trüber Tag, Bude halb offen
54	D.	25. "	0,0439	Ganz trüber Tag, Bude halb offen
55	D.	25. "	0,0408	Licht etwas besser, Bude halb offen
56	D.	25. "	0,0371	Es wird bedeutend heller, Bude halb offen
57	D.	1. Juni	0,0395	Sonniger Tag, Bude geschlossen, langsamster Gang
58	D.	1. "	0,0361	Sonniger Tag, Bude geschlossen, „zu schnell“
59	D.	1. "	0,0373	Sonniger Tag, Bude geschlossen, mittl. Geschwindigkeit
60	D.	1. "	0,0378	Sonniger Tag, Bude geschlossen, „zu langsam“
61	D.	1. "	0,0388	Leicht bewölkter Himmel, Bude geschlossen
62	D.	13. "	0,0373	Bewölkter Himmel, aber Sonnenschein
63	D.	19. "	0,0396	Sonniger Tag, leicht bewölkt, Bude geschlossen
64	D.	19. "	0,0376	Sonniger Tag, leicht bewölkt, Bude geschlossen
65	D.	19. "	0,0416	Sonniger Tag, leicht bewölkt, Bude geschlossen
66	D.	19. "	0,0345	Sonniger Tag, leicht bewölkt, Bude geschlossen
67	E.	19. Mai	0,0314	Bedeckter Himmel, Bude geschlossen
68	E.	19. "	0,0321	Bedeckter Himmel, Bude offen
69	E.	21. "	0,0335	Leicht bewölkter Himmel, Bude halb offen
70	E.	21. "	0,0324	Leicht bewölkter Himmel, Bude geschlossen
71	E.	22. "	0,0394	Klarer Himmel, Rolladen unten, Bude offen
72	E.	22. "	0,0401	Klarer Himmel, Rolladen unten, Bude offen
73	E.	23. "	0,0420	Ganz trüber Tag, Bude halb offen
74	E.	23. "	0,0355	Ganz trüber Tag, Bude halb offen, „zu schnell“
75	E.	25. "	0,0470	Ganz trüber Tag, Bude halb offen
76	E.	25. "	0,0371	Es wird bedeutend heller, Bude halb offen
77	E.	26. "	0,0352	Trüber Tag, Bude offen, mittlere Geschwindigkeit
78	E.	26. "	0,0420	Trüber Tag, Bude offen, langsamster Gang
79	E.	27. "	0,0392	Sonniger Tag, Rolladen unten, Bude offen
80	E.	1. Juni	0,0313	Sonniger Tag, Bude geschlossen, „etwas zu schnell“
81	E.	1. "	0,0411	Sonniger Tag, Bude geschlossen, mittl. Geschwindigkeit
82	E.	1. "	0,0375	Sonniger Tag, Bude geschlossen, mittl. Geschwindigkeit
83	E.	1. "	0,0454	Bewölkter Himmel, Bude geschlossen
84	E.	1. "	0,0429	Bewölkter Himmel, Bude geschlossen
85	E.	1. "	0,0439	Bewölkter Himmel, Bude geschlossen
86	E.	13. "	0,0311	Bewölkter Himmel, aber Sonnenschein, Bude offen
87	E.	19. "	0,0404	Sonniger Tag, leicht bewölkt, Bude geschlossen
88	E.	19. "	0,0375	Sonniger Tag, leicht bewölkt, Bude geschlossen
89	E.	19. "	0,0333	Sonniger Tag, Bude halb offen
90	E.	19. "	0,0347	Sonniger Tag, Bude halb offen
91	E.	19. "	0,0332	Sonniger Tag, Bude halb offen
92	E.	19. "	0,0327	Sonniger Tag, Bude halb offen
93	E.	19. "	0,0329	Sonniger Tag, Bude halb offen
94	E.	19. "	0,0375	Sonniger Tag, Bude halb offen
95	E.	19. "	0,0329	Sonniger Tag, Bude halb offen
96	E.	19. "	0,0329	Sonniger Tag, Bude halb offen
97	E.	19. "	0,0329	Sonniger Tag, Bude halb offen
98	E.	22. "	0,0424	Bewölkter Himmel, Bude geschlossen
99	E.	22. "	0,0393	Bewölkter Himmel, Bude geschlossen
100	E.	22. "	0,0407	Bewölkter Himmel, Bude geschlossen
101	E.	24. "	0,0363	Sonniger Tag, leicht bewölkt, Bude halb offen
102	E.	24. "	0,0356	Sonniger Tag, leicht bewölkt, Bude halb offen
103	E.	24. "	0,0322	Sonniger Tag, leicht bewölkt, Bude halb offen

Laufende Nummer	Beobachter	Datum	Entwicklungszeit des 1. pos. Nachbildes in Sekunden	Bemerkungen
104	E.	24. Juni	0,0352	Sonniger Tag, leicht bewölkt, Bude halb offen
105	E.	24. "	0,0354	Sonniger Tag, leicht bewölkt, Bude halb offen
106	E.	24. "	0,0308	Sonniger Tag, leicht bewölkt, Bude halb offen
107	E.	24. "	0,0334	Sonniger Tag, leicht bewölkt, Bude halb offen
108	E.	24. "	0,0347	Sonniger Tag, leicht bewölkt, Bude halb offen
109	E.	24. "	0,0346	Sonniger Tag, leicht bewölkt, Bude halb offen
110	E.	24. "	0,0323	Sonniger Tag, leicht bewölkt, Bude halb offen
111	E.	24. "	0,0340	Sonniger Tag, leicht bewölkt, Bude halb offen
112	v. B.	28. April	0,0313	Sonniger Tag, Bude offen, „zu schnell“
113	v. B.	28. "	0,0368	Sonniger Tag, Bude offen, „zu langsam“
114	v. B.	28. "	0,0329	Sonniger Tag, Bude offen, „mittlere Geschwindigkeit“
115	v. B.	4. Mai	0,0313	Sonniger Tag, Bude offen, „zu schnell“
116	v. B.	4. "	0,0368	Sonniger Tag, Bude offen, „vielleicht etwas langsam“

Die durchschnittliche Entwicklungszeit des ersten positiven Nachbildes beläuft sich also für die für unsere Beobachtungen bestehenden äusseren Bedingungen auf 0,035—0,040 Sekunden.

Die in der Tabelle gegebenen Werte zeigen nun aber im ganzen eine Schwankungsbreite, wie sie nach dem, was oben über die Grösse des durch die Methode bedingten Fehlers gesagt wurde, durch diesen nicht zu erklären ist. Denn in den Fällen, bei denen nicht „langsamster“ oder „schnellster Gang“ oder etwas Ähnliches ausdrücklich vermerkt ist, waren wir bestrebt, eine für das Zustandekommen unseres Phänomens günstige mittlere Geschwindigkeit einzustellen.

Für die Erklärung der grösseren Schwankungen kommen zweifellos gewisse Verschiedenheiten der äusseren Bedingungen, unter denen die einzelnen Versuche angestellt wurden, als ausschlaggebend in Betracht. Die bei jedem Versuche über die Beleuchtungsverhältnisse gemachten Vermerke weisen unmittelbar auf einen solchen Zusammenhang hin. Die Werte 1—22, 35—38, 47—51, 57—60, 63—66, 69—72, 79—82, 87—97, 101—116 sind bei guter Beleuchtung an klaren sonnigen Tagen gewonnen worden, die übrigen Werte dagegen an trüben und sehr trüben Tagen, also bei schlechter Beleuchtung. So erhielt Dittler die Werte 29—34 an einem ausserordentlich trüben Tage, als der Himmel von schweren Gewitterwolken umzogen war. Die Werte 54, 55, 56 sind am selben Tage nacheinander gewonnen worden unter folgenden äusseren Umständen: 54: „ganz trübe“, 55: „Licht etwas besser“, 56: „es wird bedeutend

heller“. Man vergleiche in diesem Zusammenhange auch die Werte 75 und 76. Einzelne Male wurde an sonnigen Tagen das Licht auch durch die Jalousien abgeblendet. Solchen Fällen entsprechen die Werte 50, 51, 79. Umgekehrt erhielten wir den Wert 32 (zu vergleichen mit 29, 30, 31, 33, 34), als wir die Intensität des Reizlichtes einmal dadurch steigerten, dass wir den weissen Papierschirm durch einen Spiegel ersetzten. Auch der Umstand, ob die Bude ganz offen, halb verdeckt oder ganz verhängt war, übte einen deutlichen Einfluss auf die Werte aus in dem Sinne, dass unter sonst gleichen Bedingungen bei geschlossener Bude die Werte fielen, bei offener Bude stiegen.

Schon aus den in der Tabelle III zusammengestellten Versuchen scheint sich also zu ergeben, dass die Helligkeit des Reizlichtes, mochte sie nun objektiv oder subjektiv begründet sein, einen wesentlichen Einfluss auf den zeitlichen Ablauf des Erregungsvorganges hat.

Tabelle IV a.

Bude geschlossen. Spalte wie bei Tab. III. Fixationsmarke *b*. Beobachtung mon- und binokular. Helladaptation.

Laufende Nummer	Beobachter	Datum	Entwicklungszeit des I. posit. Nachbildes in Sekunden	Bemerkungen
1	D.	1. Juni	1,0388	Ohne Pauspapier
2	E.	1. "	0,0454	" "
3	D.	1. "	0,0439	" "
4	E.	1. "	0,0429	" "
5	D.	1. "	0,0595	Mit 3 Lagen Pauspapier
6	E.	1. "	0,0530	" 3 " "
7	D.	1. "	0,0536	" 3 " "
8	E.	1. "	0,0492	" 3 " "
9	E.	19. Juni	0,0323	Ohne Pauspapier
10	E.	19. "	0,0333	" "
11	E.	19. "	0,0347	" "
12	E.	19. "	0,0332	" "
13	E.	19. "	0,0327	" "
14	E.	19. "	0,0329	" "
15	E.	19. "	0,0329	" "
16	E.	19. "	0,0438	mit 2 Lagen Pauspapier
17	E.	19. "	0,0425	" 2 " "
18	E.	19. "	0,0412	" 2 " "
19	E.	19. "	0,0369	" 2 " "
20	E.	19. "	0,0365	" 2 " "

Sonniger
Tag, leicht
bewölkter
Himmel

Sonniger
Tag, leicht
bewölkter
Himmel

Tabelle IV b.

Versuchsbedingungen wie bei IV a.

Laufende Nummer	Beobachter	Datum	Entwicklungszeit des I. posit. Nachbildes in Sekunden	Bemerkungen
1	D.	1. Juni	0,0378	Hochgezogene Jalousien, kein Pauspapier
2	E.	1. "	0,0375	
3	D.	1. "	0,0572	Beide Jalousien unten, 3 Lagen Pauspapier
4	E.	1. "	0,0567	" " " 3 " "

Tabelle IV c.

Versuchsbedingungen wie bei IV a.

Laufende Nummer	Beobachter	Datum	Entwicklungszeit des I. posit. Nachbildes in Sekunden	Bemerkungen
1	D.	19. Juni	0,0396	Weisser Schirm
2	D.	19. "	0,0376	" "
3	D.	19. "	0,0416	" "
4	E.	19. "	0,0404	" "
5	E.	19. "	0,0375	" "
6	D.	19. "	0,0345	" "
7	D.	19. "	0,0611	Grauer Schirm
8	D.	19. "	0,0537	" "
9	E.	19. "	0,0643	" "
10	D.	19. "	0,0553	" "
11	E.	19. "	0,0558	" "
12	D.	19. "	0,0537	" "

Zu demselben Resultat führten uns Versuche, die eigens unter diesem Gesichtspunkt angestellt wurden. Wir variierten die Lichtstärke der Reizspalten dabei bald in der Weise, dass wir eine oder mehrere Lagen von Pauspapier dicht vor die Spalten setzten (Tab. IV a), bald indem wir die Lichtstärke der reflektierenden Papierfläche änderten, bald indem wir beide Methoden kombinierten (Tab. IV b). Auch durch mehr oder weniger weit geführte Abdunklung der Bude erzielten wir ähnliche Wirkungen. Bei den Versuchen der Tabelle IV c wurde der reflektierende weisse Papierschirm mit einem ziemlich dunklen, grauen vertauscht. Die Wirkung der Intensitätsherabsetzung äusserte sich, wie aus den Tabellen zu ersehen ist, in allen Fällen in einer deutlichen Verzögerung der im Auge ablaufenden Reaktionen.

Ein ganz ähnlicher Einfluss liess sich von der Reduktion der Höhe der Lichtspalte nachweisen. Wenn wir an Stelle unserer Spalte von 20 mm Höhe unter Beibehaltung unseres Fixationspunktes (*a* bis *d*) ganz niedere Lichtspalte [ca. 1 mm hoch¹⁾], wie wir sie auch zur Untersuchung der Vorgänge in der Fovea centralis verwendeten (siehe S. 622), am Auge vorbeigehen liessen, so stiegen die Werte für die Entwicklungszeit des ersten positiven Nachbildes bei Beobachtung im indirekten Sehen unter sonst gleichen Bedingungen wie früher auf 45–50 σ an (Tab. V).

Tabelle V.

Bude geschlossen. Spalte: $h = 1$ mm, $b = 0,5$ mm, $d = 5$ mm. Fixationspunkte *b* und *f*. Beobachtung monokular. Helladaptation.

Laufende Nummer	Beobachter	Datum	Entwicklungszeit des 1. posit. Nachbildes in Sekunden	Bemerkungen	
1	D.	18. Juni	0,0702	Foveal	} Sonziger Tag
2	D.	18. "	0,0784	"	
3	D.	18. "	0,0683	"	
4	D.	18. "	0,0475	Extrafoveal	
5	D.	18. "	0,0459	"	
6	D.	18. "	0,0528	"	} Sonziger Tag, Himmel leicht bewölkt
7	E.	24. Juni	0,0650	Foveal	
8	E.	24. "	0,0705	"	
9	E.	24. "	0,0658	"	
10	E.	24. "	0,0435	Extrafoveal	
11	E.	24. "	0,0443	"	
12	E.	24. "	0,0456	"	

Noch ungleich höher wurden die entsprechenden Zeitwerte, wenn wir dieselben niederen Lichtspalte durch die Stelle des direkten Sehens wandern liessen. In der Fovea centralis laufen die von uns beobachteten Prozesse durchgehends beträchtlich langsamer ab als in extrafovealen Bezirken der Netzhaut. Diese Tatsache ist ja auch aus den Arbeiten von Hess schon hinlänglich bekannt. In der Tabelle V, auf die wir oben schon verwiesen, führen wir eine Reihe vergleichender Versuche an, die die verschiedene Reaktionsgeschwindigkeit zentraler und peripherer

1) Die Reduktion nahmen wir in der Weise vor, dass wir die hohen Spalte von oben und unten her verkürzten. Die niedrigen Spalte entsprachen ihrer Lage nach also den mittelsten Teilen der hohen Spalte.

Netzhautteile deutlich hervortreten lassen. Zugleich geht aus ihr, wie gesagt, die Verzögerung des Reaktionsverlaufs, wie er für extrafoveale Netzhautgebiete durch Verkleinerung der Reizspalte bedingt wurde, mit Deutlichkeit hervor, zumal wenn man bedenkt, dass die Versuche an hellen, sonnigen Tagen angestellt wurden.

Über die Ergebnisse unserer Versuche mit farbigem Reizlicht ist nach dem bisher Ausgeführten kaum mehr etwas prinzipiell Wichtiges nachzutragen. Die Erscheinung des Dreispaltbildes war in jeder Beziehung hierbei ebenso eindringlich wie bei farblosem Reizlichte. Die drei Spaltbilder erschienen uns, wie wir es ganz ähnlich bei den Einzelversuchen mit farbigem Reizlicht beobachtet hatten, gewöhnlich wieder wesentlich gesättigter und leuchtender in der Farbe als die ruhenden zwei Spalte. Besonders auffallend war dies bei dem zweiten Spaltbild. Am dritten Spaltbild, das den beiden anderen in Farbe und Sättigung meist ganz gleich erschien, bemerkten wir am äussersten hinteren Rand bisweilen eine geringe Inhomogenität. Dabei machte dieser Rand allerdings in der Regel lediglich den Eindruck geringerer Sättigung; nur in vereinzelten Fällen erschien er auch anders gefärbt und zeigte z. B. bei dem von uns verwendeten Grün einen gelblichen rückwärtigen Saum. Aber wie gesagt, im allgemeinen erschienen die drei Spaltbilder doch immer nahezu vollkommen gleichartig. Abgesehen von den zeitlichen Differenzen, die den für farbloses Reizlicht gefundenen vollständig analog zu setzen sind, machte es für die Erscheinung der drei Spaltbilder auch absolut keinen Unterschied, ob sie sich auf fovealen oder extrafovealen Netzhautpartien abbildeten. Auch der Adaptationszustand des Auges hatte, soweit er überhaupt in die Untersuchung mit einbezogen wurde — es liegen nur sechs Versuche für kurze Dunkeladaptation ($\frac{1}{4}$ und $\frac{1}{2}$ Stunde) vor, die übrigen Angaben beziehen sich alle auf das gut helladaptierte Auge —, keinen merklichen Einfluss auf das Phänomen.

Hingegen war ein zunächst auffallender Unterschied im zeitlichen Ablauf gegenüber dem farblosen Reizlicht zu konstatieren, der sich allerdings sehr bald als ein nur scheinbarer herausstellte. Die in der Tabelle VI für die einzelnen Farben angegebenen Zeitwerte konnten nämlich im Vergleich mit den unter den gleichen Bedingungen für farbloses Reizlicht gefundenen Werten auf den ersten Blick den Anschein erwecken, als verliefen die Reaktionen der Netzhaut bei Verwendung farbigen Lichtes langsamer. Dem ist

aber nicht so. Unseres Ermessens sind die Unterschiede, die die bezüglichen Werte für farbiges und farbloses Reizlicht zeigen, lediglich auf eine durch das Vorsetzen der farbigen Gelatinefolien bedingte Herabsetzung der Lichtintensität zurückzuführen. In der Tat wurden ja auch bei der Ermittlung der Werte 29 und 30 einfach die offenen Reizspalte benutzt, ohne dass ihre Lichtstärke irgendwie herabgesetzt worden wäre. Es ist also kaum ein Grund dafür vorhanden, bei Verwendung farbigen Reizlichtes eine Verzögerung der Netzhautreaktion anzunehmen. Die in der Tabelle VI für die einzelnen Farben verzeichneten Zeitwerte für den Eintritt des ersten positiven Nachbildes müssen vielmehr einfach mit den Werten in Parallele gebracht werden, die wir bei mässiger Herabsetzung der Intensität unseres farblosen Reizlichtes erhalten haben.

Tabelle VI.

Versuche vom 26. und 27. Mai 1908. Beides helle, aber nicht sonnige Tage. Bude offen. Fixierung *a*, *b* und *d*. Spalthöhe = 20 mm. Helladaptation.

Laufende Nummer	Farbe des Reizlichtes	Beobachter	Entwicklungszeit des I. positiven Nachbildes in Sekunden
1	Rot	D.	0,0503
2	"	D.	0,0586
3	"	E.	0,0631
4	"	E.	0,0503
5	Gelbliches Rot	E.	0,0432
6	Orange	E.	0,0586
7	"	E.	0,0677
8	"	E.	0,0458
9	"	D.	0,0458
10	Rötliches Gelb	E.	0,0532
11	Grünliches Gelb	E.	0,0548
12	" "	E.	0,0520
13	" "	E.	0,0445
14	Grün "	E.	0,0490
15	"	E.	0,0492
16	Blau	E.	0,0557
17	"	E.	0,0507
18	"	E.	0,0470
19	"	E.	0,0414
20	"	D.	0,0414
21	Violett	E.	0,0470
22	"	E.	0,0482
23	"	E.	0,0501
24	Purpur	E.	0,0462
25	"	D.	0,0462
26	"	E.	0,0532
27	"	E.	0,0583
28	"	D.	0,0523
29	Farblos	E.	0,0351
30	"	E.	0,0391

Tabelle VII.

Heller, aber nicht sonniger Tag. Spalte $h = 20$ mm, $b = 0,5$ und $d = 5$ mm.
Fixationsmarke b . Bude offen. Beobachtung monokular. Helladaptation.

Laufende Nummer	Farbe des Reizlichtes	Beobachter	Datum	Entwicklungszeit des I. positiv. Nachbildes in Sekunden	Bemerkungen
1	Orange	D.	30. Mai	0,0645	
2	"	E.	30. "	0,0633	
3	Grünliches Gelb	D.	30. "	0,0620	
4	"	E.	30. "	0,0636	
5	"Grün "	D.	30. "	0,0636	
6	"	E.	30. "	0,0742	
7	Blau	D.	30. "	0,0667	
8	"	E.	30. "	0,0695	
9	Violett	D.	30. "	0,0658	
10	"	E.	30. "	0,0648	
11	Purpur	D.	30. "	0,0642	
12	"	E.	30. "	0,0724	
13	Farblos	D.	30. "	0,0573	
					„etwas langsam“
					1 Lage Pauspapier

Tabelle VIII.

Sehr heller, sonniger Tag (18. Juni 1908). Spaltgrösse wie bei Tab. VII.
Bude geschlossen. Fixationsmarken b und f . Beobachtung monokular. Helladaptation.

Farbe des Reizlichtes	Extrafoveal			Foveal		
	Lfd. Nr.	Beobachter	Entwicklungszeit des I. pos. Nachbildes in Sek.	Lfd. Nr.	Beobachter	Entwicklungszeit des I. pos. Nachbildes in Sek.
Rot	1	D.	0,0474	17	D.	0,0675
"	2	E.	0,0462	18	E.	0,0637
Gelbliches Rot	3	D.	0,0455	19	D.	0,0659
"	4	E.	0,0459	20	E.	0,0682
Orange "	5	D.	0,0450	21	D.	0,0777
"	6	E.	0,0442	22	E.	0,0733
Rötliches Gelb	7	D.	0,0459	23	D.	0,0725
"	8	E.	0,0446	24	E.	0,0705
"Grün "	9	D.	0,0462	25	D.	0,0705
"	10	E.	0,0457	26	E.	0,0621
Blau	11	D.	0,0489	27	D.	0,0706
"	12	E.	0,0438	28	E.	0,0610
Violett	13	D.	0,0438	29	D.	0,0720
"	14	E.	0,0470	30	E.	0,0658
Purpur	15	D.	0,0443	31	D.	0,0790
"	16	E.	0,0537	32	E.	0,0658

Der Einfluss der Spalthöhe auf die Entwicklungszeit der ersten positiven Nachbildphase und der Unterschied in der Geschwindigkeit

des Ablaufs der Reaktionen, je nachdem zentrale oder periphere Netzhautteile gereizt wurden, äusserte sich auch bei Verwendung farbigen Reizlichtes mit grosser Bestimmtheit. Für den Einfluss der Spalthöhe legen die Werte der Tabelle VII Zeugnis ab. Sie wurden unter schätzungsweise denselben Bedingungen der Beleuchtung erhalten wie die auf Tabelle VI zusammengestellten Werte. Die Tabelle VIII schliesslich gibt Vergleichsversuche wieder für die Geschwindigkeit der in den zentralen und peripheren Netzhautteilen ablaufenden Prozesse. Mit den Werten der Tabelle VII lassen die hier gegebenen Werte leider deshalb keinen direkten Vergleich zu, weil die Versuche der Tabelle VIII bei ungleich stärkerer Beleuchtung des reflektierenden Schirmes und bei geschlossener Bude vorgenommen wurden.

Überblicken wir zum Schlusse, um den Vergleich mit den für den Eintritt des Purkinje'schen Bildes in der Literatur angegebenen Zeitwerten zu erleichtern, alle von uns gewonnenen Werte, so finden wir als höchsten Wert für die Entwicklungszeit des ersten positiven Nachbildes, den wir überhaupt erhalten haben, 0,0784 Sek. (Tab. V, 2), als niedrigsten 0,0298 (Tab. III, 2). Dabei haben wir unter ausgiebiger Variation der äusseren Versuchsbedingungen gearbeitet. Wenn wir von den extremsten Fällen absehen, so dürfen wir sagen, dass sich unsere Werte nicht gar weit über und unter den Mittelwert von 0,04 Sekunden bewegen. Für eine richtige Würdigung speziell unserer höchsten Werte ist zu berücksichtigen, dass wir in den einschlägigen Versuchen nicht nur auffallend herabgesetzte Lichtintensitäten benutzt haben, sondern dass auch im übrigen gerade alle diejenigen Bedingungen erfüllt waren, die den zeitlichen Verlauf der in der Netzhaut sich abspielenden Reaktionen im Sinne einer Verzögerung beeinflussen (niedrige Reizspalte, direktes Sehen). Trotzdem hat kein einziger unserer Werte auch nur $\frac{1}{12}$ Sekunde erreicht.

Nun sind von den verschiedensten Beobachtern für den zeitlichen Abstand der primären Phase von der nächstfolgenden positiven Phase, als welche bei ihnen das Purkinje'sche Nachbild galt, Werte angegeben worden, die zwischen $\frac{1}{3}$ und $\frac{1}{6}$ Sekunde schwanken. Wir können diese Angaben für das Purkinje'sche Bild bestätigen, halten es aber zugleich auf Grund unserer Erfahrungen für wahrscheinlich, dass die betreffenden Zeitwerte gerade unter den äusseren Bedingungen, unter denen wir für unser Bild die höchsten Werte

zu verzeichnen hatten, sogar noch höher steigen können. Demnach lässt sich also auch an der Hand der für den Eintritt unserer ersten positiven Nachbildphase und des Purkinje'schen Bildes tatsächlich vorliegenden Zeitangaben der Nachweis erbringen, dass unser erstes positives Nachbild zwischen der primären Phase und dem Purkinje'schen nachlaufenden Bild liegen muss, also mit dem letzteren keineswegs identisch sein kann.

Wir kommen somit aus all den angeführten Gründen zu dem Ergebnis, dass zwischen die bisher sogenannten Phasen 1 und 2 des Ablaufs des Erregungsvorganges bei kurzdauernder Reizung des Sehorganes noch zwei bisher übersehene Phasen einzuschalten sind: zuerst ein sehr kurzes dunkles Intervall (etwa $\frac{1}{25}$ Sekunde lang) und ihm folgend eine helle, bei farbigem Reizlicht diesem gleichgefärbte Phase.

Kritische Übersicht.

Bei einer Durchsicht der einschlägigen Literatur fanden wir eine Reihe von Beobachtungen, die darauf schliessen lassen, dass wahrscheinlich auch schon andere Beobachter das von uns beschriebene erste positive Nachbild bemerkt haben. Freilich ist es von ihnen durchgehends anders gedeutet, und zwar meist mit dem zweiten (dem sogenannten Purkinje'schen) positiven Nachbild identifiziert worden. Es ist nicht immer leicht, festzustellen, inwieweit die zum Teil recht unvollständig beschriebenen oder unter dem Einfluss von vorher gefassten Meinungen gedeuteten Beobachtungen hierher zu zählen sind. Wir müssen uns daher im folgenden auf mehr oder weniger naheliegende Vermutungen beschränken. Immerhin aber glaubten wir einen solchen Versuch, die vielfach widersprechenden Beobachtungen älterer Forscher auf Grund unserer Feststellungen irgendwie miteinander in Einklang zu bringen, nicht ganz unterlassen zu dürfen. Betreffen diese Widersprüche doch nicht nur die verschiedenen Theorien, die zur Erklärung der vorliegenden Erscheinungen entwickelt worden sind, sondern auch die Beobachtungen selbst.

Vor allem ist es uns sehr wahrscheinlich, dass bei dem von mehreren Autoren beobachteten „inhomogenen Charakter“ der bisher sogenannten primären Phase vielfach die Anwesenheit unseres ersten positiven Nachbildes eine Rolle spielte. Besonders die von Hess

durchgeführten Untersuchungen über die sogenannte primäre Phase¹⁾ legen den Gedanken nahe, dass das erste positive Nachbild hier öfters aufgetreten, wenn auch noch nicht in seiner Eigenschaft als solches erkannt worden ist²⁾. Bei seiner Versuchsanordnung schien Hess die primäre Phase häufig ziemlich deutlich in zwei Teile zu verfallen, welche er als Phase 1*a* und Phase 1*b* bezeichnet. Die Phase 1*b* ist nach seinen Beobachtungen meist viel weniger gesättigt (bei farbigem Reizlicht), im Grenzfall sogar ganz farblos. Bisweilen glaubte Hess sogar ein dunkles Intervall zwischen den Phasen 1*a* und 1*b* zu bemerken. Es ist nun naheliegend, zu vermuten, dass hier die Phase 1*a* mit dem wirklich primären Bild, die Phase 1*b* mit unserem ersten positiven Nachbild identisch sei. Ferner stimmte die Phase 1*b*, wenn überhaupt noch eine Färbung an ihr zu erkennen war, nach den Angaben von Hess in der Farbe mit der Phase 1*a* überein.

Eine weitere Andeutung dafür, dass unser erstes positives Nachbild nicht ganz unbemerkt geblieben ist, scheint uns in folgendem zu liegen: Vielfach ist darüber gestritten worden, ob das Purkinjesche Nachbild zum Reizlicht komplementär- oder gleichgefärbt sei. Nicht selten ist dasselbe allerdings mit dem von Hess entdeckten und von ihm als Phase 5 oder auch als tertiäres Bild bezeichneten verwechselt worden, und es erklären sich die widerspruchsvollen Angaben dann aus diesem Umstande. Aber abgesehen von diesen im allgemeinen leicht erkennbaren Fällen gibt es noch andere, wo diese Verwechslung offenbar nicht vorliegt, wo vielmehr von einem sehr bald nach der Reizung auftretenden Nachbild die Rede ist, das keinesfalls mit dem verhältnismässig spät auftretenden Hessschen identisch sein kann. Nach unseren Beobachtungen zeigt das Purkinje'sche Nachbild immer eine mehr oder weniger ausgesprochene komplementäre Färbung. Jedenfalls macht es nie einen mit dem Reizlicht gleichfarbigen Eindruck. Hingegen ist das erste von uns beobachtete positive Nachbild bei farbigem Reizlicht diesem stets gleichfarbig, niemals komplementär gefärbt. Aller Wahrscheinlichkeit nach haben jene Beobachter, welche das Purkinje-

1) Hess, Untersuchungen über den Erregungsvorgang im Sehorgan usw. Pflüger's Arch. Bd. 101 S. 226. 1904.

2) So hält Hess noch in seiner letzten Publikation ausdrücklich an der wiederholt von ihm postulierten Anzahl von sechs abwechselnd hellen und dunklen Phasen fest.

sche Bild dem Reizlicht gleichfarbig gesehen haben wollen, tatsächlich das vor ihm auftretende, erste positive Nachbild wahrgenommen.

Ganz besonders häufig scheint diese Verwechslung bei den Versuchen mit rotem Reizlicht vorgekommen zu sein. Hier wird bald behauptet, das Purkinje'sche Nachbild bleibe ganz aus, bald wird es gegenfarbig, bald gleichfarbig gesehen. Bei den von uns gewöhnlich verwendeten Lichtstärken blieb das Purkinje'sche Bild bei rotem Reizlicht vollkommen aus. Und selbst bei maximaler Steigerung der Beleuchtungsintensität wurde es nur dann gesehen, wenn die rote Gelatinefolie ausser den roten auch eine merkliche Menge blauer oder aber gelber Strahlen durchliess. Es erschien uns dann jedoch immer schwach gelblich bzw. bläulich. Hingegen fehlte unser erstes positives Nachbild bei unseren Versuchsbedingungen nie und erschien bei jeder Farbe des Reizlichtes regelmässig in gleicher Farbe mit diesem. Wenn wir nun annehmen, dass jene Beobachter, für welche das Purkinje'sche Nachbild ausblieb, entweder mit wirklich angenähert homogenem roten Reizlicht gearbeitet oder, wenn dies nicht der Fall war, zu geringe Lichtintensitäten angewendet haben, und dass ferner das gleichfarbige rote Nachbild, wo es gesehen wurde, mit unserem ersten positiven Nachbild identisch gewesen sei, dann lösen sich alle Widersprüche der verschiedenen Berichte.

Um nur einige Beispiele aus der Literatur anzuführen, sei erwähnt, dass von Kries¹⁾ und Bidwell²⁾ nach rotem Reizlicht kein sekundäres Nachbild gesehen haben. Mc. Dougall und Hess haben ein rotes Nachbild gesehen.

Mc. Dougall sagt in der Arbeit „The sensations excited by a single momentary stimulation of the eye“ (Brit. Journ. of Psychol. vol. I. Seite 108): „If the intensity of this red objekt-light is much increased there appears . . . a single narrow band of low intensity but of good saturation, forming a „ghost“ very simular in general appearence and behaviour (except as regards colour) to the hypical Bidwells ghost.“ Ähnlich bemerkt Hess („über den Ablauf des Erregungsvorganges“ etc. Arch. f. Ophthalm. Bd. 51, 2, 1900, S. 246): „ich konnte mit den käuflichen gesättigt roten (mit Kupferoxydul überfangenen) Gläsern deutliche und schöne Nachbilder erhalten, die in ihrem ganzen Verhalten, Färbung etc., mit jenen bei Anwendung andersfarbiger Lichter im allgemeinen übereinstimmten.“ „Bei Anwendung ziemlich grosser Lichtstärke und Benutzung sehr

1) v. Kries, Über die Wirkung kurzdauernder Lichtreize auf das Sehorgan. Zeitschr. f. Psych. u. Physiol. d. Sinnesorgane Bd. 12 S. 92. 1896. Vgl. auch v. Kries in Nagel's Handb. d. Physiol. Bd. 3 S. 223. 1904.

2) Bidwell, On the recurrent images following visual impressions. Proc. of the the Roy. Soc. June 1894.

gesättigt roter Gläser sah ich wiederholt die dritte Phase sehr deutlich, aber nicht gegenfarbig, sondern gleichfalls rot, und zwar in einem ganz leicht bläulich roten Tone.“

Und weiterhin („Untersuchung über den Erregungsvorgang“ etc. Pflügers Arch. Bd. 101 S. 253. 1904): „Nach kurzdauernder Reizung mit gesättigt rotem Reizlichte von passender Lichtstärke erscheint die Phase 3, wie ich früher zeigte, nicht gegenfarbig, sondern gleichfalls rot, bei Benutzung gelblichroten Reizlichtes oft bläulichrot.“

In der Arbeit „Untersuchung über das Abklingen“ etc. (Pflüg. Arch. Bd. 95, S. 17. 1903) sagt Hess: ich habe . . . „schon früher gezeigt und hervorgehoben, dass bei Benutzung gesättigt roten Reizlichtes Phase 3 gleichfalls rot gesehen werden kann“. Im folgenden (S. 12 f.) sucht er sogar den Nachweis zu führen, dass diese rote Phase mit seiner Phase 3 identisch sein müsse. Er benutzte zur Reizung einen zur einen Hälfte bellgrauen, zur anderen roten Streifen und beobachtete nun ein ungefähr gleichzeitiges Auftreten des ersten positiven Nachbildes für beide Streifenhälften. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist dieses Nachbild eben für beide Streifenhälften identisch mit unserem ersten positiven Nachbild, nicht mit dem Purkinjeschen. Das Ergebnis mehrerer eigenen Versuche, die unter den von Hess angegebenen Bedingungen mit einem zur Hälfte weissen, zur Hälfte roten Papierstreifen von uns angestellt wurden, deutet wenigstens auf einen solchen Zusammenhang hin.

In analoger Weise dürften sich die Befunde verschiedener Beobachter bezüglich der andersfarbigen Reizlichter aufklären. Doch verkennen wir nicht, dass hier auch andere Faktoren bisweilen ihren Einfluss ausgeübt haben mögen. Die Färbung der Nachbilder ist ja gewöhnlich verhältnismässig schwach, wie auch die Helligkeiten relativ gering zu sein pflegen. Um so mehr müssen daher die chromatische Stimmung des Auges sowie die grössere oder geringere Farbenempfindlichkeit des beobachtenden Auges in Betracht gezogen werden.

An Beispielen mögen folgende genügen: Hess bemerkt in den „Untersuchungen über das Abklingen usw.“ (Pflüger's Arch. Bd. 95 S. 13. 1903): „In einem von einer 25 kerzigen Mattglasglühlampe beleuchteten Dunkelzimmer erhielt ich von einem gesättigt blauen Papierstreif eine deutlich blaue Phase 3“. Und Mc Dougall sagt über seine Befunde (l. c. S. 108): „In the case of a blue object-light of moderate intensity I have frequently seen the ‚ghost‘ distinctly tinged with blue, and rarely I have seen it yellowish in tone. In the case of a green object-light I have frequently seen the ‚ghost‘ tinged with the complementary purple, rarely I have seen it greenish in tone.“

Nicht ganz in den Rahmen unserer Betrachtung fallen die von Charpentier¹⁾ unter dem Namen der „bandes noires“ beschriebenen

1) Charpentier, Propagation à distance de la réaction oscillatoire de la rétine. Arch. de Physiol. 1892 p. 541, und Nouvelles recherches sur les oscillations rétinienes. Arch. de Physiol. 1896 S. 677.

Nachbilder sowie einige ähnliche von Hess¹⁾ zuerst gemachte Beobachtungen. In beiden Fällen handelt es sich nämlich nicht um die bei Momentanbelichtung, sondern um die bei raschem Übergang von schwacher zu starker bzw. von starker zu schwacher Belichtung im Sehorgan sich abspielenden Vorgänge. Dieselben sind nach ihrer Art sowie in ihrem zeitlichen Ablauf den von uns eingehend untersuchten Erscheinungen, wie es scheint, nicht unähnlich. Wenigstens konnten wir, allerdings nur auf Grund successiver Vergleiche, feststellen, dass sowohl die erste „nachlaufende“ helle Phase, die Hess beobachtet hat, wenn er einen schwarzen Schirm vor eine weisse Fläche schob, als auch die erste „nachlaufende“ dunkle Phase, die er sah, wenn er umgekehrt einen weissen Schirm vor eine schwarze Fläche schob, beiläufig dieselbe Entwicklungszeit besitzen wie unser erstes positives Nachbild nach momentaner Belichtung der Netzhaut.

Schliesslich sei noch in aller Kürze darauf hingewiesen, dass wir unter unseren Versuchsbedingungen niemals auch nur andeutungsweise Erscheinungen gesehen haben, die an die von Mc Dougall²⁾ gelegentlich beobachteten „Zapfen-“ und „Stäbchenbänder“ erinnert hätten, die in Form einzelner heller Streifen, bis zu zwanzig an Zahl, den Raum zwischen der primären Phase und „Bidwells Ghost“ (d. h. dem Purkinje'schen Bild) ausfüllten. Allerdings unterschieden sich Mc Dougall's Versuchsbedingungen wesentlich von den unseren, vor allem was die Intensität des verwendeten Reizlichtes betraf.

Zusammenfassung.

Die mitgeteilten Untersuchungen führten zu dem hauptsächlichen Ergebnis, dass bei Reizung der Netzhaut mit bewegter Lichtquelle (schmäler leuchtender Spalt) ausser unter extremen Bedingungen der Dunkeladaptation und der Intensität des Reizlichtes zwischen dem primären und dem sogenannten Purkinje'schen Bilde ein bis jetzt nicht beschriebenes helles Nachbild auftritt. Dieses neue erste positive Nachbild ist von dem primären Bilde durch ein dunkles Intervall getrennt. Es ist bei Beobachtung mit hell adaptiertem Auge wohl am deutlichsten, doch auch mit dunkel

1) Hess, Untersuchungen über den Erregungsvorgang im Sehorgan bei kurz- und länger dauernder Reizung. Pflüger's Arch. Bd. 101 S. 246 ff. 1904.

2) Mc Dougall, The sensations excited etc. British Journ. of Psychol. vol. 1 p. 106.

adaptiertem Auge zu sehen. Bei Verwendung farbigen Reizlichtes erscheint es zu diesem nie gegenfarbig, sondern ist ihm im wesentlichen stets gleich gefärbt; im Unterschied zum sogenannten Purkinje'schen Bild tritt es bei jeder beliebigen Farbe des Reizlichtes mit derselben Deutlichkeit auf. Zwischen dem Verhalten der fovealen und extrafovealen Netzhautbezirke konnten wir bezüglich seines Auftretens keine prinzipiellen Unterschiede finden.

Die Dauer des zwischen dem Eintritt des primären Bildes und unseres ersten positiven Nachbildes liegenden Zeitintervalles (der „Entwicklungszeit“ des ersten positiven Nachbildes) bestimmten wir nach der Hering'schen „Dreibildmethode“ auf durchschnittlich 0,04 Sek. Sie erwies sich als in hohem Masse von der Intensität des Reizlichtes abhängig in dem Sinne, dass die Steigerung der Lichtstärke das Auftreten des ersten positiven Nachbildes beschleunigte. Verlängerung der Reizspalte, d. h. Vermehrung der gleichzeitig gereizten Netzhautstellen ohne Änderung der Belichtungsdauer wirkte in analogem Sinne wie eine Intensitätssteigerung des Reizlichtes. In der Fovea centralis war der Eintritt des ersten positiven Nachbildes gegenüber den parazentralen und peripheren Netzhautteilen deutlich verzögert. Die Qualität des Reizlichtes hatte auf die zeitlichen Verhältnisse keinen merklichen Einfluss.

5

6

α β γ

7

α β γ

8

Fig. 13.

Fig. 16.

Fig. 19.

Fig. 14.

Fig. 17.

Fig. 20.

Fig. 15.

Fig. 18.

Fig. 21.

a.

Fig. 22.

b.

a.

Fig. 23.

b.

Fig. 24.

Fig. 25.

Fig. 26.

Fig. 27.

Fig. 28.

Fig. 29.

Fig. 30.

Fig. 31.

Fig. 32.

Fig. 33.

Fig. 34 a - c.

Fig. 38.

Fig. 35 a - c.

Fig. 39 a u. b.

Fig. 36 a u. b.

Fig. 37 a u. b.

Fig. 40.

Fig. 41.

Fig. 42.

Fig. 43.

Fig. 44.

Fig. 45.

Fig. 46.

Fig. 47.

Fig. 48.

(Hürthle.)

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 8.

Fig 6.

Dasselbe wie in Fig. 5, nach Durchschneidung des rechten Schenkels des Atrioventrikulärbündels (siehe Schnitt S_2 auf Fig. 1) Unstöße, dessen Kontraktion sich 1 in einem gewissen Intervalle von 2, 3 und 4. Siehe Seite 231.

Fig 7.

Fig 8.

Hand, Mäulchen mit Blut durchströmtes Herz. Oben C = Corus des rechten Ventrikels, unten P = ventraler Papillarmuskel. Kontraktion sich von C. Zeit in Sek. P. C. = 0.0118 - 0.0118.

145. Aus J. Wieg. Bismuth.

Dasselbe wie in Fig. 7. P. C. = 0.0118. Siehe Seite 231.

Verlag von Martin Heger, Bonn.

Fig. a.

Fig. b.

Fig. c.

Fig. d.

Fig. e.

Fig. f.

(Violence.)

Fig. 1. Luftsäcke sind ausgeschaltet.

Fig. 2. Luftsäcke sind nicht ausgeschaltet.

Fig. 3. Luftsäcke ausgeschaltet.

Fig. 4. Luftsäcke nicht angeschaltet.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 1

Abbildung des Bauwerks in der Ansicht von oben

Fig. 2

Abbildung des Bauwerks in der Ansicht von unten