phosphorsauren Phosphoroxydes die Meinung des Chemikers, wenn diess nöthig wäre, bestätigen würde, welcher die phosphatische Säure zuerst als eine aus bestimmten Verhältnissen bestehende Zusammensetzung der Phosphorsäure und der phosphorigen Säure betrachtete. Es schien jedoch, als wollten einige Chemiker diese Ansicht nicht annehmen.

Die constante Beschaffenheit des Verhältnisses der Phosphorsäure zur phosphorigen Säure bei der phosphatischen Säure, wenn sie als eine Verbindung der zwei ersten betrachtet wird, zeigte eine Verbindung in bestimmten Verhältnissen an. Sie würden aber ohne Zweifel in dieser Zusammensetzung, um sie ohne Widerrede zu charakterisiren, irgend eine Eigenschaft zu sehen gewünscht haben, welche sich weder in der Phosphorsäure noch in der phosphorigen Säure befände.

Alle diese Bedingungen sind bei dem phosphorsauren Phosphoroxyl erfüllt. Das Verhältniss des Phosphors zum Sauerstoff ist darin constant, und wir haben gesehen, dass es merkwürdige ihm eigenthümliche Eigenschaften besitzt.

Dieser Körper bietet also ein Beispiel von einem wirklichen Salze dar, wo der Phosphor, indem er sich mit dem Sauerstoffe verbindet, unbestritten die Säure und die Base liefert, und es ist kein Grund mehr vorhanden, dieselbe Thatsache in Betreff der phosphatischen Säure anzunehmen.

III.

Bemerkungen über einige Mineralien.

Von

Thomas Thomson.

Professor der Chemie an der Universität zu Glasgow.

(Aus den Records of general science, Nr. XVII., Mai 1836, S. 332.)

I. Nacrit und Talcit.

Einige Exemplare, die ich kürzlich aus Irland durch die Güte Dr. Scoulers, Professor der Mineralogie an der Royal Dublin Society, erhielt, setzten mich in Stand, mich davon zu überzeugen, dass ich in meiner Mineralogie (Vol. I. S. 244.) zwei verschiedene Mineralspecies unter dem Namen Na-

36 Thomson, Bemerkungen üb. einige Mineralien.

crit mit einander vermischt habe. Um diese zwei Species von einander zu unterscheiden, beschränke ich den Namen *Nacrit* und lege ihn bloß einem Mineral aus Amerika bei, das von mir im Jahre 1827 analysirt und beschrieben wurde. Dem andern Mineral, aus Irland, werde ich den Namen *Talcit* geben; wie ihm dieser Name wahrscheinlich von Kirwan gegeben wurde. Siehe dessen Mineralogie B. I. S. 149.

Nacrit. Das einzige Exemplar dieses Minerals, welches ich gesehen habe, erhielt ich vor ungefähr zehn Jahren vom Dr. Torrey zu New-York. Auf dem dabei befindlichen Zettel war es bezeichnet als grüner Glimmer in Glimmerschiefer aus Braunschweig im Staate Maine. Das Exemplar bestand aus hellgrünen Schuppen, die ungleichmässig in einem Gesteine zerstreut waren, welches vornehmlich aus Quarz nebst vielem Eisenkies bestand.

Die Farbe der Schuppen ist weiss mit einem schönen Schatzen von hellem Smaragdgrün.

Glanz stark und perlmutterartig.

Besteht aus Platten, die biegsam, aber nicht elastisch sind. Unter dem Mikroskope betrachtet, haben sie einige Dicke.

Es hat eine sehr deutliche Spaltbarkeit parallel den breiten Seiten der Schuppen. Sie bieten einige undeutliche Anzeichen von zwei andern Spaltungsrichtungen dar, die auf ein schiefes vierseitiges Prisma als Grundform hindeuten.

Durchscheinend. Anfühlen nicht fettig.

Sehr weich. Specifisches Gewicht 2,788.

Nach dem Glühen behalten sie immer noch ihren perlmutterartigen Glanz bei, haben aber ihre grüne Farbe verloren und sind silberweiss geworden.

Vor dem Löthrohre schmilzt es schwer. Seine Bestandtheile sind folgende:

Kieselerde	64,440	60,20
Thonerde	28,844	30,83
Eisenoxydul	4,428	3,55
Wasser	1,000	5,00
	98,712 *)	99,58 **)

*) Nach meiner Analyse.

**) Gelber erdiger Talk von Merowitz, analysirt von John. Journal des Mines XXIII, 384.

Die aus dieser Analyse abgeleitete Atomenzahl der Bestandtheile ist folgende:

Kieselerde	31,16	2,34
Thonerde	13,28	1
Eisenoxydul	0,88	0,066.

Die Kieselerde ist im Ueberschusse vorhanden, weil die Nacritkörner in Quarz vorkommen und es unmöglich ist, denselben gänzlich auszuscheiden.

Ich bin deshalb geneigt, den Nacrit als ein Thonerdebisilicat zu betrachten.

Talcit. Die Exemplare des Talcits aus Irland sind aus der Grafschaft Wicklow, wo er im Granit krystallisirt vorkommt. Ich erhielt ihn auch in Schuppen, die in einer weichen Substanz zerstreut waren, welche einigermaassen das Aussehen von Chlorit hatte. Der Fundort dieses letzten Exemplares ist Strathbane in der Grafschaft Tyrone.

Die Schuppen sind silberweiss, ohne die grüne Färbung, welche den Nacrit charakterisirt.

Die Krystalle sind grosse vierseitige Prismen mit rauhen Flächen, die unter einem Winkel von ungefähr 91° zusammentreffen.

Glanz der Krystalle schwach, der Schuppen schimmernd und perlmutterartig.

Schuppen durchscheinend, Krystalle undurchsichtig.

Härte 2,25. Specifisches Gewicht 2,6918.

Werden die Krystalle zerstossen, so scheinen sie aus silberweissen Schuppen zu bestehen.

Die Bestandtheile des Talcites sind folgende:

				Atome.
Kieselerde	46,000	44,55	22,27	1,48
Thonerde	35,200	33,80	15,02	1
Eisenoxydul	2,880	7,70	1,54	
Kalk	9,608	1,30	0,37	
Magnesia	—	3,30	1,32	
Manganoxydul	3,944	2,25	0,45	
Wasser	2,000	6,65	5,91	1/3
	99,632 *)	99,55 **)		

*) Die Krystalle wurden von Dr. Schort analysirt.

**) Die Schuppen wurden von J. Tennant analysirt.

38 Thomson, Bemerkungen üb. einige Mineralien.

Nach den Schuppen berechnet, die augenscheinlich reiner als die Krystalle sind, ist das Mineral ein Thonerdesesquisilicat. Die Menge Eisenoxydul, Kalk, Magnesia, Manganoxydul und Wasser ist in den beiden analysirten Exemplaren so verschieden, dass dieselben nicht als wesentlich für die Zusammensetzung des Minerals betrachtet werden können.

II. Holmit.

Vorigen November erhielt ich von Finch ein kleines Exemplar von einem Mineral, das er von Warwick, in dem Staate New-York nahe am Hudson, mitgebracht hatte.

In Amerika führte es den Namen Bronzit. Es wurde von einem meiner Zöglinge einer chemischen Analyse unterworfen. Da er aber einige unerwartete Schwierigkeiten fand, so wurde ich bewogen, die wenigen übrig gebliebenen Körner zu untersuchen. Ich entdeckte Zirkonerde darin. Aber die in meinem Besitze befindliche geringe Menge hinderte mich, es einer genauen Analyse zu unterwerfen, da mein Exemplar schon bei der Untersuchung über die Natur der Bestandtheile erschöpft war. Zum Glück erhielt ich gegen den Anfang des jetzigen Jahres eine kleine Schachtel mit Mineralien vom Dr. Holmes zu Montreal, und unter andern auch ein ziemlich grosses Exemplar des vermeintlichen Bronzites. Ich ersuchte meinen Freund und Schüler Richardson, es zu analysiren, was er mit seiner gewöhnlichen Genauigkeit that.

Da dieses Mineral augenscheinlich neu ist, so gab ich ihm den Namen Holmit als einen kleinen Tribut der Dankbarkeit gegen den Dr. Holmes zu Montreal, dem ich so viele neue und merkwürdige Mineralien aus Canada und den vereinigten Staaten von Amerika verdanke.

Farbe dunkel rothbraun. Glanz halbmatt.

Gefüge blätterig, blos mit einer bemerkbaren Spaltbarkeit. Die Platten oder Blätter, in die es sich zerspaltet, sind elastisch wie die des Glimmers, können aber nicht so dünn erhalten werden.

Durchsichtig in dünnen Platten.

Härte 6. Specifisches Gewicht 3,098.

Vor dem Lüthrohre verliert es seine Farbe und wird undurchsichtig. Mit kohlensaurem Natron erleidet es keine Ver-

änderung. Mit Borax schmilzt es zu einer farblosen durchsichtigen Perle, die ein Skelett von Kieselerde enthält. Die Phänomene mit doppeltphosphorsaurem Natron sind dieselben, ausgenommen, dass die Perle in der reducirenden Flamme eine grünlich - gelbe Farbe erhält. Seine Bestandtheile sind folgende:

		Atome.
Kieselerde	19,35	9,68
Thonerde	41,75	19,88
Zirkonerde	2,05	0,54
Eisenoxyd	4,80	0,96
Manganoxydul	1,35	0,30
Kalk	11,45	3,27
Magnesia	9,05	3,62
Wasser	4,55	4,04
Flusssäure	0,90	0,72
	<hr/> 98,25.	

Nehmen wir an, dass die Flusssäure in Verbindung mit Kalk gewesen sei, so reducirt sich diese Base auf 2,55 Atome. Die Atome der Basen belaufen sich auf 27,85, während die der Kieselerde 9,68 betragen. Nun ist der dritte Theil von 27,85 9,28. Daher ist es einleuchtend, dass das Mineral aus 3 Atomen Base mit einem Atome Kieselerde besteht. Die Formel für diese Zusammensetzung ist folgende:

Es ist ein vierfaches Thonerdesalz und kann zwischen Bergleder und Perlstein im I. Bde. S. 390 meiner Mineralogie gesetzt werden.

Wird unter Bronzit das verstanden, was gewöhnlich Schillerspath genannt wird, dann ist der Holmit ein ganz verschiedenes Mineral.

III. Anthophyllit und Schillerspath.

Unter einer Menge von Mineralien, die Dr. Holmes zu Montreal mir während des gegenwärtigen Winters übersandte, befand sich ein ziemlich grosses Exemplar, als dessen Fundort Perth in Obercanada angegeben wurde. Es bestand aus einer Zusammenhäufung unvollkommener Krystalle, die sehr viel von dem Aussehen des Anthophyllites hatten. Sein specifisches Gewicht war 2,707, und seine Bestandtheile waren folgende:

40 Thomson, Bemerkungen üb. einige Mineralien.

		Atome.
Kieselerde	57,60	28,8
Thonerde	3,20	1,42
Eisenoxydul	2,10	0,46
Kalk	3,55	1,01
Magnesia	29,30	11,9
Wasser	3,55	3,1
	<hr/> 99,3.	

Daher ist seine Zusammensetzung:

Wenn der Leser S. 207 im ersten Bande meiner Mineralogie aufschlägt und die Analysen des Anthophyllites vergleicht, so wird er sich überzeugen, dass das amerikanische Exemplar ein Anthophyllit sei, wie seine äusseren Charaktere anzeigen. Aber bei den von Vopelius, L. Gmelin und mir analysirten Exemplaren von Anthophyllit sieht man, dass nicht weniger als 13 Procent Eisenoxydul darin waren, während in dem amerikanischen Exemplare blos 2,1 Procent enthalten sind. Hieraus schliesse ich, dass Eisenoxydul kein wesentlicher Bestandtheil des Anthophyllites sei. Da Kalk und Thonerde in einem der analysirten Exemplare gänzlich fehlen, so können sie keine wesentlichen Bestandtheile sein. Der grosse Unterschied in dem Betrage des Wassers und seine Abwesenheit in einem der Exemplare macht es unwahrscheinlich, dass es in die chemische Zusammensetzung des Anthophyllites eingeht. Daher bin ich geneigt, zu schliessen, dass der Anthophyllit, wenn er frei von aller fremdartigen Substanz erhalten werden könnte, ein wasserfreies Magnesiabisilicat sein und durch Mg S_2 dargestellt werden würde.

Schillerspath im Gegentheil ist ein wasserhaltiges Magnesiabisilicat oder $\text{Mg S}_2 + \text{Aq.}$

Wir dürfen nach diesem nicht darüber erstaunt sein, dass Schillerspath specifisch leichter als Anthophyllit ist und dass zwischen den beiden Mineralien eine gewisse Aehnlichkeit besteht.

IV. *Deweylit.*

Ich erhielt ein kleines Exemplar dieses Minerals vom Dr. Holmes, unglücklicherweise aber vergass ich, seinen Fundort aufzuzeichnen, und bemerkte blos, dass es in Ame-

rika analysirt worden war und dass es folgende Bestandtheile enthielt:

Kieselerde	40
Magnesia	40
Wasser	20
	<hr/> 100.

Das Exemplar machte eine amorphe Masse aus und war ungefähr noch einmal so gross als ein Taubenai.

Sein Gefüge ist körnig und seine Farbe hell gelblich-weiss. Bruch splitterig.

Durchscheinend an den Kanten. Harzglanz. Lässt sich leicht pulvern.

Härte 2,5. Specifisches Gewicht 2,2474.

Vor dem Löthrohre für sich allein wird es weiss und undurchsichtig. Mit kohlensaurem Natron schmilzt es zu einer Perle, welche ganz das Aussehen von Email hat, in der Hitze weiss ist, aber nach erfolgter Erkaltung eine rothe Farbe annimmt. Mit Borax schmilzt es unter geringem Aufbrausen zu einer durchsichtigen farblosen Perle. Mit doppeltphosphorsaurem Natron schmilzt es weder in der reducirenden noch in der oxydirenden Flamme, aber die Probe nimmt das Aussehen von Email an, gerade als wäre sie mit kohlensaurem Natron geschmolzen worden.

Die Bestandtheile des Minerals sind folgende:

Kieselerde	41,42	20,71	8,8	
Magnesia	25,53	9,41	4,0	
Natron	6,25	1,56	0,66	
Thonerde	4,47	1,98	0,84	} 1,04
Ceriumoxyd	3,57	0,40	0,17	
Eisenoxyd, eine Spur	—	—	—	
Wasser	19,86	17,05	7,23	
	<hr/> 101,10.			

Aus diesen Bestandtheilen können wir folgende Formel für seine Zusammensetzung ableiten:

Keine bekannte Mineralspecies stimmt mit dieser Formel hinsichtlich seiner Zusammensetzung überein. Wäre es nicht wegen der Anwesenheit von NS_2 , so könnte man annehmen, sie sei vom edeln Serpentin blos dadurch verschieden, dass es zweimal so viel Wasser enthalte, als in die Zusammensetzung

42 Thomson, Bemerkungen üb. einige Mineralien.

dieses letzteren Minerals eingeht. Auf alle Fälle muss der Deyelit eine neue Mineralspecies ausmachen.

V. *Amphodelit.*

Diesen Namen gab Nordenskiöld einem Mineral, das er in dem Kalksteinbruche von Lojo in Finnland fand. Berzelius giebt eine kurze Beschreibung desselben zugleich mit der Analyse von Nordenskiöld in seinem Jahresberichte für 1833, S. 174.

Voriges Jahr erhielt ich ein kleines Exemplar eines Minerals vom Dr. Holmes zu Montreal, dessen Aehnlichkeit mit dem Amphodelit von Nordenskiöld mir auffiel, so weit ich es nach der von Berzelius gegebenen Beschreibung beurtheilen konnte. Der Fundort war Brytown in Obercanada.

Das Exemplar war eine amorphe Masse, die nicht viel grösser war als ein Taubenei. Ich konnte keine Spaltbarkeit an ihm entdecken, noch einigen Anschein von Krystallisation, während an Nordenskiöld's Exemplare zwei Spaltungsrichtungen bemerkt werden konnten, die in einem Winkel von $94^{\circ} 19'$ zusammentrafen.

Die Farbe dieses Minerals war zum Theil weiss und zum Theil hell rosenroth, ungleichmässig vertheilt und allmählig in einander laufend, so dass es ungewiss bleibt, wo die eine beginnt und die andere aufhört. Kleine olivengrüne Flecken und Punkte durchdringen die Masse, die höchst wahrscheinlich von einer fremdartigen Substanz herkommen, aber in zu geringer Menge vorhanden und zu innig mit dem Steine verbunden sind, um sich trennen zu lassen.

Gefüge körnig. Glanz zwischen Glas- und Harzglanz. Durchscheinend an den Kanten.

Härte ungefähr 6, oder nicht viel weicher als Feldspath. Specifisches Gewicht 2,8617.

Es wurde in meinem Laboratorio mit grosser Sorgfalt von John Tennant analysirt. Folgende Tabelle zeigt die Bestandtheile der amerikanischen Varietät und des lappländischen Amphodelites, der von Nordenskiöld analysirt wurde.

	Nordenskiöld.	Tennant.
Kieselerde	45,80	45,80
Thonerde	35,45	26,15
Kalk	10,15	16,25
Magnesia	5,05	2,95
Eisenoxydul	1,70	4,70
Wasser	1,88	2,00
	<hr/> 100,03	<hr/> 97,85.

Die Kieselerde ist in beiden Exemplaren genau in derselben Menge vorhanden. Die Totalsumme der Basen ist in beiden gleich, obgleich das Gewicht der einzelnen Bestandtheile abweicht. Folgende Formeln stellen die Zusammensetzungen beider Varietäten dar:

Lappländische Varietät $3 \text{ Al S} + (\frac{1}{2} \text{ Ca} + \frac{1}{2} \text{ Mg} + \frac{1}{2} \text{ O}) \text{ S}$.

Amerikanische Varietät $2 \text{ Al S} + \left\{ \begin{matrix} \text{Ca} \\ \text{Mg} \\ \text{f} \end{matrix} \right\} \text{ S}_2$

Ich halte es für wahrscheinlich, dass diese beiden Varietäten eine fremdartige Substanz enthalten und dass die Unterschiede zwischen ihnen von diesem Umstaude herrühren.

VI. Weissit.

Der Name Weissit wurde von Trolle Wachtmeister einem Minerale gegeben, das in nierenförmigen Stücken ungefähr von der Grösse einer Haselnuss in Chloritschiefer in Erick Matt's Grube zu Fahlun in Schweden vorkommt.

Gegen das Ende des vorigen Jahres erhielt ich vom Dr. Holmes zu Montreal ein Exemplar eines Mineralen von Pottou in Niedercanada, das er durch den Namen Grauer Chlorit unterschied. Dieses Exemplar steht in naher Verwandtschaft mit dem Weissit von Trolle Wachtmeister.

Seine Farbe ist aschgrau, mit einem geringen Anstriche von Blau.

Das Gefüge ist schieferig. Harzglanz. Bruch eben.

Undurchsichtig. Es fühlt sich nicht seifenartig an, jedoch führt es in Canada den Namen Seifenstein.

Härte 1,75. Es lässt sich leicht mit dem Nagel kratzen und scheint weicher als der Selenit.

Specifisches Gewicht 2,8263.

Auf meine Bitte wurde es von John Tennant in mei-

44 Thomson, Bemerkungen üb. einige Mineralien.

nem Laboratorio analysirt, der die folgenden Bestandtheile erhielt:

		Atome.
Kieselerde	55,05	27,5
Thonerde	22,60	10
Eisenoxydul	12,60	2,8
Kalk	1,40	0,4
Magnesia, nebst einer	5,70	2,2
Spur von Mangan		
Wasser	2,25	2
<hr/>		99,6.

Die durch die Mengen angezeigte Formel ist $2 \text{ Al S}_2 + (\frac{2}{3} \text{ f} + \frac{1}{3} \text{ Mg}) \text{ S}_2$.

Trolle Wachtmeister fand in seinem Weissit folgende Bestandtheile:

		Atome.
Kieselerde	50,69	29,84
Thonerde	21,70	9,64
Magnesia	8,99	3,60
Eisenoxydul	1,43	0,31
Manganoxydul	0,63	0,14
Kali	4,10	0,68
Natron	0,68	0,17
Zinkoxyd	0,50	0,05
Wasser m. Ammoniak	3,20	2,84
<hr/>		100,72.

Die aus diesen Mengen hervorgehende Formel ist:

Nach Vergleichung der Analysen dieser zwei Mineralien halte ich es für sehr wahrscheinlich, dass die einzigen wesentlichen Bestandtheile Al S_2 , während alle andre zufällige Unreinigkeiten sind. Lässt man diese Annahme gelten, so ist der Weissit bloß eine unreine Varietät des Nacrites, der zu Anfange beschrieben worden ist.

VII. Magnesit.

Im ersten Bande meiner Mineralogie S. 178 habe ich eine unvollkommene Beschreibung dieses Minerals gegeben, das in dem Mergelkalksteine um Paris vorkommt, von Alexander Brogniart zuerst beachtet und von Berthier analysirt wurde. Da ich niemals ein Exemplar dieses Minerals gesehen hatte, so war meine Beschreibung nothwendigerweise unvollkommen.

In einer vorigen October vom Dr. Holmes erhaltenen Schachtel voll Mineralien befand sich ein kleines Exemplar, das als wasserfreier Deweylit bezeichnet war. Dieses Exemplar stimmte genau mit dem Magnesit überein, so weit ich es nach Berthier's Beschreibung beurtheilen konnte. Ich will noch hinzusetzen (da Berthier es anzugeben vergessen hat), dass das specifische Gewicht 2,0964 beträgt und dass das Mineral undurchsichtig ist. Es wurde von John Tennant analysirt. Ich werde Berthier's Analyse des Magnesites danebenstellen, damit der Leser urtheilen könne, in wie weit sie übereinstimmen.

	Berthier.	Tennant.
Kieselerde	54	50,70
Magnesia	24	23,65
Thonerde	1,4	3,55
Eisenoxydul	—	1,70
Wasser	20,1	20,60
	<hr/> 99,5	<hr/> 100,2.

Das französische Exemplar ist am reinsten; aber die Formel für beide, mit Weglassung der Unreinigkeiten, wie sie sich aus der Vergleichung der beiden Analysen ergeben, ist:

Das Mineral ist also ein wasserhaltiges Magnesiatri-silicat.

IV.

Analyse des in den Umgebungen von Autun gefundenen Nontronites.

V o n

J A C Q U E L A I N,
Préparateur au der école centrale.

(*Annales de Chimie et de Physique*, Sept. 1837. S. 101.)

Der Nontronit wurde schon von Dufrenoy im Departement Aveyron in kleinen Haufen in dem Sandsteine gefunden, welcher den Granit von dem Lias trennt. Berthier hat die Varietät beschrieben und analysirt, welche in dem Dorfe Saint-Pardoux in dem Bezirke Nontron in Dordogne gefunden wird.

Der Nontronit, welchen ich untersucht habe, findet sich bei Montmort, im Bezirke Autun im Departement der Saône und Loire. Er ist in kleinen Stücken im Granite in zersetztem Zustande verbreitet (die ganze Gegend besteht aus Granit). Er