Nouvelles Additions A La Flore De Corse

M. L. Lutz

To cite this article: M. L. Lutz (1901) Nouvelles Additions A La Flore De Corse, Bulletin de la Société Botanique de France, 48:6, CXLVIII-CL, DOI: [10.1080/00378941.1901.10831889](https://doi.org/10.1080/00378941.1901.10831889)

To link to this article: <http://dx.doi.org/10.1080/00378941.1901.10831889>

Published online: 08 Jul 2014.

Submit your article to this journal [↗](#)

Article views: 7

View related articles [↗](#)

Ophrys tenthredinifera Wild. — Maquis, à Aleria en terr. calcaire, 17 avril 1903.

Spiranthes aestivalis Rich. — Rochers humides du Tallano, juillet 1902.

Ruppia rostellata G. G. — Fossés d'eau saumâtre, à Saint-Florent, 11 juin 1901.

Carex frigida All. — Bords des torrents, au Coscione, juillet 1902.

Danthonia decumbens DC. — Tourbières du lac de Creno, 20 juillet 1902.

NOUVELLES ADDITIONS A LA FLORE DE CORSE; par M. L. LUTZ.

Après la Session extraordinaire, j'ai repris l'exploration de l'île que j'avais commencée l'année précédente. J'avais comme principaux objectifs le massif de l'Incudine et la région montagneuse qui borde la plaine orientale. Parti d'Ajaccio, je me suis d'abord rendu à Sartène, où j'ai retrouvé M. Maire; nous sommes allés ensemble jusqu'à Zonza, où nous attendait l'hospitalité amicale de M. et M^{me} Michel-Despallières, puis, après une excursion dans la forêt de Barrocaggio-ouest, nous avons fait l'ascension de l'Incudine. De retour à Zonza, nous avons traversé le col de Bavella et, par la vallée de Solenzara, nous avons gagné la côte orientale et Ghisonaccia. Laissant M. Maire continuer sa route vers le Nord de l'île, je me suis arrêté à Cervione. J'ai fait une première herborisation entre cette localité et Pietra-Mala, où se trouve une mine d'amiante en exploitation. Une deuxième excursion m'a conduit de Cervione à San Nicolao, Regetti, Sainte-Lucie et Padulella. Je me suis ensuite rendu à Vescovato, où j'ai poussé une nouvelle pointe dans la chaîne montagneuse en passant par Venzolasca et Loreto di Casinca et retour à Vescovato.

Enfin, de Bastia, où j'ai retrouvé M. Maire, j'ai refait avec lui l'excursion à Saint-Florent qui figurait dans mon programme de 1900, de manière à explorer en détail les marais saumâtres des environs de cette ville.

Dans la Note qui précède, M. Maire a mentionné un certain nombre de plantes intéressantes qui ont été récoltées au cours de

nos herborisations communes : je n'y reviendrai pas ici ; je me bornerai à citer les espèces nouvelles ou peu répandues rencontrées au cours des excursions que j'ai faites seul ou celles que M. Maire n'a pas signalées dans son travail.

Anemone apennina. — Piana de Renucci (Incudine).

Ranunculus Marschlinsii. — Bergeries de Fianosa (Incudine).

Ranunculus platunifolius. — Bergeries de Fianosa.

Aconitum Napellus. — Bergeries de Fianosa.

Thlaspi rivale. — Bergeries de Fianosa.

Viola nummularifolia. — Piana de Renucci.

Reseda lutea. — Forêt de Barrocaggio.

Dianthus virgineus var. *brevifolius*. — Col de Téghime, San Nicolao, défilés de l'Ancône, Pietra-Mala.

Spergularia macrorhiza. — Saint-Florent.

Cerastium Thomasii. — Incudine.

Linum catharticum. — San Nicolao, Pietra-Mala.

Lathyrus pratensis. — San Nicolao.

Colutea arborescens. — San Nicolao, Regetti.

Potentilla corsica. — Bergeries de Fianosa.

Sorbus Aria. — Forêt de Barrocaggio.

Epilobium parviflorum. — Défilés de l'Ancône.

Epilobium tetragonum. — San Nicolao.

Lythrum Græfferi. — Saint-Florent.

Bunium corydalinum. — Forêt de Barrocaggio, Bergeries de Fianosa.

Chærophyllum temulum. — Pietra-Mala.

Centranthus ruber. — Regetti.

Petasites fragrans. — Venzolasca.

Senecio Jacobæa. — Porto-Vecchio, San Gavino di Carbini, Casabianda (bords de l'étang del Sale).

Gnaphalium luteo-album. — Défilés de l'Ancône.

Helichrysum frigidum. — Monte d'Oro, vers 2000 mètres ; lac de Melo, depuis 1600 mètres, au-dessus des Bergeries (Communiqué par M. F. Camus).

Chamæpeuce Casabonæ. — Forêt de Barrocaggio, Cervione, col de Téghime, Vivario, entre Barchetta et Ponte-Nuovo.

Santolina Chamæcyparissus form. *incana*. — Padulella.

Leuzea conifera. — Monte Cinto (Communiqué par M. F. Camus).

Tyrimnus leucographus. — Défilés de l'Ancône.

Pinguicula corsica. — Monte Cinto (Communiqué par M. F. Camus).

Primula grandiflora. — Piana de Renucci (Incudine).

Cerinth tenuiflora Bert. — Forêt de Bavella, partie basse.

Cynoglossum montanum. — Quenza.

Lithospermum arvense. — Entre Sainte-Lucie et San Nicolao.

Physalis Alkekengi. — Vescovato.

Digitalis purpurea et *Digitalis lutea*. — J'ai trouvé ces deux plantes côte à côte dans une châtaigneraie entre Cervione et San Nicolao, non loin de ce dernier village.

Ajuga Iva. — Saint-Florent.

Melittis Melissophyllum. — Col de Tégime, Regetti.

Salvia Sclarea. — Venzolasca.

Acanthus mollis. — Vescovato.

Daphne Laureola. — Incudine.

Aristolochia Clematitis. — Padulella.

Euphorbia dulcis. — Forêt de Barrocaggio.

Ornithogalum pyrenaicum. — Entre Cervione et San Nicolao.

Gladiolus segetum. — Regetti.

Orchis laxiflora. — San Gavino di Carbini.

Limodorum abortivum. — Col de Tégime.

Cephalanthera rubra. — Regetti.

Fuirena pubescens. — Caldaniccia.

Brachypodium pinnatum. — Route de Zonza à San Gavino di Carbini.

Piptatherum paradoxum. — Mon attention a été attirée sur cette plante par M. Delacour, et j'ai constaté que la presque totalité des échantillons récoltés dans la région d'Ajaccio, comme *Piptatherum multiflorum*, se rapportent au type *P. paradoxum*, caractérisé par les épillets de la base de l'inflorescence stériles.