gebracht, verascht, zerrieben, in einer Platinschale mit wenigen Tropfen Wasser befeuchtet und mit 2 ccm starker Schwefelsäure versetzt. Beim Zudecken mit einem Uhr-
glase und Erwärmen trat starke Ätzung des Glases ein. Zur quantitativen Bestimmung in 360 g Eingeweideteilen wurde die Kieselfluorwasserstoffsäure mit 60/o-igem Alkohol erschöpfend ausgezogen, der Auszug mit Petroläther entfettet und schließlich auf 800 ccm gebracht; hiervon wurden 200 ccm mit Ammoniak versetzt und im Wasserbade eingedampft, der Rückstand wurde verascht und in üblicher Weise die Kieselsäure bestimmt; erhalten wurden 0,081 g Kieselsäure, entsprechend 0,194 g Kieselfluorwasserstoffsäure, entsprechend 1,33 g freier Kieselfluorwasserstoffsäure in der übergebenen Gesamtmenge der Eingeweideteile von 620 g. Fluorverbindungen lassen sich im übrigen in Leichenteilen leicht durch Einäschern unter Zusatz von Soda und Ätzprobe auf Glas nachweisen.

J. Großfeld.

J. Rosenbloom: Die Nichtbeeinflussung der „Ptomaine“ durch gewisse Morphinreaktionen. (Journ. Biol. Chem. 1914, **18**, 131—132.) — Verf. hat bereits früher (*Z.* 1917, **33**, 361) nachgewiesen, daß die bei der Fäulnis menschlicher Organe auftretenden bakteriellen Zersetzungsstoffe keine Reaktionen geben, die denen des Morphins ähneln, und daß daher der Nachweis von Morphin durch die Gegenwart von Fäulnisstoffen nicht gestört wird. Verf. hat nunmehr Gehirn, Herz, Lungen, Magen, Leber und die Beinmuskeln einer Leiche untersucht, die bereits 13 Monate in der Erde gelegen hatte. Wurde schwefelsaures Morphin zugesetzt, so konnte es in diesen Leichenteilen ohne weiteres nachgewiesen werden. *Max Müller.*

R. Heller: Eine neue optische Methode zur Auffindung von Spermaspuren. (Viertelj. gerichtl. Med. u. öff. Sanitätsw. 1915, **50**, 37—42.) — Die neue Untersuchungsmethode zur Auffindung von Samenspuren gründet sich auf die Tatsache, daß Eiweißkörper unter dem Einflusse ultravioletten Lichtes fluorescieren. Trotzdem dieses Fluoreszenzlicht recht stark ist, kann es nur wahrgenommen werden, wenn die sichtbaren Strahlen der Lichtquelle wenigstens zu einem großen Teile durch geeignete „Strahlenfilter“ absorbiert werden, welche für kurzwellige Strahlen in genügendem Maße durchlässig sind. Als geeignetes Filter hat sich in Kombination mit Farbgläsern insbesondere das von Wood eingeführte Nitrosodimethylanilin als sehr wertvoll erwiesen. Im Anschluß an die Untersuchungen von Wood hat Lehmann durch gleichzeitige Verwendung von Nitrosodimethylanilin mit einer Kupfersulfatlösung, die in einer Doppelcuvette aus Jenaer Blauviolglas in den Gang der Lichtstrahlen eingeschaltet werden, eine für Erzeugung von Fluoreszenz leistungsfähige Anordnung geschaffen. Das Lehmann'sche „U. V.-Filter“ läßt Strahlen im Gebiete von ungefähr 300—400 μ in genügendem Maße durch, während höhere Wellenlängen fast vollständig absorbiert werden. Zur Erregung fluoreszenzfähiger Körper wird das von einer an ultravioletten Strahlen reichen Lichtquelle (z. B. Nickellichtkohlen) ausgesandte Licht durch das U. V.-Filter geschickt. Wird der Untersuchungsgegenstand in den von einer Quarzlinse erzeugten Strahlenkegel der „U. V.-Filterlampe“ gebracht, so läßt sich seine Fluoreszenz im verdunkelten Versuchsraum gut beobachten. Die Überlegenheit der Fluoreszenzmethode gegenüber den anderen Verfahren der Voruntersuchung wird besonders an Proben augenfällig, an welchen sich ganz unscheinbare und spärliche Spuren befinden.

Max Müller.

M. Freund und E. Speyer: Beitrag zur Kenntnis des Morphins. (Ber. Deutsch. Chem. Ges. 1915, **48**, 497—502.)

Milch und Käse.

Alfred Hildebrandt: Untersuchung von Stutenmilch. (Milchwirtsch. Zentralbl. 1917, **46**, 273—278, 289—293, 303—310 u. 315—319.) — Unter kritischer Besprechung der in Frage kommenden Untersuchungsverfahren und Beifügung der

mittleren Zusammensetzung der Milcharten anderer Tiere zwecks Vergleiches werden eine Anzahl von Stutenmilchanalysen mitgeteilt, die wegen der verhältnismäßigen Seltenheit derartiger Untersuchungen und wegen der Schwierigkeit in der Beschaffung von Stutenmilch von nicht unerheblichem Wert sind. In der nachfolgenden Tabelle sind die erhaltenen Werte zusammengestellt, berechnet nur die Werte für Wasser, fettfreie Trockensubstanz und Milchzucker. Untersucht wurde die Milch vor und nach dem Säugen des Füllens, bezeichnet als „Vormilch“ (a) und „Nachmilch“ (b), die wie ersichtlich keine regelmäßigen Unterschiede zeigten.

Nr.	Datum	Spezif. Gewicht		Trockensubstanz %		Fett ¹⁾ %		Fettfreie Trockensubstanz %		Asche %		Stickstoff %		Eiweißstoffe %		Milchzucker %		Peroxyd-Reaktionsstärke	
		a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b
1	5.4.	1,0380	1,0365	10,00	9,81	0,60	1,00	9,40	8,81	0,39	0,41	0,36	0,36	2,19	2,19	6,22	5,21	0	0
2	7.4.	1,0327	1,0296	9,45	9,33	0,20	1,30	9,25	8,03	0,39	0,40	0,35	0,33	2,13	2,01	6,53	4,32	0	0
3	5.4.	1,0390	—	10,30	—	0,90	—	9,40	—	0,61	—	0,44	—	2,67	—	6,12	—	II	—
4	7.4.	1,0332	—	10,90	—	1,90	—	9,00	—	0,55	—	0,37	—	2,25	—	6,20	—	II-III	—
5	13.4.	1,0385	—	11,20	—	1,55	—	9,65	—	0,61	—	0,48	—	2,91	—	6,14	—	0	—
6	14.4.	1,0352	1,0341	11,85	12,03	3,35	3,40	8,50	8,63	0,71	0,74	0,43	0,43	2,61	2,61	5,18	5,23	0	0
7	17.4.	1,0376	1,0381	9,59	9,74	0,30	0,35	9,29	9,39	0,51	0,51	0,37	0,39	2,25	2,37	6,53	6,51	0	0
8	19.4.	1,0377	1,0377	10,56	10,58	1,50	1,25	9,06	9,33	0,49	0,49	0,39	0,36	2,37	2,19	6,20	6,65	I	I
9	26.4.	1,0348	1,0357	10,49	10,46	0,75	0,80	9,74	9,66	0,49	0,49	0,49	0,45	2,97	2,73	6,28	6,44	0	0
10	29.4.	1,0357	1,0357	10,30	10,23	1,05	1,05	9,25	9,18	0,43	0,47	0,38	0,36	2,31	2,19	6,51	6,52	0	I
11	5.5.	1,0366	1,0366	10,22	9,90	1,25	1,15	8,97	8,75	0,44	0,44	0,37	0,37	2,25	2,25	6,28	6,06	II	I
12	9.5.	1,0382	1,0382	9,77	9,79	0,70	0,65	9,07	9,14	0,42	0,43	0,39	0,39	2,37	2,37	6,28	6,34	III	III ²⁾
13	10.5.	1,0382	1,0382	9,84	9,82	0,65	0,65	9,19	9,17	0,43	0,43	0,42	0,42	2,55	2,55	6,21	6,19	III	III ²⁾
14	16.5.	1,0370	1,0370	9,13	9,17	0,60	0,65	8,53	8,52	0,35	0,35	0,34	0,32	2,06	1,94	6,12	6,23	0	0
15	22.5.	1,0391	1,0340	8,97	10,57	0,20	1,25	8,77	9,32	0,42	0,54	0,36	0,34	2,19	2,06	6,16	6,72	II	III
16	26.5.	1,0366	1,0356	8,84	9,53	0,30	1,00	8,54	8,53	0,34	0,34	0,31	0,33	1,88	2,00	6,32	6,19	0	0
17	30.5.	1,0360	1,0370	9,65	10,06	0,55	0,70	9,10	9,36	0,39	0,41	0,37	0,37	2,25	2,25	6,46	6,70	0	0
18	6.6.	1,0380	1,0390	9,52	9,66	0,25	0,10	9,27	9,56	0,40	0,40	0,32	0,32	1,94	1,94	6,93	7,22	0	0
19	7.6.	1,0390	1,0360	9,62	9,92	0,60	0,55	9,02	9,37	0,41	0,40	0,38	0,37	2,31	2,25	6,30	6,72	0	0
20	15.6.	1,0390	1,0390	9,07	9,16	0,10	0,20	8,97	8,96	0,38	0,39	0,35	0,34	2,12	2,06	6,47	6,51	0	0
21	22.6.	1,0360	1,0360	10,09	10,02	0,25	0,50	9,84	9,52	0,34	0,32	0,32	0,32	1,94	1,94	7,56	7,26	0	0

J. Großfeld.

A. Weich und L. Wilk: Abnorme Milch. (Arch. Chem. u. Mikrosk. 1917, 10, 45—47.) — Als Stallprobe entnommene anormale Milch von einer trächtigen Kuh zeigte folgende Zusammensetzung: Milchertrag $\frac{3}{4}$ l, spezifisches Gewicht 1,0242, Fett 2,10%, Milchzucker 2,81%, stickstoffhaltige Substanz 3,07%, Refraktionszahl 32,4, Nitratreaktion negativ, Asche 0,76%, Trockensubstanz (gewichtsanalytisch) 8,78%, Säuregrade nach Soxhlet-Henkel 2,4°. Das Chlorkaliumserum nach der Vorschrift von Ackermann war nicht herzustellen, sondern erst bei Anwendung der doppelten Menge der vorgeschriebenen Chlorkaliumlösung. Die Milch machte den Eindruck einer alkalisch gemachten, wie die Probe mit Alizarin und Rosolsäure anzeigte. Mikroskopisch konnte das Vorhandensein weder von Eiter noch von Streptokokken nachgewiesen werden, sodaß auch nicht auf eine Eutererkrankung der Kuh geschlossen werden konnte.

J. Großfeld.

¹⁾ In dem Fett wurde die Verseifungszahl zu 256, die Jodzahl bei dem aus der Trockensubstanz gewonnenen Fett zu 29,8, bei auf nassem Wege, durch Ausschütteln mit Äther aus alkalischer Milchlösung gewonnenen, zu 33,13 gefunden.

²⁾ Mehr rotviolett gegenüber blauviolett bei Kuhmilch.

Heinrich Poda: Die Beurteilung der kondensierten Milch vom Standpunkte des Lebensmittelgesetzes und ihre Wertbestimmung. (Arch. Chem. u. Mikrosk. 1916, 9, 103—107.) — Kondensierte Milch ist nach Verf. als gefälscht anzusehen, wenn 1. die nach der Gebrauchsanweisung durchgeführte Verdünnung eine Flüssigkeit ergibt, welche in ihrer Zusammensetzung einer gewässerten bzw. mit Zuckerwasser gestreckten Milch gleichkommt, 2. die zur Herstellung der Konservé verwendete Milch ganz oder teilweise abgerahmt war. Zum Nachweise dieser Fälschungen genügt in der Regel die Ermittlung des Gehaltes an Fett, Trockensubstanz und Rohrzucker. Eine Untersuchung von Handelsproben ergab, daß diese sämtlich hiernach als gefälscht zu bezeichnen waren. Ihr Wert ergibt sich aus dem Gehalte an Milchtrockensubstanz und Rohrzucker; der Preis der Präparate steht im Kleinverkehre etwa 3—5-mal höher als ihr Wert. Aus diesen Gründen ist nach Verf. ihre Einschränkung im Verkehre zu wünschen.

J. Groffeld.

H. Mohorec: Über das Verhalten einiger chemischer Substanzen bei der Milchkonservierung. (Arch. f. Hygiene 1916, 86, 254—262.) — Um den Säuregrad, der bei der freiwilligen Gerinnung der Milch beobachtet wird, bei Gegenwart verschiedener Konservierungsmittel (Natriumsalicylat, Natriumbenzoat, Benzoesäure, Borsäure, Soda, Borax, Formaldehyd) zu bestimmen, versetzte Verf. Milchproben mit verschiedenen Mengen der Konservierungsmittel, überließ sie der Säuerung und bestimmte täglich den Säuregrad. Die Ergebnisse sind in nachstehender Tabelle enthalten.

Zusatz zur Milch	Geronnen nach Tagen	Säuregrade bei der Gerinnung	Zusatz zur Milch	Geronnen nach Tagen	Säuregrade bei der Gerinnung
Ohne Zusatz	4	32	Ohne Zusatz	4	31
0,047 % Natriumsalicylat	8	31	0,042 % Soda (Na_2CO_3)	5	32
0,071 " "	10	30	0,090 " "	5	32
0,118 " "	15	30	0,179 " "	5	35
Ohne Zusatz	4	32	0,270 " "	7	36
0,063 % Natriumbenzoat	7	33	0,359 " "	8	39
0,126 " "	9	31	0,448 " "	8	39
0,189 " "	9	30	0,539 " "	10	40
0,252 " "	10	30	Ohne Zusatz	3	35
Ohne Zusatz	3	32	0,106 % Borax	7	41
0,104 % Benzoesäure	5	36	0,213 " "	11	52
Ohne Zusatz	5	31	0,305 " "	16	62
0,045 % Borsäure	5	33	Ohne Zusatz	2	34
0,135 " "	7	42	0,0004 % Formaldehyd	3	34
0,224 " "	8	45	0,0008 " "	3	33
0,314 " "	10	52	0,0013 " "	4	35
			0,0017 " "	5	34
			0,0021 " "	5	34

Die scheinbare Erhöhung des Säuregrades zur Zeit der Gerinnung beim Zusatz einer Säure rührt nur von der Steigerung der Acidität infolge des Säurezusatzes her. Die für Soda und Borax gefundenen Werte des Säuregrades sind durch das Verhalten beim Titrieren gegen Phenolphthalein, bzw. den Kohlensäuregehalt der Milch zu erklären. Eine wirkliche Erhöhung des Säuregrades bei der mit Konservierungsmitteln versetzten Milch wurde nicht beobachtet; die Gerinnbarkeit der Milch bleibt bei Zusatz nicht zu großer Mengen des Konservierungsmittels unverändert; das Konservierungsmittel verzögert nur bis zu einem gewissen Grade das Gerinnungsvermögen und verschleiert das Verdorbensein der Milch.

G. Sonntag.

G. Singer: Die Konservierung der Marktmilch mit Wasserstoff-superoxyd. (Arch. f. Hygiene 1917, **86**, 263—273.) — Die Versuche wurden derart ausgeführt, daß zu 100 ccm Milch die entsprechende Menge Wasserstoffsuperoxyd zugesetzt wurde. Die Milch wurde jeden Morgen wenige Stunden nach dem Melken verarbeitet. Der Zusatz von 1,5 ccm 10 %-iger Wasserstoffsuperoxydlösung zu 1 l Milch verhindert das Wachstum pathogener Keime und Säurebildner. Auch 0,8 ccm verhüten noch die Entwicklung pathogener Mikroorganismen. Bei geringeren Mengen aber, und zwar bei einem Zusatz von 0,3 ccm Wasserstoffsuperoxydlösung auf 1 l Milch, gedeihen außer Dysenterie alle pathogenen und nichtpathogenen Keime bei 22° schon innerhalb 24 Stunden gut, während dieselbe Menge Wasserstoffsuperoxyd schon genügt, die spontane Gerinnung innerhalb dieser Zeit zu verhüten. Mit Rücksicht auf die geringe Haltbarkeit der Wasserstoffsuperoxydlösungen muß die allgemeine Einführung des sonst wirksamen Verfahrens Bedenken erregen.

G. Sonntag.

Grimmer und E. Urbchat: 1. Über die Bestimmung des Milchzuckers. 2. Über Caseinbestimmungen. (Milchwirtsch. Zentralbl. 1917, **46**, 257—259.) — Vergleichende Versuche, das Milchprotein zwecks Milchzuckerbestimmung durch Fällung mit Kupfersulfat und Natronlauge nach Ritthausen oder nach einem neuen Gedanken mit kolloidalem Eisenhydroxyd niederzuschlagen, ergaben, wie aus den mitgeteilten 43 Analysen an Kuhmilch und Ziegenmilch hervorgeht, gute Übereinstimmung. Von der kolloidalen Eisenhydroxydlösung, die 4,91 % kolloidal gelöstes Ferrihydroxyd enthielt, wurde aus einer Bürette zu 25 ccm Milch, mit Wasser auf 400 ccm gebracht, soviel Eisenlösung zugegeben, bis die überstehende Flüssigkeit wasserklar erschien. In der Regel waren 17—18 ccm Eisenlösung erforderlich; zugesetzt wurden fast immer 20 ccm, in einzelnen Fällen auch 22 ccm. Zu der Mischung wurden 10 ccm einer kaltgesättigten Natriumfluoridlösung hinzugefügt, auf 500 ccm aufgefüllt und in üblicher Weise weiter verfahren. — Versuche, das Casein durch Fällung mit Eisenaunlösung bekannten Gehaltes und jodometrische Rücktitration des Eisenüberschusses zu bestimmen, ergaben noch keine durchaus zuverlässigen Resultate, wahrscheinlich infolge eines methodischen Fehlers noch unbekannter Art.

J. Großfeld.

L. L. van Slyke und A. W. Bosworth: Die Ursache der Acidität der frischen Milch und ein Verfahren zur Bestimmung der Acidität. (Journ. Biol. Chem. 1914, **19**, 73—76.) — Die Acidität frischer Milch ist zurückzuführen auf das Vorhandensein saurer Phosphate, die sich wegen des Vorhandenseins der gelösten Kalksalze nicht titrieren lassen, da das sich bildende neutrale Dicalciumphosphat hydrolysiert und weiter zu Tricalciumphosphat umgesetzt wird. Dieses entzieht sich der Titration, weil es unlöslich ist, dagegen wird die gebildete Phosphorsäure mittitriert, wodurch der Säuregrad der Milch größer erscheint, als er in Wirklichkeit ist. Die Verff. machen deshalb den Vorschlag, die störenden Kalksalze durch Kaliumoxalat zu entfernen und hierauf zu titrieren. Sie verfahren dabei folgendermaßen: 100 ccm Milch werden mit 50 ccm destilliertem Wasser und 2 ccm einer gesättigten Lösung von neutralem Kaliumoxalat versetzt und frühestens nach 2 Minuten mit $\frac{1}{10}$ N.-Natronlauge unter Zusatz von Phenolphthalein titriert. Die Kaliumoxalatlösung muß vor der Verwendung auf ihre Reaktion geprüft und — wenn nötig — neutralisiert werden. Die Wirkung dieser Behandlungsweise an 21 Milchproben von einzelnen Kühen, die einmal ohne, das andere Mal mit Kaliumoxalat titriert worden waren, war folgende: Es wurden verbraucht Kubikzentimeter $\frac{1}{10}$ N.-Natronlauge für 100 ccm Milch:

Probe	Ohne Oxalatzusatz	Nach Oxalatzusatz	Probe	Ohne Oxalatzusatz	Nach Oxalatzusatz
1	15,0	6,4	12	18,4	9,6
2	15,2	7,0	13	18,4	9,4
3	15,6	6,8	14	18,6	9,4
4	16,0	6,8	15	18,6	9,4
5	17,0	8,0	16	19,0	9,4
6	17,0	8,0	17	19,2	10,0
7	17,2	8,0	18	19,4	10,4
8	17,6	9,0	19	20,0	9,8
9	17,8	8,8	20	22,0	12,8
10	18,0	9,0	21	23,8	14,0
11	18,2	9,6			

Max Müller.

H. Kreis: Veränderung der Lichtbrechung bei der Aufbewahrung der Milch. (Bericht über die Lebensmittelkontrolle im Kanton Basel-Stadt 1917, 31—33.) — Die Milch einer Kuh war als gewässert befunden worden, und die Vergleichung mit zwei Stallproben, die innerhalb vier Tagen erhoben worden waren, bestätigte diesen Verdacht. Die Untersuchung der drei Milchproben ergab:

	Milch vom	2. August	4. August	6. August
Spezifisches Gewicht (Grade) . . .		27,8	32,4	32,1
Fett		3,06 ‰	2,77 ‰	2,76 ‰
Trockenmasse		10,97 „	11,50 „	11,49 „
Fettfreie Trockenmasse		7,93 „	8,73 „	8,73 „
Refraktionszahl des Serums . . .		37,0	39,1	38,8

Es wurde ein Obergutachten verlangt, und infolge verschiedener Umstände verstrichen nahezu vier Wochen, bis der Obergutachter in der Lage war, die mit 1 ‰ Formalin konservierten und im Keller aufbewahrten Milchproben zu untersuchen. Dabei ergab sich, daß trotz dem Formalinzusatz eine beträchtliche Milchsäurebildung stattgefunden hatte. Die beanstandete Milch hatte den Säuregrad 14,6, die erste Stallprobe 14,0, die zweite 11,0. Es war aber keine Probe geronnen. Es war also zu erwarten, daß auch die Refraktionszahlen verändert sein würden; aber es stellte sich nun die merkwürdige Tatsache heraus, daß die Refraktionszahl der gewässerten Milch von 37,0 auf 39,2 gestiegen war, während sich die Refraktionszahlen der Stallproben nur unwesentlich verändert hatten. Daß aber trotzdem nicht etwa bei der ersten Bestimmung der Refraktionszahl ein Irrtum vorgekommen war, konnte nachträglich mit Sicherheit bewiesen werden. Schon die Tatsache, daß die beanstandete Milch das spezifische Gewicht 27,8 und die fettfreie Trockenmasse 7,93 ‰ aufwies, war mit der Annahme einer Refraktionszahl von 39 nicht in Einklang zu bringen. Ferner konnte durch die Untersuchung des Serums nach Pfyl und Turnau, welches wenigstens innerhalb gewisser Grenzen vom Säuregehalt der Milch nicht beeinflusst wird, gezeigt werden, daß die Refraktionszahl der beanstandeten Milch (42,5) niedriger war, indem für die beiden Stallproben 43,5 und 43,5 gefunden wurden. Endlich ergab die Aschenbestimmung durch den Obergutachter für die beiden Stallproben 0,71 ‰ und 0,69 ‰, für die beanstandete Milch aber nur 0,61 ‰. — Um nun auch noch direkte Beweise dafür zu haben, daß Milch, mit 1 ‰ Formalin konserviert, sich ohne zu gerinnen bei längerem Aufbewahren so verändern kann, daß die Refraktionszahlen wesentlich zunehmen, sind konservierte Milchproben während mehrerer Wochen im Keller aufbewahrt und hernach davon die Refraktionszahlen bestimmt worden. Die dabei gefundenen Refraktionszahlen sind folgende:

Milch	21. Aug.	27. Sept.	Milch	4. Sept.	27. Sept.	Milch	8. Nov.	14. Dez.
Nr. 1	38,0	39,7	Nr. 3	37,4	38,0	Nr. 5	34,1	36,7
„ 2	37,9	39,2	„ 4	37,0	38,8	„ 6	39,2	40,9

Die beiden letzten Proben sind besonders interessant, weil eine Milch mit etwa 25 % Wasserzusatz nebst Stallprobe vorliegt und auch in diesem Falle das Serum der beanstandeten Probe sich weit stärker verändert hat, als das der Stallprobe. Offenbar handelt es sich hier um die peptonisierende Wirkung von Bakterienenzymen, welche Spaltungsprodukte des Caseins erzeugen, die durch die Chlorcalciumlösung nicht mehr fällbar sind.

C. Mai.

Orla Jensen: Über die Milchsäurebakterien und ihre Identifizierung. (Zeitschr. Gärungsphys. 1915, 5, 10—16.) — Das erste was man zu tun hat, ist festzustellen, ob der vorliegende Organismus wirklich eine echte Milchsäurebakterie ist, d. h. eine gram-positive unbewegliche Bakterie, die aus den Kohlenstoffquellen vornehmlich Milchsäure bildet. Man muß ferner auch die Art der Milchsäure feststellen. Nach Untersuchungen des Verf's. bildet eine bestimmte Milchsäurebakterie stets die gleiche Art von Milchsäure, die Energiequellen mögen Alkohole, Aldosen oder Ketosen, Pentosen, Hexosen oder Polysaccharide sein. Ebenso genau wie man das Verhalten der Bakterien gegen die Kohlenstoffquellen bestimmt, muß man auch ihr Verhalten den Stickstoffquellen gegenüber präzisieren. Ohne Gegenwart von Zucker geschieht dies am einfachsten mittels der von Sörensen ausgearbeiteten Formoltitrierung. Das erste Merkmal zur Identifizierung einer Milchsäurebakterie ist die Art und Weise, in welcher sie ihre Nährstoffe und Energiequellen verwertet. Als zweites Merkmal kommt dann in Betracht, welche verschiedenen Stickstoff- und Kohlenstoffquellen sie auszunutzen imstande ist. Als weiteres Merkmal ist noch die Minimal- und Maximaltemperatur des Wachstums zu erwähnen.

P. Neumann.

F. Duchacek: Über *Bacillus paralacticus*. (Biochem. Zeitschr. 1917, 82, 31—47.) — Metschnikoff hat für Medizinalpräparate eine Milchsäurebakterie *Bacillus paralacticus* empfohlen, die in Reinkultur gezüchtet von der Gesellschaft „Le Ferment“ in Paris unter der Bezeichnung „Lactobacilline“ in den Handel gebracht wird. Aus dieser „Lactobacilline“ isolierte Verf. einen coccusartigen *Bacillus*, der kaum $\frac{1}{4} \mu$ lang ist, der auf Agar bei 40° durchscheinende winzige Kolonien mit glattem Rande, ähnliche auch auf Gelatine, die durch ihn nicht verflüssigt wird, bildet. In der Bierwürze wächst er nicht; die Milch koaguliert er in ganzer Masse gleichmäßig porzellanartig; das Gerinnsel wird auch nach längerem Aufbewahren (2 Monate) nicht gelöst, denn das Casein wird von dem Bakterium überhaupt nicht angegriffen. In der Milch ohne jeden Zusatz werden höchstens 0,6—0,7 % Milchsäure erzeugt, die Zuckerverluste betragen nur höchstens 16—17 %, die völlig als Milchsäure wieder gefunden werden. Wird die schädliche Einwirkung der entstehenden Milchsäure durch indifferente Neutralisierungsmittel aufgehoben, so wird die Lebensdauer des *Bacillus* verlängert; die Zuckerverluste überstiegen selbst nach 4 Monaten nicht 50 %, weil das Gerinnsel oberhalb des Neutralisierungsmittels (Calciumcarbonat) einen Säuregrad besitzt und behält, der für den *B. paralacticus* viel zu hoch ist und weitere Milchsäuregärung hemmt. Viel besser als Milch entspricht eine vom Verf. vorgeschlagene Nährlösung — peptonisierter Malzkeimextrakt mit Lactose, Glykose oder Galactose und gefälltem kohlensaurem Kalk — den Anforderungen des *Bacillus*, denn die Neutralisation der schädlichen freien Säuren erfolgt hier bedeutend leichter als in der Sauermilch; der Säuregrad der Lösung erreicht nie die dem Bakterium gefährliche Grenze, es behält daher seine Aktivität bis zur völligen Erschöpfung des Nährmediums, vergärt die Gesamtmenge der Lactose, Glykose und Galactose und verschont nicht einmal die geringe Menge jener reduzierenden Zucker — vorwiegend Maltose — die durch Extrak-

tion der Malzkeime in die Nährlösung gelangen. Aus den Versuchen ließ sich folgern, daß der *Bacillus* die Lactose in Milchsäure direkt vergärt, oder es werden die durch Hydrolyse gebildeten Monosaccharide zu Milchsäure ebenso schnell gespalten wie sie entstanden sind. Die Gesamtmenge des Zuckers wird in d-Milchsäure übergeführt; als Nebenprodukte erscheinen die flüchtigen Säuren, Essig- und Ameisensäure in Mengen, die 4,6% der Gesamt-Säure entsprechen; von diesen entfallen 4,2% auf Essigsäure und 0,4% auf Ameisensäure. Alkohol, Aceton, Bernsteinsäure, Acetyl-methylcarbinol und 2-, 3-Butylenglykol konnten nicht festgestellt werden. In den Mischkulturen mit *Bac. bulgaricus* unterliegt der *Bac. paralacticus* sehr bald; die rasch steigende Acidität des Nährsubstrates bedroht die Existenz einer jeden anderen Milchsäurebakterie, sodaß schließlich immer *Bac. bulgaricus* Sieger bleibt. *Max Müller.*

H. C. Lythgoe: Die Zusammensetzung von Mustermilch bei der Untersuchung von Proben bekannter Reinheit durch das Gesundheitsamt von Massachusetts. (*Journ. of Ind. and Engin. Chem.* 1914, 6, 899–908; *Chem. Zentralbl.* 1915, I, 849.)

Klein und Klose: Butterungsversuche zum Zwecke der näheren Ermittlung und Begrenzung des vom jeweiligen Säuerungsgrade und Fettgehalt des Rahms sowie der verschiedenen Füllung des Butterungsgerätes auf den Butterungsvorgang ausgeübten Einflusses. (*Milchw. Zentralbl.* 1917, 46, 211–217.)

R. Eichloff: Maßnahmen für die höchste Butterausbeute. — Die Rahmreife. (*Milchw. Zentralbl.* 1917, 46, 225–228, 278–282 u. 353–358.)

G. Tellera: Systematische Untersuchungen über die Steigerung der fettfreien Trockensubstanz beim Abrahmen von Milch. (*Boll. Chim. Farm.* 1914, 53, 358–365; *Chem. Zentralbl.* 1915, I, 268.)

J. W. Leather: Der Nachweis der Wässerung von Milch. (*Analyst* 1915, 39, 432; *Chem. Zentralbl.* 1915, I, 573.)

P. N. van Eck: Eine empfindliche Reaktion auf Chromate. (*Chem. Weekblad* 1915, 12, 6–8; *Chem. Zentralbl.* 1915, I, 399.)

Konservierungsmittel.

F. Johannessohn: Der Einfluß des Formaldehyds auf die Eiweißverdauung. (*Biochem. Zeitschr.* 1917, 83, 28–41.) — Verf. hat die Einwirkung des Formaldehyds auf die Fermente selbst und auf Eiweiß in Betracht gezogen. Zur Untersuchung verwandt wurde eine von Schering bezogene Formalinlösung. Als Fermente wurden das Pepsin Finzelberg und das Trypsin Merck sowie das Trypsinogenum activatum der Gesellschaft Pharmakon benutzt. Das Pepsin Finzelberg wurde durch eintägige Einwirkung selbst 10%-iger Formaldehydlösungen in seiner Wirksamkeit nicht gestört. Die Pankreaspräparate werden verschieden stark geschwächt; das Trypsinogenum act. wurde durch 1/20%-iges, das Trypsin Merck dagegen erst durch 1% Formaldehyd unwirksam. Hühnereiweiß wurde schon nach 9-tägiger Einwirkung von 1%-iger Formaldehydlösung fast unverdaulich für Pepsinsalzsäure, während es vom Trypsin noch zu 4/5 verdaut wurde. Die widersprechenden Ergebnisse verschiedener Forscher über den Einfluß des Formaldehyds auf die Eiweißverdauung hängen sicherlich von der Verschiedenheit der benutzten Fermentpräparate, zum Teil aber auch von der verschiedenen Beschaffenheit der angewandten Formaldehydlösung (vorhandene Ameisensäure) ab. Als praktische Folgerung aus den Versuchen ergibt sich, daß das Formaldehyd auf jeden Fall die Eiweißverdauung schädigt, entweder durch Schädigung des Fermentes (Trypsin) oder durch Beeinflussung des Eiweißes, das dann für das Ferment (Pepsin) unangreifbar wird. Bei der Verwendung des Formaldehyds als Frischerhaltungsmittel dürften beide Möglichkeiten vorliegen, da durch Aufnahme-derartig konservierter Nahrungsmittel ein Überschuß von freiem Formaldehyd wohl in den Verdauungskanal mit hineingelangen könnte. *Max Müller.*