Untersuchungen über das Narceïn;

von *Martin Freund*.

(Erste Abhandlung; mitbearb. von *G. B. Frankforter*) ¹⁾.

[Mittheilung aus der chem. Abtheilung des pharmakol. Instituts zu Berlin.]

(Eingelaufen am 16. Juni 1893.)

Das Narceïn, welches Pelletier²⁾ im Jahre 1832 im Opium auffand, ist nur wenigmal zum Gegenstand chemischer Forschung gemacht worden. Nachdem sowohl der Entdecker, wie auch später Couerbe³⁾ Formeln für dasselbe aufgestellt hatten, gelangte Anderson⁴⁾ auf Grund seiner Analysen der Base, ihres Chlorhydrats und Platindoppelsalzes zu der Zusammensetzung:

welche von allen späteren Bearbeitern des Narceïns, insbesondere von Hesse⁵⁾, Beckett und Wright⁶⁾, Claus und Meixner⁷⁾ bestätigt worden ist.

Das Narceïn ist eine tertiäre Base; Beckett und Wright⁸⁾ beschreiben ein Jodäthylat, welches bei der Digestion mit Silberoxyd eine Ammoniumbase lieferte, die beim Erhitzen mit Alkali wieder Narceïn ergab. Claus und Ritzefeld⁹⁾, welche sich eingehend mit dem Studium der Halogenalkyladditionsproducte beschäftigt haben, bestätigen die letzterwähnte Beobachtung

¹⁾ Der Antheil des Herrn Frankforter an der vorliegenden Abhandlung ist aus dessen Inaug.-Dissert., Berlin 1893: „Beitrag zur Kenntniss des Narceïns“ ersichtlich.

²⁾ Diese Annalen **5**, 163.

³⁾ Diese Annalen **17**, 171.

⁴⁾ Diese Annalen **86**, 182.

⁵⁾ Diese Annalen **129**, 250.

⁶⁾ Journ. chem. Soc. **28**, 699.

⁷⁾ Journ. f. prakt. Chem. **37**, 1.

⁸⁾ Journ. chem. Soc. **28**, 699.

⁹⁾ Ber. d. deutsch. chem. Ges. **18**, 1571.

von Beckett und Wright nicht. Sie fanden, dass jene Verbindungen, denen die allgemeine Formel:

zukommt, unter dem Einfluss von Alkalien in Alkylnarceïne:

übergehen und glauben demnach, dass Beckett und Wright nur jodwasserstoffsäures Narceïn in Händen hatten.

Oxydationsversuche sind mit dem Narceïn zuerst von Beckett und Wright¹⁰⁾ angestellt worden. Mit Kaliumdichromat und Schwefelsäure erhielten sie Methylamin und etwa 10 pC. Hemipinsäure; in ähnlicher Weise wirkt nach ihren Beobachtungen Eisenchlorid, sowie Braunstein und Schwefelsäure. Claus und Meixner¹¹⁾ gelangten bei der Behandlung von Narceïnsulfat mit Kaliumpermanganat zu der dreibasischen „Narceïnsäure“:

welche beim Erhitzen sich nach folgender Gleichung zersetzt:

Der Körper von der Formel $\text{C}_{12}\text{H}_8\text{O}_6$ wurde als eine Dioxynaphtalindicarbonsäure erkannt, welche durch Reduction mit Jodwasserstoff in eine Naphtalindicarbonsäure und schliesslich in Naphtalin verwandelt werden konnte.

Wir haben, um weitere Anhaltspunkte für die Constitution zu gewinnen, das Narceïn der Einwirkung starker Alkalien unterworfen und sind dabei zu wohlcharakterisirten Salzen gelangt. Dieselben leiten sich jedoch nicht von der von Anderson aufgestellten Formel:

sondern von einer um ein Molekül Wasser ärmeren Verbindung her, so dass dem Natriumsalze z. B. die Formel:

zukommt.

¹⁰⁾ Journ. chem. Soc. **29**, 467.

¹¹⁾ Journ. f. prakt. Chem. **37**, 1.

Auf die Richtigkeit der Anderson'schen Formel vertrauend, neigten wir anfangs der Ansicht zu, dass unter Wasserabspaltung aus dem Narceïn ein neuer Körper von der Zusammensetzung $C_{23}H_{27}NO_8$, das „Aponarceïn“, entstanden sei. Diese Auffassung schien durch die Thatsache bestätigt zu werden, dass bei der Zersetzung der Alkaliverbindung mit methylalkoholischer Salzsäure ein Chlorhydrat:

gewonnen werden konnte.

Auch die Einwirkung von Halogenalkylen auf das Natriumsalz führte zu Körpern, welche sich von einer solchen Base herleiten liessen. Dagegen wollte es nicht gelingen, der freien Base selbst habhaft zu werden. Beim Zersetzen der Natriumverbindung, sei es in wässriger, sei es in alkoholischer Lösung, wurde stets Narceïn gewonnen.

Die leichte Entstehung dieser Alkaliderivate führte zu einer Prüfung, ob die Reaction auf das Vorhandensein einer Carboxylgruppe zurückgeführt werden könne. In der That zeigte es sich, dass, wenn man jene Verbindungen, in einem Alkohol suspendirt, mit Chlorwasserstoff behandelt, dadurch Esterbildung hervorgerufen wird und Chlorhydrate neuer Basen

gebildet werden.

Bald ergab es sich, dass das Narceïn, für sich in dieser Weise behandelt, eben dieselben Körper liefert. Es musste also bei Zugrundelegung der Anderson'schen Formel auch hier die Abspaltung von einem Molekül Wasser angenommen werden.

Die erwähnten Reactionen sind jedoch auf einfachere Weise zu erklären. Zahlreiche weitere Analysen führten nämlich unzweifelhaft zu dem Ergebniss, dass dem Narceïn nicht die Formel

sondern die Zusammensetzung

zukommt. Das Ergebniss der mit der freien Base ausgeführten Analysen wurde durch die Untersuchung ihrer Salze vollauf bestätigt. Dieses überraschende Resultat musste die Aufmerksamkeit auf eine Verbindung hinleiten, welche Roser vor einigen Jahren aus dem Jodmethylat des Narcotins hergestellt hat. Durch Erhitzen desselben mit Alkali zerfällt es, indem eine Umlagerung vor sich geht, in folgender Weise:

Die neu entstandene Verbindung krystallisirt mit drei Molekülen Wasser und zeigte sich in allen äusseren Eigenschaften dem Narceïn so ähnlich, dass Roser anfangs glaubte, beide Körper für identisch halten zu müssen¹²⁾. Doch kam er von dieser Ansicht zurück, als sein Product sich physiologisch unwirksam erwies¹³⁾ und bei 100° getrocknet Werthe ergab, die der Zusammensetzung

entsprachen, während das Narceïn in den meisten Handbüchern als stark wirksame Substanz aufgeführt wird, und die Formel

für dasselbe hinlänglich bewiesen galt. Roser bezeichnete daher sein Product mit dem Namen: „Pseudonarceïn“¹⁴⁾.

Neue physiologische Untersuchungen des Narceïns haben aber ergeben, dass dasselbe in reinem Zustande durchaus nicht toxisch wirkt¹⁵⁾. Als nun der Beweis erbracht worden war, dass auch die alte Formel des Narceïns in

abzuändern ist, schien eine nochmalige Vergleichung von Narceïn und Pseudonarceïn geboten¹⁶⁾

Dieselbe hat sich auf eine grosse Anzahl von Derivaten

¹²⁾ Deutsches Reichspatent 44 890, Classe 12.

¹³⁾ Diese Annalen **254**, 357.

¹⁴⁾ Diese Annalen **247**, 167.

¹⁵⁾ v. Schröder, Arch. f. exper. Path. u. Pharmak. 1883, 132.

¹⁶⁾ Siehe auch: Merck, Chem.-Ztg. 1889, 525.

beider Körper erstreckt und zu dem Ergebniss geführt, dass an der Identität beider Substanzen nicht zu zweifeln ist.

Roser hat es unterlassen, für sein Pseudonarceïn eine Formel aufzustellen. Aber seine Forschungen über das Narcotin, welche durch die gleichzeitigen Untersuchungen über das Hydrastin ergänzt und bestätigt werden, führen ohne Schwierigkeit zu einem Schlusse in Betreff der Structur.

Unter Zugrundelegung der von Roser¹⁷⁾ für das Narcotin ermittelten Constitution und unter Berücksichtigung der beim Studium des „Methylhydrasteins“ gewonnenen Erfahrungen¹⁸⁾ kann sich die Umwandlung des Narcotinmethyljodids bei der Behandlung mit Alkali nur in folgender Weise vollziehen:

¹⁷⁾ Diese Annalen **254**, 357.

¹⁸⁾ Freund, diese Annalen **271**, 347 ff.

Das durch Formel I angedeutete Zwischenproduct ist bisher nicht isolirt worden; beim Hydrastin hingegen vollzieht sich die Reaction stufenweise, indem das Jodmethylat erst in das Methylhydrastin übergeht, welches durch Aufspaltung der Lactonbindung in Methylhydrasteïn verwandelt werden kann.

Mit dem Nachweise der Identität von Pseudonarceïn und Narceïn folgt auch für letzteres die durch Formel III wiedergegebene Constitution. Was die Stellung der Substituenden in dem zweiten Benzolkern betrifft, so ist diejenige der Seitenkette ohne weiteres gegeben, während für die Gruppen CH_2O_2 und CH_3O aus Roser's Untersuchungen benachbarte Lagerung hervorgeht. Macht man die Annahme, dass im Narcotin die Gruppe CH_2O_2 sich an derselben Stelle, wie im Hydrastin befindet¹⁹⁾, so bleiben für die Structur des Narceïns nur folgende Möglichkeiten:

Das Narceïn erscheint hiernach als substituirtes Phenylbenzylketon. Schon Beckett und Wright²⁰⁾ haben im Anschluss an ihre Arbeiten eine Vermuthung geäußert, deren Richtigkeit durch die vorliegende Arbeit erwiesen wird. Indem diese Forscher

¹⁹⁾ Freund, diese Annalen **271**, 346.

²⁰⁾ Journ. chem. Soc. **29**, 471.

Narcotin $C_{22}H_{23}NO_7$ Oxynarcotin $C_{22}H_{23}NO_8$ Narcein $C_{23}H_{29}NO_9$

mit einander verglichen, gelangten sie für jene drei Alkaloide zu folgender Auffassung:

Wenn diese Speculation auch in Bezug auf Narcotin sich irrig erwiesen hat, indem dieses nicht als Aldehyd, sondern als ein Lacton zu betrachten ist²¹⁾, so trifft sie doch völlig bei dem Narcein zu. Sie ist nur dahin zu berichtigen, dass der Rest $(C_{13}H_{20}NO_4)$ — entsprechend der neuen, für das Narcein aufgestellten Formel $C_{23}H_{27}NO_8$ — umzuwandeln ist in $(C_{13}H_{18}NO_3)$.

Beckett und Wright hatten keine Vorstellung über die Gruppierung der Atome in diesem Rest; die oben aufgestellte Constitutionsformel lässt denselben als mehrfach substituierte Benzylgruppe erscheinen.

Die von uns beobachteten Reactionen und auch eine ganze Reihe der von früheren Autoren gemachten Angaben erklären sich zwanglos mit jener Formel. Dieselbe enthält kein asymmetrisches Kohlenstoffatom, womit die von Hesse²²⁾ beobachtete Inactivität des Narceins übereinstimmt. Sie giebt befriedigende Erklärung für die Bildung von Hemipinsäure wie für das Auftreten von Dimethylamin und Trimethylamin bei der Oxydation. Die leichte Entstehung von Salzen mit Basen, sowie die Bildung von Estern beruht auf der Anwesen-

²¹⁾ Roser, diese Annalen **254**, 357.

²²⁾ Diese Annalen **176**, 199.

heit der Carboxylgruppe. Bei der Bestimmung der Methoxylgruppen haben wir, wie jene Formel es erfordert, das Vorhandensein von drei derselben festgestellt.

Die Anwesenheit einer Ketongruppe²³⁾ im Molekül des Narceïns liess sich durch Darstellung eines Phenylhydrazons und eines Oxims erweisen. In beiden Fällen wurden die Anhydroproducte gewonnen:

Narceïnphenylhydrazonanhydrid

Narceïnoximanhydrid.

Die letzte Verbindung wird durch Kochen mit Alkali leicht aufgespalten und geht dabei in das Narceïnoxim

über.

Während alle diese Reactionen im besten Einklange mit der für das Narceïn aufgestellten Formel stehen, giebt die letztere für die von Claus und seinen Schülern gewonnenen

²³⁾ Die folgend beschriebenen Versuche habe ich allein ausgeführt.

Resultate keine Erklärung. Zumal war es der von Claus und Ritzefeld²⁴⁾ beobachtete Uebergang der Narceïnhalogenalkyladditionsproducte in Alkylnarceïne:

welcher Zweifel an der Richtigkeit der neuen Formel erwecken musste. Die Versuche sind daher zum Theil wiederholt worden, haben aber zu anderen Ergebnissen geführt, welche die für das Narceïn geltend gemachte Auffassung vollauf bestätigen. Narceïn vereinigt sich mit Jodmethyl zu einem amorphen Additionsproduct, welches sich beim Kochen mit Kalilauge glatt in Trimethylamin und das Kaliumsalz einer neuen Säure, der „Narceonsäure“ spaltet:

Dieser Zerfall ist bei Zugrundelegung der für das Narceïn aufgestellten Structurformel ohne weiteres verständlich:

Was endlich die aus den Untersuchungen von Claus und Meixner²⁵⁾ hervorgehenden Beziehungen des Narceïns zum Naphtalin anbetrifft, so ist zu bemerken, dass man mit Hilfe jener Formel in einfacher Weise Derivate des Naphtalins construiren kann, z. B.

²⁴⁾ Ber. d. deutsch. chem. Ges. **18**, 1571.

²⁵⁾ Journ. f. prakt. Chem. **37**, 1.

Allerdings ist es nicht möglich, für die Bildung der dreibasischen Narceïnsäure und ihre Spaltung in Kohlensäure, Dimethylamin und Dioxynaphtalindicarbonsäure eine befriedigende Erklärung zu geben. Die geringe Ausbeute, welche Claus und Meixner erhalten haben, könnte die Vermuthung erwecken, dass die Narceïnsäure ihre Entstehung einer Verunreinigung des verarbeiteten Narceïns verdanke. Eine Wiederholung jener Versuche mit chemisch reinem Material wäre um so mehr erwünscht, als ich bei Verwendung eines solchen die in Frage kommende Verbindung nicht erhalten konnte.

Der durch die vorliegende Arbeit sicher erwiesene Uebergang von Narcotin in Narceïn giebt Veranlassung zu der Frage, ob letzteres in der That im Opium präexistirend vorhanden ist, oder etwa durch die bei der Verarbeitung üblichen Operationen das Narcotin theilweise in Narceïn verwandelt wurde. In der That lässt die Behandlung des Opiumextractes mit Chlorcalcium nach dem Verfahren von Robertson Gregory die Bildung von etwas Chlormethyl nicht unmöglich erscheinen, welch

letzteres, an Narcotin sich addirend, die Umwandlung desselben in Narceïn hervorrufen könnte.

Hingegen hat Pelletier die Isolirung des Alkaloïds nach einer anderen Methode²⁶⁾ bewerkstelligt, wobei eine derartige Reaction ausgeschlossen erscheint. Ebensovienig sind die Bedingungen für eine solche Umwandlung bei der Verarbeitung des Opiums nach der Vorschrift von E. Merck vorhanden, und dennoch ist auch hierbei das Auftreten jener Base nachgewiesen worden²⁷⁾.

Endlich spricht für die Präexistenz des Narceïns der Umstand, dass Winkler²⁸⁾ dasselbe aus den Kapseln des blausamigen Mohns durch blosses Extrahiren mit Alkohol gewonnen hat.

Herr Dr. Louis Merck in Darmstadt theilte mir gütigst mit, dass auch nach seinen jahrelangen im Fabrikationsbetrieb gemachten Beobachtungen an dem Vorkommen von Narceïn im Opium und in den Mohnkapseln nicht zu zweifeln ist.

Von den Opiumalkaloïden sind nunmehr drei ihrer Constitution nach erforscht: das Papaverin²⁹⁾, Narcotin³⁰⁾ und Narceïn. Die beiden ersten sind directe Abkömmlinge des Isochinolins, während das letztere zu demselben in gewisser Beziehung steht. Berücksichtigt man die Thatsache, dass auch Hydrastin³¹⁾ und Berberin³²⁾ Derivate des Isochinolins sind, so tritt uns die Bedeutung dieser Verbindung als Stammsubstanz von Pflanzenbasen deutlich vor Augen.

²⁶⁾ Siehe Gmelin-Kraut, Handbuch d. org. Chem. **4**, II, 1332.

²⁷⁾ Siehe Fehling's Handwörterbuch **4**, 676 (Hesse).

²⁸⁾ Gmelin-Kraut, Handbuch d. org. Chem. **7**, II, 1984.

²⁹⁾ Goldschmiedt, Monatsh. d. Chem. **6**, 667.

³⁰⁾ W. Roser, diese Annalen **254**, 357.

³¹⁾ M. Freund, diese Annalen **271**, 345.

³²⁾ Perkin jun., Journ. chem. Soc. 1890, 1004.

Experimenteller Theil.

I. Narceïn.

Das Narceïn, mit welchem die nachstehend beschriebenen Versuche angestellt worden sind, entstammt der Fabrik von E. Merck in Darmstadt und wird von derselben unter der Bezeichnung Narceinum purissimum Merck³³⁾ in den Handel gebracht. Dasselbe besteht aus sehr leichten, schneeweissen, wie Filz aussehenden Stücken, welche bei näherer Betrachtung sich aus haarfeinen Nadeln zusammengesetzt erweisen. Sie enthalten weder Halogen noch Schwefelsäure. In nicht zu wenig kochendem Wasser, in heissem absolutem und verdünntem Alkohol ist die Substanz klar löslich und scheidet sich beim Erkalten wieder aus. Man bemerkt hierbei, dass die aus absolutem Alkohol erhaltenen Krystalle weniger fein und verfilzt sind, wie die aus Wasser und verdünntem Alkohol. Früheren Beobachtungen zufolge ist Narceïn in Chloroform, Benzol und Aether unlöslich. Für die krystallwasserhaltige Substanz können wir diese Beobachtung bestätigen; dagegen löst sich das durch drei- bis vierständiges Trocknen bei 100° vollständig entwässerte Präparat in heissem Chloroform und Benzol ziemlich leicht, in Aether kaum. Werden diese Lösungen im Exsiccator concentrirt, so findet keine Krystallbildung statt. Dieselbe tritt jedoch momentan ein, wenn man der Lösung durch Anhauchen etwas Feuchtigkeit zuführt. Der Schmelzpunkt des Narceïns ist fast von jedem Beobachter anders angegeben worden und hängt unzweifelhaft etwas von der Schnelligkeit des Erhitzens ab. Das Merck'sche Präparat schmilzt an der Luft getrocknet bei 163 — 165°. Durch mehrfaches Umkrystallisiren aus absolutem Alkohol und darauf aus Wasser kann der Schmelzpunkt bis auf etwa 170° hinaufgerückt

³³⁾ Zu einigen Versuchen, bei welchen dies noch ausdrücklich hervorgehoben ist, wurde Handelsnarceïn angewendet; dasselbe entstammte gleichfalls der Merck'schen Fabrik und wird von derselben unter der Bezeichnung Narceinum purum verkauft.

werden. — Dies gilt für die krystallwasserhaltige Substanz; in völlig trockenem Zustande dagegen schmilzt der Körper schon bei 140—145°. Bleibt die ganz trockne Substanz auch nur einige Minuten an der Luft stehen, so zieht sie Wasser an und schmilzt dann wieder erst über 160°. Es ist hierbei zu erwähnen, dass auch Hesse den Schmelzpunkt zuerst³⁴⁾ bei 145° beobachtet hat, während er in seinem Artikel in Fehling's Handwörterbuch³⁵⁾ denselben bei 162° liegend angiebt. Auch Roser³⁶⁾, welcher den Schmelzpunkt des Merck'schen Narceïns bei 165° fand, erwähnt, dass nach längerem Trocknen die Substanz schon bei 140—143° zusammenschmilzt.

Die Blaufärbung³⁷⁾, welche Narceïnkristalle beim Uebergiessen mit wässriger Jodlösung annehmen, zeigt das Merck'sche Präparat in sehr deutlicher Weise. Desgleichen tritt Rothfärbung³⁸⁾ ein, wenn man die Lösung des Alkaloïds in Chlorwasser mit Ammoniak versetzt.

Während den früheren Angaben zufolge das Narceïn aus Wasser mit nur zwei Molekülen Wasser krystallisiren soll, enthält es thatsächlich entsprechend der Formel

drei Moleküle Krystallwasser, das bei 100° vollständig entweicht.

I. 1,0450 g verloren in 7 Stunden bei 95— 98° 0,1186.

II. 1,9195 g " " 10 " " 95— 98° 0,2080.

III. 0,9650 g " " 6 " " 95— 98° 0,1095.

IV. 0,6904 g " " 5 " " 95—100° 0,0760.

V. 0,4766 g " " 6 " " 95—100° 0,0560.

VI. 0,4354 g " " 7 " " 95° 0,0432.

Berechnet für		Gefunden					
$\text{C}_{23}\text{H}_{27}\text{NO}_8 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
$3\text{H}_2\text{O}$	10,82	11,3	10,83	11,35	10,01	11,38	9,92

³⁴⁾ Diese Annalen **129**, 250.

³⁵⁾ Band **4**, 676.

³⁶⁾ Diese Annalen **247**, 169.

³⁷⁾ Fresenius, Ztschr. f. anal. Ch. **9**, 390.

³⁸⁾ Vogel, Ber. d. deutsch. chem. Ges. **7**, 906.

Dass der Gewichtsverlust lediglich dem Entweichen des Wassers und keiner anderweitigen Zersetzung zuzuschreiben ist, ergibt sich aus folgenden Versuchen, wobei die Substanz in einem Strom von trockenem Wasserstoff in kochendem Wasserbade getrocknet und das entweichende Wasser in einem gewogenen Chlorcalciumrohre aufgefangen wurde.

I. 0,9650 g verloren in 6 Stunden bei 100° 0,1096. Zunahme des Chlorcalciumrohres 0,1191.

II. 0,6906 g verloren in 6 Stunden bei 100° 0,0760. Zunahme des Chlorcalciumrohres 0,0718.

Berechnet für	Verlust gefunden	Zunahme
3H ₂ O 10,82	I. 11,35	12,03
	II. 11,02	11,11

Allerdings entweichen zwei Moleküle Wasser viel leichter wie das dritte, was durch zwei besondere Versuche constatirt wurde.

I. 0,8375 g, an der Luft getrocknet, verloren im Vacuum über Chlorcalcium im Laufe von drei Tagen 0,0159 = 1,8 pC. Da ein weiterer Gewichtsverlust nicht eintrat, wurde das Trocknen im Vacuum über Schwefelsäure fortgesetzt. Nach sechs Tagen betrug der Verlust 0,0513 = 6,1 pC., nach vier Wochen 0,0814 = 9,72 pC.

	Berechnet für
2H ₂ O	7,2
3H ₂ O	10,8

II. 0,7297 g, an der Luft getrocknet, verloren bei 95—100° in 30 Minuten 0,0552 = 7,5 pC. Gewichtsconstanz trat erst nach über drei Stunden ein; Gesamtverlust 0,0738 = 10,12 pC.

Die trockne Substanz ist ausserordentlich hygroskopisch.

0,9650 g, trocken, nahmen bei dreistündigem Stehen an der Luft um 0,0326 g zu.

	Berechnet für	Gefunden
	C ₂₃ H ₂₇ NO ₈	
1H ₂ O	4,04	3,4

Nach zwei Tagen betrug die Gewichtszunahme 6,3 pC.

Die Hygroskopicität des trocknen Narceins ist so bedeutend, dass sogar im Exsiccator über Chlorcalcium Wasser

aufgenommen wird, während beim Stehen über Schwefelsäure nur eine sehr geringe Gewichtszunahme eintritt.

0,6556 g, trocken, nahmen über Nacht im CaCl_2 -Exsiccator 0,0192 g zu.

	Berechnet für	Gefunden
	$\text{C}_{23}\text{H}_{27}\text{NO}_8$	
$1\text{H}_2\text{O}$	4,04	2,92

Der beim Trocknen verbleibende Rückstand sieht vollkommen weiss und unzersetzt aus. Der Umstand, dass frühere Beobachter bei der Analyse der getrockneten Substanz zu Zahlen gelangten, welche der Formel

entsprechen, kann nach den obigen Beobachtungen nicht allzusehr überraschen. — Dieselben haben entweder die Substanz nicht lange genug getrocknet oder vielleicht unter Bedingungen gearbeitet, welche die Wiederaufnahme eines Theiles des durch das Trocknen entfernten Wassers zuließen.

Auch wir sind, bevor wir mit den Eigenschaften des Narceins genügend vertraut waren, bei mehreren Analysen zu Zahlen gelangt, welche der Formel $\text{C}_{23}\text{H}_{27}\text{NO}_9$ entsprechen, während in anderen Fällen Werthe erhalten wurden, die zwischen den für $\text{C}_{23}\text{H}_{29}\text{NO}_9$ und $\text{C}_{23}\text{H}_{27}\text{NO}_8$ berechneten liegen.

Ein solches Resultat erhielt auch von Schröder³⁹⁾, welcher ebenfalls ein Merck'sches Präparat zu seinen physiologischen Versuchen gebraucht hat. Von der Formel $\text{C}_{23}\text{H}_{29}\text{NO}_9$ ausgehend, glaubt er den gefundenen Mehrgehalt an Kohlenstoff einer Verunreinigung mit Meconin zuschreiben zu müssen. Hiergegen ist jedoch zu bemerken, dass Meconin nur 61,85 pC. C enthält und daher eine Beimengung von etwa 50 pC. desselben erforderlich wäre, um den Kohlenstoffgehalt derartig zu erhöhen. Wir glauben das Resultat von v. Schröder's Analyse der oben erwähnten Ursache zuschreiben zu müssen, denn eine ganze Reihe von Analysen, die später mit dem getrockneten Narcein ausgeführt wurden, lassen keinen Zweifel an der Zusammensetzung desselben.

³⁹⁾ Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 1883, 132.

I.	0,2225 g	gaben	0,5052 CO ₂	und	0,1345 H ₂ O.						
II.	0,2227 g	"	0,5012 CO ₂	"	0,1291 H ₂ O.						
III.	0,2083 g	"	0,4744 CO ₂	"	0,1246 H ₂ O.						
IV.	0,2491 g	"	0,5721 CO ₂	"	0,1448 H ₂ O.						
V.	0,2132 g	"	0,4850 CO ₂	"	0,1218 H ₂ O.						
VI.	0,3647 g	"	0,8226 CO ₂	"	0,1998 H ₂ O.						
VII.	0,2250 g	"	0,5121 CO ₂	"	0,1336 H ₂ O.						
VIII.	0,2244 g	"	0,5098 CO ₂	"	0,1323 H ₂ O.						
Berechnet für			Gefunden								
C ₂₃ H ₂₇ NO ₈			I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	Mittel
C	62,02		61,93	61,38	62,07	62,64	62,4	61,48	62,07	61,96	61,88
H	6,06		6,6	6,44	6,44	6,48	6,34	6,1	6,59	6,53	6,41

An dieser Stelle ist noch zu bemerken, dass Anderson⁴⁰⁾ bei der Analyse eines Narceïns, welches der Fabrik von Pelletier & Caventou entstammte, ebenfalls Zahlen erhielt, die der Formel C₂₃H₂₇NO₈ einigermassen entsprechen.

II. Salze des Narceïns mit Basen.

Narceïnkaliüm, C₂₃H₂₆NO₈K + C₂H₆O.

Die Thatsache, dass das Narceïn sich in verdünnten Alkalien leicht auflöst, ist so lange bekannt, wie das Alkaloid selbst. — Auch Anderson hat bereits ein festes Alkalisalz des Narceïns in Händen gehabt, aber nicht als solches erkannt. Er erwähnt, dass starkes Alkali aus Lösungen des Narceïns in verdünntem Alkali ein Oel abscheidet, welches bald erstarrt; doch hielt er die feste Masse für nichts anderes wie Narceïn. Hesse⁴¹⁾ dagegen sprach die Vermuthung aus, dass jene Substanz ein Alkalisalz des Narceïns sei, ohne jedoch Analysen anzustellen. Wird lufttrocknes Narceïn in 33 procentige Kalilauge eingetragen und kurze Zeit auf 60—70° erwärmt, so entsteht eine wachsartige Masse, die beim Erkalten zu einer weissen, krystallinischen Substanz erstarrt. Zur Entfernung des mechanisch anhaftenden Alkalis wurde dieselbe zwischen Thon gepresst, wobei ein Pulver erhalten wurde, welches sich nicht nur in Wasser, sondern

⁴⁰⁾ Diese Annalen **86**, 182.

⁴¹⁾ Fehling's Handwörterbuch, **4**, 676.

auch in absolutem Alkohol ausserordentlich leicht löst. Fügt man Aether zur alkoholischen Lösung bis zur Trübung, so scheiden sie beim Stehen zu Rosetten gruppirte Krystalle ab, welche bei 90° schmelzen. — Präparate verschiedener Darstellung, aber alle nur einmal umkrystallisirt, ergaben Zahlen, die annähernd auf die Formel:

stimmen. Als die Verbindung jedoch nochmals umkrystallisirt wurde, ergab sie Zahlen, die gut für die Formel:

passen.

0,3489 g verloren bei $60-70^{\circ}$ 0,0288.

	Berechnet für	Gefunden
	$\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$	
	8,6	8,3
I.	0,2735 g, bei $60-70^{\circ}$ getrocknet,	gaben 0,5718 CO_2 und 0,1434 H_2O .
II.	0,2444 g, bei $60-70^{\circ}$ getrocknet,	gaben 0,5104 CO_2 und 0,1231 H_2O .
III.	0,1458 g, bei $60-70^{\circ}$ getrocknet,	gaben 0,0272 K_2SO_4 .
IV.	0,1030 g, „ $60-70^{\circ}$ „ „	„ 0,0185 K_2SO_4 .

	Berechnet für	Gefunden			
	$\text{C}_{23}\text{H}_{26}\text{NO}_8\text{K}$	I.	II.	III.	IV.
C	57,14	57,04	56,98	—	—
H	5,4	5,82	5,61	—	—
K	8,08	—	—	8,3	8,05

Narceinnatrium, $\text{C}_{23}\text{H}_{26}\text{NO}_8\text{Na} + \text{C}_2\text{H}_6\text{O}$.

Wird Narcein in derselben Weise mit frisch bereiteter 33 procentiger Natronlauge behandelt, so verwandelt es sich in die Natriumverbindung. Die Bildung derselben geht schon bei längerem Stehen in der Kälte vor sich und vollzieht sich schnell bei $60-70^{\circ}$. Man gewinnt alsdann sofort eine feste, weisse, aus dicken, kurzen Krystallen bestehende Masse. Arbeitet man bei 100° , so wird eine wachsartige Substanz gewonnen, welche sehr bald in die feste krystallinische Form übergeht. — Nachdem der Körper durch Pressen zwischen Thonstücken vom

anhaftenden Alkali befreit ist, wird er in Alkohol gelöst, von welchem er schwerer wie die Kaliumverbindung aufgenommen wird. Fügt man vorsichtig Aether hinzu, so scheidet sich das Natriumsalz bald in schönen, weissen Prismen vom Schmelzpunkt $159 - 160^{\circ}$ aus. In Wasser ist die Verbindung leicht löslich.

0,1524 g verloren bei $80 - 90^{\circ}$ 0,0126.

	Berechnet	Gefunden
C_2H_6O	8,98	8,33

Bleiben die Krystalle längere Zeit mit der alkoholisch-ätherischen Mutterlauge in Berührung, so enthalten sie keinen Krystallalkohol.

- I. 0,1565 g, bei 90° getrocknet, gaben 0,3376 CO_2 und 0,0840 H_2O .
- II. 0,1637 g, " 90° " " 0,3535 CO_2 " 0,0969 H_2O .
- III. 0,2942 g, " 90° " " 0,5908 CO_2 " 0,1568 H_2O .
- IV. 0,3804 g, " 90° " " 0,0556 Na_2SO_4 .
- V. 0,1524 g, " 90° " " 0,0266 Na_2SO_4 .

Berechnet für		Gefunden				
$C_{23}H_{26}NO_8Na$		I.	II.	III.	IV.	V.
C	59,10	58,85	58,91	58,76	—	—
H	5,57	5,94	6,16	6,24	—	—
Na	4,99	—	—	—	4,73	5,58

Ein aus künstlich bereitetem (Pseudo-)Narceïn hergestelltes Präparat schmolz um 2° höher, erwies sich aber sonst in jeder Beziehung mit der eben beschriebenen Verbindung identisch.

Die Krystallisationsfähigkeit des Natriumsalzes liess einen Versuch angezeigt erscheinen, mit Hilfe dieser Verbindung die Reinigung des Alkalöides zu bewerkstelligen. Das Handelsnarceïn enthält gewöhnlich geringe Mengen von Säuren, von welchen es nur schwer befreit werden kann. Das von uns unter der Bezeichnung Narceïnum purum von E. Merck bezogene Präparat erwies sich als halogenhaltig. Es wurde in der oben beschriebenen Weise mit starker Natronlauge in das Natriumsalz übergeführt, letzteres aus alkoholischer Lösung durch Aetherzusatz zweimal umkrystallisirt und dann in wässriger Lösung durch Einleiten von Kohlensäure zerlegt. Aus heissem Wasser

einmal umkrystallisirt, schmilzt das so ausgeschiedene Narceïn, welches sich halogenfrei erwies, bei 165—166°, während das Handelspräparat, welches als Ausgangsmaterial gedient hatte, bei 160° zusammensinterte und bei 162—163° vollständig geschmolzen war. Die Analyse ergab genau die für Narceïn stimmenden Werthe, 9,92 pC. Wasser und in der getrockneten Substanz 61,94 pC. C und 6,44 H.

Narceïnbarium, $(C_{23}H_{26}NO_8)_2Ba$.

Wird eine nicht zu concentrirte wässrige Lösung des Natriumsalzes mit Chlorbarium versetzt, so scheidet sich ein weisser, aus schönen Nadeln bestehender Niederschlag aus. Bei Anwendung concentrirter Lösungen erscheint das Salz als schweres, weisses, krystallinisches Pulver. Es ist in Wasser nicht sehr löslich, in Alkohol mehr, in Aether und Chloroform unlöslich. Der Schmelzpunkt liegt bei 182°. Die bei 100° getrocknete Substanz gab bei der Analyse folgende Werthe:

I. 0,2130 g gaben 0,4184 CO_2 und 0,1016 H_2O .

II. 0,3016 g „ 0,0664 $BaSO_4$.

	Berechnet für $(C_{23}H_{26}NO_8)_2Ba$	Gefunden	
		I.	II.
C	53,85	53,52	—
H	5,07	5,3	—
Ba	13,36	—	12,94

Das Baryumsalz kann auch direct erhalten werden, indem man Narceïn mit concentrirtem Barytwasser erhitzt.

Narceïnsilber, $C_{23}H_{26}NO_8Ag$.

Das Silbersalz ist ziemlich zersetzlich; zu seiner Darstellung kühlt man die wässrige Lösung des Natriumsalzes mit Eis und fügt im Dunkeln Silbernitrat hinzu. Man gewinnt so ein feines, weisses Pulver, welches nach dem Trocknen im Exsiccator analysirt wurde.

0,2892 g gaben 0,0647 $AgCl$.

	Berechnet für $C_{23}H_{26}NO_8Ag$	Gefunden
Ag	19,37	20,31

Narceïnblei, $(C_{23}H_{26}NO_8)_2Pb$.

Durch Zersetzung des Natriumsalzes mit Bleinitrat erhält man feine, kurze, weisse Nadeln, die in Wasser und Alkohol ziemlich schwer löslich sind. Sie schmelzen bei etwa 157° .

I. 0,2134 g, bei 100° getrocknet, gaben 0,3988 CO_2 und 0,0997 H_2O .

II. 0,3034 g, „ 100° „ „ 0,0811 $PbSO_4$.

	Berechnet für $(C_{23}H_{26}NO_8)_2Pb$	Gefunden	
		I.	II.
C	50,41	50,93	—
H	4,74	5,12	—
Pb	18,91	—	18,2

Narceïnkupfer, $(C_{23}H_{26}NO_8)_2Cu$.

Kupfersulfat fällt aus der Lösung des Natriumsalzes als ein grünliches Pulver, welches sich bei 172° zersetzt. In kaltem Wasser und Alkohol ist es kaum löslich, beim Erhitzen damit wird es zersetzt.

0,1545 g, bei 100° getrocknet, gaben 0,3308 CO_2 und 0,0692 H_2O .

	Berechnet für $(C_{23}H_{26}NO_8)_2Cu$	Gefunden
C	58,04	58,4
H	5,46	4,98

*Zersetzung der Alkalisalze mit Säuren.**a) In wässriger Lösung mit Kohlensäure.*

Wie in der Einleitung erwähnt, wurde anfangs vermuthet, dass die aus dem Narceïn gebildeten Alkaliverbindungen sich von einer neuen, um ein Molekül Wasser ärmeren Base herleiten. Die Alkalisalze wurden daher in verschiedener Weise mit Säuren zu zerlegen versucht.

Da man annehmen konnte, dass die zu erwartende Base sich mit einem Ueberschuss von Mineralsäuren zu Salzen vereinigen würde, so bewirkten wir die Zerlegung zunächst durch Kohlensäure. Beim Einleiten derselben in eine nicht zu verdünnte wässrige Lösung des Kaliumsalzes schieden sich feine Nadeln aus, die bald die ganze Flüssigkeit breiartig erfüllten.

Dieselben zeigten alle Eigenschaften des Narceïns; ihr Schmelzpunkt lag bei 162—165°. Die Analyse der bei 100° getrockneten Substanz ergab die Zusammensetzung des Narceïns $C_{23}H_{27}NO_8$.

b) In alkoholischer Lösung mit Salzsäure.

Eine gewogene Menge des Natriumsalzes wurde in absolutem Alkohol gelöst und die zur Zersetzung erforderliche Menge titrierter alkoholischer Salzsäure hinzugefügt. Die vom Kochsalz abfiltrirte Flüssigkeit schied beim Stehen im Exsiccator Nadeln ab vom Schmelzpunkt 159—160°, welche sich in jeder Beziehung wie Narceïn verhielten und bei der Analyse die Zusammensetzung des Narceïns ergaben.

Einwirkung von Halogenalkylen auf Narceïnnatrium.

1. Jodmethyl bei Gegenwart von Aethylalkohol. 1 g des Natriumsalzes wurde in 10 ccm absolutem Alkohol gelöst und mit einem Ueberschuss von Jodmethyl drei Stunden unter Rückfluss gekocht. Das Filtrat hinterliess beim Verdunsten ein feines, gelbes, krystallinisches Pulver, welches aus Wasser umkrystallisirt, bei 203° schmolz. — Die Analysen stimmen am besten auf die Verbindung

0,2904 g, bei 110° getrocknet, gaben	0,5400 CO ₂	und	0,1508 H ₂ O.
0,2167 g, „ 110° „ „	0,4032 CO ₂	„	0,1146 H ₂ O.
0,1466 g, „ 110° „ „	0,0589 AgJ.		

	Berechnet für $C_{23}H_{26}(C_2H_5)NO_8 \cdot CH_3J$	Gefunden		
		I.	II.	III.
C	50,73	50,72	50,74	—
H	5,6	5,74	5,35	—
J	20,61	—	—	21,6

Die nachfolgenden Versuche haben in der That den Beweis erbracht, dass der zur Lösung des Natriumsalzes verwendete Aethylalkohol mit in Reaction tritt. — Beim Erhitzen mit Alkali verwandelt sich die Substanz in eine gelbe, ölige Masse.

2. Jodmethyl bei Gegenwart von Methylalkohol. Dass der als Lösungsmittel dienende Alkohol an der Reaction theilnimmt, geht schon daraus hervor, dass ein anderes Product erhalten wird, wenn das in Methylalkohol gelöste Natriumsalz mit Jodmethyl behandelt wird. Das Reactionsproduct ist dem vorher beschriebenen ähnlich; doch krystallisirt es besser und schmilzt bei 193—194°. Die Analysen weisen auf die Formel:

- I. 0,2176 g, bei 110° getrocknet, gaben 0,3970 CO₂ und 0,1244 H₂O.
 II. 0,2044 g, „ 110° „ „ 0,1187 AgJ.

	Berechnet für $\text{C}_{23}\text{H}_{26}(\text{CH}_3)\text{NO}_8\cdot\text{CH}_3\text{J}$	Gefunden	
		I.	II.
C	49,8	49,77	—
H	5,3	6,24	—
J	21,13	—	21,07

3. Jodäthyl bei Gegenwart von Aethylalkohol. Das Reactionsproduct bildet ein gelbliches Pulver, welches durch Umlösen in Alkohol oder Wasser gereinigt bei 131—132° schmilzt. Es hat die Formel:

- I. 0,2761 g, bei 100° getrocknet, gaben 0,5254 CO₂ und 0,1568 H₂O.
 II. 0,2498 g, „ 100° „ „ 0,4822 CO₂ „ 0,1404 H₂O.
 III. 0,2422 g, „ 100° „ „ 0,4562 CO₂ „ 0,1340 H₂O.
 IV. 0,2130 g, „ 100° „ „ 0,0817 AgJ.

	Berechnet für $\text{C}_{23}\text{H}_{36}(\text{C}_2\text{H}_5)\text{NO}_8\cdot\text{C}_2\text{H}_5\text{J}$	Gefunden			
		I.	II.	III.	IV.
C	51,51	51,89	52,6	51,38	—
H	5,72	6,32	6,24	6,14	—
J	20,02	—	—	—	20,71

4. Jodäthyl bei Gegenwart von Methylalkohol. Das erhaltene Product zeigt denselben Schmelzpunkt wie der mittelst Jodmethyl und Aethylalkohol gewonnene Körper. Dennoch halten wir die beiden Substanzen nicht für identisch, sondern für isomer und ertheilen der Verbindung die Formel:

5. Jodallyl bei Gegenwart von Aethylalkohol. Das Reactionsproduct geht durch Behandeln mit Wasser in ein Pulver vom Schmelzpunkt 154—155° über, welches bei der Analyse Werthe ergab, die der Formel

entsprechen.

0,2442 g, bei 100° getrocknet, gaben 0,4632 CO₂ und 0,1405 H₂O.

	Berechnet für	Gefunden
	$\text{C}_{23}\text{H}_{26}(\text{C}_2\text{H}_5)\text{NO}_8\cdot\text{C}_3\text{H}_5\text{J}$	
C	52,4	51,8
H	5,61	6,39

6. Einwirkung von Methyljodid bei Gegenwart von Aether. Schliesst man die Gegenwart von Alkohol aus, so ersetzt die Methylgruppe das Natrium und ausserdem lagert sich ein Molekül CH₃J an das Stickstoffatom:

Das Reactionsproduct erwies sich identisch mit der Verbindung, die mittelst Jodmethyl und Methylalkohol gewonnen wurde. — Ein analoges Resultat wurde erhalten, als das Natriumsalz mit Jodäthyl und Aethyläther erhitzt wurde.

7. Einwirkung von Methylalkohol auf das Natriumsalz. Um unzweifelhaft festzustellen, dass bei den oben beschriebenen Versuchen der Alkohol an der Reaction theilnimmt, wurde das Natriumsalz mit Methylalkohol einige Stunden gekocht und dann zur Trockniss eingedampft. Der Rückstand gab, mit Wasser behandelt, eine halbfeste Masse, die sich identisch erwies mit dem später zu beschreibenden Narceïnmethylester:

Bei der Behandlung mit Salzsäure ging die Substanz in das gut krystallisirte Chlorhydrat vom Schmelzpunkt 148 bis 149° über.

III. Salze des Narceïns mit Säuren.

1. *Chlorhydrat*. Dasselbe ist bereits von Anderson⁴²⁾, Winckler⁴³⁾, Petit⁴⁴⁾ und Wright⁴⁵⁾ hergestellt und analysirt worden. Alle diese Beobachter fanden es nach der Formel

zusammengesetzt und weichen nur in ihren Angaben betreffs des Krystallwassergehaltes von einander ab.

Wir haben das Salz nochmals untersucht, sind aber zu Resultaten gelangt, welche die für das wasserfreie Narceïn von uns aufgestellte Formel vollauf bestätigen. Uebergießt man Narceïn bei gewöhnlicher Temperatur mit einer Salzsäure vom specifischen Gewicht 1,1, so tritt zuerst Lösung ein. Als bald beginnt aber die Abscheidung schöner Krystalle, welche zuerst auf Thon und dann über Nacht im Exsiccator über Schwefelsäure getrocknet wurden. — Das so gewonnene Präparat ist nach der Formel

zusammengesetzt, doch ist wahrscheinlich ein Theil des Krystallwassers schon im Exsiccator entwichen.

I. 0,4815 g verloren bei 120° 0,0847 H₂O.

II. 0,2748 g " " " 0,0481 H₂O.

III. 0,2797 g " " " 0,0481 H₂O.

Berechnet für		Gefunden		
$\text{C}_{23}\text{H}_{27}\text{NO}_3\text{HCl} + 5\frac{1}{2}\text{H}_2\text{O}$		I.	II.	III.
5½ H ₂ O	17,05	17,59	17,5	17,2

0,1947 g, bei 120° getrocknet, gaben 0,4162 CO₂ und 0,1059 H₂O.

Berechnet für		Gefunden
$\text{C}_{23}\text{H}_{27}\text{NO}_3\text{HCl}$		
C	57,3	58,29
H	5,8	6,05

Der Schmelzpunkt des bei 120° getrockneten Salzes lag bei 188 — 192°. Bei einer zweiten Darstellung wurde das

⁴²⁾ Diese Annalen **86**, 182.

⁴³⁾ Gmelin-Kraut, Handbuch d. org. Chem. **7**, II, 1986.

⁴⁴⁾ Bull. Soc. Chim. [2] **18**, 534.

⁴⁵⁾ Journ. chem. Soc. [2] **12**, 109.

Narceïn in erwärmter Salzsäure gelöst und die abgeschiedenen Krystalle nochmals aus heisser Salzsäure (specifisches Gewicht 1,1) umkrystallisirt. Dieses Präparat zeigte die Zusammensetzung:

welche Roser auch für sein aus (Pseudo-)Narceïn hergestelltes Chlorhydrat ermittelt hat.

I. 0,4460 g verloren bei 120° 0,0430.

Berechnet für	Gefunden
$\text{C}_{23}\text{H}_{27}\text{NO}_8\text{HCl} + 3\text{H}_2\text{O}$	
10,8	9,64

II. 0,2322 g, getrocknet, gaben 0,4886 CO₂ und 0,1226 H₂O.

III. 0,3171 g „ „ 0,0956 AgCl.

	Berechnet für	Gefunden	
	$\text{C}_{23}\text{H}_{27}\text{NO}_8\text{HCl}$	I.	II.
C	57,3	57,38	—
H	5,8	5,87	—
Cl	7,37	—	7,45

Uebergiesst man Narceïn mit einer Auflösung von Chlorwasserstoffgas in Methylalkohol, so tritt zunächst Lösung ein. Bald aber beginnt die Abscheidung von Krystallen, welche, wenn man in verdünnter Lösung gearbeitet hat, die Form langgestreckter Rhomboëder besitzen. Dieselben schmelzen bei 190—192° und besitzen die Zusammensetzung:

Der Methylalkohol entweicht schon bei längerem Stehen an der Luft, schneller im Exsiccator und in ganz kurzer Zeit bei 100°. Der Trockenrückstand zeigt ebenfalls den Schmelzpunkt 190—192°.

	Berechnet für	Gefunden		
	$\text{C}_{23}\text{H}_{27}\text{NO}_8\text{CH}_3\text{O}$	I.	II.	III.
CH ₄ O	6,23	5,93	7,4	
	Berechnet für	Gefunden		
	$\text{C}_{23}\text{H}_{27}\text{NO}_8\text{HCl}$	I.	II.	III.
C	57,3	56,63	57,58	57,2
H	5,8	5,9	6,34	6,3

Wie aus dem Schmelzpunkt und der Analyse hervorgeht, sind die aus wässriger und methylalkoholischer Lösung gewonnenen getrockneten Salze miteinander identisch.

Ein aus (Pseudo-)Narcein hergestelltes Präparat schmolz ebenfalls bei 190—192°.

Mit einer Auflösung von Chlorwasserstoff in Aethylalkohol liefert das Narcein rhombische Tafeln mit sehr stumpfen Winkeln; zuweilen sind die Kanten an den spitzen Winkeln etwas abgestumpft; manchmal finden sich mehrere Tafeln nebeneinander gelagert, selten sind sie kreuzartig durcheinander gewachsen. Sie schmelzen bei 158—159° und sind nach der Formel

zusammengesetzt. Während jedoch bei dem vorher beschriebenen Salze der Methylalkohol so leicht entweicht, tritt hier bei 100 bis 110° kein Gewichtsverlust ein; bei höherer Temperatur findet allmählich Zersetzung statt.

	Berechnet für $\text{C}_{23}\text{H}_{27}\text{NO}_8 \cdot \text{HCl} + \text{C}_2\text{H}_6\text{O}$	Gefunden			
		I.	II.	III.	IV.
C	56,87	56,7	56,72	56,8	—
H	6,25	6,38	6,5	6,58	—
Cl	6,72				6,72

Vollkommen identisch mit dem beschriebenen Salze erwies sich das mittelst (Pseudo-)Narcein und äthylalkoholischer Salzsäure bereitete Chlorhydrat.

Platindoppelsalz. Dasselbe ist bereits von Anderson, Hesse, Claus und Meixner und Roser untersucht worden und besitzt nach den Angaben dieser Forscher die Zusammensetzung:

Während Hesse⁴⁶⁾ einen Gehalt von zwei Molekülen Krystallwasser constatirte, fanden Claus und Meixner⁴⁷⁾ das Salz wasserfrei und Roser⁴⁸⁾ bestätigt diese Angabe. Der

⁴⁶⁾ Diese Annalen **129**, 250.

⁴⁷⁾ Journ. f. prakt. Chem. **37**, 1.

⁴⁸⁾ Diese Annalen **247**, 169.

Schmelzpunkt wird zu 195—196° angegeben. — Wir stellten das Salz in der Weise her, dass Narceïn in Salzsäure (gleiche Theile HCl spezifisches Gewicht 1,1 und Wasser) gelöst, auf 70—80° erwärmt und Platinchlorid zugefügt wurde. Beim Erkalten schieden sich prachtvolle Nadeln ab. Das Salz schmilzt bei 190—191° zu einem braunen Syrup und zersetzt sich bei 195—196° unter Aufschäumen; bei 120° erleidet es keinen Gewichtsverlust.

- I. 0,2140 g, bei 120° getrocknet, gaben 0,3260 CO₂ und 0,0938 H₂O.
 II. 0,3142 g " " " " " 0,0478 Pt.

	Berechnet für (C ₂₃ H ₂₇ NO ₈ HCl) ₂ PtCl ₄ + 2H ₂ O	Gefunden	
		I.	II.
C	41,26	41,54	—
H	4,48	4,86	—
Pt	14,83	—	15,21

Das Salz besitzt also in der That die schon früher ermittelte Zusammensetzung; mit Rücksicht auf die übrigen von uns festgestellten Thatsachen muss man aber annehmen, dass es zwei Moleküle Wasser enthält, welche durch Erhitzen nicht ausgetrieben werden können, und wir ertheilen der Verbindung daher die Formel:

Dieselbe Zusammensetzung besitzt das aus (Pseudo-)Narceïn bereitete Platinsalz, dessen Schmelzpunkt wir bei 190° beobachteten. Roser ertheilte zwar der Verbindung die Formel:

doch stimmen seine Analysen (gef. Roser C = 41,57, H = 4,83, Pt = 14,66) weit besser auf das wasserhaltige Salz.

2. *Nitrat*. Das Nitrat wird bereits von Winckler⁴⁹⁾, wie auch von Anderson⁵⁰⁾ erwähnt. Wir erhielten es bei Gelegenheit eines Oxydationsversuches aus einer Lösung von Narceïn in mässig verdünnter Salpetersäure. Es bildet schwach

⁴⁹⁾ Gmelin-Kraut, **7**, II, 1986.

⁵⁰⁾ Diese Annalen **86**, 182.

gelbgefärbte Nadeln, die bei 97° sich zersetzten. Bei 60—70° getrocknet, wurde es analysirt.

- I. 0,2330 g gaben 0,4488 CO₂ und 0,1250 H₂O.
 II. 0,2222 g „ 0,4321 CO₂ „ 0,1162 H₂O.
 III. 0,2705 g „ 13,5 ccm Stickgas bei 16,5° und 741 mm Druck.

	Berechnet für C ₂₃ H ₂₇ NO ₈ HNO ₃ + H ₂ O	Gefunden		
		I.	II.	III.
C	52,47	52,53	52,92	—
H	5,7	5,98	5,8	—
N	5,34	—	—	5,1

3. *Sulfat*. Becket und Wright⁵¹⁾ haben für das saure Sulfat die Formel C₂₃H₂₉NO₉·H₂SO₄ + 10H₂O aufgestellt; da aber die genannten Forscher das krystallwasserhaltige Salz der Analyse unterworfen haben, lassen ihre Zahlen eine Entscheidung, mit welcher Formel die Base in die Verbindung eingetreten ist, nicht zu. Bei der Untersuchung des getrockneten Sulfates hat es sich nun ergeben, dass dasselbe nach der Formel

zusammengesetzt ist. Aus der Lösung der Base in heisser verdünnter Schwefelsäure scheidet sich das Salz in feinen, centriscb gruppirtcn Nadeln aus, welche die Flüssigkeit breitartig erfüllen. Die lufttrockne Substanz verlor bei zweitägigem Stehen im Vacuum ihr gesammtcs Krystallwasser, so dass bei 110° keine weitere Gewichtsabnahme stattfand.

- I. 0,2226 g gaben 0,4190 CO₂ und 0,1115 H₂O.
 II. 0,2083 g „ 0,3822 CO₂ „ 0,1060 H₂O.

	Berechnet für C ₂₃ H ₂₇ NO ₈ ·H ₂ SO ₄	Gefunden		Berechnet für C ₂₃ H ₂₉ NO ₉ ·H ₂ SO ₄
		I.	II.	
C	50,83	51,35	50,02	49,20
H	5,34	5,57	5,66	5,53

Das aus Pseudonarceïn bereitete Sulfat hat nach Roser die Zusammensetzung C₂₃H₂₇NO₈·H₂SO₄ + 2H₂O.

4. *Perjodide*. Jörgensen⁵²⁾ erhielt aus dem Narceïn

⁵¹⁾ Journ. chem. Soc. **13**, 699.

⁵²⁾ Journ. f. prakt. Chem. [2] **2**, 457.

zwei Verbindungen, welchen er, unter Zugrundelegung der Anderson'schen Formel, die Zusammensetzung

zuschrieb. Da seine Analysen besser auf die Salze der um ein Molekül Wasser ärmeren Base stimmen, so ist auf eine nochmalige Untersuchung verzichtet worden.

Berechnet für $(\text{C}_{23}\text{H}_{29}\text{NO}_9\cdot\text{HJ})_2\text{J}$	Gefunden		Berechnet für $(\text{C}_{23}\text{H}_{27}\text{NO}_8\cdot\text{HJ})_2\text{J}$
	I.	II.	
J 29,1	30,1	29,6	29,9
Berechnet für $\text{C}_{23}\text{H}_{29}\text{NO}_9\cdot\text{HJ}_3$	Gefunden Jörgensen		Berechnet für $\text{C}_{23}\text{H}_{27}\text{NO}_8\cdot\text{HJ}_3$
J 45,08	45,8		46,07

IV. Ester des Narceïns und ihre Salze.

Das Narceïn enthält nach der in der Einleitung entwickelten Constitutionsformel ein Carboxyl. Einen weiteren Beweis für dessen Vorhandensein liefert die Bildung von Estern bei der Behandlung mit Alkoholen und Salzsäure.

1. *Narceïnmethylester.*

Chlorhydrat. Dasselbe kann sowohl aus dem Natriumsalz wie auch aus dem freien Narceïn erhalten werden. Beide Substanzen liefern, wenn man sie mit methylalkoholischer Salzsäure übergießt, zuerst das vorher beschriebene Chlorhydrat

vom Schmelzpunkt 190—192°. Wird dasselbe mit Methylalkohol unter Zusatz von methylalkoholischer Salzsäure einige Stunden digerirt, so geht es vollständig in Lösung, und nach starker Concentration scheiden sich schöne Krystallnadeln aus. Die Verbindung lässt sich auch gewinnen, wenn man Narceïn in Methylalkohol suspendirt, Chlorwasserstoffgas bis zur Sättigung einleitet und die Lösung verdunstet. Sie krystallisirt aus Wasser in rechtwinkligen Krystalltafeln, die bei 146—147° erweichen, bei 149° schmelzen. — Sie ist krystallwasserfrei und hat die Zusammensetzung:

- I. 0,2140 g gaben 0,4538 CO₂ und 0,1223 H₂O.
 II. 0,1347 g „ 0,2884 CO₂ „ 0,0773 H₂O.
 III. 0,1470 g „ 0,0438 AgCl.

	Berechnet für C ₂₃ H ₂₆ (CH ₃)NO ₈ HCl	Gefunden		
		I.	II.	III.
C	58,12	57,83	58,35	—
H	6,05	6,35	6,38	—
Cl	7,14	—	—	7,41

Die wässrige Lösung liefert auf Zusatz von Ammoniak, Soda oder Alkalien eine halbfeste, wachsartige Base, die nicht zur Krystallisation gebracht werden konnte. Erhitzt man dieselbe mit Kalilauge, so wird sie zunächst dünnflüssig, bei einigem Kochen tritt jedoch Lösung ein und beim weiteren Eindampfen scheidet sich eine gelbe, ölige Masse aus, die nichts anderes als das Kaliumsalz des Narceïns ist. Löst man nämlich jenes Oel in wenig Wasser, so krystallisirt auf Zusatz von Salmiak sofort das Narceïn aus. Der Methylester wird also durch Kochen mit Alkalien verseift.

Ein mit (Pseudo-)Narceïn bereitetes Präparat zeigte dieselben Eigenschaften, schmolz aber bei 151—152°.

Platindoppelsalz. Die warme wässrige Lösung des Chlorhydrats giebt mit Platinchlorid kurze derbe Krystallsäulen vom Schmelzpunkt 205—206°. Dieselben enthalten kein Krystallwasser.

- I. 0,2134 g gaben 0,3403 CO₂ und 0,0954 H₂O.
 II. 0,1584 g „ 0,0234 Pt.

	Berechnet für (C ₂₃ H ₂₆ (CH ₃)NO ₈ HCl) ₂ PtCl	Gefunden	
		I.	II.
C	43,34	43,47	—
H	4,51	4,95	—
Pt	14,74	—	14,76

Bromhydrat. Bei der Digestion des Narceïns mit methylalkoholischer Bromwasserstoffsäure wurden keine befriedigenden Resultate erhalten. Dagegen gelangt man mit Leichtigkeit zu dem Salz, indem man Bromkaliumlösung zu einer nicht zu verdünnten Lösung des Chlorhydrats hinzufügt. Aus Wasser

krystallisirt es in Prismen vom Schmelzpunkt 148° (Präparat aus (Pseudo-)Narceïn: Schmelzpunkt $152—153^{\circ}$); es enthält kein Krystallwasser.

I. 0,2634 g gaben 0,5101 CO_2 und 0,1344 H_2O .

II. 0,3146 g „ 0,1085 AgBr.

	Berechnet für $\text{C}_{22}\text{H}_{26}(\text{CH}_3)\text{NO}_8\text{HBr}$	Gefunden	
		I.	II.
C	53,23	52,83	—
H	5,55	5,67	—
Br	14,81	—	14,67

Jodhydrat. Dasselbe wurde in gleicher Weise gewonnen; aus Wasser krystallisirt, schmilzt es bei 139° . (Präparat aus (Pseudo-)Narceïn: Schmelzpunkt $141—143^{\circ}$.)

I. 0,2132 g, bei 100° getrocknet, gaben 0,3808 CO_2 und 0,1053 H_2O .

II. 0,2273 g „ 110° „ „ 0,0894 AgJ.

	Berechnet für $\text{C}_{22}\text{H}_{26}(\text{CH}_3)\text{NO}_8\text{HJ}$	Gefunden	
		I.	II.
C	49,03	48,70	—
H	5,10	5,48	—
J	21,63	—	21,2

2. Narceïnäthylester.

Chlorhydrat. In schönen Krystallen lässt sich das Chlorhydrat des Äthylesters gewinnen, wenn man Narceïn in Alkohol suspendirt und etwas alkoholische Salzsäure zugiebt. Aus der klaren Lösung scheidet sich bald das Salz

vom Schmelzpunkt $159—160^{\circ}$ ab, welches beim Digeriren auf dem Wasserbade nach einigen Stunden verschwunden ist. Aus der eingedampften Lösung krystallisirten weisse Nadeln, die zwischen $200—205^{\circ}$ schmolzen. Zur Trennung von etwa noch vorhandenem Narceïnsalz wurde die wässrige Lösung mit Natronlauge — worin Narceïn leicht löslich ist — gefällt. Die abgeschiedene ölige Masse wurde gewaschen und in Salzsäure gelöst. Man erhielt so Krystalle, welche glatt bei $206—207^{\circ}$ schmolzen. (Ein Präparat aus (Pseudo-)Narceïn zeigte denselben Schmelzpunkt.) Dieselben sind krystallwasserfrei.

I. 0,2288 g gaben 0,4954 CO₂ und 0,1355 H₂O.

II. 0,3355 g „ 0,0930 AgCl.

	Berechnet für C ₂₃ H ₂₆ (C ₂ H ₅)NO ₈ HCl	Gefunden	
		I.	II.
C	58,88	58,99	—
H	6,28	6,55	—
Cl	6,96	—	6,76

Das *Platinsalz* ist ein krystallisirtes Pulver vom Schmelzpunkt 194—195°.

I. 0,2517 g, bei 110° getrocknet, gaben 0,4095 CO₂ und 0,1145 H₂O.

II. 0,1902 g „ 110° „ „ 0,0274 Pt.

	Berechnet für (C ₂₃ H ₂₆ (C ₂ H ₅)NO ₈ HCl) ₂ PtCl ₄	Gefunden	
		I.	II.
C	44,21	44,36	—
H	4,71	5,04	—
Pt	14,44	—	14,40

Bromhydrat. Dasselbe krystallisirt aus der wässrigen Lösung des Chlorhydrats nach Zusatz von Bromkalium in irregulären Prismen. Schmelzpunkt 215—216°; es ist wasserfrei.

0,2200 g, bei 120° getrocknet, gaben 0,0774 AgBr.

	Berechnet für C ₂₃ H ₂₆ (C ₂ H ₅)NO ₈ HBr	Gefunden
Br	14,44	14,9

Jodhydrat. Dasselbe wurde in analoger Weise hergestellt. Schöne Prismen vom Schmelzpunkt 212°; es ist wasserfrei.

0,2642 g, bei 120° getrocknet, gaben 0,1050 AgJ.

	Berechnet für C ₂₃ H ₂₆ (C ₂ H ₅)NO ₈ HJ	Gefunden
J	21,12	21,48

V. Weitere Versuche mit Narceïn.

1. Anzahl der Methoxygruppen.

Die Bestimmung erfolgte nach der Methode von Zeisel unter Anwendung von lufttrocknem Narceïn.

I. 0,3024 g gaben 0,4779 AgJ.

II. 0,2498 g „ 0,3924 AgJ.

	Berechnet für C ₂₀ H ₁₈ NO ₆ (OCH ₃) ₃ + 3H ₂ O 3OCH ₃	Gefunden	
		I.	II.
	20,10	20,88	20,76

2. Nachweis des Carbonyls.

a) Narceïnoximanhydrid, $C_{23}H_{26}N_2O_7$.

3 g reinstes Narceïn wurden mit der gleichen Gewichtsmenge Hydroxylaminchlorhydrat und 100 ccm Wasser acht bis zehn Stunden gekocht, wobei eine auch in der Kälte fast klar bleibende Lösung entstand. Beim Zusatz von Ammoniak schied sich ein klebriger, flockiger Niederschlag aus, der beim Erwärmen mit etwas Wasser krystallinisch wurde. Aus 96 procentigem Alkohol wurde der Körper in undeutlichen, weissen, lichtempfindlichen Krystallen vom Schmelzpunkt $171-172^{\circ}$ erhalten, welche bei $100-110^{\circ}$ sich gelb färben, ohne an Gewicht zu verlieren oder den Schmelzpunkt zu verändern.

0,2607 g gaben 14,5 ccm Stickgas bei 18° und 757 mm Druck.

	Berechnet für	Gefunden
	$C_{23}H_{26}N_2O_7$	
N	6,3	6,4

Zum Vergleich wurde das Oxim auch aus Narceïn, welches aus Narcotin bereitet worden war, hergestellt; es schmolz, aus Alkohol zweimal umkrystallisirt, bei $172-173^{\circ}$ und erwies sich in jeder Beziehung mit dem vorigen Präparat identisch.

0,2038 g gaben 0,4632 CO_2 und 0,1131 H_2O .

	Berechnet für	Gefunden
	$C_{23}H_{26}N_2O_7$	
C	62,44	61,99
H	5,88	6,16

Das Oximanhydrid bildet beim Auflösen in verdünnter Salzsäure ein gut krystallisirtes Chlorhydrat, welches getrocknet bei $206-208^{\circ}$ schmilzt.

Narceïnoxim, $C_{23}H_{28}N_2O_8 + H_2O$.

Wird das eben beschriebene Oximanhydrid einige Minuten mit starker Kalilauge gekocht, so bildet sich ein helles Oel, welches beim Verdünnen mit Wasser in Lösung geht. Dampf man nach dem Sättigen mit Kohlensäure ein, so scheidet sich das Kaliumsalz des Oxims in Oeltropfen aus, welche bald zu

schönen, zwischen 155—165° schmelzenden Krystallen erstarren. Durch Zusatz von Essigsäure zur wässrigen Lösung derselben lässt sich das freie Oxim schön krystallisiert ausfallen. Dasselbe wurde in heissem 80 procentigem Alkohol gelöst und daraus in Prismen erhalten, die bei 160° zu sintern anfangen und sich bei 167° zersetzen. Dieselben enthalten, nachdem sie bei 70—80° getrocknet sind, ein Molekül Wasser.

I. 0,2389 g gaben 0,5095 CO₂ und 0,1368 H₂O.

II. 0,3034 g „ 16 ccm Stickgas bei 21° und 759 mm Druck.

	Berechnet für C ₂₃ H ₂₈ C ₂ O ₈ + H ₂ O	Gefunden	
		I.	II.
C	57,74	58,1	—
H	6,27	6,3	—
N	5,8	—	6,02

Die Substanz verlor bei 105—110° zwei Moleküle Wasser unter Bildung des Oximanhydrids.

0,4371 g verloren 0,0315.

	Berechnet	Gefunden
2H ₂ O	7,5	7,2

Die Verwandlung des Oxims in sein Anhydrid lässt sich auch durch kurzes Kochen mit Salzsäure bewerkstelligen, wobei aus der Lösung das Chlorhydrat des letzteren sich ausscheidet. Das Narceïnoxim krystallisiert auch aus heissem Wasser; in Alkali löst es sich sehr leicht schon in der Kälte, in Soda und Ammoniak beim Erwärmen. Seine stark sauren Eigenschaften erklären sich durch die gleichzeitige Anwesenheit der Oxim- und der Carboxylgruppe.

b) *Narceïnphenylhydrazonanhydridchlorhydrat*, C₂₉H₃₁N₃O₆.HCl.

5 g Handelsnarceïn wurden mit der berechneten Menge (1,5 g) salzsaurem Phenylhydrazin und etwa 200 ccm Wasser 30—40 Stunden gekocht. Auf Zusatz von verdünnter Natronlauge zu der lauwarmen, klaren Flüssigkeit schieden sich braune, harzige Flocken ab, die sich beim Rühren zusammenballten und nach einiger Zeit krystallinisch erstarrten. Die abfiltrirte Substanz wurde in heisser verdünnter Salzsäure gelöst und er-

gab beim Erkalten einen Brei von mikroskopisch kleinen, schwach gefärbten, langgestreckten, sechsseitigen Säulen, die zwischen $165-170^{\circ}$ schmolzen. Zur Reinigung wurde das Salz mehrere Male aus Wasser umkrystallisirt, wobei der Schmelzpunkt auf $175-176^{\circ}$ stieg. Als es nochmals mit Soda zerlegt und die freie Base wieder in das Chlorhydrat verwandelt wurde, gelang es weisse Nadeln vom Schmelzpunkt $180-182^{\circ}$ zu erhalten. Dieselben Resultate wurden bei Anwendung von Narceïn puriss. erhalten. Ein zum Vergleich aus künstlich bereitetem Narceïn (Pseudonarceïn) hergestelltes Präparat erwies sich mit dem vorigen identisch, schmolz aber von vornherein glatt bei $185-186^{\circ}$. Analyse I ist mit dieser Substanz, alle anderen sind mit dem vorher beschriebenen, bei $175-176^{\circ}$ schmelzenden Präparate ausgeführt.

- I. 0,2363 g, bei 100° getrocknet, gaben 0,5432 CO_2 und 0,1303 H_2O .
 II. 0,2171 g „ 100° „ „ 0,5005 CO_2 „ 0,1200 H_2O .
 III. 0,2136 g gaben 14 ccm Stickgas bei 20° und 765 mm Druck.
 IV. 0,2900 g „ 0,0756 AgCl.

	Berechnet für $\text{C}_{29}\text{H}_{31}\text{N}_3\text{O}_6\cdot\text{HCl}$	Gefunden			
		I.	II.	III.	IV.
C	62,87	62,69	62,84	—	—
H	5,78	6,13	6,13	—	—
N	7,58	—	—	7,57	—
Cl	6,41	—	—	—	6,45

Wird das Chlorhydrat mit absolutem Alkohol erhitzt, so scheidet sich aus der zuerst entstandenen Lösung sehr bald ein viel schwerer lösliches, isomeres Salz in schönen Nadeln vom Schmelzpunkt 220° ab. Dieselbe Verbindung wird auch aus dem niedriger schmelzenden Chlorhydrat durch Lösen desselben in Methylalkohol oder durch kurzes Digeriren mit Aceton oder Xylol erhalten. Auch Wärme allein vermag die Umwandlung zu bewerkstelligen; bei der Schmelzpunktsbestimmung beobachtet man, dass die bei circa 175° geschmolzene Masse wieder fest wird, um dann erst bei $215-220^{\circ}$ zu erweichen. Analyse I ist mit einem, bei 222° schmelzenden, aus künstlichem Narceïn

bereiteten Präparat, Analyse II mit einem bei 220° schmelzenden Präparat aus Handelsnarceïn angestellt.

I. 0,2451 g, bei 120° ohne Verlust getrocknet, gaben 0,5656 CO₂ und 0,1329 H₂O.

II. 0,4354 g, bei 120° ohne Verlust getrocknet, gaben 0,114 AgCl.

	Berechnet für C ₂₉ H ₃₁ N ₃ O ₆ .HCl	Gefunden	
		I.	II.
C	62,87	62,94	—
H	5,78	6,02	—
Cl	6,41	—	6,47

Durch Krystallisiren aus heissem Wasser lässt sich das bei 220° schmelzende Chlorhydrat in die niedrig schmelzende Verbindung zurückverwandeln, wobei das aus natürlichem Narceïn bereitete Präparat wieder mit dem Schmelzpunkt 175—176°, das andere mit dem Schmelzpunkt 185—186° gewonnen wird. Wahrscheinlich beruht die hier zu Tage tretende Isomerie auf einem Bindungswechsel:

3. Einwirkung von Jodmethyl auf Narceïn.

Narceonsäure, C₂₁H₂₀O₈. Claus und Ritzefeld⁵³⁾ beschreiben das Narceïn methyljodid als fast farblose, bei 173° schmelzende Nadeln, die sich durch Erwärmen der Componenten leicht erhalten lassen. Ich fand, dass im offenen Gefässe bei fünf- bis sechsständigem Erhitzen fast die ganze Menge des Narceïns unverändert blieb und nahm daher die Digestion unter Anwendung eines grossen Ueberschusses von Jodmethyl im Einschlussrohre bei 100° vor. Nach dreistündigem Erhitzen zeigten sich im Rohre zwei Schichten, von denen die untere unverändertes Jodmethyl war, während die obere aus einer zähen, braunen Masse bestand, welche, bei gelinder Temperatur getrocknet, sich in ein festes, sprödes Harz verwandelte. Da Krystallisationsversuche ohne Erfolg blieben, wurde das aus 10 g Handelsnarceïn erhaltene Additionsproduct direct mit

⁵³⁾ Ber. d. deutsch. chem. Ges. **18**, 1571.

50 ccm 30 procentiger Kalilauge etwa 30 Minuten in starkem Kochen erhalten; das in Strömen entweichende Trimethylamin wurde in Salzsäure aufgefangen und durch Analyse seines Platinsalzes identificirt.

Berechnet	Gefunden
36,87	35,98

Im Kolben schwamm auf der Lauge das Kaliumsalz der neuen Säure in Form einer braunen, halbfesten Masse, welche mechanisch abgetrennt und in 100 ccm Wasser gelöst wurde. Als man die filtrirte Flüssigkeit in 200 ccm sehr verdünnte Salzsäure eintropfen liess, fiel die Säure in schwach gefärbten, bald krystallinisch werdenden Flocken aus; sie wurde mehrmals aus starkem Alkohol umkrystallisirt. Nach der ersten Krystallisation erschien die Substanz unter dem Mikroskop in Form kleiner, platter Rhomboëder mit zwei sehr stumpfen Winkeln. Manchmal sind zwei Individuen zu einem Kreuz oder drei zu einem Stern verwachsen. Durch Abrundung des einen Winkel-paares erhalten die Krystalle zuweilen eine wetzsteinartige Form. Nach der zweiten und dritten Krystallisation, zumal bei Anwendung von absolutem Alkohol, zeigten die erhaltenen Krystalle die Form von platten, stumpf abgeschnittenen Säulen, welche ganz schwach gelbbraunlich gefärbt waren, bei 203 bis 204° schmolzen und sich stickstofffrei erwiesen. Sie wurden ohne Verlust bei 120° getrocknet.

0,1525 g gaben 0,3508 CO₂ und 0,0699 H₂O.

	Berechnet für	Gefunden
	C ₂₁ H ₂₀ O ₈	
C	63,00	62,74
H	5,00	5,09

Löst man die Substanz noch ein Mal in einem heissen Gemisch von gleichen Theilen Chloroform und absolutem Alkohol, so erhält man weisse, glänzende Krystalle, die bei 205—206° zu sintern anfangen, aber erst bei 208—209° schmelzen. Sie erscheinen zumeist als sechsseitige Säulen, doch treten manchmal auch unregelmässige sechsseitige Tafeln auf.

Die neue Verbindung ist in Wasser unlöslich; in Alkohol und Eisessig löst sie sich schwerer als in Chloroform. Mit Alkalien, Soda und Ammoniak bildet sie Salze und wird durch Säurezusatz wieder gefällt.

Zum Vergleich wurde auch aus Narcotin bereitetes Narceïn mit Jodmethyl behandelt und das Additionsproduct mit Kalilauge gekocht. Das Trimethylamin wurde auch hier durch Analyse seines Platinsalzes identificirt.

Berechnet	Gefunden
36,87	36,36

Die dabei entstehende stickstofffreie Verbindung erwies sich mit der vorher beschriebenen Narceonsäure völlig identisch.

0,1534 g gaben 0,3559 CO₂ und 0,0736 H₂O.

	Berechnet für C ₂₁ H ₂₀ O ₈	Gefunden
C	63,00	63,27
H	5,00	5,33

Einwirkung von Bromäthyl und Benzylchlorid auf Narceïn.

Nach Claus und Ritzefeld vereinigen sich Narceïn und Bromäthyl beim Erwärmen ziemlich leicht miteinander. Ich habe Narceïn mit einem Ueberschuss von Bromäthyl sechs Tage unter Rückfluss gekocht, ohne eine irgendwie erhebliche Einwirkung constatiren zu können. Beim Kochen des Alkaloïds mit Benzylchlorid entstand ein braunes Reactionsproduct, aus dem es mir aber nicht gelang, das von Claus und Ritzefeld beschriebene, gut krystallisirte Narceïnbenzylchlorid (Schmelzpunkt 162°) zu isoliren. Mit Rücksicht hierauf muss es zweifelhaft erscheinen, ob das zu der vorliegenden Untersuchung verwendete Narceïn mit dem von jenen Forschern verarbeiteten Präparat identisch ist, und es wäre erwünscht, wenn Herr Claus eine Wiederholung der betreffenden Versuche veranlassen würde.

Oxydation des Narceïns.

a) Mit Permanganat bei Gegenwart von Alkali. 5 g Narceïn wurden in das Kaliumsalz verwandelt, letzteres in

150 ccm Wasser aufgelöst und mit einer dreiprocentigen Lösung von Permanganat bei Zimmertemperatur versetzt. Es wurden mehr wie zehn Moleküle Permanganat auf ein Molekül Narcein gebraucht, bis keine Entfärbung mehr eintrat. Das mit Schwefelsäure neutralisirte Filtrat wurde zur Trockne gebracht und mit absolutem Alkohol extrahirt. Beim Verdunsten hinterblieb eine braune Masse, aus der sich ein Baryumsalz herstellen liess, welches bei der Zersetzung etwas unreine Hemipinsäure ergab.

b) Mit Permanganat bei Gegenwart von Schwefelsäure. 20 g aus Narcotin bereitetes Narcein wurden in 200 ccm Wasser suspendirt, 20 ccm Schwefelsäure (1 : 3) hinzugegeben und das gebildete Sulfat in der von Claus und Meixner⁵⁴⁾ beschriebenen Weise mit 60 g Permanganat, gelöst in drei Liter Wasser, oxydirt. Auch die weitere Verarbeitung erfolgte nach jener Vorschrift, doch konnte beim Ausschütteln des Reactionproductes mit Aether nur eine sehr geringe Menge eines Körpers isolirt werden, welcher anscheinend Hemipinsäure war.

Weitere Versuche zur Gewinnung der von jenen Forschern beschriebenen Narceinsäure wurden nicht angestellt, da eine nähere Untersuchung dieser Verbindung nicht beabsichtigt war.

c) Mit Salpetersäure. Die Einwirkung von Salpetersäure auf Narcein wurde in verschiedener Weise ausgeführt, ohne dass es gelungen wäre, eines neuen Oxydationsproductes in grösserer Menge habhaft zu werden. Es wurde lediglich Oxalsäure, etwas Hemipinsäure und eine Säure vom Schmelzpunkt 157° gewonnen; letztere jedoch in so kleiner Quantität, dass eine nähere Untersuchung nicht ausgeführt werden konnte.

Zum Schluss sei es uns gestattet, der Fabrik von E. Merck in Darmstadt, welche durch gütige Ueberlassung des kostspieligen Materials die vorliegenden Versuche sehr gefördert hat, unsern besten Dank abzustatten.

⁵⁴⁾ Journ. f. pract. Chem. **37**, 1.