Plantes De Judée (Deuxième Note)

M. Michel Gandoger

To cite this article: M. Michel Gandoger (1889) Plantes De Judée (Deuxième Note), Bulletin de la Société Botanique de France, 36:3, 177-181, DOI: [10.1080/00378941.1889.10830438](https://doi.org/10.1080/00378941.1889.10830438)

To link to this article: <http://dx.doi.org/10.1080/00378941.1889.10830438>

Published online: 08 Jul 2014.

Submit your article to this journal [↗](#)

Article views: 13

View related articles [↗](#)

PLANTES DE JUDEE (deuxième Note), par **M. Michel GANDOGER.**

Dans le XXXIII^e volume du Bulletin (1886), p. 243, j'ai donné une première liste des plantes récoltées en Judée par M. Joseph Planche. Depuis cette époque, et pendant les années 1886, 1887 et 1888, ce collecteur a soumis à mes déterminations de nouvelles séries d'espèces récoltées soit à Bethléem, soit dans d'autres localités intéressantes de la Palestine et de la Judée.

Sans contenir beaucoup de plantes endémiques, les listes suivantes permettront cependant d'apprécier le fond de la végétation de cette région. En somme, la flore est celle de l'extrême sud de l'Europe ou de l'Afrique septentrionale, avec un mélange plus ou moins considérable d'espèces propres à la Syrie. Ces dernières sont plus abondantes dans la région montagneuse où la végétation revêt un caractère particulier. A une faible distance des côtes de la Méditerranée, elle offre la quasi-uniformité qu'on remarque sur presque tous les rivages de cette mer, quoique cependant, en Orient, elle soit peut-être un peu plus variée qu'en Occident. Mais, en avançant dans l'intérieur des terres, on voit bientôt un changement considérable.

Ainsi, dans la région des plaines vers la mer Morte et la vallée du Jourdain, la flore revêt déjà ce facies qui caractérise si bien la Perse et la Mésopotamie : abondance de plantes épineuses, Crucifères, Papilionacées, Rubiacées, Cynarocéphalées, Salsolacées, etc.; puis, plus à l'Orient et au Sud, la végétation désertique.

Voici le nom des espèces récemment envoyées :

A Bethléem :

Clematis cirrosa.
Batrachium circinatum.
 — *capillaceum.*
Ranunculus rhynchocarpus.
 — *myriophyllus.*
 — *arvensis.*
Ceratocephalus falcatus.
Nigella glauca.
 — *ciliaris.*
Rœmeria orientalis.
Bongardia Chrysogonum.
Leontice Leontopetalum.
Fumaria leucantha.
 — *densiflora.*
Erysimum australe.
Diplotaxis Harra.
Matthiola tristis.

Malcolmia africana.
 — *crenulata.*
 — *lunata.*
Isatis aleppica.
 — *raphanifolia.*
Enarthrocarpus lyratus var. bipinnatifolius.
Neslia paniculata.
Calepina Corvini.
Capsella Bursa-pastoris.
Alyssum campestre.
Farselia eriocarpa.
Erophila macrocarpa.
Aethionema Buxbaumii.
Arabis verna.
Capparis spinosa.
Helianthemum niloticum.
Reseda alba.

- Silene commutata.*
 — *Gaillardotiana.*
 — *conoidea.*
 — *nocturna.*
Holosteum liniflorum.
Alsine... (flores rosei).
Lepigonum medium.
Cerastium nemorale.
Dianthus pallens.
Linum strictum.
 — *flavum.*
 — *angustifolium.*
Lavatera cretica.
Althæa Aucheri.
 — *acaulis.*
Hypericum crispum.
 — *atomarium.*
Geranium pusillum.
Tribulus terrestris.
Peganum Harmala.
Ruta bracteosa.
Haplophyllum villosum.
 — *Biebersteinii.*
Rhamnus oleoides.
Pistacia Terebinthus.
Acacia Stephaniana.
Anagyris foetida.
Calycotome infestans.
Trifolium stellatum.
 — *piluliferum.*
 — *physodes.*
 — *resupinatum.*
 — *scutatum.*
 — *alexandrinum.*
 — *Lagrangei.*
Trigonella coësyriaca.
 — *spicata.*
Medicago cærulea.
Anthyllis tetraphylla.
Lupinus hirsutus.
Ononis mitissima.
 — *hirta.*
 — *antiquorum.*
Alhagi Turcorum.
Arthrolobium scorpioides.
Onobrychis Caput-galli.
Scorpiurus vermiculata.
Astragalus Drusorum.
 — *christianus.*
 — *Stella.*
 — *albidus.*
Psoralea palestina.
Vicia cuneata.
Lathyrus stenophyllus.
Ervum Biebersteinii.
 — *nigricans.*
Rufus sanctus.
- Poterium spinosum.*
Ecballium Elaterium.
Glinus lotoides.
Lythrum thymifolia.
 — *flexuosum.*
Polycarpon tetraphyllum.
Herniaria cinerea.
Sedum altissimum.
Umbilicus horizontalis.
Telmisa microcarpa.
Chætosciadium trichospermum.
Artemisia squamata.
Eryngium falcatum.
 — *creticum.*
Reutera gracilis.
Ridolfia segetum.
Caucalis tenella.
Exoacantha heterophylla.
Helosciadium nodiflorum.
Scandix persica.
Anthriscus silvestris.
Lagœcia cuminoides.
Bupleurum nodiflorum.
Galium sp.
 — *cordatum.*
 — *articulatum.*
 — *Vaillantii.*
 — *tricornis.*
Rubia Olivieri.
Callipeltis cucullaria.
Asperula orientalis.
 — *setosa.*
Lonicera etrusca.
Valerianella vesicaria.
 — *coronata.*
Asterocephalus palestinus.
Scabiosa Columbaria var.?
Cephalaria calva.
Anthemis tripolitana.
 — *arvensis.*
Phagnalon saxatile.
Pulicaria arabica.
Inula viscosa.
Bellis silvestris.
Calendula ægyptiaca.
Filago spathulata.
Achillea Santolina.
Varthemia iphionoides.
Chrysanthemum Myconis.
Crupina Crupinastrum.
Centaurea hyalina.
Amberboa Lippii.
Carduus arabicus.
Kentrophyllum syriacum.
Echinops syriacus.
Cirsium strigosum.
Picnomon Acarna.

- Tragopogon crocifolius*.
Scorzonera undulata.
Podospermum canum.
Thrinia tuberosa.
Lactuca cretica.
 — *coriacea*.
Catananche lutea.
Scolymus hispanicus.
Chondrilla juncea.
Phænopus orientalis.
Tolpis altissima.
Crepis hierosolymitana.
Hagioseris galilæa.
Campanula Rapunculus *var. spiciformis*.
Specularia pentagonia.
Nerium Oleander.
Rhazya orientalis.
Styrax officinalis.
Erythræa babylonica.
Convolvulus syriacus.
 — *Dorycnium*.
 — *cœlesyriacus*.
Physalis somnifera.
Solanum miniatum.
Verbascum tripolitanum.
Heliotropium Boræi.
Echium setosum.
Alkanna lutea.
 — *hispida*.
 — *orientalis*.
Asperugo procumbens.
Cynoglossum clandestinum.
Podonosma syriacum.
Verbena supina.
Vitex Agnus-castus.
Lippia nodiflora.
Stachys palestina.
 — *campanulata*.
 — *hirta*.
Thymbra spicata.
Thymus capitatus.
Sideritis condensata.
 — *pullulans*.
Scutellaria Sieberi.
Origanum Onites.
Phlomis chrysophylla.
Teucrium divaricatum.
Lamium amplexicaule.
 — *album* *var.*
Salvia hierosolymitana.
Micromeria Juliana.
Mentha tomentosa.
Marrubium vulgare.
Molucella lævis.
 — *spinosa*.
Calamintha incana.
Eremostachys laciniata *var. glabrescens*.
- Anarrhinum orientale*.
Veronica syriaca.
 — *anagalloides*.
Linaria albifrons.
 — *fruticosa*.
Acanthus syriacus.
Phelipæa ægyptiaca.
Plumbago europæa.
Statice ægyptiaca.
 — *sinuata*.
 — *articulata*.
Boerhaavia orientalis.
Plantago Lagopus.
Atriplex alba.
 — *incana*.
 — *leucoclada*.
Chenopodium Vulvaria.
Beta maritima.
Noea spinosissima.
Rumex roseus.
Polygonum romanum.
Osyris alba.
Aristolochia hirta.
Euphorbia helioscopia.
 — *Chamæsyce*.
 — *Paralias*.
 — *Peplis*.
 — *Peplus*.
 — *lanata*.
 — *Apios*.
 — *Acanthothamnus*.
Crozophora tinctoria.
Andrachne telephioides.
Parietaria judaica.
 — *diffusa*.
Urtica atrovirens.
Quercus rigida.
Ephedra campylopoda.
Asparagus horridus.
Tamus communis.
 — *creticus*.
Arisarum vulgare.
Allium philisteum.
 — *syriacum*.
 — *criophyllum*.
Bellevalia orientalis.
Muscari Pinardi.
 — *theræum*.
Fritillaria Olivieri.
Scilla autumnalis.
 — *hemisphærica*.
Gladiolus atrovioleaceus.
Crocus lævigatus.
Colchicum orientale.
Ophrys anthropophora.
 — *fusca*.
 — *lutea*.

Ophrys Ferrum-equinum.
 — æstrifera.
 — Speculum.
 Orchis sancta.
 — punctulata.
 — anatolica.
 Serapias neglecta.
 Juncus multiflorus.
 Carex Linkii.
 — divisa.
 — distans.
 Cyperus Monti.
 — patulus.
 — pygmæus.
 Scirpus maritimus.
 — — var. monostachys.
 Cynosurus echinatus.
 — elegans.
 Lamarckia aurea.
 Cynodon Dactylon.
 Piptatherum multiflorum.
 — cærulescens.
 Egilops triaristata.
 Triticum bæoticum.

Lolium tenue.
 Hordeum marinum.
 — leporinum.
 — maritimum.
 Agropyrum Linkii.
 Agrostis verticillata.
 Pennisetum Tiberiadis.
 Briza maxima.
 Poa bulbosa var. vivipara.
 Bromus madritensis.
 — scoparius.
 — arvensis.
 — macrostachys var. tomentosus.
 Arrhenatherum palestinum.
 Koeleria hispida.
 Avena orientalis.
 Lagurus ovatus.
 Phalaris aquatica.
 Sorghum halepense.
 Secale montanum.
 Polypogon monspeliensis.
 Sclerochloa memphitica.
 Ramalina parietina.

A Amoas :

Zizyphus Spina-Christi.
 Bellis annua.
 Lagoseris bifida.
 Thrincia hispida.

Iris palestina.
 Ophrys bicornis.
 — Ferrum-equinum.

Au Mont-Thabor :

Pistacia chia.

| Styrax officinalis.

Au Mont-Carmel :

Polycarpon tetraphyllum.
 Sedum altissimum.
 Thymus capitatus.

| Stachys palestina.
 Euphorbia Peplis.

Au lac de Tibériade :

Batrachium circinatum.
 Nerium Oleander.
 Vitex Agnus-castus.

| Juncus multiflorus.
 Pennisetum Tiberiadis.

A Nazareth :

Reseda alba.
 Exoacantha heterophylla.
 Thymbra spicata.
 Sideritis ambigua.

| Sideritis pullulans.
 Origanum Onites.
 Pennisetum Tiberiadis.

A Saint-Jean-d'Acre :

Nigella ciliaris.
Lagonychium Stephanianum.
Rubus sanctus.
Lythrum flexuosum.
Rhazya orientalis.
Asterocephalus proliferus.
Physalis somnifera.

Erythræa babylonica.
Vitex Agnus-castus.
Lippia repens.
Statice sinuata.
Euphorbia Paralias.
Scirpus maritimus.

A Jéricho et aux bords du Jourdain à son embouchure vers la mer Morte :

Sinapis orientalis.
Reseda alba.
Oligomeris glaucescens.
Ochradenus baccatus.
Silene colorata.
Cerastium nemorale.
Zygophyllum dumosum.
Vicia hybrida.
 — *narbonensis.*
Astragalus Johannis.
Retama Retam.
Chætosciadium trichospermum.
Ainsworthia cordata.

Lycium orientale.
Statice pruinosa.
Boerhavia procumbens.
Phelipæa longiflora.
Atriplex Halimus.
Anabasis Ehrenbergii.
Suæda asphaltica.
 — *altissima.*
Osyris alba.
Urtica pilulifera.
Populus euphratica.
Asphodelus fistulosus.

SÉANCE DU 22 MARS 1889.

PRÉSIDENCE DE M. G. BONNIER, PREMIER VICE-PRÉSIDENT.

M. Maury, vice-secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance du 8 mars dont la rédaction est adoptée.

M. le Président a le regret d'annoncer à la Société le décès d'un éminent botaniste, M. Charles Martins, correspondant de l'Institut et professeur honoraire à la Faculté des sciences de Montpellier.

Charles Martins était né à Paris en 1806. A la fois géologue et botaniste, il a publié de très nombreux travaux qui traitent surtout des rapports que présentent entre elles les deux sciences dont il s'occupait. Un de ses premiers Mémoires, souvent cité et où il expose la topographie botanique du mont Ventoux, est resté classique en géographie botanique. C'est d'ailleurs cette partie de notre science qui a été principalement l'objet de ses études. Dans deux voyages scientifiques au nord de l'Europe et dans une excursion sur les côtes de l'Asie Mineure, Charles Martins a recueilli un grand nombre d'obser-