Schreiben des Herrn Professors *Weisse*, Directors der Sternwarte in Cracau, an den Herausgeber.

Hierbei übersende ich Ihnen einige an der hiesigen Sternwarte beobachtete Sternbedeckungen und Mondsterne für die Astron. Nachrichten. Zugleich erlaube ich mir, einige Resultate der meteorologischen Beobachtungen des Jahres 1855 beizufügen.

Der mittlere Barometerstand war 329^m010 Paris. M.

Dreissigjährige Beobacht. geben denselben = 329^m064.

Der höchste Stand des Barom. war den 19. Decbr. 338^m94

Der tiefste — — — 14. Febr. 317^m40,

so dass die ganze Oscillation 21^m54 betrug.

Die mittlere Temperatur war = +5^o3 R., bedeutend geringer, als das dreissigjährige Mittel = +6^o49 R.

Die grösste Wärme war den 3. u. 4. August = +26^o8 R.

Die kleinste — — — 20. December = -24^o2 R.

Die Oscillation = 51^o0.

Der mittlere Dunstdruck war = 3^m083.

Der grösste — — — den 26. August = 8^m15.

Der kleinste — — — den 31. Januar = 0^m10.

Die mittlere Luftfeuchtigkeit war = 82,53.

Der herrschende Wind war von West.

Gewitter zählte man 33, Stürme 28, Schnee fiel an 69, Regen an 132 Tagen.

Die Reduction und Catalogisirung der *Bessel'schen* Zonen, welche die Sterne zwischen +15° und +45° der Declination enthalten, habe ich beendet, und der Catalog ist zum Drucke bereit. Ich erwarte nächstens Nachricht aus St. Petersburg, ob der Druck sogleich beginnen und ununterbrochen fortgeführt werden kann. Die einzelnen Stunden dieses neuen Cataloges enthalten folgende Zahl von Beobachtungen:

die 0 ^h	1542	VI ^h	1922	XII ^h	1205	XVIII ^h	1931
I	1488	VII	1702	XIII	1354	XIX	2055
II	1482	VIII	1531	XIV	1329	XX	1884
III	1334	IX	1222	XV	1574	XXI	1557
IV	1471	X	1245	XVI	1880	XXII	1399
V	2067	XI	1227	XVII	1966	XXIII	1390

Die Anzahl aller Beobachtungen beträgt daher zusammen 37757.

In diesem neuen Cataloge sind die öfters beobachteten Positionen eines Sterns nicht zusammengezogen, sondern alle Beobachtungen sind einzeln angegeben mit der Zahl der Zone, wo die Beobachtung enthalten ist.

Cracau, den 19. August 1856.

Dr. *Max Weisse*.

Sternbedeckungen und Mondsterne, beobachtet auf der K. K. Sternwarte in Cracau.

Sternbedeckungen.

			Mittl. Zt. Kr.	Sternzeit	
1854 Novbr. 25	Eintritt	35 Capricorni um	8 ^h 18 ^m 36 ^s 36 =	0 ^h 35 ^m 9 ^s 61	sehr gut
— Decbr. 27	„	μ Piscium „	8 13 25,53 =	2 37 7,97	ziemlich gut
1855 März 23	„	98 k Tauri „	10 9 58,17 =	10 13 3,54	sehr gut
— Juni 27	„	22 Scorpii „	10 8 17,20 =	16 29 51,70	sehr gut
1856 März 10	„	ρ ² Arietis „	9 5 19,03 =	8 19 58,12	gut
— „ 10	„	ρ ³ Arietis „	9 13 15,82 =	8 27 56,22	ziemlich gut
— „ 11	„	33 Tauri „	11 2 24,76 =	10 21 19,64	gut
— „ 13	„	136 C Tauri „	10 33 48,80 =	10 0 32,09	sehr gut
— „ 17	„	Leonis „	7 20 44,54 =	7 2 42,34	gut
— Juni 16	„	20 σ Scorpii „	8 37 19,33 =	14 18 16,30	sehr gut

Sterne im Parallel des Mondes.

		AR	Fäd.			AR	Fäd.
1854 Nov. 27	Mond. I Rand	23 ^h 4 ^m 11 ^s 32	5	1855 Jan. 24	ν Piscium	1 ^h 33 ^m 52 ^s 47	5
	B. A. 8285	23 42 44,87	5		Mond. I Rand	1 51 0,75	5
	27 Piscium	23 51 14,34	5		ξ' Ceti	2 5 18,41	3
— Dec. 27	20 Ceti	0 45 35,57	5		ξ ² Ceti	2 20 26,57	5
	c Piscium	1 0 53,95	5	— Mai 28	m Virginis	13 34 1,88	5
	Mond. I Rand	1 18 57,62	5		Mond. I Rand	13 59 40,66	5
	o Piscium	1 37 44,50	5		α ² Librae	14 42 53,13	3

		AR	Fäd.
1855 Juni 27	δ Scorpii	15 ^h 51 ^m 47 ^s 96	2
	β' Scorpii	15 57 2,85	2
	Mond. I Rand	16 18 51,88	4
	$\mathcal{A}$ Ophiuchi	17 6 28,48	1
	θ Ophiuchi	17 13 8,88	5
— Aug. 23	Mond. I Rand	18 31 25,03	5
	ν' Sagittarii	18 45 27,36	5
	ξ Sagittarii	18 53 25,76	5
— Aug. 24	Mond. I Rand	19 39 23,91	5
	c Sagittarii	19 53 47,11	5
	π Capricorni	20 19 3,93	5
— Aug. 25	π Capricorni	20 19 3,95	1
	Mond. I. Rand	20 46 33,16	5
	γ Capricorni	21 32 6,05	5
	δ Capricorni	21 38 4,91	3
— Aug. 27	τ^2 Aquarii	22 41 57,53	5
	δ Aquarii	22 47 0,01	5
	Mond. II Rand	22 53 29,62	5
1856 Jan. 14	Mond. I Rand	1 30 25,87	5
	ξ' Ceti	2 5 22,04	5
	ξ Arietis	2 17 6,00	5
— März 14	η Geminorum	6 6 11,60	5
	μ Geminorum	6 14 15,33	5
	Mond. I Rand	6 33 48,18	5
	δ Geminorum	7 11 31,97	5

		AR	Fäd.
1856 März 17	Mond. I Rand	9 ^h 18 ^m 22 ^s 95	5
	ε Leonis	9 37 41,79	5
	η Leonis	9 59 29,90	5
— März 18	ε Leonis	9 37 41,76	5
	η Leonis	9 59 30,17	5
	Mond. I Rand	10 6 35,25	5
	44 Leonis	10 17 41,11	5
	ρ Leonis	10 25 14,97	5
— März 19	44 Leonis	10 17 41,02	5
	ρ Leonis	10 25 14,92	5
	Mond. I Rand	10 52 9,83	5
— April 17	ν Virginis	11 38 29,00	5
	β Virginis	11 43 13,11	5
	Mond. I Rand	12 4 27,77	5
	η Virginis	12 12 33,86	5
	γ Virginis	12 34 23,71	5
— Mai 14	τ Leonis	11 20 32,81	5
	β Virginis	11 43 13,01	5
	Mond. I Rand	11 48 38,98	5
	10 Virginis	12 2 19,73	5
— Mai 15	10 Virginis	12 2 19,96	5
	Mond. I Rand	12 31 35,29	5
— Juli 14	τ Scorpii	16 26 58,35	5
	Mond. I. Rand	16 46 8,66	5
	d Ophiuchi	17 18 12,88	5

Dr. Max. Weisse.

Schreiben des Herrn Professors *Wolf* an den Herausgeber.

Während mir die schöne Witterung dieses Sommers fast täglich erlaubt, meine Beobachtungen der Sonnenflecken fortzusetzen, und mir so das Vergnügen gewährt, ihr erstes, vorausbestimmtes Minimum sich einhalten zu sehen, habe ich auch begonnen, in der seit Kurzem unter meiner Redaction erscheinenden „Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich“ eine Reihe von Mittheilungen über die Sonnenflecken zu veröffentlichen. Die Erste enthält eine Zusammenstellung aller meiner bisherigen Beobachtungen, welche den Lesern der Astron. Nachr. im Wesentlichen bereits bekannt sind. Die Zweite, welche ich eben zum Drucke fertig habe, enthält dagegen neue Untersuchungen, deren Resultate ich mir denselben hier in Kurzem vorzulegen erlaube: Nach meinen siebenjährigen Beobachtungen der Sonnenflecken zeigt sich in denselben ausser der oben berührten grossen Periode von $11\frac{1}{2}$ Jahren auch eine dem Erdjahre

entsprechende Periode, und zwar in gedoppelter Weise: Einerseits ist das, das Perihel enthaltende Winterhalbjahr im Allgemeinen fleckenreicher als das, das Aphel enthaltende Sommerhalbjahr. Andererseits finden sich nahe zur Zeit der Equinoctien, nämlich Ende Februar oder Anfang März und erste Hälfte October zwei Maxima, — nahe zur Zeit der Solstitien, nämlich Anfang Januar und Anfang Juli, zwei Minima. Noch besser als mit den beiden Solstitien treffen die beiden Minima mit den Tagen (5. Januar und 6. Juli) zusammen, wo die Erdaxe in die durch eine Parallele zu ihr und die Sonnenaxe gelegte Ebene fällt. Ebenso kommt das eine Maximum dem einen der Tage (7. October und 3. April) nahe, wo die Erdaxe sich am weitesten von jener Ebene entfernt, und es wird daher wahrscheinlich auch das andere Maximum mit dem andern dieser Tage zusammenfallen sollen, und in meiner verhältnissmässig nur sehr kurzen Beobach-