Rapport Sur L'Excursion Faite Par La Société, Le 17 Mai, Sur La Côte De Collioure A Banyuls En Passant Par Le Fort Saint-Elme Et Les Garigues De La Croix-Blanche

Dr M. Le Simon Pons

To cite this article: Dr M. Le Simon Pons (1891) Rapport Sur L'Excursion Faite Par La Société, Le 17 Mai, Sur La Côte De Collioure A Banyuls En Passant Par Le Fort Saint-Elme Et Les Garigues De La Croix-Blanche, Bulletin de la Société Botanique de France, 38:10, LXXXIV-LXXXVI, DOI: [10.1080/00378941.1891.10839605](https://doi.org/10.1080/00378941.1891.10839605)

To link to this article: <http://dx.doi.org/10.1080/00378941.1891.10839605>

Published online: 08 Jul 2014.

Submit your article to this journal [↗](#)

Article views: 9

View related articles [↗](#)

et pour constater la présence de l'*Asplenium marinum*, signalé dans les falaises de Mourrèdes par le regretté P. Oliver.

Les retardataires rejoignent le gros de la troupe et nous rentrons à Collioure, très chargés, et par conséquent très satisfaits de notre première herborisation.

RAPPORT SUR L'EXCURSION FAITE PAR LA SOCIÉTÉ, LE 17 MAI, SUR LA CÔTE DE COLLIOURE A BANYULS EN PASSANT PAR LE FORT SAINT-ELME ET LES GARIGUES DE LA CROIX-BLANCHE; par **M. le Dr Simon PONS**.

A une heure et demie, nous étions tous réunis devant l'hôtel, attendant le signal du départ. Nous quittons la ville dans la direction du Sud-Est, prenant pour point de repère le Fort Saint-Elme qui domine à la fois Collioure et Port-Vendres. Nous suivons pendant dix minutes un sentier encaissé et entouré à gauche et à droite de terrains cultivés, conditions peu favorables pour une bonne récolte. Sur le bord même du sentier, nous observons l'*Acanthus mollis* non fleuri; c'est la seule localité des environs où l'on observe cette plante. On note :

Alyssum maritimum.
Cynosurus echinatus.
Convolvulus althæoides.
Punica Granatum.
Urospermum Dalechampii.
Osyris alba.
Koeleria phleoides.
Euphorbia segetalis.
 — *serrata*.
 — *biumbellata* Poir.
Polypodium vulgare.
Urospermum picroides.
Crepis virens Vill.
 — *taraxacifolia*.

Fumaria capreolata var. β . *speciosa*
 [F. *speciosa* Jordan].
Rosa sempervirens var. *scandens* Mill.
Andryala sinuata forma *lyrata* Pourr.
Convolvulus Cantabrica.
 — *arvensis*.
Cistus albidus.
 — *salvifolius*.
Ornithopus compressus.
Rhamnus Alaternus.
Melandrium macrocarpum Willk. [*Lych-
 nis macrocarpa* Boiss. et Reut.].
Calycotome spinosa.
Helichrysum Stœchas.
Lavandula Stœchas.

Nous ne tardons pas à quitter le sentier pour battre les anciennes vignes envahies par la végétation spontanée depuis que le phylloxéra a détruit les vignobles du Roussillon. Des murs destinés autrefois à soutenir les terres s'échelonnent en gradins tout le long de ces garigues et entravent la marche; mais les espèces intéressantes foisonnent et nous récoltons :

Sedum altissimum Poir.
Avena sterilis.
Silene italica.
 — *inflata* v. *oleracea* (S. *oleracea* Bor.).
Filago arvensis.

Crepis recognita Hall.
Centaurea cærulescens Willd.
Rosa dumalis Bechst.
Lactuca perennis forma *cichoriifolia*.
Antirrhinum majus forma ?... (Rouy).

Quercus Suber.	Orobanche cruenta (sur l' <i>Ulex parvi-</i> <i>florus</i>).
Avena barbata.	

Dans un ravin, chacun cueille une branche de *Myrtus communis* et l'ascension recommence ; le vent du nord souffle avec violence et tempère l'ardeur du soleil ; nous rejoignons sans trop de fatigue le sentier qui nous conduira en quelques instants au *Fort Saint-Elme*. Chemin faisant, nous voyons :

Asplenium Adiantum-nigrum <i>forma</i> .	Cratægus ruscinonensis <i>Grenier</i> . Reseda aragonensis [<i>R. Phytsuma</i> L. pro p.]. Linaria ambigua <i>Huet</i> .
Smilax aspera.	
Anarrhinum bellidifolium <i>var. luseti-</i> <i>tianum</i> .	
Dorycnium suffruticosum.	

Avant d'arriver à la route stratégique, le *Sideritis Endressii* attire surtout notre attention ; malheureusement, il n'est pas encore en fleur. Tout autour et dans l'enceinte même du fort, nous récoltons :

Allium Chamæmoly (en fruits avancés).	Mercurialis Huetii. Trigonella monspeliaca.
Potentilla hirta.	

Nous prenons quelques minutes de repos, tout en admirant le panorama qui s'offre à nos yeux : d'un côté, Port-Vendres avec son port et sa jetée ; de l'autre, la baie de Collioure, avec les sinuosités de la côte ; derrière nous, au premier plan, *Madeloc* et le pic *Taillefer* ; plus loin, la *Massane* se reliant au massif des Albères ; et tout à fait au fond, à l'ouest et au nord-ouest, le sommet du *Canigou*, couvert encore de neige, et la crête bleuâtre des Corbières.

Nous descendons lentement sur Port-Vendres, tantôt en suivant la route stratégique, tantôt en pénétrant dans les garigues de la *Croix-Blanche*, où nous avons à cueillir quelques bonnes plantes :

Ruta angustifolia.	Medicago Murex <i>Willd</i> . — suffruticosa <i>Ram</i> . Aceras densiflora <i>Boiss</i> . Polycarpon peploides. Bromus rubens. — mollis. — madritensis. Cynoglossum pictum.
Cheilanthes odora.	
Thapsia villosa.	
Phelipæa Muteli <i>Reuter</i> .	
Onopordon illyricum <i>var. maritimum</i>	
<i>Debeaux</i> .	
Carduus tenuiflorus.	
Lotus corniculatus.	
Medicago præcox <i>DC</i> .	

Dans les environs de Port-Vendres et se rapprochant de la mer, on constate la présence de :

Hyoseris radiata.	Cineraria maritima (non fleuri). Asphodelus microcarpus. <i>Viv</i> .
Carduus pycnocephalus.	
Frankenia lævis.	

A quatre heures, nous étions à Port-Vendres. Notre premier soin est d'aller explorer les environs du port et la jetée. A droite du port, dans une prairie, M. Foucaud nous signale la présence du *Ranunculus macrophyllus*.

Dans les lieux herbeux nous récoltons :

Trifolium tomentosum.	Lagurus ovatus.
Echium plantagineum.	Euphorbia segetalis forma pinea
Daucus Gingidium L. (non fleuri).	[E. pinea L.].
Passerina hirsuta.	— pithyusa.

Avant d'arriver au premier tunnel, sur les rochers escarpés abondent :

Armeria ruscinonensis Gir.	Sonchus tenerrimus var. pectinatus.
----------------------------	-------------------------------------

Dans les fossés et les mares : *Callitriche verna* Kütz.

Trois tunnels à traverser, et nous voici sur la jetée. Nous jouissons un instant du spectacle grandiose de la mer agitée ; les vagues viennent se briser avec fracas sur les énormes rochers crevassés qui relient la jetée à la côte. Retournant sur nos pas, nous visitons la ville et assistons à l'arrivée d'un paquebot transatlantique. A cinq heures et demie, départ pour Collioure. En quittant Port-Vendres, quelques botanistes vont récolter, autour du cimetière, le *Convolvulus lineatus* L. et y cherchent en vain le *Convolvulus siculus* L.

La route de Port-Vendres à Collioure est admirablement située ; elle suit en corniche les sinuosités de la côte : le trajet n'est pas long et semble trop court.

A six heures nous rentrions à Collioure, avec un fort butin et la satisfaction d'une deuxième journée aussi bien remplie que la précédente.

RAPPORT SUR L'HERBORISATION FAITE PAR LA SOCIÉTÉ, LE 18 MAI, AU PIC DE TAILLEFER ; par M. le D^r PONS.

Le programme est un peu plus chargé que les jours précédents : nous devons faire l'ascension du pic *Madeloc* (650 mètres), en passant par la vallée du *Douy*, l'ermitage de *Consolation* et le mas de la *Serre*. A cinq heures et demie, nous quittons Collioure dans la direction du vallon du *Douy*, suivant un sentier encaissé et entouré de haies et de murs de soutien. On signale aussitôt :

Punica Granatum.	Ranunculus bulbosus.
Celtis australis.	Veronica arvensis.
Lycium europæum.	Sisymbrium officinale.
Fumaria capreolata.	Picridium vulgare.
— parviflora.	Alyssum maritimum.
— officinalis.	Crepis virens Vill.
— major Rchb.	— taraxacifolia.