mittlerendes Hinken nach einer Gemütsbewegung. Dann Verschwinden der Symptome durch acht Jahre. Dann nach körperlicher Überanstrengung neuerliches plötzliches Einsetzen der Symptome. Die Fuss- und Beinarterien waren völlig (auch radiologisch) normal. Späterhin neuerliches Aufhören der Symptome.

Bei Beantwortung der Frage, ob eine angeborene Enge der Gefässe den Symptomenkomplex der Claudicatio intermittens begünstigt, möchte ich darauf hinweisen, dass zwischen einer juvenilen und einer späteren Form unterschieden werden muss. Für die juvenile Form würde die angeborene Zartheit gewiss in Frage kommen, wie die eben mitgeteilten Beobachtungen Oppenheims und Mendels zeigen. Ob aber dieses Moment auch für die Claudicatio intermittens der älteren in Betracht kommt, ist zweifelhaft.

Besserung organischer Formen, selbst sehr weitgehende, haben wir wiederholt gesehen, sogar wenn Gangrän anscheinend unvermeidbar ist, kann noch Rückbildung erfolgen.

Unter unseren Fällen waren 70 Proz. Juden, obgleich die älteren Leute weitaus prävalierten.

Platffuss sah ich nicht selten, ich glaube in 15 Proz. der Fälle.

Bezüglich der Prognose darf man nicht verzweifeln. Einer meiner Kranken, den ich vor zwölf Jahren zum ersten Male sah, ist noch heute berufsfähig.

Nach diesem Vortrag wird auf Antrag wegen vorgerückter Zeit beschlossen, die Zeitdauer der noch folgenden Vorträge auf höchstens zehn Minuten zu fixieren und eine Diskussion nur ausnahmsweise und auf ausdrücklichen Wunsch der Versammlung zuzulassen.

16. Herr Otto Maas-Berlin: **Zur Kenntnis familiärer Nervenkrankheiten.** (Mit 6 Abbildungen.)

Ich möchte mir erlauben, Ihnen über zwei Geschwister zu berichten, bei denen das gleiche Nervenleiden bestand, das aber, wie so häufig bei familiären Krankheiten, keinem der bekannten Typen zugerechnet werden kann. — Während wir in der Mehrzahl solcher Fälle nur über den klinischen Befund Kenntnis erhalten — da die Krankheiten nicht unmittelbar zum Tode führen, bietet sich nur selten Gelegenheit zur anatomischen Untersuchung —, war ich in der Lage, beide Fälle auch histologisch zu untersuchen. Die Patienten, die ich dank der Liebenswürdigkeit des leitenden Arztes des Siechenhauses in der Fröbelstrasse, Herrn Sanitätsrat Gräffner, zu beobachten Gelegenheit hatte, wurden vor 6 Jahren in der Berliner neurologischen Gesellschaft demonstriert¹⁾.

1) Berliner klin. Wochenschrift. 1904. Nr. 31. Neurol. Zentralbl. 1904.

Die wesentlichsten Punkte aus der Krankengeschichte sind folgende:

Die Mutter der Kinder litt in den letzten Lebensjahren an seniler Demenz, der Vater war Trinker und endete durch Selbstmord, sonst habe ich nichts über hereditäre Belastung in Erfahrung bringen können; weder bei den Geschwistern des Vaters, noch denen der Mutter, sowie deren Kindern sind Nervenleiden vorgekommen, die Eltern waren nicht blutsverwandt, auch für hereditäre Lues unserer Patienten hat sich kein Anhaltspunkt ergeben. Ausser unseren Patienten hatten die Eltern derselben noch zwei Kinder, die in jungen Jahren starben.

Unsere Patienten waren beide bis zum 14. Lebensjahr gesund, in diesem Alter stellte sich bei ihnen Schwäche und Unsicherheit der Hände und Füße ein, auch machte sich schon bald deutliche Abmagerung derselben bemerkbar. Bei der Schwester scheinen auch schon beim Beginn der Krankheit die geistigen Fähigkeiten etwas nachgelassen zu haben, während der Bruder bis zum Tode geistig gesund blieb. Die Schwester stand, als ich sie zuerst sah, im 24. der Bruder im 30. Lebensjahr; die Schwester starb 3 1/2 Jahre, der Bruder ca. 4 1/2 Jahre später. Während meiner Beobachtungszeit schritt das Leiden wohl noch etwas fort, neue Symptome traten aber nicht auf.

Der klinische Befund war folgender: Pupillen und Augenhintergrund völlig normal, ebenso der Facialis. Bei Augenbewegungen, die im übrigen frei waren, sah man zuweilen ein paar nystagmoide Zuckungen, die herausgestreckte Zunge zitterte fibrillär, die Sprache war deutlich näselnd und skandierend, das Gaumensegel hob sich bei der Schwester etwas mangelhaft, beim Bruder gut, die Kehlkopfuntersuchung (San.-R. Dr. Gräffner) ergab nur bei dem Bruder pathologischen Befund: „Das linke Stimmband befindet sich in Kadaverstellung, das rechte bewegt sich ungenügend.“

Die Muskulatur der oberen Extremitäten war schlaff und atrophisch, ganz besonders deutlich war die Atrophie am Daumen- und Kleinfingerballen, wie Sie das auf der Photographie hier sehen; bei beiden bestand auch ein leichter Grad von Krallenhand. Der Muskeltonus war herabgesetzt, Sehnenphänomene nicht gesteigert, z. T. abgeschwächt, alle aktiven Bewegungen waren stark paretisch, Opposition des Daumens fehlte ganz, beim Fingernasenversuch sah man bei dem Bruder geringes, bei der Schwester sehr grobes Wackeln, das Lagegefühl war aber bei beiden völlig intakt, ebenso das Gefühl für Berührungs- und Schmerzreize.

Auch die Rumpfmuskulatur war sehr schwach, so dass sich die

Patientin aus der Rückenlage ohne Unterstützung der Hände nicht erheben konnten.

An den unteren Extremitäten sah man bei dem Bruder deutlich fibrilläres Zittern, bei der Schwester hat das früher ebenfalls bestanden, was ich einer, einige Jahre zuvor von anderer Seite angefertigten Krankengeschichte entnehme. Bei beiden bestand ausgesprochener Hohl Fuss und Atrophie der Muskulatur, die aber zum Teil

Fig 1 zeigt die Atrophie des Unterarms und der Daumenballenmuskulatur im Gegensatz zu dem darüber befindlichen Daumenballen eines normalen Individuums.

durch Fettgewebe verdeckt war; Spasmen, erhöhtes Kniephänomen, dorsaler Zehenreflex, zeitweilig auch Fussklonus. Bei der Schwester bestand fast völlige Lähmung der Beine, bei dem Bruder distalwärts an Intensität zunehmende Parese. Bei dem Bruder bestand beim Kniehackenversuch Wackeln, bei der Schwester liess sich das in Folge der Lähmung nicht feststellen, hat aber auch in früheren Jahren bestanden. Auch an den unteren Extremitäten ergab die Prüfung des Gefühls normalen Befund für alle Qualitäten.

Die elektrische Untersuchung ergab beim Bruder nur quantitative

Störungen, bei der Schwester in den kleinen Handmuskeln auch träge Zuckung.

Störungen des Wasserlassens und Doppeltsehen hat bei beiden Patienten zu keiner Zeit bestanden; Genitalien waren gut entwickelt, Menses bei der Schwester regelmässig.

Von den differentialdiagnostisch in Betracht kommenden Krankheitsbildern unterscheidet sich das Leiden unserer Patienten in wesentlichen Punkten: von der amyotrophischen Lateralsklerose durch das Wackeln bei Zielbewegungen, von der Friedreichschen Krankheit durch die im Vordergrund stehenden Atrophien. Nur in ganz vereinzeltten Fällen Friedreichscher Krankheit wurden Muskelatrophien beobachtet, meines Wissens aber in keinem so früh und so intensiv auftretend wie hier. — Durch diese unterscheidet sich das Leiden unserer Patienten auch von der „Hérédoataxie cérébelleuse Maries“¹⁾, bei der auch Augenmuskellähmungen auftreten, die bei unseren Patienten fehlen.

Im Rahmen dieser kurzen Demonstration muss ich es mir selbstverständlich versagen, auf die ganz vereinzeltten, mehr oder minder nahestehenden Beobachtungen anderer Autoren einzugehen.²⁾

Die Schwester starb im Dezember 1907 an einer Lungenentzündung, der Bruder ohne vorhergegangene Krankheit plötzlich im Januar 1909.

Das Gehirngewicht beim Bruder betrug 1100 Gramm, bei der Schwester 1000 Gramm; auffällig klein war bei beiden das Kleinhirn (s. Fig. 2), das des Bruders wog nach mehrmonatlicher Härtung in Müllerscher Flüssigkeit zusammen mit der Brücke 70 Gramm, während das normale Kleinhirngewicht 130 bis 150 Gramm beträgt. Auch das Rückenmark war im ganzen sehr klein und dünn.

Die histologische Untersuchung, die ich z. T. noch im Laboratorium meines verehrten früheren Chefs, des Herrn Professor Oppenheim, z. T. im Laboratorium des Hospitals Buch ausführte, hatte folgendes Ergebnis:

A. Nissl-Färbung. 5. Cervikalsegment.

Die Zahl der Vorderhornzellen ist stark vermindert, namentlich aber hat der Bau der einzelnen Zelle in stärkster Weise gelitten, die Zellen sind wesentlich kleiner als normal, nur ganz vereinzelt sieht man die charakteristische polygonale Figur; an vielen fehlen die Fortsätze, oder dieselben sind stark verkürzt; der Kern ist meist gut erhalten, häufig ist die Kernmembran auffallend dunkel gefärbt. An

1) Die Selbständigkeit dieser Krankheit wird heute meist nicht mehr anerkannt. S. Oppenheim, Lehrbuch. 5. Aufl. S. 226.

2) Eine übersichtliche Darstellung des ganzen Gebietes gibt Bing in den Ergebnissen der inneren Medizin und Kinderheilkde. 1909. Bd. 4.

manchen Zellen sind auch die Nisslschollen kleiner als normal und lassen die charakteristische Lagerung vermissen, vielfach ist auch das Protoplasma der Zellen mitgefärbt und es heben sich die Nisslschollen nicht so deutlich wie normalerweise von der Grundsubstanz ab. In

Fig. 2. Gehirnbasis. Bemerkenswert die Kleinheit des Cerebellums.

manchen stark abgerundeten Zellen umgeben die Nisslschollen den Kern kranzförmig; nirgends Pigmentvermehrung.

In allen übrigen Höhen boten die Vorderhörner durchaus das gleiche Bild, während an den Zellen der Stilling-Clarkeschen Säulen nichts Pathologisches festgestellt werden konnte.

B. Weigert- und van Gieson-Färbung.

Cervikalmark (s. Fig. 3 bis 6¹⁾): Diffuse Aufhellung der ganzen Seiten- und Vorderstränge, namentlich im Gebiet der Pyramidenbahn;

Fig. 4.

Fig. 6.

Figs. 3—6 Rückenmark. Weigertpräparate.

Fig. 3.

Fig. 5.

1) Die Mikrophotogramme sind nach Präparaten der Schwester hergestellt, da bei dieser die Degeneration stärker ist und auf der Reproduktion deutlicher hervortritt.

relativ am besten erhalten sind die der grauen Substanz unmittelbar benachbarten Fasern. Die Hinterstränge sind normal.

Fast überall an der Peripherie leichter Grad von Randgliose. Im Gegensatz zu den hinteren Wurzeln sind die austretenden vorderen Wurzeln ausserordentlich dünn, und das Fasernetz der grauen Substanz ist namentlich im Gebiet der Vorderhörner stark aufgehellt. Die einzelnen Fasern sind grösstenteils sehr dünn, dünner als in normalen Vergleichspräparaten und zwar in allen Strängen, gequollene Fasern sind fast nirgends zu sehen. Namentlich im Gebiet der Pyramiden seitenstränge sieht man mässige Vermehrung des Gliagewebes. Pia und Gefässwände bieten nichts Abnormes.

Die Degeneration nimmt in den tieferen Segmenten an Intensität etwas ab, ist aber bis in das Sakralmark herab zu verfolgen, stets die gleichen Gebiete betreffend; im Dorsalmark ist bemerkenswert, dass das Fasernetz der Clarkeschen Säulen gut erhalten ist.

In den distalen Partien der Medulla oblongata heben sich die Hinterstränge durch ihren normalen Farbenton im Weigert-Präparat von der übrigen weissen Substanz deutlich ab; in der Brückengegend erscheinen die Pyramiden normal, und es lässt sich in den Schnitten dieser Höhe ebenso wie in solchen der Grosshirnhemisphären im Weigert-Präparat nichts Pathologisches nachweisen.

Da bedauerlicherweise beide Gehirne in Müllerscher Flüssigkeit konserviert wurden, lässt sich über feinere Zellveränderungen der Hirnrinde nichts aussagen. Im van Gieson-Präparat schien im Kleinhirn die Zahl der Purkinjeschen Zellen vermindert zu sein.

In keinem der untersuchten peripheren Nerven, Ischiadicus, Peroneus, Tibialis anticus, Medianus, Radialis und Ulnaris, konnte Degeneration von Nervenfasern nachgewiesen werden.

Zusammenfassend lässt sich also sagen: Die Zahl der Nervenzellen in den Vorderhörnern des Rückenmarks ist vermindert, die erhaltenen Zellen sind grösstenteils schwer verändert, in der Art, wie wir das bei chronischen Zellerkrankungen zu sehen gewohnt sind. In der weissen Substanz findet sich Aufhellung im ganzen Gebiet der Vorderseitenstränge, am deutlichsten im Gebiet der Pyramidenseiten- und Kleinhirnseitenstrangbahn.

Das anatomische Bild unterscheidet sich also von dem der Friedreichschen Krankheit einmal durch die Intaktheit der Hinterstränge und zweitens durch die Erkrankung der Vorderhornzellen. Schwieriger ist die Beantwortung der Frage, ob das anatomische Bild von dem der amyotrophischen Lateralsklerose zu unterscheiden ist. In einem von mir vor einigen Jahren untersuchten Falle von amyotrophischer Lateralsklerose erschienen im Cervikalmark die Kleinhirn-

seitenstrangbahnen normal — und hoben sich durch ihre dunklere Färbung von der degenerierten Pyramidenseitenstrangbahn deutlich ab; indessen ist es ja bekannt, dass bei der amyotrophischen Lateralsklerose die Degeneration meist nicht scharf begrenzt ist, und es ist erst kürzlich wieder von Holmes¹⁾ auf Grund zahlreicher anatomisch untersuchter Fälle darauf hingewiesen worden, dass auch die Kleinhirnsseitenstrangbahnen bei amyotrophischer Lateralsklerose zuweilen degenerieren.

Ich glaube also, dass auf Grund des Rückenmarkbefundes unsere Fälle nicht von der amyotrophischen Lateralsklerose abgetrennt werden können. Es bleibt aber die Frage offen, ob die Untersuchung der Grosshirn- und namentlich der Kleinhirnrinde mittels der Nisslschen Methode sichere Unterschiede ergeben hätte.

Dass das Kleinhirn zum mindesten funktionell nicht normal war, dafür spricht das grobe Wackeln bei Zielbewegungen, bei vollkommener Intaktheit des Lagegefühls. — Schon erwähnt wurde, dass das Cerebellum auffällig klein war und ein Gewicht hatte, das weit unter der Norm lag.

In Betracht zu ziehen ist auch noch die hereditäre Lues, die zuweilen zu Krankheitsbildern führt, bei denen die Beteiligung des Kleinhirns im Vordergrund steht. Erst kürzlich hat Sträussler²⁾ auf diese Fälle hingewiesen und betont, wie ähnlich das so entstehende Krankheitsbild dem der Friedreichschen Krankheit werden kann. Gegen die Annahme einer hereditären Lues, spricht aber eine Reihe gewichtiger Gründe, namentlich die Intaktheit der Pupillenreaktion und des Augenhintergrundes bei beiden Patienten, und die normale Intelligenz, wenigstens bei dem männlichen Patienten³⁾, während bei hereditärer Lues sowohl Augen- sowie psychische Symptome besonders häufig sind.

Nicht in Abrede stellen möchte ich die Möglichkeit, wenn auch für deren Annahme kein Anhaltspunkt vorliegt, dass Lues in der Ascendenz schädigend auf das Keimplasma unserer Patienten eingewirkt haben könnte, findet sich doch z. B. schwere Neurasthenie und Hysterie nicht so selten bei Individuen, bei denen sonst keine schädlichen ätiologischen Momente vorliegen, Lues in der Ascendenz aber nachzuweisen ist. Schon Higier⁴⁾ hat die Ansicht ausgesprochen, dass möglicher-

1) Holmes, The pathology of amyotrophic lateral sclerosis. Review of neurology. 1909. Nr. 11.

2) Zeitschrift f. die gesamte Neurologie und Psychiatrie. Bd. 2. 1910.

3) Bei der Schwester bestand ein leichter Grad von Schwachsinn, der aber nur bei eingehender Prüfung zutage trat.

4) Neurol. Zentralbl. 1909. Nr. 18. — Vergl. auch Bing, l. c. S. 109.

weise bei endogenen Krankheiten, zu denen unsere Fälle unbedingt zu rechnen sind, ein *primum nocens* exogener Natur in der aufsteigenden Ahnenreihe vorliegen könnte, speziell Lues oder Alkohol. —

Vor einigen Jahren hat nun Edinger¹⁾ eine neue Theorie der Entstehung von Nervenkrankheiten aufgestellt, dass nämlich durch die Funktion das Nervengewebe aufgebraucht würde und also die Funktion die Ursache der Erkrankung sei, und er hat diese Theorie speziell auch für die Erklärung der familiären Krankheiten verwerten zu können geglaubt. Namentlich sein Schüler Bing hat sich dieser Auffassung angeschlossen und noch kürzlich die Aufbrauchstheorie als geeignet bezeichnet, uns das Verständnis der familiären Krankheiten näher zu bringen. Ich habe mich von der Berechtigung dieser Anschauung in Bezug auf die familiären Krankheiten nicht überzeugen können. Nach der Aufbrauchstheorie degenerieren am leichtesten die langen Bahnen im Rückenmark, in unseren Fällen aber sind die Hinterstränge, die zu den längsten Bahnen gehören, völlig normal, während die kurzen, den Pyramidensträngen benachbarten Fasern deutliche Aufhellung zeigen.

Es ist meines Erachtens auch schwer verständlich, in welcher Weise die Funktion eingewirkt haben sollte, um bei unseren Patienten ein von den gewöhnlichen abweichendes, bei beiden so völlig übereinstimmendes Krankheitsbild zu erzeugen.

Nun nimmt ja auch Edinger an, dass bei den hereditären Krankheiten die degenerierten Bahnen abnorm schwach angelegt sind, er glaubt aber, dass erst die Funktion die Bahnen zur Degeneration bringt und somit der Funktion das wesentlichste Moment an der Erkrankung zuzuschreiben sei. „Die Aufbrauchstheorie allein erklärt also, wie es kommt, dass ein zweifellos unentwickeltes Rückenmark erst im Laufe des Lebens unter dem Bilde kombinierter Sklerose progressiv entartet“ (S. 41 l. c.). —

Dem gegenüber scheint es mir von Bedeutung, was auch von Oppenheim betont wird, dass doch abnorm kleine Rückenmarke beobachtet werden, die nicht zur Degeneration kommen.

Gerade, wenn man solche Fälle wie die unserigen sieht, drängt sich meines Erachtens der Gedanke auf, dass die wesentlichste Ursache der Erkrankung in der Anlage des Nervensystems liegen muss. Es soll nicht bestritten werden, dass gelegentlich äussere Schädigungen, wie

1) Edinger, Der Anteil der Funktion an der Entstehung von Nervenkrankheiten. Wiesbaden 1908.

Infektionskrankheiten oder Überanstrengungen, auslösend¹⁾ oder beschleunigend auch auf familiär-hereditäre Krankheiten wirken mögen, nur glaube ich, dass die Art der Erkrankung ganz allein durch die Anlage bestimmt ist und dass die Degeneration der betreffenden Bahnen infolge von konstitutionellen Eigentümlichkeiten erfolgt, über deren Eigenart uns bis jetzt jede Vorstellung fehlt.

17. Herr Immelmann-Berlin: Bedeutung der Röntgenstrahlen für die Diagnostik der Nervenkrankheiten (mit Demonstration).

Vortragender demonstriert an einer grossen Reihe von Projektionsbildern den praktischen und wissenschaftlichen Wert der Röntgenstrahlenuntersuchung bei neurologischen Erkrankungen. Er zeigt zunächst die normale Entwicklung des Knochengerüsts, dann die verlangsamte und beschleunigte (Myxödem, Kretinismus, Zwerg- und Riesenwuchs). Nachweis der erweiterten Sella turcica (Akromegalie). Weiterhin Bilder a) akuter Knochenatrophie (Aufhellung der Schatten, verwaschene Struktur, ungleichmässige und scheckige Zeichnung); b) chronischer Knochenatrophie. (In schweren Fällen geht die Zeichnung der Struktur ganz verloren.) Die folgenden Bilder zeigen Fremdkörper, Projektile, Knochensplitter, die auf bestimmte Gehirn- und Rückenmarksteile oder periphere Nerven drücken und deren genaue Lokalisation nach ganz einfacher mathematischer Berechnung möglich ist.

Ferner gestatten die Röntgenstrahlen bequem die Differentialdiagnose bei Gelenkerkrankungen (Tabes, Arthritis deformans, Syringomyelie u. a. m.).

Rückenmarksleiden, bei denen der primäre Sitz der Krankheit die Wirbelsäule ist (Fraktur, Luxation, Dislokation), die traumatische und tuberkulöse Spondylitis, die chronische Versteifung der Wirbelsäule, sie alle geben auf der Röntgenplatte charakteristische Bilder.

Auch die Diagnose der Krankheiten der peripheren Nerven bei Schussverletzungen, Callus, Luxation, der Neuralgien (Halsrippe, Mediastinaltumor, Aneurysma), der Ischias (Exostose), des intermittierenden Hinkens (Arteriosklerose) wird durch das Röntgenbild wesentlich erleichtert.

Zum Schluss macht Vortragender noch auf die Möglichkeit aufmerksam, gegebenen Falles Simulanten festzustellen.

1) Sehr beachtenswert in dieser Hinsicht erscheint mir eine Beobachtung von Nonne, Über eine eigentümliche familiäre Erkrankungsform des Zentralnervensystems. Arch. f. Psych. 1891. Bd. 22. S. 284.