Stelle di confronto.

*	α 1886.0	δ 1886.0	Autorità
1	10 ^h 36 ^m 30 ^s .60	+ 1° 27' 28".9	Schj. 3915
2	10 43 53.09	+ 1 32 54.3	W ₁ 10 ^h 756
3	10 46 22.27	+ 1 37 47.7	W ₁ 10 ^h 817

*	α 1886.0	δ 1886.0	Autorità
4	10 ^h 56 ^m 54 ^s .35	+ 1° 51' 37".3	W ₁ 10 ^h 993
5	11 0 11.11	+ 1 49 35.3	W ₁ 10 ^h 1051
6	10 52 56.01	+ 2 20 30.3	W ₁ 10 ^h 923

La cometa al 7 ottobre era globulare col diametro di circa 3': mi parve di vedervi traccia di coda ad ovest; ma lo stato del cielo poco favorevole non mi permise di acquistarne la certezza. Negli altri giorni la cometa apparve sempre più debole; al 13 scomparve nel micrometro anulare a 17^h 27^m, cioè a 41 minuti prima del nascere del sole: allora erano visibili le stelle vicine di 8^a, ma non quelle di 9^a.

Al 8 e 9 ottobre ho potuto fare l'osservazione spettrale; lo spettro era il solito formato dalle tre bande degli idrocarburi: delle quali quella di mezzo era la più lunga e più forte: dopo veniva la meno refrangibile: la più refrangibile era appena visibile.

Il nucleo fu sempre ben distinto: il suo spettro è continuo, debole fra le bande, molto rinforzato su di esse.

Osservatorio di Palermo 1886 Ottobre 14.

Elemente und Ephemeride des Cometen 1886 ... (Finlay).

Die Elemente sind erhalten mit Berücksichtigung der Aberration und Parallaxe durch Variation der curtirten Distancen aus den Beobachtungen 1886 Sept. 26 Capstadt, Sept. 29 Rom, Oct. 1 Wien und Oct. 16 Albany. Letztere Beobachtung wurde mir von Mr. J. Ritchie jr. durch den Science Observer Code wie folgt mitgetheilt:

1886 Oct. 16.5386 M. Z. Gr. $\alpha = 17^h 59^m 25^s.9$ $\delta = -26^\circ 39' 9''$
Beobachter Egbert, Dudley Observatory.

Die Rechnung ist nur fünfstellig geführt worden, um genäherte Elemente zu finden, die zu der Berechnung der Ellipse dienen konnten. Es zeigte sich aber, dass innerhalb der Unsicherheit der fünfstelligen Rechnung den obigen Beobachtungen durch eine Parabel genügt werden kann. Dieselbe ist:

$$\begin{aligned} T &= 1886 \text{ Nov. } 21.0840 \text{ M. Z. Berlin} \\ \omega &= 304^\circ 13' 43'' \\ \Omega &= 46 \ 37 \ 8 \\ i &= 3 \ 16 \ 11 \end{aligned} \left. \begin{array}{l} \\ \\ \\ \end{array} \right\} \text{Mittl. Aequ. 1886.0}$$

$$\log q = 0.06884$$

Darstellung der Beobachtungen:

$$\begin{aligned} 1886 \text{ Sept } 29 \quad d\lambda &= +0'.14 \quad d\beta = +0'.08 \\ \text{Oct. } 1 \quad &= -0.14 \quad = -0.47 \end{aligned}$$

Die Abweichung Oct. 1 in Breite ist allerdings gross, doch handelt es sich hier nur um einzelne Beobachtungen des Cometen.

Ob hiernach der Comet mit dem de Vico'schen identisch ist, ist durch obige Beobachtungen noch nicht erwiesen.

Aus vorstehenden Elementen ergibt sich folgende Ephemeride für 12^h M. Z. Berlin:

$$\begin{aligned} x &= [9.99963] \sin(v + 80^\circ 48'.0) \\ y &= [9.95485] \sin(v - 8 \ 3.5) \\ z &= [9.63877] \sin(v - 14 \ 7.4) \end{aligned}$$

Berlin 1886 Oct. 20.

1886	α	δ	$\log r$	$\log A$
Oct. 23	18 ^h 22 ^m 50 ^s	-26° 30'.9	0.0989	0.1144
24	26 25	26 27.8		
25	30 4	26 24.5		
26	33 46	26 20.9		
27	37 30	26 16.9	0.0915	0.1101
28	41 17	26 12.6		
29	45 6	26 8.0		
30	48 58	26 3.0		
31	52 52	25 57.5	0.0850	0.1056
Nov. 1	18 56 48	25 51.6		
2	19 0 47	25 45.2		
3	4 48	25 38.4		
4	8 50	25 31.1	0.0795	0.1012
5	12 55	25 23.3		
6	17 2	25 15.0		
7	21 11	25 6.2		
8	25 22	24 56.8	0.0751	0.0970
9	29 35	24 46.9		
10	33 49	24 36.5		
11	38 6	24 25.6		
12	42 24	24 14.1	0.0718	0.0932
13	46 44	24 2.1		
14	51 5	23 49.5		
15	55 28	23 36.4		
16	19 59 51	23 22.7	0.0697	0.0899
17	20 4 16	23 8.5		
18	8 42	22 53.7		
19	13 10	22 38.3		
20	17 38	22 22.4	0.0689	0.0874
21	22 7	22 5.9		
22	26 37	21 48.8		
23	31 8	21 31.2		
24	20 35 39	-21 13.0	0.0693	0.0856

H. Oppenheim.