ASTRONOMISCHE NACHRICHTEN.

№ 1116.

Aus einem Schreiben des Herrn Professors Dr. *Galle*, Directors der Breslauer Sternwarte,
an den Herausgeber.

Die hier eben noch sichtbare Sonnenfinsterniss vom 17, September konnte bei recht günstigem Wetter so gut beobachtet werden, als die Nähe des Horizontes kurz nach dem Sonnenaufgange überhaupt gestattete. Der erste Blick des aus den Dünsten des (sonst sehr freien) Horizontes auftauchenden Sonnenrandes wurde um $5^h 29^m 37^s$ Sternzeit oder $2^m 2^s$ später beobachtet, als eine genaue Berechnung dieses Zeitmomentes ergeben hatte. Das verfinsterte Segment am unteren Rande war sogleich nach dem Aufgange mit freiem Auge scharf sichtbar, ohne die sonst häufig hier wahrnehmbaren Gestalts-

Veränderungen der Sonnenscheibe. Das Ende der Finsterniss wurde wie folgt beobachtet:

M. Br. Zt. Beobachter

$17^h 58^m 13^s$ *Galle* mit dem $2\frac{1}{2}$ füss. Fraunh. auf der Gallerie,

17 58 9 *Günther* mit dem 4füss. Fraunhofer im Thurme.

Barom. für 0^0 Temp. 333,31 Par. L., Therm. $+12^0$ R.

Wegen des wallenden Randes ist indess die Unsicherheit dieser Zeitmomente auf eine halbe Minute zu schätzen.

Breslau 1857 Oct. 20.

J. G. Galle.

Bestimmung der Bahn des Cometen I. 1854, von Herrn Dr. *Rzepecki*.

Mit Beziehung auf № 953 der A. N., worin Herr Prof. *Galle* die von mir berechneten Elemente des Cometen I. 1854 anzuführen die Güte gehabt hat, wünschte ich zu bemerken, dass ich bei einer wiederholten Durchsicht jener Arbeit, welche ich auch neulich zu einer Doctordissertation benutzte, in der schliesslichen Berechnung der Elementencorrectionen einen kleinen Fehler gefunden habe, nach dessen Entfernung die Werthe der den Durchgang durch das Perihel und den Perihelabstand angehenden Grössen eine unbedeutende Veränderung erlitten, so dass die neuen Elemente sich folgendermaassen gestalten:

T' 1854 Jan. 3,97377

π $56^0 6' 32'' 35$

Ω 227 2 47,9

i 66 6 47,3

$lg q$ 0,310618

Bew. rückl.

Ich kann nicht umhin, ihre grosse Uebereinstimmung mit den vom Herrn Dr. *Oudemans* aufgestellten Elementen dieses Cometen zu erwähnen, welche aus den Beobachtungen des ersten Monats hergeleitet sind (s. A. N. XXXVIII. p. 39.)

Die Beschaffenheit der zwölf Bedingungs-Gleichungen brachte es mit sich, dass die Bestimmung der Länge des Perihels wegen des sehr kleinen Divisors für $d\pi$ ungenau ausfiel, was ich durch eine Umstellung der Unbekannten in der Auflösung der fünf Endgleichungen, jedoch vergeblich,

zu vermeiden suchte. — Auf diesem Wege bekam ich das Resultat:

T' 1854 Jan. 3,97235

π $56^0 6' 34'' 6$

Ω 227 2 47,8

i 66 6 46,8

$lg q$ 0,310618

Bew. rückl.

Mit Berücksichtigung jener Unbestimmtheit von π , für dasselbe also z. B. (im Sinne der rechtläufigen Bewegung) $\pi + \delta\pi$ schreibend, erhalten wir die wahrscheinlichsten Elemente:

T' 1854 Jan. 3,97235 $+ [6,75663] \delta\pi$

π $56^0 6' 34'' 6$ $- 0,932766 \delta\pi$

Ω 227 2 47,8 $+ 0,033617 \delta\pi$

i 66 6 46,8 $+ 0,173646 \delta\pi$

$lg q$ 0,310618 $+ [2,039299] \delta\pi$

Bew. rückl.

wobei $\delta\pi$ einen Werth von $\pm 100''$ annehmen kann, ohne dadurch die Uebereinstimmung der Rechnung mit der Beobachtung zu gefährden. Was den Vergleich dieser anbelangt, so führe ich denselben in der folgenden Tafel an, welche zwar mit Zugrundlegung des ursprünglichen, etwas fehlerhaften Elementensystems berechnet worden ist, aber auch nach dem zuletzt angeführten, welches ich als das wahrscheinlichste betrachte, nicht merklich anders ausfallen würde.

№	1853	Beobachtungsort	R — B		Die Beobacht. ist enthalten	A. N. Bd. pag.
			AR	Decl.		
1	Dec. 2	Göttingen	+10"3	+12"8	XXXVII.	409
2	4	Bonn	+ 1,2	+ 3,6	=	395
3	4	"	+13,7	+10,2	XXXVIII.	50
4	4	"	+15,8	+ 3,8	=	—
5	4	"	+ 6,3	+ 6,6	=	—
6	4	"	+13,6	— 6,7	=	—
7	5	"	+16,7	+ 2,6	=	—
8	5	"	+ 5,4	+ 1,9	=	—
9	9	Göttingen	— 2,7	+ 2,0	XXXVII.	409
10	10	Bonn	— 9,4	—23,3	XXXVIII.	50
11	10	Göttingen	+ 9,1	— 4,2	XXXVII.	409
12	11	Wien	— 5,7	— 1,9	=	395
13	11	Bonn	— 1,8	—10,0	XXXVIII.	50
14	11	Göttingen	—13,2	+14,8	XXXVII.	409
15	12	Wien	—11,3	— 6,0	XXXVIII.	11
16	12	Bonn	— 8,8	—11,9	=	50
17	13	"	+ 4,7	—13,6	=	—
18	17	Berlin	+ 3,4	+ 5,1	=	15
19	22	Hamburg	— 0,6	+10,6	=	61
20	22	"	+ 1,8	+ 5,6	=	11
21	22	Bonn	+10,9	+ 0,2	=	50
22	22	"	+ 5,4	— 1,9	=	—
23	25	"	— 1,3	— 0,3	=	—
24	25	"	— 0,1	+ 0,2	=	—
25	25	Hamburg	— 5,4	+10,0	=	61
26	25	Berlin	+ 5,4	— 2,6	=	32
27	25	"	+ 4,4	— 6,2	=	—
28	25	Göttingen	+10,1	+108,2	=	94
29	26	Bonn	+ 5,7	+ 2,7	=	50
30	26	"	+ 5,3	— 6,1	=	50
31	28	Hamburg	—28,8	— 7,9	=	61
32	28	Leiden	+ 7,2	—12,5	=	39
33	28	Berlin	+ 7,9	— 5,0	=	74
34	30	Wien	— 5,6	+ 1,1	=	61
35	31	Padua	+ 9,9	— 2,2	=	166
1854						
36	Jan. 1	Wien	+ 0,5	— 2,2	=	110
37	1	Bonn	— 1,1	+ 0,4	=	341
38	1	Leiden	+ 5,0	— 2,2	=	39
39	2	Wien	— 5,9	+ 0,7	=	110
40	7	"	— 5,6	— 7,8	XXXIX.	190

№	1854	Beobachtungsort	R — B		Die Beobacht. ist enthalten	A. N. Bd. pag.
			AR	Decl.		
41	Jan. 7	Wien	—16"1	+ 5"0	XXXVIII.	110
42	12	Berlin	+ 6,3	+15,7	=	74
43	16	Wien	— 7,3	— 4,3	=	110
44	17	Padua	— 2,2	—18,3	=	166
45	18	Kremsmünster	—13,5	— 2,6	=	321
46	18	Bonn	+ 4,4	+ 4,2	=	341
47	18	Göttingen	—13,6	— 6,6	=	94
48	18	Bonn	— 7,6	— 5,0	=	341
49	19	Leiden	+ 4,7	+ 8,7	=	332
50	19	Berlin	+13,7	+ 3,8	=	270
51	19	Bonn	— 1,4	+13,3	=	341
52	20	"	— 6,3	+ 8,7	=	—
53	20	Berlin	+ 7,8	— 1,0	=	270
54	22	Bonn	— 0,6	— 0,9	=	341
55	22	Leiden	— 0,5	+11,2	=	332
56	22	Rom	+ 4,0	+18,2	=	192
57	23	Olmütz	+ 1,8	+22,8	=	214
58	23	Kremsmünster	+ 1,2	—14,1	=	321
59	23	Wien	+ 2,8	— 6,7	=	110
60	23	Berlin	— 0,4	+ 6,0	=	270
61	24	Kremsmünster	—27,6	—18,6	=	321
62	24	Bonn	— 2,2	+ 6,3	=	341
63	25	Kremsmünster	—20,4	+23,0	=	321
64	25	Olmütz	+10,6	+11,7	=	214
65	25	Bonn	+ 0,9	+ 5,4	=	341
66	25	Leiden	+ 2,0	+ 6,6	=	332
67	25	Wien	— 0,6	+ 8,1	=	110
68	26	"	— 1,8	+ 5,3	=	—
69	26	Berlin	+ 5,7	+12,7	=	270
70	27	Rom	+ 0,0	+ 5,5	=	192
71	28	"	—23,4	+17,3	=	—
72	29	"	—34,8	+16,4	=	—
73	30	"	+ 4,4	—10,8	=	—
74	Feb. 14	Bonn	— 3,0	+ 7,7	=	341
75	23	"	— 2,4	— 8,6	=	—
76	23	"	+10,7	—10,0	=	—
77	26	Berlin	+10,5	—21,7	=	270
78	28	Leiden	+ 6,8		=	332
79	28	"		—40,3	=	—
80	März 1	Bonn	+ 7,1	—15,1	=	341

Dr. Rzepecki.