VII.

Ueber das Carcinom.

Von

Dr. med. C. Karg,

Kgl. Sächs. Stabsarzt, Privatdocent und Assistent an der chirurg. Klinik zu Leipzig.

(Hierzu Tafel I—X.)

Im Jahre 1865 hat Thiersch seine berühmte Arbeit über den Epithelkrebs der Haut, das Ergebniss jahrelanger histologischer Untersuchungen, veröffentlicht. Seit dieser Zeit sind mehr als 25 Jahre vergangen mit ihrem hastigen Vorwärtsdrängen auf allen Gebieten des menschlichen Wissens — seine Lehren aber sind unverändert dieselben geblieben. Die scharfe Trennung, die von den frühesten Stufen der Entwicklung des Embryo zwischen dem Epithel auf der einen und dem Bindegewebe auf der anderen Seite physiologisch besteht, übertrug er mit grosser Klarheit auf das Gebiet der Pathologie. Er brachte damit Ordnung in das Gewirr der einander widerstreitenden Ansichten über den Krebs und wies dem Epithelkrebs die ihm zukommende Rolle in anatomischer und klinischer Beziehung zu, die ihm bis heute nicht wieder mit Erfolg bestritten werden konnte und wohl auch nie bestritten werden wird. In pathologisch-anatomischer Beziehung sind die Untersuchungen über den Krebs durch die Arbeiten Thiersch's zweifellos zu einem gewissen Abschluss gebracht worden. Alle die neueren Ansichten, wie sie z. B. Klebs in seinem Handbuche entwickelt, der neben dem Epithel auch dem Bindegewebe eine wichtige Rolle bei der Bildung des Krebsgewebes zuerkennt, all die Resultate exacter moderner Forschung, wie die so wichtige Lehre von der indirecten Kern- und Zelltheilung, — sie haben zwar in manchen Beziehungen neues Licht über die Lehre vom Krebs verbreitet und uns einen tieferen Einblick in das Wesen der Krankheit und die Einzelheiten des pathologisch-anatomischen Befundes gebracht,

an den Fundamenten aber, wie sie von Thiersch festgestellt worden sind, vermochten sie nicht zu rütteln und werden sie nicht rütteln. Sie dienten nur dazu, die Thiersch'schen Lehren immer weiter und weiter auszubauen. Diese Lehren bilden für uns die Grundlagen, auf denen fussend wir in der Erkenntniss des Carcinoms weiter zu kommen versuchen müssen.

Ein weiterer fundamentaler Fortschritt in der Lehre von der Krebskrankheit wird zu erwarten sein, wenn es uns glückt, das Dunkel, welches die Aetiologie dieser Krankheit auch heute noch umhüllt, zu lichten.

Zwischen der Arbeit von Thiersch und heute liegen die grossen Fortschritte, welche die Medicin auf dem Gebiete der Infectiouskrankheiten, anknüpfend an die Arbeiten Koch's und Pasteur's, gemacht hat. Der pathologisch-anatomischen und histologischen Seite der Forschung hat sich als eine nicht minder wichtige und reizvolle Aufgabe die Forschung nach der Aetiologie der Krankheitsbilder ebenbürtig an die Seite gestellt. So bedeutend aber auch die Resultate dieser Forschung auf dem Gebiete der Infectiouskrankheiten geworden sind — für den Krebs haben die Methoden, die dort so Glänzendes geleistet haben, vollständig versagt. Wir sind in der Erkenntniss der Aetiologie der Krebskrankheit trotz aller Mühen der hervorragendsten Forscher — ich nenne nur der Besten einen, Cohnheim — nicht weiter gekommen, als seiner Zeit Thiersch.

Ich halte es für eine Ehrenpflicht und für eine Pflicht der Dankbarkeit gegen unseren verehrten Lehrer und Meister, dass es heute einer von uns Jüngeren versucht, das zusammenzustellen, was in der Carcinomfrage seit Thiersch geleistet worden ist. Es ist der bleibenden Ausbeute nicht viel. Wenn ich mich dieser Aufgabe unterziehe, so geschieht es nicht, weil ich mich etwa besonders berufen dazu fühlte, sondern weil ich in den letzten Jahren überreiche Gelegenheit hatte, histologische Studien an dem grossen Material zu machen, welches die chirurgische Klinik zu Leipzig bietet. Wir haben uns bemüht, fast ausnahmslos jeden Fall von Neubildung, der zur Operation kam, sei er gutartig oder bösartig, sei er in seinen Anfängen befindlich oder schon fortgeschrittener, eingehend histologisch zu untersuchen. Bei diesen Untersuchungen konnte ich, wie ich glaube, Manches sehen und beobachten, wozu Anderen nicht die Gelegenheit geboten war. Wenn meine Arbeiten auch nur Fragmente sind, wenn auch mir es nicht vergönnt war, einen Schritt in der Lehre vom Krebs vorwärts zu thun, so haben sie mich doch, wie ich glaube, etwas tiefer in die histologische Erkenntniss des Carcinoms

geführt und mich vor manchem Irrthum bewahrt, in den Andere verfallen sind. Ich gebe mich der Hoffnung hin, dass vielleicht auf dieser oder jener Stelle das Auge des Meisters beistimmend ruhen möge.

Planmässig habe ich meine Arbeiten über das Carcinom und besonders über das Vorkommen von Mikroorganismen in demselben erst durchgeführt, als ein Fall von Paget's „Disease of the nipple“ in unsere Beobachtung gekommen war. Dieser Fall gab mir die erwünschte Gelegenheit, selbst Untersuchungen über das Vorkommen von Protozoen bei dieser Krankheit vorzunehmen und die Angaben französischer Autoren über positive Befunde in dieser Beziehung einer eingehenden Prüfung zu unterziehen. Ich stelle deshalb diesen Fall, der auch, wie ich glaube, sehr lehrreiche Aufschlüsse in pathologisch-anatomischer Beziehung über die Entwicklung und die Art der oberflächlichsten Form des Hautcarcinoms ergeben hat, an die Spitze des Berichtes über meine eigenen Untersuchungen.

Wenn wir Aerzte es unternehmen wollen, ein Urtheil über das Vorkommen von Protozoen im Carcinom und deren ätiologische Bedeutung abzugeben, so dürfen wir uns die Mühe nicht verdriessen lassen, echte Protozoen kennen zu lernen und sie mit denjenigen Gebilden zu vergleichen, die wir als Protozoen im Carcinom deuten möchten. Ich habe im Anschluss an meine histologischen Untersuchungen über das Carcinom einiges Material von Protozoen bei Thieren durchforscht, das ich Herrn Medicinalrath Pfeiffer, einem der besten Protozoenkenner, verdanke. Ich füge die Resultate in einigen Bildern und einer kurzen Beschreibung bei und glaube, dass ich damit Manchem eine erwünschte Gabe bringe, der sich gern auf diesem Gebiete orientiren möchte, dem aber Material nicht selbst zur Verfügung steht.

Eine Besprechung der Therapie des Carcinoms kann füglich unterbleiben. Wir sind hier noch keinen Schritt weiter gekommen, als Thiersch zur Zeit der Veröffentlichung seiner Arbeit. Die Hoffnung, die er selbst damals hegte, dass es dereinst gelingen würde, gegen diese schrecklichste und verderblichste der Krankheiten ein anderes Heilmittel zu finden, als Messer und Glüheisen, hat sich bis jetzt nicht erfüllt. Die überschwänglichen Erwartungen, welche für die Heilung der Infectionskrankheiten und auch des Carcinoms an die Entdeckung Koch's geknüpft wurden, sie sind mit dem Tuberculin dahingegangen. Der frühere Skepticismus und ein wohl etwas zu weitgehender Pessimismus herrschen wieder unumschränkt auf dem Gebiete der Therapie, ganz besonders des Carcinoms. Die Angaben von Mosetig und die Behauptungen von Adamkiewicz, der ein

Heilmittel des Krebses gefunden haben wollte, haben kaum die Beachtung nüchternen Forscher und Kliniker gefunden. Sie sind als Irrthümer und Träumereien zurückgewiesen worden. Und doch darf man auch hier die Hoffnung, weiter zu kommen, nicht aufgeben. Was wir vergeblich erstrebt, und worin wir geirrt haben, das finden vielleicht spätere Geschlechter. Uns aber bleibt die Aufgabe, den Feind, den wir bekämpfen wollen, möglichst in allen seinen Eigenschaften kennen zu lernen. Vielleicht liefern die folgenden Worte nach dieser Richtung einen, wenn auch nur bescheidenen Beitrag.

I.

Die Bemühungen der Forscher, mehr Licht in das Wesen der Carcinomkrankheit zu bringen, haben sich in den letzten Jahren besonders in drei Richtungen bewegt. Man hat sich bemüht, bestimmte morphologische Eigenthümlichkeiten des Krebses und der Krebszellen aufzufinden. Man hat weiterhin trotz vieler vergeblicher Bemühungen immer und immer wieder versucht, das Carcinom von einem Thier auf ein zweites zu verpflanzen, um den lange gesuchten und erst in der Neuzeit geglückten Nachweis von der Ueberimpfbarkeit des Carcinoms zu erbringen, und endlich hat man sich drittens mit unermüdlicher Ausdauer bemüht, für den Krebs charakteristische Mikroorganismen nachzuweisen und deren Züchtung zu versuchen, eine Frage, die zweifellos in neuester Zeit im Mittelpunkt des Interesses pathologisch-anatomischer Forschung steht.

Thiersch suchte bekanntlich das Wesen des Epithelkrebses in einer Störung des statischen Gleichgewichtes, in welchem Epithel und Bindegewebe von Ablauf ihrer Entwicklung an im normalen Zustande verharren. Während den Zellen epithelialer Herkunft längere Zeit eine höhere vitale Energie innewohnt, atrophirt das Bindegewebe in den Jahren, in welchen sich Carcinome zu entwickeln pflegen. Damit ist eine Veränderung in den Verhältnissen des Druckes gegeben, welchen die verschiedenen Bestandtheile des Körpers auf einander ausüben, und eine Schranke gefallen, die dem Wachsthum und Wuchern der Epithelien physiologisch gezogen war.

Dass in der That das Bestehen eines derartigen Druckes ein physiologisches Gesetz ist, dem eine ganz hervorragende Bedeutung für das Wachsthum des Körpers und den Aufbau seiner Formen zukommt, ist durch viele einschlägige Beobachtungen mit Sicherheit erwiesen. Ich möchte den vielen bekannten Beweisen noch einen sehr

packenden hinzufügen, den gerade wir Chirurgen neuerdings gelegentlich der Hautverpflanzung häufig beobachten können. Eine gesunde granulirende Fläche wuchert, solange sie unbedeckt ist, ich möchte sagen ohne Grenze und Ziel. Oft kommt es zur Bildung wahrer Granulationsgeschwülste, immer aber muss der Arzt darauf bedacht sein, die über das Niveau der Haut hinausschiessenden Granulationen niederzuhalten. Ganz anders, wo die Fläche durch die einsäumende Ueberhäutung oder künstlich durch Hautverpflanzung mit Epithel bedeckt ist. Durch den Druck des wachsenden Epithels wird die Bildung neuen wuchernden Bindegewebes verhindert. Wir können an transplantierten Hautstückchen, die anheilen, oft sogar sehen, dass sie tiefer liegen und auch tiefer bleiben, als die umgebende Haut, während etwa von Epithel unbedeckt gebliebene Reste von Granulationsgewebe weit zwischen ihnen herauswuchern. Und doch geht auch hier unter dem anheilenden Epithel eine sehr lebhaftige Bildung neuen Gewebes und neuer Gefässe vor sich. Es wird aber durch den Druck welchen das verpflanzte Epithel ausübt, niedergehalten.

Die Anschauung von Thiersch ruht demnach auf festbegründeten physiologischen Gesetzen und erfreut sich auch heute noch der Zustimmung Vieler. Jedenfalls ist etwas Besseres noch nicht an ihre Stelle getreten. Sie erklärt aber nicht Alles, und es würde falsch sein, wenn man sich dies verhehlen wollte. Eine Erklärung dafür, was den eigentlichen Anstoss für die Entwicklung eines Carcinoms an einer bestimmten Körperstelle giebt, bleibt sie schuldig. Die Atrophie des Bindegewebes ist eine von den mitwirkenden Ursachen bei der Entwicklung des Krebses, aber bei Weitem nicht die einzige. Wir würden sonst nicht einsehen, warum das Carcinom nicht eine viel häufigere Erkrankung ist, da ja dieser Schwund des Bindegewebes im höheren Alter Niemanden verschont, und wir würden nicht begreifen, warum das Carcinom nicht Halt macht, wenn es auf ein widerstandsfähiges Gewebe, z. B. eine Fascie oder den Knochen trifft, sondern auch diese festen Grenzen rücksichtslos durchbricht. Das Epithelcarcinom müsste also einen wesentlich gutartigeren Charakter haben, als er ihm in Wahrheit zukommt. Man hat deswegen angenommen — und zwar schon Thiersch selbst —, dass neben der nachgewiesenen Atrophie des Bindegewebes, die nur die Disposition für die Erkrankung an Carcinom bildet, noch ein Reiz die Epithelien treffen müsse, der ihnen die den Krebszellen eigene Proliferationsenergie verschaffe. Man nahm seine Zuflucht zur Lehre von dem irritativen Ursprung der Carcinome. Nun sehen wir allerdings, dass sich hier und dort ein Krebs auf einem alten Beingschwur oder in

einer Narbe entwickelt, und es ist zweifellos, dass gewisse Reize zur Carcinombildung führen können. Hierher gehört der Krebs der Paraffinarbeiter an Hand und Vorderarm, der Schornsteinfegerkrebs am Scrotum, vielleicht auch der Krebs der Unterlippe bei dem Pfeife rauchenden Bauer und der Krebs der Gallenblase nach Cholelithiasis. Aber diese vereinzeltten Beobachtungen lassen sich nicht verallgemeinern. Es lässt sich aus ihnen keinesfalls ein allgemein gültiges Gesetz für die Genese des Carcinoms herleiten. In tausend und abertausend Fällen von Carcinom der Haut oder der Drüsen lässt sich ein solcher Zusammenhang nicht einmal vermuthen. Dazu kommt noch, dass wir niemals auf dem Wege des Versuches auch an Thieren, bei denen Carcinom spontan vorkommt, wie an Hunden und Ratten, durch chronische Reize ein Carcinom erzeugen können. Alle Versuche in dieser Richtung sind fehlgeschlagen, so auch die neuerdings von Hanau angestellten, der Monate lang das Scrotum von alten Hunden und Ratten mit Theer einpinselte, ohne mehr als ein Ekzem zu erzielen.

Zur Erklärung dieses schwierigen Punktes stellte Cohnheim seine Theorie von der Entwicklung des Carcinoms, wie der Geschwülste überhaupt aus bei der Anlage des Embryo versprengten Keimen auf. Diese tief durchdachte Hypothese gründete er auf die Lehren der Entwicklungsgeschichte und die eingehendste Kenntniss derselben. So fruchtbringend auch die Cohnheim'schen Lehren geworden sind, so sicher sie gelten für eine ganze Reihe von Geschwülsten, gerade für die Entwicklung des Carcinoms erweisen sie sich unzulänglich. Zunächst widerspricht ihnen die oben berührte Thatsache, dass sich auf chronisch entzündlichem Boden Carcinome entwickeln können. Wir müssten in einem solchen Falle das zufällige Zusammentreffen beider Momente bei einem und demselben Individuum annehmen, was mir wenigstens in hohem Grade gezwungen erscheint. Auch die histologische Durchforschung der frühesten Stadien des Carcinoms hat einzelne Beobachtungen zu Tage gefördert, welche mit der Lehre Cohnheim's nicht in Einklang zu bringen sind. Zwar kann man häufig genug aus kleinen Naevus und Warzen der Haut bösartige Tumoren sich entwickeln sehen. Derjenige, der Warzen und Pigmentmale als abgesprengte Keime ansieht, wird in diesem Verhalten eine Bestätigung der Cohnheim'schen Ansicht finden. In anderen Fällen ist aber von derartigen verirrtten Keimen bei der Entwicklung des Carcinoms nichts zu finden. So sah Hauser¹⁾ Carcinom ausgehen

1) Das Cylinderepithelcarcinom des Magens und des Dickdarmes. Jena 1890.

von den vollständig normalen Drüsen des Darmes, und ich selbst vom unveränderten Rete Malpighi.¹⁾

Auf andere Weise sucht Klebs die Schwierigkeiten der Carcinomfrage zu lösen. Den Anstoss für das Wachsthum der Epithelien geben nach ihm eindringende Leukocyten, deren Kernchromatin mit demjenigen der Epithelzellen verschmilzt. Es handelt sich dabei um einen der Befruchtung analogen Process. Nach dem Eindringen der aus dem Leukocytenchromatin entstehenden „Keimkörner“ in die Epithelien kommt es zur Theilung der letzteren. Diese Wucherung geht am energischsten dort von Statten, wo Leukocyten zahlreich in das Epithel eingewandert sind. Mit der ihm eigenen bilderreichen Phantasie verfolgt Klebs alle Stadien, welche die Zelle vom Moment des Eindringens des befruchtenden Keimkornes an bis zum Abschluss der Theilung durchläuft, und giebt davon Abbildungen. Durch diese Befruchtung werden der Epithelzelle Energien mitgetheilt, die sie früher nicht hatte, und die sie nunmehr mit den Eigenschaften der Krebszelle ausstatten. Dazu gehört die erhöhte Proliferationsenergie und die Unregelmässigkeit in der Gestalt und der Form der Kernfiguren und des Zelltheilungsprocesses.

Auch Schleich²⁾ ist, unabhängig von Klebs, zu einer ähnlichen Ansicht gekommen. Er lässt die von einem Reize getroffene Zelle ihre Nachbarschaft inficiren. Es kommt zur Bildung einer Geschwulst, die er als eine Art fragmentarischen Embryo, entstanden durch pathologische Zeugung, auffasst.

Ohne mich mit diesen Autoren in einen Prioritätsstreit einlassen zu wollen, muss ich das Recht, einen ähnlichen Gedanken zuerst ausgesprochen zu haben, für mich in Anspruch nehmen. In einer Arbeit³⁾, die ein Jahr vor der ersten Mittheilung von Klebs erschienen ist, habe ich meine Ansichten niedergelegt. Allerdings konnte ich so weitgehende speculative Schlüsse an sie nicht knüpfen, wie dieser Autor es thut. Ich bin damals zu der Ansicht gekommen, die auch Cornil⁴⁾ u. A. vertreten, dass die Leukocyten und die beweglichen Zellen im Allgemeinen bei der Regeneration der Gewebe, wie bei der Entwicklung der Geschwülste den fixen Zellen Nähr-

1) Vgl. auch unten die Entwicklung des Carcinoms bei Paget's Disease of the nipple.

2) Ueber die Aetiologie der Geschwülste. Berlin 1889; und: Infection und Geschwulstbildung. Deutsche med. Wochenschr. 1891. Nr. 3.

3) Deutsche Zeitschrift f. Chirurgie. Bd. XXV. S. 323. 1887.

4) Sur le procédé de division indirecte des noyaux des cellules épithéliales dans les tumeurs. Archiv de physiologie 1886. p. 310.

material zuführen, das zum Aufbau besonders des Kernchromatins dient, und dass diesem Vorgange eine gewisse Aehnlichkeit mit der Befruchtung der Eizelle durch das eindringende Spermatozoon nicht abzusprechen ist. Weiter aber glaubte ich in meinen Schlüssen nicht gehen zu dürfen, ohne den Boden des thatsächlich Beobachteten zu sehr zu verlassen und mich in vagen Speculationen zu verlieren. Die Bilder, die Klebs wiedergiebt, war ich und bin ich heute noch nicht so zu sehen und zu deuten im Stande, wie dieser Autor es will. Es ist mir aber gelungen, einige weitere Beweise für den engen Zusammenhang zu erbringen, der auch im postembryonalen Leben zwischen den epithelialen Zellen und solchen mesodermalen resp. parablastischen Ursprunges besteht. Aus ihnen können wir mit Sicherheit den Schluss ziehen, dass unter Umständen die letzteren den ersteren als Nährmaterial dienen. Am deutlichsten ist dies bei der Einwanderung von Pigmentzellen in transplantierte Haut zu beobachten, wie ich dies in einer früheren Arbeit ausgeführt habe.¹⁾ Ich gebe heute das Photogramm eines solchen Präparates in Fig. 1, Taf. I. Wir sehen die Pigmentzellen mit Fortsätzen weit in das Epithel eindringen. Dieselben werden von den Epithelien ähnlich einer Art Phagocytosis aufgenommen. Aehnliche Bilder gelingt es in einer Anzahl von Tumoren, leider aber nicht in allen, darzustellen, wenn man nach vorhergehender Hämatoxylintinction mit Carbolfuchsin färbt und mit ganz schwach saurem Alkohol differenzirt. Am schönsten sah ich dann neben Leukocyten in das Epithel einwandernde Zellen, die mit den Ehrlich'schen Mastzellen identisch zu sein scheinen, bei einem Papillom am Oberschenkel und bei Paget's Erkrankung der Haut der Mamma. Fig. 2 (Taf. I) giebt von diesem Verhalten eine Abbildung. Die Zellen haben einen bläschenförmigen Kern und ein ausserordentlich fein gekörntes Protoplasma, das mit verzweigten Fortsätzen zwischen die Epithelien hineinragt. Die feinen Körnchen sind mit Fuchsin leuchtend roth gefärbt.

Diese Beobachtungen lassen es mir zweifellos erscheinen, dass die Einwanderung von Leukocyten und Bindegewebszellen in das Epithel für die Ernährung desselben im Allgemeinen und bei der Geschwulstbildung im Besonderen eine wichtige Rolle spielt. Ich kann aber in diesem Vorgange nichts für den Krebs Charakteristisches sehen und noch weniger in ihr das Wesen dieser Erkrankung finden. Auch geht mir die Parallele, die Klebs zwischen der physiologischen Befruchtung der Eizelle und der pathologischen der Epithelzelle durch

¹⁾ Studien über transplantierte Haut. Archiv f. Anatomie u. Physiologie. 1888. S. 369.

das Keimkorn zieht, viel zu weit. Derartige rein speculative Theorien haben, wie die Geschichte der Medicin lehrt, immer auf Irrwege geführt. Sie bringen uns in der Erkenntniss der Aetiologie der Geschwülste nicht weiter. Bei der Wundheilung, bei der Bildung des Granulationsgewebes, bei der Anheilung transplanterter Haut und im ganz normalen Epithel sehen wir die gleiche „Befruchtung“ sich abspielen. Warum kommt es hier nicht zur Bildung einer bösartigen Geschwulst, wenn diese „Befruchtung“ das Wesen derselben ausmacht? Im Gegentheil, bei der Einwanderung von Bindegewebszellen in das Epithel haben wir es mit einem rein physiologischen Vorgange zu thun, der mit der Ernährung des Epithels in Zusammenhang steht und für das wuchernde Epithel eines Krebses eine besondere Wichtigkeit gewinnen mag, zur Erklärung des Wesens der Krebskrankheit und der Eigenschaften der Krebszellen im Sinne von Klebs lässt sich dieser Vorgang aber nicht verwenden.

Der Entdeckung der indirecten Kerntheilung und des Auftretens der Kerntheilungsfiguren am Ei und an der normalen thierischen und pflanzlichen Zelle kommt das Verdienst zu, auch der pathologisch-anatomischen Forschung neue Bahnen gewiesen zu haben. Angeregt durch die Arbeiten Flemming's, Strassburger's und Anderer, wurde das ganze Gebiet der pathologischen Anatomie auf das Vorkommen und die Bedeutung der indirecten Zell- und Kerntheilung für pathologische Vorgänge durchmustert. Die Arbeiten von Arnold ¹⁾ sind in dieser Beziehung bahnbrechend gewesen. Ihnen schliessen sich die von Ziegler, Nauwerck, Martin, Oliva, Hanseemann, Vf. und vielen Anderen an.

Es war von vornherein zu erwarten, dass in Geweben mit so ausgesprochener Proliferationstendenz, wie es die bösartigen Neubildungen sind, sich Kerntheilungsbilder zahlreich finden würden. Diese Erwartung wurde nicht getäuscht. Die Zahl der karyokinetischen Figuren ist gerade in Carcinomen und Sarcomen so gross, dass dieselben in Bezug darauf weder von dem Knochenmark, noch von den Keimcentren der Lymphdrüsen übertroffen werden, in denen bekanntlich ebenfalls eine sehr energische Zellvermehrung stattfindet. Die Beobachtung des Auftretens dieser Figuren hat eine neue Stütze für die Lehre Thiersch's von der epithelialen Herkunft der Krebszellen gebracht. Mit Hülfe dieses so unzweideutigen Befundes können wir ihre Abstammung aus den Epithelien der Haut und der Drüsen überall direct verfolgen.

1) Virchow's Archiv. Bd. 78. S. 279.

Als man die Bedeutung der indirecten Zelltheilung für die Geschwulstlehre erkannt hatte, glaubte man nach irgend welchen Unregelmässigkeiten suchen zu müssen, die man als charakteristisch für die bösartigen Neubildungen ansprechen könnte, ähnlich wie man früher, als die Zelle entdeckt worden war, nach einer specifischen Krebszelle suchte und sie auch in den geschwänzten Körperchen gefunden zu haben meinte. Nach meinen Erfahrungen und Vorstellungen über das Wesen pathologischer Processe glaube ich nicht, dass diese Bemühungen von Erfolg begleitet sein werden. Wir sehen überall in der Pathologie, dass die Vorgänge, welche sich an der Zelle selbst abspielen, sich an nichts von denen unterscheiden, die wir an ihr unter normalen Verhältnissen kennen. Nur die Intensität der einzelnen Erscheinungen, das Neben- und Nacheinander an ganzen Zellgruppen ist geändert.

Was zunächst die Zahl der Mitosen anlangt, so hat ihre grössere oder geringere Menge als ein Kennzeichen der Bösartigkeit einer Geschwulst dienen sollen. Schütz¹⁾ will ihre Anzahl geradezu als ein diagnostisches Merkmal für die Malignität verwendet wissen. Zweifellos muss zugegeben werden, dass die Bösartigkeit einer Geschwulst im geraden Verhältniss zu ihrem Zellreichthum und der Schnelligkeit der Zelltheilung steht, dass also im Allgemeinen dieser Satz berechtigt ist. Aber einmal giebt es Geschwülste, deren bösartiger Charakter unbestritten ist, in denen man aber trotz Anwendung guter Fixierungsmittel nur sehr wenig Mitosen findet. Ich konnte dieses Verhalten bei einigen schnellwachsenden Sarcomen beobachten. Die mikroskopischen Bilder liessen keine andere Deutung zu, als dass die Vermehrung der Zellen auf anderem, als mitotischem Wege, dem der directen und indirecten Fragmentirung nach Arnold erfolgte. Auf der anderen Seite kann man sehr intensive Kerntheilung und sehr zahlreiche Theilungsbilder auch bei gutartigen Neubildungen sehen, so Ströbe²⁾ bei einem Polypen der Portio vaginalis und Klebs³⁾ in einem Papillom der Conjunctiva.

Ist der Reichthum an Mitosen nicht unbedingt beweisend für die Bösartigkeit einer Geschwulst, so gilt ebensowenig ein bestimmtes Gesetz über das Vorkommen und die Lagerung der Kerntheilungsbilder in den einzelnen Krebsalveolen. Während Schütz (l. c.) dieselben zumeist in der Randzone findet, betont Ströbe (l. c.) ihr

1) Mikroskopische Carcinombefunde. Frankfurt 1890.

2) Zur Kenntniss verschiedener cellulärer Vorgänge und Erscheinungen an Geschwülsten. Ziegler's Beiträge zur pathologischen Anatomie. 1891. Bd. XI. 1. S. 1.

3) Handbuch S. 529.

regelloses Vorkommen über den ganzen Alveolus. Ich glaube, dass in dieser Beziehung das Verhalten des Gewebes maassgebend ist, von dem der Krebs ausging. An Carcinomen, die dem Rete Malpighi entstammen, liegen die Kerntheilungsbilder am Rande der Alveolen, während man im Innern meist Degenerationserscheinungen, Verhornungen u. s. w. findet. Die Randzone des Krebsalveolus entspricht ihrer Lage und ihrer Bedeutung nach der basalen Zellschicht des Deckepithels der Haut und den jüngsten und kräftigsten Zellen des Rete Malpighi, an denen sich physiologisch das Zellenwachsthum abspielt, das verhornende Centrum dagegen der normalen Hornschicht, in der wir eine Zellvermehrung nicht mehr erwarten dürfen. In Drüsencarcinomen, z. B. in solchen der Mamma, des Magens und des Darmes, habe ich die Mitosen regellos über den einzelnen Alveolus zerstreut gefunden. In diesen Organen besteht physiologisch eine ähnliche Differenzirung centraler und peripherer Zellen, wie an der Haut, nicht. Sind die Krebszellenzüge sehr schmal, wie bei dem tubulären Carcinom der Mamma oder den Adenocarcinomen des Darmes, so wird auch hier der Eindruck einer mehr peripheren Lage der Zelltheilungsbilder entstehen können.

Den Ablauf der Karyokinese in Carcinomen schildert Hansemann¹⁾ vielfach in einer von dem normalen Typus abweichenden Weise. Er spricht von pathologischen und asymmetrischen Kerntheilungen. Unter letzteren versteht er eine Störung der Metakinese in der Art, dass die Anzahl der Chromatinschleifen in beiden Theilen des Kernes eine ungleiche wird. Von den so entstehenden Tochterzellen erhält die eine einen chromatinreicheren, die andere einen chromatinärmeren Kern. Diese Asymmetrie findet sich nach Hansemann in allen Epithelkrebsen, während das darauf untersuchte Controlmaterial, Tumoren anderer Art und Hyperplasien, nicht den geringsten Anhaltspunkt für ähnliche Verhältnisse erkennen liess. Hansemann knüpft an seine Beobachtungen weittragende und interessante Schlüsse. Da nach Weissmann und anderen Embryologen an das Chromatin des Kernes die wichtigsten Lebenseigenschaften der Zelle gebunden sind und nur durch dasselbe auf ihre Nachkommen vererbt werden, so müssten asymmetrische Kerntheilungen, wenn die Beobachtungen Hansemann's ganz einwandfrei sind und ihr Vorkommen nur auf bösartige Neubildungen beschränkt ist, selbstverständlich von principieller Wichtigkeit sein. Es liesse sich auf

1) Ueber asymmetrische Kerntheilung. Virchow's Archiv. Bd. 119. S. 299, und dasselbe Archiv. Bd. 112. S. 359.

diese Weise wohl erklären, dass ein Theil der Krebszellen Energien des Wachstums und der Lebensfähigkeit erhielte, welche den normalen Zellen fehlen, und welche ihnen die Eigenschaften der Krebszellen verleihen würden. Hansemann vergleicht die asymmetrische Kerntheilung mit der Ausstossung des Richtungskörperchens aus dem Ei. Er spricht von einer dadurch entstehenden Entdifferenzirung der Epithelzelle. Diejenigen Zellen, welche Kerne enthalten, die aus der kleineren Schleifenzahl hervorgegangen sind, gehen zu Grunde, während die Zellen mit dem chromatinreichen Kern die eigentlichen Carcinomzellen darstellen. Der ganze Vorgang würde, um im Sinne von Weissmann zu sprechen, mit der Ausstossung unnöthigen und für die weitere Entwicklung der Zelle nicht mehr in Betracht kommenden Ahnenplasmas zu vergleichen sein.

Die Ausführungen Hansemann's haben, wie ich gern gestehe, manches Bestechende. Man muss den Ideenreichtum, der in ihnen liegt, rückhaltslos anerkennen. Aber auch diesem Forscher kann ein ähnlicher Vorwurf, wie Klebs, nicht erspart werden. Er verliert sich zu sehr in Speculationen. Ich halte es nicht für richtig, die in der Neuzeit mehrfach betonte Analogie zwischen der Kerntheilung im Allgemeinen und der Furchung der befruchteten Eizelle zu weit zu treiben. Die Vorgänge, die sich hier abspielen, können nicht ohne Weiteres auf die Kerntheilung, auch nicht auf diejenige der Zellen bösartiger Neubildungen, übertragen werden. Die Eizelle, und noch dazu die befruchtete Eizelle ist doch ein ganz anderer biologischer Organismus, als eine einfache Epithelzelle. Die Eizelle enthält in sich die Potenzen für die Entwicklung eines ganzen Individuums. Aus der Epithelzelle aber kann, trotz aller Einflüsse, die sie von aussen treffen mögen, nie etwas Anderes werden, als wieder eine Epithelzelle. Es ist begreiflich, wenn aus dem Ei nach der Befruchtung überschüssiges Keimplasma in Gestalt des Richtungskörperchens ausgestossen wird. An der schon weit differenzirten Epithel- oder Krebszelle wäre der Zweck einer ähnlichen Erscheinung nicht recht einzusehen. Ausserdem kommt in Betracht, dass gerade die Grundlage, der ganzen Schlussfolgerung, die Asymmetrie der Theilung des Kernes bei der Ausstossung des Richtungskörperchens fehlt. Das Richtungskörperchen geht, wie die Arbeiten aller Embryologen lehren, aus genau der gleichen Anzahl von Chromatinschleifen hervor, wie der zurückbleibende Eikern.

Auch der Boden, auf welchem Hansemann fusst, ist leider nicht ganz sicher. Das Vorkommen asymmetrischer Kerntheilungen ist nicht allein auf bösartige Neubildungen beschränkt. Ströbe (l. c.)

hat die Beobachtungen Hanse mann's einer eingehenden Nachprüfung unterzogen. Er findet, dass asymmetrische Kerntheilungen ausser in Carcinomen auch in gutartigen Geschwülsten, ferner bei der Regeneration normaler Gewebe, z. B. im Harncanälchenepithel, in Glia- und Epidermiszellen und in den Keimcentren der Lymphdrüsen vorkommen. Auf Grund meiner Untersuchungen muss ich mich den Ansichten Ströbe's anschliessen. Die Resultate derselben sind folgende.

Bilder asymmetrischer Kerntheilung kommen, wie Hanse mann behauptet, in solchen Carcinomen, in welchen Mitosen häufig sind, nicht selten vor. Sie finden sich aber, wenn auch nur selten, ebenso in gutartigen Tumoren und in normalen Geweben. Diese Seltenheit ist vielleicht nur eine relative, entsprechend dem spärlicheren Vorkommen von Kerntheilungen im normalen Gewebe. In Geweben mit ausgesprochener Zellvermehrung finden sich dagegen auch im normalen Zustande asymmetrische Kerntheilungen häufiger. Es erscheint mir daher der Schluss nicht ungerechtfertigt, dass die zahlreicheren Bilder asymmetrischer Mitosen im Carcinom einfach eine Folge der hier üppigeren Zelltheilung sind.

Ferner kann die Möglichkeit nicht von der Hand gewiesen werden, dass es sich wenigstens bei einer Anzahl anscheinend asymmetrischer Kerntheilungen nur um Kunstproducte handelt. Schon wenn die beiden Tochtersterne — nur in diesem Stadium der Karyokinese ist das Beobachten einer Asymmetrie möglich — in verschiedenen Ebenen liegen, ist ein Irrthum bei der Feinheit des untersuchten Objectes recht wohl denkbar. Wenn aber in einem solchen Falle das dartübergleitende Mikrotommesser bei der Anfertigung dünner Paraffinschnitte einen Theil der Schleifen des einen Tochterkernes mit fortnimmt, so muss das ausgesprochene Bild einer Asymmetrie der Theilung entstehen, die in Wirklichkeit nicht vorhanden war.

Werfen wir noch einmal einen kurzen Rückblick auf das bis jetzt Auseinandergesetzte, so ist keine der besprochenen Theorien im Stande gewesen, uns einen völlig befriedigenden Aufschluss über das Wesen des Carcinoms zu geben. Die Entdeckung der karyokinetischen Zelltheilung hat uns einen neuen machtvollen Beweis für die epitheliale Herkunft der Krebszellen erbracht, und die morphologischen Vorgänge bei der Theilung der Krebszellen und ihrer Vermehrung sind erkannt worden. Aber irgend eine Eigenthümlichkeit derselben, die man mit Sicherheit als charakteristisch für das Krebsgewebe hätte hinstellen können, hat sich nicht auffinden lassen.

Die Impfbarkeit des Carcinoms und die parasitäre Theorie desselben.

Die klinischen Beobachtungen über den Verlauf des Carcinoms und seine entschiedene Fähigkeit, sowohl regionär als durch Verschleppung auf dem Wege der Lymph- und Blutbahn zu inficiren, hatten die Forscher immer wieder zu dem Versuche angeregt, die Ueberimpfbarkeit des Carcinoms experimentell nachzuweisen. Diese Versuche haben erst in der neuesten Zeit zu einem positiven Ergebniss geführt. Der erste ist der oft citirte Versuch von B. v. Langenbeck, der einem Hunde eine Krebsemulsion in die Schenkelvene spritzte und danach das Auftreten von Knoten in der Lunge beobachtete. Weber¹⁾ impfte in ähnlicher Weise, indem er Krebsstoff in eine Vene brachte. Neben secundären Knoten konnte er das Auftreten einer Geschwulstmasse an der Impfstelle beobachten. Ebenso wollte Billroth einen positiven Erfolg von Carcinomimpfung erzielt haben. Alle diese angeblich erfolgreichen Versuche können einer nüchternen Kritik nicht Stand halten. Sie sind in der vorantiseptischen Zeit ohne Berücksichtigung entsprechender Vorsichtsmaassregeln angestellt worden. Bei näherem Nachforschen erweisen sich die durch Einspritzen in die Venen erzielten Knoten nicht als Geschwulstembolien, sondern als metastatische miliare Abscesse, bedingt durch gleichzeitige septische Infection.

Absolut negativ fielen die zahlreichen Uebertragungsversuche von Doutrelepont²⁾ aus. Ebenso berichten die meisten Forscher der neuesten Zeit nur über negative Erfolge. So Albers³⁾ in seiner Monographie über den Krebs. Albers hat seine Versuche, unter strengster Berücksichtigung der Asepsis, in der verschiedensten Weise modificirt. Er spritzte Krebsemulsion in Venen und Lymphgefässe und implantirte ganze Stücke von Carcinom in die Bauchhöhle, das subcutane Gewebe und den Bulbus von Hunden. Alle Versuche blieben resultatlos. Die transplantierten Carcinomstücke zerfielen fettig und wurden resorbirt. Auch Versuche, bei den Hunden, die zum Experiment benutzt wurden, eine Prädisposition zu erzeugen, missglückten. Sie mussten schon deswegen missglücken, weil der Weg, diese Prädisposition zu erzeugen, und ihr Wesen völlig unbekannt sind. Der Fehler in der Albers'schen Versuchsanordnung scheint mir der zu

1) Chirurgische Erfahrungen und Untersuchungen. 1859.

2) Virchow's Archiv. Bd. 45. S. 501.

3) Das Carcinom in historischer und experimentell-histologischer Beziehung. 1887.

sein, dass Impfmateriel, welches vom Menschen stammte, auf Thiere, also eine andere Species, übertragen wurde. Die geglückten Experimente Hanau's erklären es, dass eine solche Anordnung nicht von Erfolg begleitet sein konnte. Nicht glücklicher als Albers waren Schottelius¹⁾ und v. Kahlden, Shattock und Ballance.²⁾ Auch Rinne³⁾, der von einem am Hunde spontan aufgetretenen Carcinoma recti auf andere impfte, hatte keinen Erfolg.

Diesen negativen Ergebnissen, die für Viele weitere Versuche völlig aussichtslos erscheinen liessen, stehen eine Anzahl Experimente mit positivem Resultate gegenüber: die Versuche von Novinsky, Wehr und vor Allem Hanau, der die Uebertragbarkeit des Carcinoms in unzweideutiger Weise erwies.

Der eine, schon etwas ältere positive Versuch von Novinsky⁴⁾ ist, wie der von Langenbeck und Billroth, von der Kritik nie recht anerkannt worden, wiewohl Vieles für seine Richtigkeit spricht. Novinsky hat 42 Uebertragungen des Carcinoms von Hund auf Hund angestellt. Unter diesen 42 Fällen konnte er einmal Wachsthum des übergeimpften Stückchens mit secundärer Lymphdrüsenmetastase beobachten. Durch histologische Untersuchung wurde die unzweifelhafte Krebsnatur der neugebildeten Tumoren nachgewiesen.

Wehr⁵⁾ hat durch eine Reihe von Jahren Ueberimpfungen des Carcinoms von Hund auf Hund vorgenommen und dabei regelmässig beobachten können, dass sich bohnen- bis haselnussgrosse Geschwülste im Unterhautzellgewebe bildeten, die allerdings nach 6—8 wöchentlichem Bestand zurückgingen, sich aber histologisch als Carcinom, nicht als Tumoren entzündlichen Ursprungs erwiesen. Die Demonstration Wehr's fand zunächst auf dem Congress keinen Beifall, weil Carcinome, die spontan zurückgehen, gerechte Zweifel an ihrer Natur erregen mussten. Man hat dennoch dem Autor damals vielleicht Unrecht gethan. Wenn auch am Menschen spontane Heilung eines Carcinoms undenkbar ist, so erscheint es doch von vornherein nicht absolut unmöglich, dass unter den so gänzlich veränderten Bedingungen, wie sie bei einer Impfung auf gewiss sehr verschieden empfängliche Thiere gegeben sind, ein abortives Wachsthum der übertragenen Epithelien eintreten kann, das sich eine Zeit lang verfolgen lässt, aber später infolge ungünstiger Verhältnisse wieder auf-

1) Mittheilungen aus dem pathologischen Institut zu Marburg 1881.

2) British medical Journal. No. 1576. 1891.

3) Verhandlungen der Deutschen Gesellschaft f. Chirurgie. 1889. Bd. I. S. 10.

4) Referat im Centralblatt der medicinischen Wissenschaften. 1876.

5) Verhandlungen der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie. 1888. Bd. I. S. 52.

hört. Ob man aber berechtigt ist, ein so gewachsenes Knötchen Krebs zu nennen, ist eine andere Frage. Denn neben den histologischen Eigenschaften verlangen wir von einer Geschwulst, die wir als Krebs anerkennen sollen, ebenso bestimmte und wichtige klinische Merkmale, die den durch Impfung entstandenen Knötchen Wehr's fehlen.

Ganz einwandsfrei sind die vollkommen gelungenen Impfversuche von Hanau.¹⁾

Hanau hat seine Versuche an Ratten angestellt, und zwar benutzte er ein Canceroidgeschwür von der Vulva einer Ratte, das sich spontan entwickelt hatte und histologisch aus Epithelien mit starker Neigung zur Verhornung bestand. Von diesem Geschwüre wurden männlichen alten Ratten hirsekorn-grosse Partikel in die Tumia vaginalis testiculi gebracht. In jedem Falle kam es zu histologisch und klinisch gut charakterisirter Carcinomentwicklung. Es bildeten sich sowohl am Orte der Impfung, als auch in der Bauchhöhle gewaltige Massen von Tumoren, denen die Thiere erlagen. Mit den neugebildeten Massen konnten wiederum Thiere geimpft werden. Seinen Erfolg glaubt Hanau mit Recht der Anordnung seiner Versuche zuschreiben zu dürfen. Er benutzte Thiere derselben Species und solche, die disponirt für die Erkrankung sind, also alte Ratten. Ausserdem impfte er nicht in das Unterhautzellgewebe, sondern in Lymphräume, ausgehend von den Erfahrungen, die wir über die natürliche Verbreitung des Carcinoms auf dem Wege der Lymphbahnen gesammelt haben.

Auch am Menschen sind Versuche über die Möglichkeit einer experimentellen Uebertragung des Carcinoms vorgenommen worden, und zwar von Hahn²⁾ und von v. Bergmann.³⁾ Bei einer an unheilbarem Krebs der Brust erkrankten Frau wurde eines der disseminirten Knötchen der Umgebung des primären Krebsgeschwüres von Hahn auf die gesunde Seite verpflanzt, heilte hier an und vergrösserte sich. Als die Frau ihrem ursprünglichen Leiden erlegen war, konnte die histologische Untersuchung vorgenommen werden. Das Knötchen erwies sich als aus Carcinomgewebe bestehend. Dasselbe beobachtete v. Bergmann, als er den Hahn'schen Versuch wiederholte.

So interessant dieser Versuch auch ist, so ist er nach meiner Ansicht doch nicht einwandsfrei und für eine Impfung des Carcinoms auf den Menschen nicht beweisend. Zunächst beweist er nur, dass das Carcinom auf derselben Person haften kann, deren Orga-

1) Verhandlungen der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie. 1889. Bd. II. S. 278, und Fortschritte der Medicin. 1889. Nr. 9.

2) Deutsche medicinische Wochenschrift.

3) Congress-Verhandlungen 1889, mitgetheilt gelegentlich der Carcinomdebatte.

nismus durch die primäre Erkrankung sicherlich schon ausserordentlich geschwächt ist. Als eine Impfung im engeren Sinne kann ferner ein solcher Versuch nicht angesehen werden. Nicht nur, dass bei der Transplantation nicht allein Krebselemente, d. h. Epithelien, verpflanzt werden, auch das Stroma wird mit übertragen und ein Theil der umgebenden gesunden Haut mit ihrem völlig intacten Gefässnetz. Die Anheilung eines solchen Hautläppchens kann nicht überraschen. Sie erfolgt nach denselben Gesetzen, nach denen Hautstücke bei der Transplantation von Thiersch anheilen. Einen unanfechtbaren Beweis für das Weiterwachsen der verpflanzten Krebselemente halte ich aber nicht einmal für erbracht, wenn ein solches auch aus den erwähnten Gründen sehr wahrscheinlich ist. Nach meinem Dafürhalten kann man mit Sicherheit nur dann von einem Weiterwachsen des Krebsknötchens sprechen, wenn an den Krebszellen Vermehrungsvorgänge durch das Auftreten karyokinetischer Figuren festgestellt worden sind. Eine solche Beobachtung fehlt noch. Nach dieser Richtung wäre eine Nachprüfung des Versuches von Hahn sehr erwünscht. Aus äusseren Gründen musste eine solche unterbleiben. Wir hielten uns zur Vornahme der Versuche an Kranken ohne deren ganz specielle Einwilligung nicht für berechtigt.

Die Aehnlichkeit, welche zwischen Carcinomen und bösartigen Geschwülsten auf der einen Seite, und den Infectionskrankheiten, besonders der Tuberculose, auf der anderen Seite in vielen Beziehungen besteht, macht es erklärlich, dass man auch nach Analogien in der Aetiologie Beider suchte. Als Koch durch seine genialen Entdeckungen der medicinischen Forschung einen neuen Impuls gegeben hatte, fing man an, mit erneutem Eifer auch nach der Ursache des Carcinoms zu forschen. Es entstand die parasitäre Theorie des Carcinoms und eine Bewegung zu Gunsten derselben, in deren Mitte wir uns zur Zeit noch befinden. In der That, es lassen sich eine Reihe gewichtiger Gründe für die Anschauung anführen, das Carcinom werde, wie die Infectionskrankheiten, durch parasitäres Wachsthum von aussen in den Körper eingedrungener niederer Organismen veranlasst. Die Bildung einer Geschwulst an der Stelle des primären Sitzes, das Entstehen eines Geschwürs mit der Tendenz zum Weitergreifen infolge baldigen Zerfalles der neugebildeten Zellenmassen, die Proliferationsenergie der Zellen auf der einen und ihre Hinfälligkeit auf der anderen Seite entsprechen genau dem Verhalten der Tuberculose, bei welcher wir auf den Reiz, den der eingedrungene Bacillus ausübt, zunächst die Zellen mit lebhafter Theilung antworten sehen¹⁾, bis

1) Vgl. Baumgarten, Histogenese der Tuberculose.

sie durch Stoffwechselproducte der Bakterien der Nekrobiose anheimfallen. Die regionäre und metastatische Infection auf dem Wege der Lymph- und Blutbahnen wird am besten erklärt durch ein Gift, welches die Energie der Vervielfältigung in sich selbst trägt, und das sich allmählich von dem Orte seines Eindringens aus über den ganzen Körper verbreitet. Sie ist das getreue Abbild dessen, was wir bei der Eiterung, die zur metastatischen Pyämie führt, bei der Tuberculose und der Actinomycose täglich beobachten.

Auch die Kachexie, die sich in den späteren Stadien des Carcinoms entwickelt, spricht für eine Infectionskrankheit. Dieselbe steht meist in absolutem Missverhältniss zu der Grösse der neugebildeten Tumoren und der durch sie bedingten, einfach mechanischen Schädigungen. Wenigstens sehen wir Ovarialeysten von viel gewaltigerem Umfange und vielfach grössere Uterusmyome, ohne dass es hier zu einer schwereren Schädigung des Allgemeinbefindens, zu einer Kachexie zu kommen braucht, die bei dem Carcinom nie ausbleibt. Wir werden nicht fehlgehen, wenn wir annehmen, dass es bei dem Krebs, ebenso wie bei den bakteriellen Infectionskrankheiten, schädliche Stoffwechselproducte sind, entstanden durch die veränderte Lebensthätigkeit und vielleicht Zerfall der Krebszellen oder parasitärer Mikroorganismen, deren Aufnahme in die Circulation für den Organismus vererblich wird.

Auf der anderen Seite spricht aber auch eine Reihe von Gründen gegen die parasitäre Theorie und gegen die Anschauung derer, die ein von aussen in den Organismus eindringendes Gift, einen Parasiten, für unerlässlich halten, um das histologische und klinische Symptomenbild des Krebses zu erklären. Ich selbst bin durch meine Arbeiten zu der Ueberzeugung gedrängt worden, dass die morphologischen Grundlagen und Beobachtungen, auf welche sich die parasitäre Theorie des Krebses gründet, sehr anfechtbar sind, und dass die theoretischen Erörterungen, die auf das Vorhandensein eines Carcinomparasiten hindeuten sollen, auch einer anderen Deutung fähig sind.

Zunächst brauchen wir aus theoretischen Reflexionen einen Carcinomparasiten durchaus nicht, um alle die oben erwähnten Eigenschaften des Krebses zu erklären. Zweifellos ist das Carcinom für seinen Träger eine infectiöse Erkrankung der schwersten Art. Aber die Gründe, welche für einen Carcinomparasiten sprechen, werden hinfällig, wenn wir annehmen, dass die Zelle unter veränderten Lebensbedingungen, die uns allerdings noch unbekannt sind, zu deren Erklärung es aber eines in sie eindringenden Mikroorganismus nicht bedarf, selbst infectiös wird. Unter diesen veränderten Bedingungen

wird die Zelle selbst zum Parasiten, der wuchert, der inficirt und Metastasen macht, und dessen Stoffwechselproducte zur Cachexie führen. Ich vermag nicht einzusehen, warum wir für die Körperzelle unter Umständen die Eigenschaften nicht in Anspruch nehmen sollen, die wir ohne Weiteres den Schizomyceten und Protozoen zuerkennen. Sie ist, wie diese, ein Lebewesen kleinster Art, für welches dieselben Lebensäußerungen, welche die ersteren zu Parasiten machen, recht gut denkbar sind.

Es giebt ferner aber auch nicht allein Aehnlichkeiten zwischen Carcinom und Infectionskrankheiten, es giebt auch sehr schwerwiegende Unterschiede zwischen Beiden. Ich erwähne zunächst das verschiedene Verhalten der Impfung. Wie leicht glückt bei den mannigfachsten Infectionskrankheiten die Uebertragung vom Menschen oder von einem Thiere auf ein anderes! Spuren des Secretes, welches den Infectionsstoff enthält, ja ein einzelner Bacillus oder eine Spore können genügend sein, die tödtliche Krankheit bei dem geimpften Thiere hervorzurufen. Ganz anders bei dem Carcinom. Nach vielen Mühen sind ganz vereinzelte Uebertragungsversuche gelungen. Bei diesen Uebertragungen wird aber nicht mit Spuren von infectiösem Secret, z. B. von Carcinomsaft geimpft, sondern es müssen zusammengesetzte, lebenskräftige Gewebe verpflanzt werden, wenn der Versuch glücken soll: also ein von der Haftbarkeit des Impfstoffes bei den Infectionskrankheiten sehr verschiedenes Verhalten. Es besteht kaum eine Analogie zwischen der Impfung dort und der Verpflanzung von Carcinomgewebe hier.

Endlich müsste der Carcinomparasit Eigenschaften haben, die ihn in sehr merklicher Weise von denjenigen Mikroorganismen unterscheiden, die wir als Erreger von Infectionskrankheiten kennen. In der Klasse der Bakterien dürfen wir ihn jedenfalls nicht suchen. Alle Erreger bakterieller Infectionskrankheiten sind auf das Bindegewebe angewiesen, als den Mutterboden, in dem sich Infectionen abspielen. Das epitheliale Gewebe wird nur secundär betheiligt. Am Orte des Eindringens des Infectionskeimes kommt es zu einem Abscess, zu einem Tuberkel- oder Lepraknötchen, je nach der Art des inficirenden Giftes. Immer aber gehört das neugebildete Gewebe zu dem Typus des Granulationsgewebes, hervorgegangen aus einer Wucherung der fixen Bindegewebelemente und der Auswanderung von Leukocyten aus den Gefäßen. Wird ein Keim verschleppt, so findet er an dem Orte, wo er hingelangt, wieder Bindegewebe, und das Auftreten eines neuen Tuberkels oder eines metastatischen Abscesses hat keine Schwierigkeiten. Wenn aber Carcinomkeime ver-

schleppt werden, so entsteht an dem Orte der Metastase ein Carcinom mit den ausgesprochenen Eigenschaften der primären Geschwulst, in den Lymphdrüsen oder in der Lunge z. B. ein verhornender, aus den Epithelien des Rete bestehender Knoten nach primärem Hautkrebs. Der Carcinomparasit müsste also die Eigenschaft haben, heteroplastisch auf das Gewebe, in welches er gelangt, einzuwirken, oder er kann nur in Verbindung mit lebenskräftigen Epithelzellen verschleppt werden, mit denen er ein symbiotisches Dasein führen müsste. Die erstere Annahme widerspricht den Lehren der Entwicklungsgeschichte. Für den zweiten Vorgang kennen wir zwar aus dem Thier- und Pflanzenreich einige Analogien, am Menschen aber würde er etwas durchaus Neues sein. Indess gebe ich die Möglichkeit eines solchen Verhaltens ausdrücklich zu und würde an demselben keinen Anstoss nehmen, wenn wirklich unzweideutige Beweise für die Existenz eines Carcinomparasiten erbracht würden.

Auch erscheint es unerklärlich, warum der hypothetische Carcinomparasit bei einer etwaigen Verschleppung nicht auch die Epithelien inficirt, wohin er gelangt, sondern auf die beschränkt bleibt, die den Ausgangspunkt der Metastase bildeten, z. B. bei secundärem Carcinom der Leber nach Krebs des Darmes oder der Haut auf die von Darm oder Haut abstammenden Zellen. Wir müssten annehmen, dass er nur in den Abkömmlingen der verschleppten Zellen günstige Entwicklungsbedingungen finde, alles Annahmen, die zum mindesten sehr gesucht erscheinen.

Nach diesen Auseinandersetzungen zwingen uns theoretische Erwägungen keineswegs zu der Annahme von Carcinomparasiten. Aber auch die bis jetzt vorliegenden Beobachtungen über Befunde von Mikroorganismen im Carcinom und deren Verwerthung für die Aetiologie desselben sind nicht beweiskräftig.

Ueber Bacterien im Carcinom und als Erreger desselben berichten Verneuil¹⁾, Nédopil²⁾, Scheuerlen³⁾, Schill⁴⁾, Domingo Treire⁵⁾ und Kubassoff.⁶⁾ Die Bacterienätiologie des Carcinoms ist aus den oben dargelegten Gründen höchst unwahrscheinlich. Es

1) *Propriétés pathogènes des microbes renfermés dans les tumeurs malignes.* Revue de chir. Vol. IX. p. 10.

2) *Anzeiger der k. k. Gesellschaft der Aerzte in Wien.* 1881. Nr. 8. S. 32.

3) *Die Aetiologie des Carcinoms.* Deutsche med. Wissenschaft. 1887. Nr. 48. S. 1033.

4) *Ebenda.* 1887. Nr. 48.

5) *Ebenda.* 1888. Nr. 48.

6) *Die Mikroorganismen der krebsartigen Neubildungen.* Wiestnik higieny. 1889, und Wiener medicinische Presse. 1890. Nr. 29—31 u. 33.

glaubt heute wohl auch Niemand mehr an sie. Aus der Beschreibung, welche diese Forscher von ihren Befunden geben, geht mehr als zur Genüge hervor, dass sie sich zum Theil durch die oberflächliche Anordnung ihrer Versuche täuschen liessen, zum Theil verschiedenes Andere, wie unregelmässige Kernteilungsbilder, als Bacterienhaufen im Carcinom beschrieben haben. Ihre Beobachtungen, soweit sie die gefundenen Bacterien als Erreger des Carcinoms ansehen, lehren nur das Eine, dass auch heute noch in der Wissenschaft ein grosser Fortschritt, wie es die Erkenntniss der Aetiologie der Infektionskrankheiten ist, nicht gemacht werden kann, ohne dass von den Epigonen Irrwege und falsche Pfade eingeschlagen werden.

Bei Weitem mehr Vertrauen und Interesse verdienen die Mittheilungen über Protozoen im Carcinom und die Bemühungen, diese Mikroorganismen als die Erreger des Carcinoms anzusprechen. Sie gründen sich wenigstens auf die Lebeseneigenschaften dieser Parasiten, die uns als ausgesprochene Zellschmarotzer bekannt sind.

Einer unserer besten Protozoenkenner, Pfeiffer¹⁾, hat seine Erfahrungen über das häufige Vorkommen von Protozoen als Parasiten in den Epithelzellen niederer und höherer Thiere in mehreren Aufsätzen und in einer zusammenfassenden Abhandlung niedergelegt. Diese Arbeiten bilden für den Arzt, der sich über die Frage der parasitären Aetiologie des Krebses unterrichten will, die Grundlage für weiteres Studium. Protozoen sind nach Pfeiffer, und zwar der Gattung Coccidium und Sporidium und den Flagellaten und Rhizopoden angehörig, als Schmarotzer in Epithelzellen ausserordentlich häufig. Die Wirthszelle kann, wie wir dies von dem hypothetischen Carcinomparasiten voraussetzen müssen, den Eindringling längere Zeit bewahren, ohne selbst Schaden zu leiden und in ihrer Entwicklung gestört zu werden. Im Jugendzustand stellt der Parasit ein meist sichelförmiges Protoplasmaklumpchen dar, ohne jede weitere Differenzirung. Herangewachsen, nimmt er die Eigenschaften einer Zelle an. Dann segmentirt er sich, eine Sporocyste bildend, die 4, 8 und mehr Sporen enthält, aus denen wieder die Jugendformen hervorgehen. Der Frage nach dem Vorkommen von Protozoen im Carcinom und deren ätiologischer Bedeutung steht Pfeiffer sehr sympathisch gegenüber. Er selbst beschreibt Bilder²⁾, die er nicht glaubt

1) Die Protozoen als Krankheitserreger. Jena 1890. Zeitschr. f. Hygiene: 3, 4, 5, 6. Bd. VIII. Bericht über die Sammelforschung des allgemeinen ärztlichen Vereins der Chirurgen. 1890.

2) l. c. S. 96 und Correspondenzblatt des allgemeinen ärztlichen Vereins für Thüringen 1888.

anders deuten zu können, als durch die Annahme von in die Epithelien eingedrungenen Parasiten.

In Fig. 3 u. 5 (Taf. II) gebe ich Photogramme von Schnitten durch die Niere von *Helix hortensis*, die von einem Protozoon, der zu den Coccidien gehörigen *Klossia*, befallen ist. Das Präparat wurde nach der Methode von Gram-Kühne gefärbt. Auch Färbung mit Carbolfuchsin ergab die gleichen Resultate. Die bis zu $40\ \mu$ grossen Parasiten (a) liegen in Epithelien, die durch ihren Inhalt monströs vergrössert und zu einer flachen Schale zusammengedrückt sind, welche den Parasiten umhüllt (d). Im Rest der Epithelzelle ist häufig noch der Kern sichtbar. Die Parasiten selbst haben in diesem Stadium einen hellen, bläschenförmigen Kern mit starkem, dunkel gefärbten Kernkörperchen. Das Protoplasma zeigt in unseren Präparaten eine schön ausgebildete Körnelung. Die Körner nehmen bei der Gram'schen Färbung eine tiefblaue, bei Carbolfuchsinbehandlung schön rothe Farbe an, so dass das Bild des Parasiten ein überaus zierliches wird.

Figur 4 (Taf. II) zeigt die Sporenbildung. Im Innern der von einer Membran umgebenen Sporocyste liegen 12—24 blass gefärbte Sporen mit stark lichtbrechender Membran und nicht weiter differenzirtem Inhalt. Von dem Sarcodestadium des Parasiten kann ich leider eine Abbildung nicht geben, da es mir nicht glückte, dasselbe in dem mir zugänglichen Material zu Gesicht zu bekommen.

Bei höheren Thieren und dem Menschen finden sich ähnliche Parasiten zum Theil als unschuldige Schmarotzer, wie das *Coccidium oviforme* in der Leber des Kaninchens oder die *Psorospermien* (Miescher'sche Schläuche) in den quergestreiften Muskeln des Schafes und Schweines, zum Theil aber auch als sehr verbreitete Erreger schwerer Infektionskrankheiten. Hierher gehört das in den rothen Blutkörperchen schmarotzende *Plasmodium malariae*. Seine morphologischen und biologischen Eigenschaften und seine Beziehungen zum Malariafieber sind vor Allem durch die Arbeiten italienischer Forscher klargelegt worden. Pfeiffer ist der Ansicht, dass auch in der Vaccine, der Variola und bei Herpes Zoster sarcodetförmige Protozoen vorkommen. Er ist allerdings nicht in der Lage, sie classificiren zu können, da er nur das amöboide Stadium beobachten konnte.

Auch in Geschwülsten epithelialer Herkunft, deren infectiöser Charakter erwiesen ist, hat man mit grosser Bestimmtheit parasitäre Gebilde in den erkrankten Epithelzellen gefunden und beschrieben: so im Epithelioma contagiosum der Hühner und Tauben und dem nahestehenden Molluscum contagiosum des Menschen. Die in den Zellen des letzteren sich findenden und mit Pikrinsäure gelb zu

färbenden Körner deuten Moreau¹⁾ und bis vor Kurzem auch Neisser²⁾ mit aller Entschiedenheit als Parasiten. Der Letztere ist in seinem Urtheil in neuester Zeit wieder etwas schwankend geworden. In Figur 6 (Taf. II) gebe ich die Abbildung eines Schnittes durch das Molluscum contagiosum. In den jugendlichen Zellen findet man die als Parasiten gedeuteten Gebilde als kleine Kügelchen im Protoplasma, in den älteren Schichten füllen die zu hellen, ovalen und grösseren Körperchen gewordenen Gebilde die Zelle völlig aus. Eine jede Zelle erscheint inficirt. Zwischen den einzelnen Gebilden liegen zusammengedrückt die Reste der Zelle, die in unserem Präparat durch Hämatoxylin dunkel gefärbt sind. Ich selbst kann mich von der parasitären Natur dieser Gebilde noch nicht überzeugen. Es kann auch eine eigenthümliche Form der Zelldegeneration vorliegen. Gegen ihre parasitäre Natur spricht nach meiner Ansicht der Umstand, dass sie, frisch untersucht, nie Bewegungserscheinungen wahrnehmen liessen, die z. B. bei den Malariaplasmodien so ausgesprochen sind, und dass irgend ein Vorgang, der sich als Sporulation deuten liesse, an ihnen nicht zu beobachten ist. Auch habe ich ähnliche Bilder an spitzen Condylomen und in den oberen Schichten transplanterter Haut gesehen, wo von Parasiten keine Rede sein kann.

Die erwähnten Beobachtungen wurden die Veranlassung, auch bei den bösartigen Neubildungen nach ähnlichen Parasiten zu suchen.

Thoma³⁾ war der Erste, der die Aufmerksamkeit der Forscher auf eigenthümliche Gebilde lenkte, die er in den Zellen von Mamma-, Mastdarm- und Magencarcinomen fand. Er beschreibt seinen Befund, ohne seiner kurzen Mittheilung Abbildungen beizugeben, als 4—15 μ grosse, ovale oder schiffchenförmige Gebilde mit Protoplasma und Kern, die in oder neben den Kernen von Epithelzellen liegen. Die Kerne der letzteren sind oft schlecht färbbar, ein Zeichen beginnender Degeneration. Häufig liegen in einer Zelle mehrere Körperchen, die vielleicht eingekapselte Coccidien darstellen. Man müsse sie wohl „als zweifellos parasitäre Gebilde auffassen“.

Einen ähnlichen Befund wie Thoma hat Nils Sjöbring⁴⁾ vor. Augen gehabt. Mit aller Sicherheit findet er Sporozoen im

1) Du molluscum contagiosum en visage comme maladie parasitaire. Thèse de Paris 1889.

2) Vierteljahrsschrift f. Dermatologie und Syphilis. 1888. S. 583, und Verhandlungen der dermatologischen Gesellschaft. 1891.

3) Fortschritte der Medicin. 1889. S. 413.

4) Ein parasitärer protozoenartiger Mikroorganismus im Carcinom. Fortschritte. 1890. Nr. 14.

Carcinom und beschreibt den ganzen Entwicklungsgang derselben, der in auffallender Weise mit dem bekannten des Plasmodium malariae übereinstimmt. In seiner Jugendform stellt der Parasit ein kleines Sarcodeklümpchen dar, das im Kern lebt. Aus demselben wandert er später, immer wachsend, in das Protoplasma der Zelle. Bei einer gewissen Grösse tritt Segmentirung ein; es wird eine Sporocyste mit 20—30 Sporen und einer umhüllenden Membran gebildet. Aus den Sporen entwickeln sich die Keimlinge, die von Neuem Epithelzellen inficiren und dann den ganzen Entwicklungszyklus wiederholen.

Besonderen Eifer haben französische Forscher auf das Studium der Carcinomparasiten verwandt. Die Befunde, die sie beschreiben, weichen in nicht unwesentlichen Beziehungen von den soeben geschilderten ab. Hierher gehören die Mittheilungen von Albarran¹⁾, Michaux²⁾, Malassez³⁾, Hallopeau⁴⁾ und die Arbeiten von Darier⁵⁾ und Wickham⁶⁾ über Paget's Disease. Sie alle sind von der ätiologischen Bedeutung der gefundenen Coccidien überzeugt. Die Letzteren wollen sie sogar zu diagnostischen Zwecken für Paget's Erkrankung benutzen. Sie beschreiben Gebilde von der Grösse der Epithelzellen selbst als die gesuchten Parasiten. Bei der Besprechung unseres Falles von Paget's Disease werde ich etwas ausführlicher auf den Befund dieser Autoren einzugehen haben. Wickham und Darier wollen ein vierzehntägiges Fortleben der Parasiten auf feuchtem Sand beobachtet haben. Das Misslingen einer echten Züchtung geben sie aber selbst zu.

Wieder andere Körperchen beschreibt Russel⁶⁾ als Carcinomparasiten unter dem Namen seiner „fuchsine bodies“. Mit einer bestimmten Färbemethode konnte er 4—12 μ grosse Gebilde roth färben, die einzeln oder in grösserer Zahl bald in Carcinomzellen, bald im Stroma lagen. Im Gegensatz zu den übrigen Autoren hält er seine Körperchen für Sprosspilze. Er fand sie in 43 Carcinomen regelmässig, während sie in anderen Geweben nur sehr selten vorkamen. Diese letztere Behauptung beruht auf einem Irrthum. Mit

1) De la contagion de cancer. Semaine médicale 1889. No. 29.

2) Sur des tumeurs épithéliales, contenant des psorospermies. Semaine médicale. 1889. No. 13.

3) Sur les nouvelles psorospermoses chez l'homme. Archiv. de médéc. expér. Vol. II. 1890.

4) Traité anatom.

5) Sur une nouvelle forme de psorospermose cutanée ou maladie de Paget. Soc. de biologie. 13 avril 1889.

6) An adress on a characteristic organism of cancer. British medical Journal 1890. No. 1563.

derselben Methode wie Russel konnte Klien¹⁾ in einer sehr fleissigen Arbeit die Fuchsinkörperchen ebenso häufig in anderen Geweben, wie in Carcinomen nachweisen. Klien bringt sie in Verbindung mit den Altmann'schen Zellgranulis. Jedenfalls sind sie aber weder Sporozoen, noch Sprosspilze, noch kommt ihnen eine specifische Bedeutung für das Carcinom zu.

Zu den überzeugten Anhängern von dem Vorkommen von Protozoen im Carcinom gehört auch Ramsay Wright.²⁾ In einer Arbeit über die Erkrankungen, in welchen Sporozoen eine Rolle spielen, berichtet er auch über Befunde von Mikroorganismen im Carcinom, die morphologisch und biologisch dasselbe Verhalten darboten, wie die Körperchen von Malassez, Thoma und Pfeiffer.

Gegenüber diesen positiven Befunden erhoben sich aber bald die Stimmen von Autoren, welche vor der Deutung der beschriebenen Befunde als Sporozoen warnten und diejenigen ernüchterten, welche sich schon zu überschwänglichen Hoffnungen über die Bedeutung dieser Untersuchungen für die Aetiologie des Carcinoms hatten hinreissen lassen. Die beschriebenen Gebilde wurden theilweise für Degenerationsformen von Zellen erklärt, theilweise für Zelleinschlüsse, deren Bedeutung für das Zellleben zwar noch nicht in allen Fällen klargelegt sei, die aber jedenfalls weder Sporozoen, noch irgend welche anderen Mikroorganismen seien. In vielen Fällen handele es sich um Trümmer von Leukocyten oder um abnorme und fragmentarische Kerntheilungen.

Als einer der Ersten wandte sich Eberth³⁾ gegen die Deutung der fraglichen Gebilde als Parasiten. Den in der bekannten Arbeit von Steinhaus über parasitäre Einschlüsse in den Pankreaszellen beschriebenen und als Protozoon gedeuteten „Karyophagus salamandrae“, der den Carcinomparasiten einiger Autoren absolut ähnlich ist, führte er auf das zurück, was er ist: auf Veränderungen des Zellkernes, bestehend in einer Verquellung und Verklumpung des Kerngerüsts. Eine solche findet sich schon normaler Weise an den thätigen Pankreaszellen. Im Hungerzustand verschwindet sie. Sie ist aber auch theilweise bedingt durch unzweckmässige Behandlung des Präparates, also ein Kunstproduct.

Ganz entschieden nimmt auch Ribbert⁴⁾ gegen die parasitäre

1) Ziegler's Beiträge zur pathologischen Anatomie. Bd. XI. Heft 1. 1881. Nr. 125.

2) The pathogenie Sporozoa. Toronto 1890.

3) Fortschritte der Medicin. 1890. Bd. VIII. S. 657.

4) Deutsche med. Wochenschr. 1891. Nr. 42.

Natur der Zelleinschlüsse in Epithelien Stellung. Er deutet die grösseren homogenen Körperchen, die Wickham und Darier beschreiben, als im Ganzen veränderte Epithelzellen, wie man sie in beginnenden Epithelperlen von Hornkrebsen der Haut nicht selten findet; dieselben waren schon vor der Beschreibung der neueren Autoren bekannt. Die kleineren deutet er als hervorgegangen durch Zerfall des Chromatins der Kerne. Auf diese Weise entstehen die von Sjöbring beschriebenen Sporocysten. In letzterer Beziehung befindet er sich in Uebereinstimmung mit Hansemann¹⁾, der diesen Gebilden gleichfalls ihre parasitäre Natur abspricht.

Auch nach Borrel²⁾ sind die Protozoen Wickham's und Darier's veränderte Epithelien. Sie sind das Product einer besonderen Zelldegeneration und Nekrobiose. Dieselbe Ansicht vertritt Firket.³⁾

Klebs⁴⁾ hat die Natur dieser Gebilde gleichfalls studirt. Er hält sie nicht für die gesuchten Carcinomparasiten, sondern für durch hyaline Degeneration veränderte Zellen. Er versuchte ihre Züchtung, indem er menschliches Carcinommaterial in die Bauchhöhle von Ratten implantirte, von dem Gedanken ausgehend, dass die menschlichen Zellen auf dem ungünstigen Nährboden zu Grunde gehen, etwaige Parasiten aber vielleicht zur Vermehrung zu bringen sein würden. Diese Vermehrung blieb aus. Nichts liess sich an den als Carcinomparasiten gedeuteten Körperchen auffinden, was als eine Weiterentwicklung derselben zu deuten gewesen wäre.

Shattock und Ballance⁵⁾ haben neben zahlreichen Cultur- und Impfversuchen, die oben berührt wurden, auch histologische Studien über das Carcinom und die Carcinomkörperchen vorgenommen. Sie theilen die Ansichten der letzterwähnten Forscher.

Andere Autoren wagen nicht, mit der Entschiedenheit der eben angeführten die Bedeutung der Zelleinschlüsse als Parasiten von der Hand zu weisen. Sie lassen die Frage unentschieden, mehr oder weniger nach der einen oder der andern Seite neigend. Zu ihnen

1) Virchow's Archiv. Bd. 123. S. 369.

2) Sur la signification des figures décrites comme coccioides dans les epitheliomes. Archiv de méd. expér. Vol. II. 1890.

3) Ueber eigenthümliche Veränderungen der Epidermis u. s. w. Centralblatt für allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie. 1890. Nr. 20.

4) Deutsche med. Wochenschr. 1890. Nr. 24, 25, 32.

5) A short record of work, done on the pathology of cancer during the last few years. British medical Journal. No. 1576. 1891.

gehören Siegenbeck von Heukeloom¹⁾, Ströbe²⁾ und Steinhäus.³⁾

Aus diesen so verschiedenartigen und so verschieden gedeuteten Befunden geht mit Sicherheit das Eine hervor, dass die Autoren ganz differente Dinge als die gesuchten Carcinomparasiten beschrieben und gedeutet haben. So lange aber nicht Einigkeit wenigstens in der Morphologie des Carcinomparasiten erzielt ist, können die histologischen Befunde als eine Stütze für die parasitäre Theorie des Carcinoms nicht angesehen werden. Die Frage nach der parasitären Natur des Carcinoms bleibt demnach zum mindesten eine offene.

Ich komme nuumehr zu meinen eigenen Untersuchungen über die Carcinomkörperchen.

II. Eigene Untersuchungen.

Die Zahl sämmtlicher Fälle von Carcinom, die ich untersucht habe, beträgt 74. Darunter befanden sich 22 Carcinome, die von der Haut und ihren Folliculargebilden ausgingen, 16 Mammacarcinome, 4 Magencarcinome, 7 Carcinome des Rectum, 3 Carcinome des Larynx, zahlreiche Carcinome in Lymphdrüsen u. s. w. Ausserdem habe ich 18 Fälle von Sarcom untersucht, und zur Controle 9 Fälle von gutartigen Tumoren der Haut, Papillome verschiedener Art, und 7 Fälle von Lupus, die ich auf das Vorkommen von „Carcinomkörperchen“ durchmusterte.

Ich habe schon vielfach Gelegenheit gehabt, im ersten Theile meiner Abhandlung auf die Ergebnisse meiner Untersuchungen Bezug zu nehmen. Es kann nicht in meiner Absicht liegen, sie alle einzeln aufzuführen. Ich gebe nur einen kurzen Auszug der bemerkenswerthesten Resultate, da sich die histologischen Befunde in den meisten Fällen immer wiederholen.

Meiner Abhandlung habe ich eine Anzahl mikrophotographischer Abbildungen beigegeben. Ich möchte dieselben für den wichtigeren Theil, den Text, nur als eine Erläuterung zu ihnen ansehen. Mit diesen Abbildungen weiche ich von dem herkömmlichen Verhalten ab, histologische Bilder durch Zeichnungen wiederzugeben, weil man gefunden hatte, dass die Photographie in Bezug auf histologische Einzelheiten doch gar zu unvollkommene Resultate gab. Ich verfolgte bei diesem Versuche zweierlei Zwecke: ich wollte die Photographie zum

1) Intracelluläre Gebilde im Carcinom. Centralblatt für pathologische Anatomie. 1890. Nr. 20.

2) l. c. Ziegler's Beiträge. Bd. XI. 1. 1891. S. 1.

3) Ueber Carcinomeinschlüsse. Virchow's Archiv. Bd. 126. 3. S. 533. 1891.

Zwecke der Darstellung histologischer Bilder einigermaassen rehabilitiren, und dann lag es mir daran, endlich einmal Bilder einzelner Befunde im Carcinom zu liefern, die absolut wahr sein müssen, und an denen sich nicht deuteln lässt. Wer die Literatur der letzten beiden Jahre über das Carcinom mit Interesse verfolgt hat, dem wird es wohl häufig so ergangen sein, wie mir. Ich fragte mich oft, nachdem ich eine Arbeit gelesen: Was beschreibt denn der Autor eigentlich als Parasiten? Bald glaubte ich gute alte Bekannte wiederzuerkennen, bald war ich der Ansicht, dass mir bei meinen Untersuchungen doch manches Wichtige entgangen sein musste. Zeichnungen können immer nur den Text ergänzen und erläutern. Sie sind bestimmt, das anschaulich zu machen, was der Autor beschreibt. Man mag sich Mühe geben, so objectiv wie nur möglich zu bleiben, bei jeder Zeichnung eines mikroskopischen Präparates wird der Wunsch nur zu oft der Vater des Gedankens, und es entsteht ein Bild, das an Deutlichkeit allerdings nichts zu wünschen übrig lässt, aber dem Bilde, welches das Mikroskop liefert, nicht mehr voll und ganz entspricht. Autor und Zeichner haben ihre subjective Meinung in das Bild hineingelegt, ohne nur im entferntesten die Absicht gehabt zu haben, irgendwie täuschen zu wollen.

In der Bacteriologie hat man diese Mängel längst erkannt, und dem Vorgange von Koch folgend, bedient man sich zur Vervielfältigung der Befunde fast durchgängig der Photographie als des einzig möglichen Weges, untrügliche Bilder zu erhalten, auf Grund deren etwaige Differenzen in der Deutung zur Discussion gestellt werden können.

Auf histologischem Gebiete haben diese anerkannten Vorzüge der Mikrophotographie sich bis jetzt nicht recht Geltung verschaffen können, weil die Schwierigkeiten, gute Photographien histologischer Bilder herzustellen, erheblich grösser sind, als bei der Herstellung von Bacterienphotogrammen. Man vergleiche nur die Photographien von Bacterienpräparaten und von Schnitten in dem anerkannten Atlas von Fränkel und Pfeiffer, und man wird von der Leistungsfähigkeit der Photographie in ersterer, ihrer Unvollkommenheit in letzterer Beziehung ohne Weiteres überzeugt.

Die Mängel der Photographie in der Wiedergabe histologischer Einzelheiten sind zweierlei Art: die einen liegen in der Methode und sind als solche unvermeidbar, die anderen im Präparat. Dieselben lassen sich bis zu einem gewissen Grade umgehen.

Die Photographie hat gegenüber dem gezeichneten Bilde mehrere grosse Nachtheile. Sie ist noch nicht im Stande, Farben wiederzugeben.

Wir machen aber durch die Färbung, die in vielen Fällen den Werth einer chemischen Reaction hat, häufig erst wichtige Einzelheiten sichtbar, die ungefärbt uns entgehen müssen. Dann ist die Photographie, ich möchte sagen, oft zu objectiv, so dass das Bild fehlerhaft wird. Sie giebt nur das wieder, was in der Ebene des beobachteten Sehfeldes liegt. Andere wichtige, höher oder tiefer gelegene Gegenstände werden nicht nur nicht abgebildet, sondern stören das Bild sogar dadurch, dass ihre Contouren in Form undeutlicher Zerstreuungskreise die Schärfe des Bildes beeinträchtigen. Bei der Beobachtung eines mikroskopischen Bildes und der Zeichnung desselben ergänzen wir dagegen unwillkürlich den von einer Ebene erhaltenen Eindruck durch Bilder aus anderen und combiniren so die verschiedenen Eindrücke zu einem harmonischen Ganzen.

Dieser letztere Uebelstand, ganz besonders aber das Erscheinen störender unschiefer Contouren und von Zerstreuungskreisen lässt sich dadurch vermeiden, dass wir möglichst dünne, sehr distinct gefärbte, absolut fehlerfreie Präparate herstellen, in denen das, was wir abbilden wollen, in Wahrheit nur in einer Ebene liegt. Gelingen uns derartige Präparate, dann werden wir auch erwarten können, dass sie sich zur Wiedergabe durch die Photographie eignen. Bei nicht diesen Anforderungen entsprechenden Präparaten soll man lieber auf den Versuch der Photographie verzichten.

Die Technik der Mikrophotographie ist nicht so schwierig, dass sie sich nicht mit einiger Uebung erlernen liesse. Zur Herstellung der Negative habe ich den grossen mikrophotographischen Apparat von Zeiss benutzt, der sich im Besitze des hiesigen pathologischen Institutes befindet, und der mir in dankenswerthester Weise von Herrn Prof. Birch-Hirschfeld zu diesem Zwecke überlassen wurde.

Um brauchbare Präparate von Geschwülsten zu bekommen, ist es unerlässlich, sich einer guten Methode der Fixirung zu bedienen. Die Stücke müssen noch lebenswarm in die Fixirflüssigkeit eingelegt werden. Am häufigsten habe ich die concentrirte Sublimatlösung benutzt, in welche noch während der Operation dünne Stücke der entfernten Geschwulst eingelegt und auf die Dauer von 2—6 Stunden belassen wurden. Darauf Auswaschen des Sublimats und Nachhärten in Alkohol. In derartigen Präparaten beeinträchtigen hin und wieder Ausfällungen von Quecksilber die Schönheit des histologischen Bildes. Zum Zwecke der Photographie müssen diese Niederschläge unbedingt entfernt werden. Dies gelingt am besten, wenn man die Stücke nach Abtödtung des Ueberschusses des Sublimat mit Lugol'scher Lösung

behandelt. Auch aus schon fertigen Schnitten kann auf diese Weise das Quecksilber noch entfernt werden. Die Färbbarkeit der Schnitte leidet dabei nicht.

Selbstverständlich habe ich auch alle übrigen modernen Fixierungsmittel in Anwendung gezogen, so vor Allem das Flemming'sche Gemisch, die Pikrinschwefelsäure mit verschiedenen Zusätzen, die Chromgemische, die Müller'sche Lösung und den absoluten Alkohol. Ich muss nach meinen Erfahrungen die Sublimatfixirung für die beste Methode halten, die auch von der Flemming'schen Lösung nicht übertroffen wird. Gefärbt wurde mit Hämatoxylin, Eosin, Safranin und Nigrosin. Vielfach habe ich auch die Gram-Weigert'sche Tinction für besondere Zwecke benutzt. Bei der Hämatoxylintinction, die mir immer noch zur distincten Kernfärbung die vollkommenste Methode scheint, ziehe ich eine ganz dünne Lösung, in welcher die Präparate einen bis zwei Tage bleiben, den schneller färbenden Delafield- und Böhmer'schen Gemischen vor.

Die angeblich specifischen Elemente, welche sich im Carcinom finden, und die ich der Kürze wegen als „Carcinomkörperchen“ bezeichnen will, fordern geradezu auf, eine bestimmte Färbemethode, die sie differenzirt, zu suchen. Ich habe mich dazu der von Russel angegebenen Methode bedient. Am vortheilhaftesten schien mir aber folgendes Verfahren: Vorfärben der Schnitte in dünner Hämatoxylinlösung, Färbung in erwärmtem Carbofuchsin 1—3 Minuten, Auswaschen mit Alkohol, dem eine Spur Salzsäure zugesetzt ist. In ähnlicher Weise hat Birch-Hirschfeld die Carcinomkörperchen mit Magdalaroth sichtbar gemacht. Wenn man die Differenzirung der stark roth gefärbten Schnitte nicht zu weit treibt, so erscheinen die von den Franzosen als Carcinomparasiten beschriebenen Gebilde leuchtend roth und heben sich scharf von den Kernen der Zellen ab, in welchen sie liegen. Geht man mit der Differenzirung zu weit, so verschwindet die rothe Farbe auch aus den Körperchen. Die als Sarcoden beschriebenen Protoplasmaklumpchen von Nils Sjöbring und Anderen können durch dieses Verfahren nicht differenzirt werden.

Dieses Färbeverfahren kann bei Weitem nicht den Werth einer chemischen Reaction im Sinne der differenzirenden Bacterienfärbung für die in Rede stehenden Gebilde beanspruchen. Sie macht die Körperchen aber doch sichtbar und giebt uns einige Fingerzeige über ihre Natur.

Ausser an Schnitten habe ich selbstverständlich auch am frischen, lebenden Präparat Zellen und Carcinomkörperchen untersucht. Ich

bediente mich zu diesem Zwecke am einfachsten des erwärmbaren Objectträgers von Pfeiffer.¹⁾

Zahlreich angestellte Cultur- und Impfversuche ergaben nichts Bemerkenswerthes. Ich übergehe sie deshalb.

1. Paget's Erkrankung der Brustwarze und die Protozoen von Wickham und Darier.

Im Jahre 1874 hat Sir James Paget²⁾ eine seltene Erkrankung der Brustwarze und der umgebenden Haut beschrieben, die nach ihm benannt wurde. Nach seiner Beschreibung befällt die Krankheit Frauen im Alter von 40—60 Jahren. Sie beginnt mit einer Affection der Brustwarze und des Warzenhofes. Der Warzenhof gewinnt ein lebhaft rothes Aussehen, die Hornschicht löst sich von der Unterlage, und das freiliegende Rete und die entblößten Cutispapillen sondern eine dünne, seröse Flüssigkeit ab. Das Krankheitsbild entspricht dem eines chronischen Ekzems, unterscheidet sich aber von demselben dadurch, dass es in seinen späteren Stadien unaufhaltsam in ein Carcinom übergeht. Die Krankheit dauert Jahre lang, ohne zu einer Infection der Lymphdrüsen zu führen. Sie kommt an einzelnen Stellen zur Heilung, während sie an anderen fortschreitet, und setzt jedem Versuch, sie auf anderem als operativem Wege zu heilen, den grössten Widerstand entgegen. Der Versuch Paget's, diese Erkrankung der Haut der Brustwarze als eine wohlcharakterisirte, eigenartige Krankheit hinzustellen, die ebenso vom chronischen Ekzem, wie vom Carcinom verschieden ist, ist von einigen Dermatologen nicht anerkannt worden. Kaposi rechnet sie z. B. in seinem bekannten Lehrbuche zu den Ekzemen.

Mit neuen Gründen für die Ansicht Paget's trat Wickham³⁾ auf, der diese eigenthümliche Krankheit zum Gegenstand einer ausführlichen Monographie machte. Im Anschlusse an 15 Fälle fremder und 6 Fälle eigener Beobachtung beschreibt er auf das eingehendste ihre Aetiologie und Symptomatologie. Sie ist nach ihm eine ausgesprochene parasitäre Erkrankung, die meist die Haut der Brust befällt, aber auch an anderen Körperstellen vorkommen kann. So berichtet er über einen Fall von Paget's Disease am Scrotum eines 60jährigen Mannes. Die Erreger der Krankheit sind Mikroorganismen, die zur Gattung der Sporozoen gehören. Er bezeichnet die Krankheit deswegen als psorospermose cutanée. Die Parasiten

1) l. c. p. 5.

2) St. Bartholemews Hospital reports 1874.

3) Maladie de la peau, dite maladie de Paget. Paris 1890.

dringen in die Epithelien ein, wachsen auf deren Kosten und segmentiren sich in eine Anzahl Sporen, eine Sporocyste bildend. Die Mikroorganismen sind überaus zahlreich. Sie finden sich im Rete Malpighi, wo sie, in einem hellen Hofe liegend, sich von den Epithelien deutlich unterscheiden, und häufig auch zwischen den Hornschüppchen, mit denen sie von der Oberfläche abgestossen werden oder zu Krusten zusammenbacken, welche der wunden Epidermis aufgelagert sind. Zu den Carcinomen rechnet Wickham die Krankheit nicht. Es schliesst sich aber sehr leicht Carcinom der Mamma an sie an.

Unsere Beobachtung ist folgende:

Frau M. P., 54 Jahre alt, verheirathet, ist seit 8 Jahren krank an einer „nässenden Flechte“ der Brust, die ihren Ausgang von der Brustwarze nahm und allmählich bis zur jetzigen Grösse heranwuchs. Alle Behandlung war erfolglos. Hin und wieder hat die Kranke lebhafte Schmerzen in der Brust gehabt. März 1890 Aufnahme ins Krankenhaus behufs Amputatio mammae.

Stat. praes. Kräftige Frau mit gesunden inneren Organen. Die Haut der linken Brust ist in eine lebhaft rothe, stark nässende und leicht blutende, stellenweise mit Krusten bedeckte und etwas unebene Fläche verwandelt, in deren Centrum die eingezogene Brustwarze kenntlich ist. Die Ränder der erkrankten Haut setzen sich besonders durch das Fehlen einer zusammenhängenden Hornschicht scharf gegen die gesunde ab. Sie sind gleichmässig, nicht erhaben und fühlen sich weich an, nicht infiltrirt, wie bei dem Carcinom der Haut. An einzelnen Stellen ist die wunde Fläche durch kleine Inseln unterbrochen, in denen eine zarte Hornschicht das geröthete und nässende Rete bedeckt. Die Lymphdrüsen der Achselhöhle sind nicht geschwollen.

Amputation der ganzen Brustdrüse am 8. April 1890. Der Schnitt wird im Gesunden, überall mindestens 1 Cm. von der erkrankten Fläche entfernt, geführt. Hauttransplantation nach Thiersch auf den freiliegenden Musculus pectoralis major. Glatte Heilung. Ende März 1891 lässt sich die Kranke wegen eines Recidives wieder aufnehmen. Sie ist bis zum Auftreten desselben vor einigen Wochen frei von Beschwerden gewesen.

Es findet sich eine thalergrosse, nässende Stelle mit allen Eigenschaften der früheren Erkrankung, welche an der Aussenseite des durch die erste Operation gesetzten Defectes die Brusthaut, aber auch die transplantirte neue Haut ergriffen hat.

9. April 1891 zweite Operation. Excision des Erkrankten in der gesunden Umgebung. Hauttransplantation, gute Heilung. Die Lymphdrüsen der Achselhöhle sind auch jetzt noch frei.

Mikroskopische Untersuchung. Die besten Präparate lieferten die in Sublimat fixirten Stückchen. Von ihnen sind die Photogramme, Fig. 7—10 (Taf. III u. IV), gewonnen.

Figur 7 ist die Abbildung eines Präparates von der Grenze des

Gesunden und Kranken. Sie zeigt die charakteristischen Anfänge der Erkrankung. Das Epithel ist von normaler Dicke und lässt die einzelnen Schichten gut erkennen, die basalen Cylinderzellen, die Zellen des Rete, die sich nach oben abplatten, und die verdünnte Hornschicht. Ein Theil der Hornschicht ist in Form einer Lamelle von der Unterlage abgehoben. Die Cutispapillen zeigen keine Veränderungen. Die Cutis selbst ist leicht zellig infiltrirt. Sehr auffallend ist das Auftreten eigenthümlich veränderter Zellen im Epithel (d). In unregelmässigen Zwischenräumen treten da und dort Zellen auf, die etwas grösser als die benachbarten sind, aufgequollen erscheinen und von einem hellen Hof umgeben sind. Dieser helle Hof entspricht dem Zellkörper. Das Protoplasma desselben ist aufgehellte und zeigt eine ganz feine Granulirung, welche bei Färbung mit Eosin einen zarten rosa Ton angenommen hat. Ein Stachelsaum ist nicht kenntlich. Die Grösse dieser Zellen beträgt bis zu 18μ . Ihre Kerne sind ebenfalls grösser (bis 10μ), als die der normalen Retezellen, unterscheiden sich aber von letzteren auch durch ihre innere Structur. Während der Kern der Epithelzellen bläschenförmig ist und ein dunkel gefärbtes Kernkörperchen, aber kaum ein Kerngerüst enthält, sind die Kerne der hellen Zellen um vieles dunkler gefärbt und besitzen ein dickfädiges Chromatingerüst. Sie machen den Eindruck, als wenn sie sich sämmtlich im ersten Stadium der Karyokinese, der Knäuelbildung, befänden. Jedenfalls gehören sie zu den hyperchromatischen Kernen, die Klebs im Carcinom beschrieben hat.

Figur 8 (Taf. III) zeigt die Erkrankung des Epithels in einem weiter vorgeschrittenen Stadium. Sie entspricht einer Stelle aus dem Centrum des erkrankten Haut. Die in Figur 7 noch vereinzelter Zellen bilden hier ein zusammenhängendes Ganze, welches die unteren Schichten des Rete einnimmt. Der normale Bau des Epithels ist verwischt und die basale Cylinderzellenschicht geschwunden. An ihrer Stelle findet man ein buntes Durcheinander von Zellen, deren Protoplasma aufgehellte ist, während die Zellkerne sehr deutlich hervortreten. Deutliche Zellgrenzen gegen einander sind nicht sichtbar. Die Kerne sind vergrössert und durch Hämatoxylin dunkel gefärbt. Vielfach treten an ihnen Mitosen auf, ein Zeichen, dass die Lebensenergie dieser Zellen erhöht ist, und dass sie sich in lebhafter Vermehrung befinden (Fig. 10, Taf. IV). An dem Vorgang der Kerntheilung selbst habe ich eine Abweichung von dem normalen Typus nicht wahrnehmen können.

Neben diesen Veränderungen an den Zellen des Epithels finden sich im Epithel freie Kerne und Trümmer solcher, die als Fragmente

weisser Blutkörperchen ohne Weiteres kenntlich sind. Ausserdem sieht man aber auch an Präparaten, die mit Carbofuchsin gefärbt sind, auf der Grenze von Cutis und Epithel und seltener in der ganzen Cutis Zellen, die spindelförmig oder verästelt sind, und deren Protoplasma eine feine Körnelung zeigt, die tiefroth gefärbt ist. Sie sind identisch mit den oben beschriebenen, in das Epithel einwandernden Zellen bei Geschwülsten, von denen Figur 2 (Taf. I) eine Abbildung giebt.

Die Cutis ist in diesen Stadien der Erkrankung ausserordentlich reichlich zellig infiltrirt, und zwar können wir an den sie durchsetzenden Zellen auch auf dem Photogramm sehr deutlich zwei Formen unterscheiden: die dunkel gefärbten, oft mehrkernigen Leukocyten, und bläschenförmige Kerne enthaltende epitheloide Zellen, die hervorgegangen sind aus einer Wucherung von Endothelien und fixen Bindegewebskörperchen. Die Cutispapillen selbst erscheinen aufgequollen und vergrössert.

In den bisher besprochenen Präparaten ist die Grenze zwischen Epithel und Bindegewebe noch nirgends durchbrochen, wenn auch die Veränderungen an den Epithelien selbst sehr ausgesprochen sind, ihre Anordnung regellos ist und sich eine sehr lebhaft Theilung an ihnen nachweisen liess. An anderen Stellen ist es aber zu einem Durchbruch des wuchernden Epithels gekommen. Figur 9 (Taf. IV) giebt eine solche Stelle wieder. Von dem verdünnten Epithel, welches die Oberfläche überzieht, und an dem die Hornschicht fehlt, ist ein Zapfen tief in die Cutis hineingetrieben. Derselbe besteht aus den wuchernden Zellen, deren Verhalten soeben geschildert wurde. Bei b zeigt dieser Zapfen eine Einschnürung. Durch Serienschnitte liess sich nachweisen, dass die Abschnürung an anderen Stellen eine vollkommene wurde. Es war somit ein regelrechter Alveolus mitten im Bindegewebe entstanden. Damit hat die Zellwucherung den ausgesprochenen histologischen Charakter des Epithelcarcinoms angenommen. An der Brustdrüse selbst, sowie an den Ausführungsgängen derselben, an denen häufiger von den Autoren das Auftreten secundären Carcinoms beschrieben ist, konnte etwas Abnormes nicht gefunden werden. Die atrophischen Acini der Mamma liegen in reichlich entwickeltem, derben Bindegewebe, keine Andeutung einer Wucherung zeigend.

Das exstirpirte Recidiv zeigt genau dieselbe histologische Beschaffenheit. Auch hier ist die Erkrankung ganz auf die Oberfläche beschränkt, ein Einbruch der Epithelien in die Tiefe selten, aber doch auch an einzelnen Stellen erfolgt.

Sowohl in Schnitten, als auch durch das Culturverfahren liessen sich im Gewebe, besonders in den oberen Schichten, nicht eben selten Bakterien nachweisen. Unter ihnen waren am häufigsten Staphylokokken und kleine Stäbchen. Ein solcher Befund kann uns bei einer grossen Wunde, des normalen Epithels theilweise völlig beraubten und secernirenden Fläche nicht Wunder nehmen. Die Bakterienansiedelungen sind secundärer Natur, mit der Aetiologie der Krankheit haben sie selbstverständlich nichts zu thun. Vielleicht kommt ihnen aber eine gewisse Bedeutung für die lebhaft entzündliche Infiltration der Cutis zu.

Epikrise. Wenn wir die verschiedenen Stadien der Veränderungen des Epithels, wie sie bei Paget's Disease vorliegen, neben einander halten, und wenn wir die Photogramme Nr. 7–10, welche diese verschiedenen, aber in einander übergehenden Stadien wiedergeben, unbefangen vergleichen, so kann, so viel ich sehe, über die Natur der Erkrankung ein Zweifel nicht möglich sein. Paget's Erkrankung der Haut der Brust ist ebensowenig ein hartnäckiges chronisches Ekzem der Mamma, wie eine besondere Krankheit. Es handelt sich um ein Carcinom und zwar um die oberflächlichste oder flachste Form des Carcinoms, die möglich ist. Am nächsten steht ihm das klinisch und pathologisch-anatomisch verwandte Ulcus rodens der Haut, bei dem aber auch in den langsamst verlaufenden Fällen eine viel weiter gehende und tiefer greifende Infiltration des Bindegewebes mit Krebszellen erfolgt, als hier.

Unsere Bilder geben uns Aufschluss darüber, wie ein oberflächliches Carcinom im Epithel, und zwar im völlig normalen Epithel, wo von verirrten Keimen keine Rede sein kann, beginnt. Von dem im Bindegewebe liegenden abgesprengten Krebszellennest (Fig. 9, Taf. IV) an bis zu den einzelnen, im Rete Malpighi liegenden veränderten Epithelzellen finden sich alle Uebergänge, die uns nicht im Zweifel lassen können, dass diese Bilder ein zusammenhängendes Ganze darstellen. Die Veränderungen im Epithel, wie sie Figur 7 (Taf. III) wiedergibt, und die sich in so auffälliger Weise bemerkbar machen, müssen demnach schon krebsiger Natur sein, auch wo sie zu einem Einbruche in die Cutis noch lange nicht führen. Die einzelnen Zellen im Epithel mit dem dunklen Kern und dem hellen Protoplasmahof sind die ersten Carcinomzellen, und ihr regelloses, aber noch auf das Epithel beschränktes Wachsthum ist atypisch im Sinne der Carcinomlehre. Es ist das erste Zeichen der beginnenden Carcinomwucherung im Epithel. Diese Wucherung kann, nach unserer Beobachtung, lange Zeit, an vielen Stellen dauernd, auf das Epithel beschränkt bleiben.

Es giebt also einen Epithelkrebs der Haut, der sich nur in der Epidermis abspielt, bei dem ein Einbruch in das Bindegewebe überhaupt nicht oder nur an wenigen Punkten erfolgt.

Was bei Paget's Disease den Einbruch der wuchernden Epithelien in das Bindegewebe erschwert und die Epithelerkrankung so lange auf sich selbst beschränkt, ist schwer zu sagen. Vielleicht spielt dabei die ausgedehnte kleinzellige Infiltration der Cutis eine Rolle, durch welche die Lymphspalten der Haut, die natürlichen Verbreitungswege des Carcinoms, verlegt werden müssen. Unsere Carcinomzellen sind ferner identisch mit den Gebilden, die Wickham und Darier als Protozoen bei Paget's Disease beschreiben. Ein Vergleich unserer Photogramme mit den Abbildungen, welche Wickham giebt (Fig. 10 u. 2 auf Taf. III der erwähnten Monographie), muss jeden Zweifel beseitigen. Wickham deutet als Parasiten die dunkel gefärbten Kerne unserer Zellen. Der helle Hof, von dem er seine Parasiten umgeben sein lässt, entspricht dem lichten Protoplasma. Durch das auffallende Aussehen dieser Zellen und vielleicht auch getäuscht durch unzuweckmässige Behandlung des frischen Präparates, hat er sich veranlasst gesehen, sie für etwas Fremdartiges zu halten. Ihr ganzes morphologisches und biologisches Verhalten, die Uebergänge zu den unveränderten Retezellen und ihre Kernteilungen schliessen jeden Zweifel über ihre Natur als Epithelien aus und beweisen das Irrige der Ansicht Wickham's.

Ausser diesen Kernen beschreibt Wickham aber auch noch andere Gebilde als Parasiten, denen die Eigenschaft ausgebildeter Zellen mit Zellkörper und Kern zukommt, ferner solche, die, in Segmentirung begriffen, zur Bildung von Sporocysten geführt haben. In unserem Falle von Paget's Disease konnte ich analoge Gebilde nicht auffinden. Dagegen hatte ich reichlich Gelegenheit, sie in ausgesprochenen Carcinomen, die vom Rete Malpighi ausgingen, zu sehen.

2. Wickham und Darier's Carcinomkörperchen in Carcinomen und anderen Erkrankungen.

Von den vielen Fällen, in welchen diese Körperchen aufgefunden werden konnten, wähle ich zur eingehenderen Besprechung zwei aus, in denen sie besonders zahlreich und charakteristisch auftraten. Von ihnen stammen die Präparate, welche Figur 11, 12 u. 13 (Taf. V) zur Unterlage gedient haben.

I. H. W., 60jähriger Handarbeiter, ist seit einem Jahre erkrankt mit einer Geschwulst an der linken Ohrmuschel, die in der letzten Zeit sich schnell vergrösserte und mehrfach wund wurde.

Die linke, unförmlich gewordene Ohrmuschel ist durchsetzt von einem apfelgrossen, mehrfach ulcerirten Tumor. Einige Lymphdrüsen am Kieferwinkel sind geschwollen.

Operation am 24. Juli 1890. Entfernung der Ohrmuschel und der erkrankten Drüsen. Glatte Heilung. Von der noch lebenswarmen Geschwulst wurden Stückchen in Sublimat, Alkohol und Flemming'scher Lösung fixirt.

Mikroskopische Untersuchung. Das exstirpirte Carcinom erweist sich als ein vom Rete ausgehender, sehr ausgesprochener Hornkrebs. Das Centrum der meisten grösseren Alveolen wird von gut entwickelten Epithelperlen eingenommen. In denselben finden sich neben concentrisch geschichteten Hornmassen Trümmer von Epithelien und eingewanderten Leukocyten mit theils zusammengedrückten, theils conglutinirten Kernen und Chromatinschollen. Die Ränder der Krebsalveole werden von lebenskräftigen, jugendlichen Zellen eingenommen, an denen hin und wieder Mitosen sichtbar sind. Nach dem Centrum der Alveolen nehmen die Epithelien mehr und mehr den Charakter von Platten an mit zum Theil sehr ausgesprochenen Riffen. Neben diesen gut charakterisirten Epithelzellen finden sich regellos über den Alveolus zerstreut andere, wesentlich verschiedene Zellen. Dieselben sind $10-12\ \mu$ gross, oval, haben scharfe glatte Contouren, ein ganz gleichmässiges Protoplasma und meist eine mehr oder weniger deutliche Kernfigur, die sich mit Hämatoxylin dunkel gefärbt hat. Eine feinere Structur lassen diese Kerne nicht mehr erkennen. Sie sind im Gegentheil klumpig. Häufig sind diese Gebilde von hellen Räumen umgeben und liegen in Zellen, oder erregen wenigstens einen solchen Anschein. Die Kerne der Zelle, in denen sie liegen, sind plattgedrückt und zur Seite geschoben, aber als Zellkerne noch gut charakterisirt. In Figur 11 (Taf. V) sind zwei solcher neben einander und anscheinend in Zellen liegender Körperchen wiedergegeben. Oft findet man eine Anzahl solcher Gebilde, bis zu 10 zusammenliegend. Sie werden dann häufig von einer Hülle umgeben, und man könnte geneigt sein, sie als durch Segmentirung einer Mutterzelle entstanden anzusehen. In Figur 12 (Taf. I) ist dieses Verhalten abgebildet. Am Rande eines Krebsalveolus liegt ein solcher Haufen der beschriebenen Gebilde, die sich von den jugendlichen Epithelien und den Epithelplatten, die mehr im Centrum des Alveolus liegen, deutlich unterscheiden. Behandelt man die mit Hämatoxylin vorgefärbten Schnitte in der oben beschriebenen Weise mit Carbofuchsin, so nehmen die Körperchen einen leuchtend rothen Ton an und heben sich scharf von den blau gefärbten Zellkernen ab. Betrachtet man ein Präparat ungefärbt

oder frisch, so zeigen die Körperchen einen starken Glanz, ähnlich dem von Schollen in hyaliner Degeneration. Bewegungserscheinungen konnte ich bei der Untersuchung auf dem erwärmten Objectträger nicht wahrnehmen.

Dem Vorgange von Klebs¹⁾ folgend, habe ich einige Male derartiges Körperchen enthaltendes Carcinommateriel in die Bauchhöhle von Hunden gebracht. Auch ich konnte nie etwas beobachten, was als eine Weiterentwicklung der Körperchen hätte gedeutet werden können. Sie zerfielen wie die übrigen Krebszellen und wurden resorbirt.

2. E. K., 57 jähriger Ziegelarbeiter, ist seit Weihnachten 1890 erkrankt mit Heiserkeit und Schmerzen beim Schlucken. Seit März 1891 gesellt sich dazu Husten mit schleimig eitrigem Auswurf. Aufnahme am 2. Juli 1891. Es findet sich ein Carcinom, welches die linke Seite des Kehlkopfs ergriffen hat, und von hier auf Larynx und Pharynx übergegangen ist. Auf der linken Seite des Halses vor und hinter dem Kopfnicker einige bohnen-grosse harte Lymphdrüsen.

4. Juli vorbereitende Tracheotomie, nach welcher der Kranke eine schwere putride Bronchitis durchzumachen hat. Am 27. Juli Exstirpation des Larynx, eines Theils des Pharynx und der geschwollenen Lymphdrüsen. Der Kranke übersteht den schweren Eingriff und erholt sich. 9. December. Einige, neuerdings geschwollene Lymphdrüsen unter dem linken Kopfnicker werden extirpirt. Dieselben sind in die Gefässscheide eingebrochen. Darnach Blutungen. 16. December. Unterbindung der linken Carotis interna, die durch das Carcinom arrodirt ist. 20. December. Tod an Hirnerweichung. Bei der Section findet sich noch ein zweites Carcinom im mittleren Theile des Oesophagus, entfernt von der Narbe.

Mikroskopische Untersuchung. Das primäre Larynxcarcinom ist ein Hornkrebs, ausgehend von dem Epithel des Kehlkopfs. Es finden sich in ihm zahlreiche Epithelperlen mit verhornendem Centrum. Die geschwollenen Lymphdrüsen lassen auf dem Querschnitt Krebs-saft mit dem Messer abstreichen. Einzelne derselben sind central erweicht. In den einzelnen Carcinomalveolen finden sich in ähnlicher Weise, wie so eben beschrieben, auffallende Körperchen. Eine sehr charakteristische Stelle habe ich in Figur 13 wiedergegeben. Die Ränder des Alveolus enthalten jugendliche, polymorphe Carcinomzellen (c), deren Kern sich mit Hämatoxylin tief gefärbt hat. In der Mitte dieser Zellen und sich scharf von ihnen absetzend liegt ein Häufchen von Plattenepithelien mit noch deutlichen Kernen. Die Platten sind um das Vielfache grösser, als

1) l. c. Vgl. oben S. 158.

die Randzellen des Alveolus. Wieder scharf unterschieden von diesen Platten liegt zwischen ihnen eine runde Zelle (e), die mit Eosin eine dunklere Färbung angenommen hat. In derselben ist in Umrissen der Kern sichtbar, der seinerseits vier dunklere Punkte erkennen lässt, die wohl als Kernkörperchen aufzufassen sind. Die beschriebene Zelle liegt in einem Hohlraum. Wenn im vorhergehenden Fall die Vermuthung nicht unbegründet war, dass der Hohlraum ein Kunstproduct, entstanden durch Schrumpfung infolge der Alkoholhärtung sei, so ist diese Annahme hier nicht zulässig. Das Präparat wurde in Sublimat fixirt. Der Hohlraum wird also auch im lebenden Zustande vorhanden gewesen sein. Von dem Körperchen geht zur Wand des Hohlraumes ein feiner Faden, ähnlich wie dies Wickham von seinen „Protozoen“ beschrieben hat. Durch dieses Verhalten wird die Aehnlichkeit, welche das Gebilde mit der in Figur 3 abgebildeten Klossia hat, noch erhöht. Die Kerne der zunächst liegenden Plattenepithelien sind zur Seite gedrückt.

Epikrise. Gegen die Deutung dieser Körperchen als Parasiten lassen sich gewichtige Gründe anführen.

Mit den oben beschriebenen Protozoen, von denen ich in Figur 3, 4 und 5 (Taf. II) Abbildungen gegeben habe, haben sie allerdings in Form und Lage eine gewisse Aehnlichkeit. Sie liegen, nach Figur 11 (Taf. V) zu urtheilen, in Zellen. Ich möchte aber doch darauf aufmerksam machen, dass ein solches Aussehen nicht unbedingt beweiskräftig für ihre intracelluläre Lage ist. Die Körperchen können entweder in das Protoplasma einer anderen Zelle eingestülpt sein, oder es lagern sich um ein solches andere Zellen concentrisch in mehr oder weniger dicken Schichten, den Anfang einer der bekannten Epithelperlen in Hautkrebsen bildend. Bleibt nun einmal die weitere Ausbildung der concentrischen Schichtung aus, wie das bei dem regellosen Wachsthum eines Carcinoms nicht Wunder nehmen kann, so entstehen Bilder wie die dargestellten. Der helle Raum, in welchem die Körperchen liegen, ist im ersten Falle ein Kunstproduct, entstanden durch Schrumpfung infolge der angewandten Fixirung und Härtung mit Alkohol. In Figur 16 (Taf. VII) fehlt dieser helle Raum. Dieses Präparat wurde durch Sublimatfixirung gewonnen. Das Ganze erscheint hier viel deutlicher als das, was es ist, als eine beginnende Epithelperle. Dieselbe Anschauung über diese Befunde, wie die hier auseinandergesetzte, vertritt auch Ribbert (l. c.).

Die erwähnte Aehnlichkeit mit den echten Protozoen ist ferner, wie ich glaube, nur eine rein äusserliche. Zunächst fehlt Alles, was sich nur mit einiger Sicherheit als Segmentirung und Sporocysten-

bildung deuten liesse. Dann sind die echten Protozoen, wie aus den Abbildungen ersichtlich ist, lebenskräftige Zellen mit allen Eigenschaften solcher. Sie haben einen deutlichen, bläschenförmigen und gut differenzirten Kern und ein gekörntes Protoplasma, das im Leben in lebhafter Bewegung ist. Das Carcinomkörperchen erscheint dagegen keineswegs mit der höheren Lebensenergie ausgestattet, die wir von dem hypothetischen Carcinomparasiten erwarten müssten. Sein Protoplasma entspricht einer Scholle von dem Aussehen des Hyalins Recklinghausens, und sein Kern ist ein meist undifferenzirtes, vom Zellkörper nur wenig sich abhebendes Chromatinklumpchen. Allerdings wäre es möglich, dass die abgebildeten Formen ein vorgeschrittenes Stadium des Parasiten darstellten, und dass die jugendkräftigen, infectionstüchtigen Keimlinge ganz anders geartete Sarcodetklumpchen wären. Derartige Gebilde, die ich mit irgend welcher Sicherheit als Keimlinge der Sporozoen, analog dem Malaria-Parasiten, hätte deuten können, war ich bei meinen Untersuchungen nicht im Stande aufzufinden. Jedenfalls fehlten sie aber sicher bei Hautkrebsen und gerade in den beschriebenen Fällen. Ausnahmslos fand sich, dass die Jugendform des Carcinomkörperchens die jugendliche Epithelzelle sein muss, von der sich alle Uebergänge bis zu den ausgebildeten Körperchen feststellen liessen.

Für die Anschauung, dass die beschriebenen Gebilde aus den Epithelien hervorgehen und nichts Anderes sind, als eigenthümliche degenerirte Formen derselben, spricht auch ihr Verhalten gegen Färbemittel, wenn ich dasselbe auch nicht als einen Beweis dafür ansehen möchte. Wie Prokeratin und Eleidin in den normalen Epidermiszellen durch Carbolfuchsin roth gefärbt werden, so auch die Carcinomkörperchen. Es scheint also, dass eine gewisse chemische Verwandtschaft zwischen den Stoffen, welche das letztere zusammensetzen, und den Vorstufen der Verhornung besteht.

Wer trotz dieser Gründe die Wickham-Darier'schen Körperchen immer noch für Parasiten halten möchte, denen eine Bedeutung für die Aetiologie des Krebses zukommt, der müsste wenigstens eine unerlässliche Forderung beweisen. Die Körperchen müssten in allen Fällen von Carcinom nachzuweisen sein. Auf der anderen Seite müsste ihr Vorkommen aber auch nur auf das Carcinom beschränkt bleiben. Beides ist nicht richtig, wie ich mich durch eine grössere Reihe von Untersuchungen überzeugen konnte. Die Körperchen finden sich nur in Carcinomen, die von der Haut ausgehen, in allen Drüsenkrebsen fehlen sie wenigstens in der von Wickham geschilderten Form. Sie könnten also höchstens für Hautcarcinome charakteristisch sein. Sie

kommen aber auch vor in Erkrankungen der Haut und Neubildungen nichtkrebsiger Natur. So fehlten sie nicht in drei Fällen von Hauttuberculose, die ich darauf untersuchte, während sie in zahlreichen anderen allerdings nicht nachzuweisen waren. Es scheint ihr Befund von etwaigen Unregelmässigkeiten im Verhalten des Epithels bei der Hauttuberculose abhängig zu sein. Besonders häufig waren sie in einem Falle von Lupus verrucosus — derselbe ist in Figur 20 (Taf. VIII) abgebildet —, in dem es auch zur Bildung ausgesprochener Epithelperlen gekommen war, ohne dass man aber durch den klinischen Verlauf berechtigt worden wäre, von einem hier vorliegenden Carcinom auf Lupus zu sprechen. Sie kamen ferner vor in dem gewucherten Epithel, das ein Melanosarcom an den Rändern überzog — vgl. Figur 21 (Taf. IX) —, und hier und da auch in der gewöhnlichen Hautwarze, in dieser allerdings nicht häufig.

Fassen wir noch einmal kurz das Ergebniss unserer Untersuchungen über die Wickham-Darier'schen Parasiten zusammen.

Bei Paget's Erkrankung erweisen sich die als Parasiten beschriebenen Gebilde als jugendliche Epithelien, die im Sinne einer progressiven Metamorphose verändert sind, und die sich infolgedessen von den anderen Zellen erheblich unterscheiden. In Hautcarcinomen sind sie zwar nicht mit derselben Sicherheit, aber höchst wahrscheinlich als im Sinne einer regressiven Metamorphose veränderte Epithelzellen zu deuten.

3. Russel's Körperchen, Sporocysten und Sarcodiformen im Carcinom nach Nils Sjöbring u. A.

Figur 17 (Taf. I). Fuchsin bodies nach Russel aus einem Sarcom.

Das Präparat stammt von einem Oberkiefersarcom eines 51jährigen Mannes, der am 28. November 1891 operirt wurde. Mikroskopisch erwiesen sich die Zellen des Sarcoms ausserordentlich polymorph. Neben Rund- und Spindelzellen finden sich auch mehrkernige Riesenzellen, die aber bei weitem kleiner sind, als die eines echten Riesenzellensarcoms. Härtung in Sublimat und Alkohol. Färbung nach der Methode von Russel. Zur Abbildung habe ich eine Stelle ausgesucht, in der sich eine der grösseren Zellen findet, welche im Protoplasma roth gefärbte Körner enthält, während der Kern sich in Theilung befindet. Diese Körner haben die Grösse von 1—5 μ . Sie sind rund und homogen. Sie bilden den Körper einer, wie die Kerntheilung lehrt, lebenskräftigen und in Vermehrung begriffenen Zelle. Nichts berechtigt uns, sie als Sprosspilze, wie Russel will,

anzusehen. Mit Klien und Altmann halte ich sie für Zellgranula, die auffallend gross sind.

Die Russel'schen Körperchen konnte ich mehrfach auch bei Tuberculose auffinden. Figur 18 (Taf. VII) zeigt sie bei Tuberculose der Zunge. Ausser in Riesenzellen der sehr distincten Tuberkelknötchen fanden sich im Bindegewebe vereinzelte Zellen, welche mit Fuchsin leuchtend roth gefärbte Körner enthielten, deren Grösse 3—8 μ betrug. Der Zellkern kann durch diese Körner verdeckt werden, unterscheidet sich aber im Präparat deutlich durch seine Contrastfarbe.

Figur 14 (Taf. VI) anscheinende Sporocystenbildung in einem Carcinom.

In einem Carcinom mit ausgesprochenem papillären Bau — daselbe ist in Figur 22 bei schwacher Vergrösserung wiedergegeben — fanden sich mehrfach Bilder, wie das beigegebene Photogramm.

Am Rande eines Krebsalveolus, der aus grossen Riffzellen und Epithelplatten zusammengesetzt ist, liegt eine Anhäufung von Körnern, die 2—3 μ gross sind und bei Hämatoxylintinction eine gleichmässig dunkle Farbe angenommen haben. Ich halte diese Körnchen für eine Ansammlung von Leukocyten resp. Trümmern solcher, die in das Carcinom eingewandert sind. Dadurch, dass sich Epithelien concentrisch um sie geschichtet haben, erscheint sie mit einer Art Kapsel umgeben. Neben den kleineren Herden findet man in dem Präparat auch grössere derartige Ansammlungen von Leukocyten, die als solche unverkennbar sind. Sie bilden neben abgestossenen Epithelien das Centrum der Epithelzapfen. Von den kleineren zu den grösseren finden sich alle Uebergänge.

Zwischen den Epithelien treten nicht selten auch vereinzelte, zerstreut liegende Leukocyten und Leukocytenkörner auf.

Figur 15 (Taf. VI) giebt das Innere eines Alveolus eines Carcinoms wieder, das vom Rete stammt. Das Präparat giebt ein deutliches Bild von der Mannigfaltigkeit der Zellformen, die sich in einem solchen Alveolus finden können. Während sich am Rande des Präparates noch deutlich ausgesprochene Riffzellen erkennen lassen, sehen wir im Innern neben grossen, ganz homogenen Schollen alle möglichen veränderten Epithelien und Leukocyten. Man kann aus ihnen leicht alle Formen der beschriebenen „Carcinommikroorganismen“ herausfinden.

Von den Sarcodiformen Sjöbring's und den siehel- und naviellenförmigen Körperchen, die Ströbe und Steinhaus im Kern von Carcinomzellen beschrieben haben, kann ich Photogramme nicht

geben, da mir bis jetzt brauchbare noch nicht gelungen sind. Ich behalte mir vor, meine Arbeit späterhin durch einige entsprechende Abbildungen zu ergänzen.

Wenn auch die Natur dieser Gebilde noch nicht ganz aufgeklärt ist, so kann ich doch auch in ihnen keine für das Carcinom charakteristischen parasitären Mikroorganismen sehen. Ich bin geneigt, sie mit Ribbert für Abkömmlinge des Chromatins der Epithelzellen, in anderen Fällen für Trümmer in Zellen eingeschlossener Leucocyten zu halten. Jedenfalls bleibt die Frage nach ihrer Natur zunächst noch offen.

III. Einige klinische Beobachtungen.

Es lag in meiner Absicht, das grosse Material von Carcinomen, welches die hiesige chirurgische Klinik bietet, wenigstens über einige Jahre statistisch zu sichten. Dieser Versuch stiess aber auf unüberwindliche Schwierigkeiten. Es war in der mir zu Gebote stehenden Zeit nicht möglich, über sämtliche Kranke eines gewissen Zeitraumes genügende Erkundigungen einzuziehen. Das Ergebniss desselben ist daher unvollständig geblieben. Eine unvollkommene Statistik kann aber in ihren Schlüssen nur zu leicht zu falschen Vorstellungen und unrichtigen Bildern führen. Ich habe deshalb von meiner Absicht Abstand genommen und beschränke mich auf eine kurze Besprechung einiger, für den Kliniker besonders wichtiger Fragen, anknüpfend an Fälle unserer Beobachtung. Die Resultate unserer statistischen Arbeit sollen später im Zusammenhange mitgetheilt werden.

In der Lehre von dem Carcinom interessiren den Praktiker hauptsächlich zwei Fragen: die Sicherheit der Diagnose des Carcinoms im einzelnen Falle, und die Möglichkeit der definitiven Heilung desselben auf operativem Wege.

Es ist begreiflich, dass man sich fortgesetzt bemüht, die Diagnose des Carcinoms möglichst sicher zu stellen; hängt doch von ihr die Vornahme einer oft sehr verantwortungsvollen und oft verstümmelnden, aber auch, wenn zur rechten Zeit ausgeführt, unsere Kranken vor schwerem Siechthum bewahrenden Operation ab. Unterlassungen in dieser Beziehung sind, wie das Studium der Literatur der letzten Jahre lehrt, nicht häufig zu beklagen gewesen. Man war vielmehr, wie dies besonders Esmarch ¹⁾ in seinem bekannten Vortrag betonte, mit dem operativen Eingriffe oft zu schnell und ent-

1) Verhandlungen der Deutschen Gesellschaft f. Chirurgie. 1889. Bd. II. S. 121.

fernte mit dem Messer Geschwüre und Geschwülste, die auf einfacherem Wege der Heilung zugänglich gewesen wären. Ganz besonders gilt dies von syphilitischen, tuberculösen und actinomycotischen Ulcerationen an Lippe und Zunge. In einzelnen Fällen mag damit dem Kranken nicht geschadet worden sein, in anderen kann aber, besonders wenn es sich um bald nach der Operation wiederkehrende luetische Leiden handelt, unberechenbarer Nachtheil aus der irrigen Diagnose erwachsen. Aus diesen Gründen tritt Esmarch und mit ihm wohl die grosse Mehrzahl der Kliniker mit aller Entschiedenheit dafür ein, in jedem Falle, in dem es nur einigermaassen angängig erscheint, die klinische Diagnose durch die mikroskopische Untersuchung eines excidirten Probetheilchens zu sichern, ehe ein grösserer chirurgischer Eingriff unternommen wird, unbedingt aber wenigstens nach der Operation die entfernte Afterbildung einer eingehenden mikroskopischen Durchforschung zu unterziehen.

Nach diesen Vorschriften wird in unserer Klinik schon seit langer Zeit verfahren. In jedem zweifelhaften Falle von Neubildung oder Geschwür wird das Mikroskop zu Hülfe gezogen. Ist eine Probeexcision aus localen Gründen unthunlich, oder die Diagnose aus dem klinischen Verhalten so klar, dass sie unnöthig erscheint, so wird wenigstens nach der Operation eine sorgfältige mikroskopische Untersuchung vorgenommen, schon um über die Art des Tumor und seinen Ausgangspunkt ein Urtheil zu gewinnen. Ausserdem werden alle durch die Operation gewonnenen Neubildungen aufbewahrt, so dass in jedem Falle, in welchem aus diesen oder jenen Gründen Zweifel an der ersten Diagnose auftreten, eine Nachuntersuchung vorgenommen werden kann. Dass aber trotz aller dieser Vorsichtsmaassregeln ein Irrthum in der Diagnose immer noch möglich sein kann, sollten wir in einem in vielen Beziehungen lehrreichen Falle erleben.

A. W., 40 Jahre alt, Krankenhausdiener, stellt sich mir im Jahre 1883 mit einem kleinen Geschwür am linken Zungenrand vor, das sich seit einigen Wochen entwickelt hatte, und das er durch Aetzen mit Arg. nitric. vergeblich zur Heilung zu bringen versucht hatte. Das kleine, etwa linsengrosse Geschwürchen war kraterförmig und hatte wallartige, zerklüftete Ränder, die sich hart anfühlten. Dem Aussehen nach musste es für ein beginnendes Epithelcarcinom gehalten werden. Es wurde in der Klinik excidirt. Der kleine Defect heilte ohne Zwischenfall. Die nach der Operation vorgenommene mikroskopische Untersuchung bestärkte uns in der Diagnose „beginnendes Carcinom“. Wir fanden Epithelwucherung, die in die Tiefe greift, ohne sonstige Unregelmässigkeiten. Auf Grund dieser Untersuchung glaubten wir W. längere Zeit für einen der

wenigen Kranken halten zu müssen, an denen durch frühzeitige Diagnose und Operation die definitive Heilung eines Zungencarcinoms geglückt ist.

W. hatte einen Leichentuberkel an der linken Hand, herrührend von einer vorübergehenden Beschäftigung als Leichendiener im pathologischen Institut. Dieser Leichentuberkel entzündete sich im Jahre 1885 und führte zu einer Lymphgefässentzündung mit Drüsenschwellung in der Achselhöhle. Ich konnte damals Bacillen in ihm auffinden. Im Anschlusse an diese Affection erkrankte W. ein Jahr später an einer Miliartuberculose, der er erlag. Diese so ausgesprochene tuberculöse Erkrankung bestimmte mich, noch einmal das alte Zungengeschwür nachzusehen. Ich fand zunächst nur, wie früher, Epithelwucherung. Als ich aber Schnittserien anlegte, gelang es, einige spärliche Tuberkelknötchen zwischen der Musculatur der Zunge aufzufinden. Bacillen konnten nicht nachgewiesen werden. Das Zungengeschwürchen war also tuberculös, und unsere frühere Annahme ein Irrthum, bedingt durch die auffallend starke Wucherung des Epithels und die grosse Seltenheit der Tuberkelknötchen, die nur in wenigen Präparaten aufgefunden werden konnten.

In zwei weiteren Fällen war ich längere Zeit im Zweifel, ob ich auf Grund des histologischen Befundes ein Carcinom annehmen sollte, das sich auf lupöser Grundlage entwickelt hat, oder nicht.

Fräulein R. Sch., 27 Jahre alt, befindet sich seit längerer Zeit in der Behandlung unserer Poliklinik wegen eines Lupus im Gesicht. Die immer von Neuem auftretenden Knötchen werden von Zeit zu Zeit durch Ustion zerstört. Neben diesem Lupus leidet die Kranke an einer schweren Tuberculose der rechten Hand, die zu einer hochgradigen Zerstörung derselben geführt hat. Die Erkrankung hat übergegriffen auf Knochen und Sehnenscheiden und hat durch Verlust von Phalangen und Zerstörung von Fingergelenken eine sehr schwere Verstümmelung und völlige Gebrauchsunfähigkeit der rechten Hand verursacht. Als ich die Patientin zum ersten Male sah, im Jahre 1888, hatte sie an dem verstümmelten 4. Finger ein grosses Geschwür, das übelriechendes Secret absonderte, und in dessen Tiefe Knochen freilag. Die das Geschwür umgebende Haut war vielfach zerklüftet, mit Krusten bedeckt und zeigte deutlichen papillären Bau. Behufs mikroskopischer Untersuchung wurde ein Stück vom Rande des Geschwürs excidirt. Neben typischen Tuberkelknötchen in der reichlich zellig infiltrirten Cutis finden sich die Papillen ausserordentlich gewuchert und tief in die Cutis hineinreichende Epithelzapfen. An einzelnen Stellen ist es sogar zur Abschnürung von Epithel und zur Bildung regelrechter Epithelperlen gekommen. Mit Rücksicht auf den klinischen Verlauf, auf das schon Jahre lang bestehende Leiden konnte ich mich trotz dieses histologischen Befundes für Annahme eines Carcinoms nicht entscheiden. Der weitere Verlauf rechtfertigte meine Ansicht. Die Zerstörung der Hand hat zwar weitere Fortschritte gemacht, das Geschwür aber kam nach Herausnahme des abgestorbenen Knochens und Ausschaben zur Heilung.

Von dem zweiten Falle stammt das Präparat, das ich in Figur 20 (Taf. VIII) abgebildet habe.

M. G., 31 Jahre alt, erkrankt im November 1889 mit einem kleinen Geschwür am rechten Unterschenkel, welches sie mit Carbolumschlägen behandelt. Unter dieser Behandlung entstehen ausgedehnte papilläre Wucherungen am Unterschenkel. Früher war Patientin immer gesund. Keine Lues. Durch längeren Aufenthalt und Pflege im Krankenhaus wird die Wucherung zur Rückbildung und das Geschwür zur Heilung gebracht. Im Januar 1891 erfolgt Wiederaufbruch des Geschwürs. Im Juni besteht ein grosses Geschwür im unteren Drittel des Unterschenkels und der inneren Seite des Fusses. Dasselbe ist vielfach zerklüftet und wird durchsetzt von Epithelinseln, die unregelmässig, warzig und zerklüftet erscheinen. An einzelnen Stellen zeigt das Geschwür Tendenz zur Heilung, während an anderen die Ränder zerfressen und unterminirt sind. In der Umgebung des Geschwüres finden sich vereinzelte hirse-korn- bis linsengrosse rothe Knötchen in der Haut, die etwas über das Niveau derselben hervorragen und schwach abschuppen. Die Haut des Unterschenkels ist weithin bräunlich pigmentirt. Die Lymphdrüsen der Leiste sind nicht abnorm vergrössert. Nach Abtragung der Granulationen und der gewulsteten Ränder wird das Geschwür nach der Methode von Thiersch transplantiert. Es erfolgt glatte Heilung. Es treten aber immer noch kleine Ulcerationen im Bezirk des früheren Geschwüres und in der Umgebung auf, die es nöthig machen, dass die Kranke unter ärztlicher Beaufsichtigung bleibt. Es gelingt immer, diese kleinen Recidive durch Aetzen, ohne grösseren Eingriff, zur Heilung zu bringen.

Die mikroskopische Untersuchung eines Stückes vom Rande des Geschwüres (Fig. 20, Taf. VIII) ergiebt ausserordentliche vergrösserte und gewucherte Papillen und Epithelzapfen, welche in die Cutis durchgebrochen und atypisch gewuchert sind. Zahlreiche Epithel-nester und -perlen liegen in der Tiefe. In ihnen lassen sich unschwer die Wickham-Darier'schen Carcinomkörperchen nachweisen. Auf der Grenze der Epithelwucherung und des Bindegewebes findet sich eine sehr reichliche kleinzellige Infiltration mit ausgesprochenen Tuberkelknötchen an einzelnen Stellen. Dieselben sind als solche unverkennbar an den typischen epitheloiden und Riesenzellen und der centralen Nekrose. Tuberkelbacillen konnten nach langem Suchen ganz vereinzelt in den Riesenzellen gefunden werden.

Die mikroskopische Untersuchung lässt also über die Natur des primären Leidens nicht im Zweifel. Es handelt sich um eine Haut-tuberculose. Ist aber die begleitende Epithelwucherung als Carcinom aufzufassen oder nicht? Wer nur den mikroskopischen Befund entscheiden lassen wollte und eine Stelle im Auge hat, wie e in Fig. 20, Taf. VIII, der könnte meines Erachtens an der Diagnose eines Haut-carcinoms kaum zweifeln. Und dennoch ist diese Epithelwucherung nicht krebsiger Natur. Der klinische Verlauf, das Alter der Patientin, das Fernbleiben der Lymphdrüsenanschwellung und nicht zum wenigsten

die Heilung des Geschwürs nach Abschabung und Transplantation sprechen entschieden gegen eine solche Annahme.

Derartige Epithelwucherungen, die unter Umständen der histologischen Deutung eines Falles nicht unerhebliche Schwierigkeiten bereiten können, sind bei chronisch entzündlichen Zuständen der Haut nichts Seltenes. Man findet sie z. B. an den Rändern alter Beingeschwüre und besonders häufig, wie in den geschilderten Fällen, bei Tuberculose der Haut. Sie kommen aber auch bei Geschwülsten der Haut anderer, als carcinomatöser Natur vor.

Figur 21 (Taf. IX) giebt bei schwacher Vergrößerung einen Schnitt durch ein Melanosarkom wieder. In der Mitte ist das Sarcom ulcerirt. Es liegt hier die eigentliche Geschwulstmasse frei. An den Rändern und auch an der Oberfläche, bei b, ist das Epithel, so weit die Geschwulst noch von solchem überzogen ist, ausgiebig gewuchert. Wir finden nicht allein tief in das Bindegewebe reichende Epithelzapfen (b), sondern auch ganze Nester von Epithelien (b), so dass ich, wenn die Geschwulst aus ihnen allein bestände, keinen Augenblick an der Diagnose „Epithelkrebs der Haut“ zweifeln würde. Der histologische Befund an dem eigentlichen Tumor jedoch und das klinische Verhalten erweisen ihn als ausgesprochenes Melanosarkom.

Ich bin weit entfernt, aus diesen drei Fällen und dem histologischen Befund bei unserem Melanosarkom irgendwie den Werth der mikroskopischen Untersuchung excidirter Stückchen für die Diagnose bösartiger Tumoren herabsetzen zu wollen. Niemand ist von ihrer Bedeutung mehr durchdrungen, als gerade wir. Unsere Beobachtungen lehren uns aber doch, dass, wenn auch nur ausnahmsweise, selbst die sorgfältigste Benutzung aller zu Gebote stehender Hilfsmittel in seltenen und besonders schwierigen Fällen uns nicht vor einem Irrthum zu bewahren vermag, und dass auch die mikroskopische Untersuchung nicht jedesmal unbedingte Gewissheit über die Natur eines Falles geben muss. Sie gewinnt ihren hohen Werth erst, wie allgemein anerkannt ist, unter gleichzeitiger Berücksichtigung sämtlicher klinischen Symptome. Allein kann sie ebenso zu Irrthümern führen, wie die einseitige klinische Begutachtung.

Die Frage nach der definitiven Heilung des Carcinoms durch operative Eingriffe hat man, wie die Verhandlungen der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie vom Jahre 1889 lehren, dahin entschieden, dass man eine bleibende Heilung annimmt, wenn 3—4 Jahre nach der Operation vergangen sind, ohne dass es zum Auftreten eines Recidives gekommen ist. Fälle von flachem Krebs des Gesichtes, auch von Krebs der Unterlippe und des Mastdarmes, bei denen die

Heilung so lange Bestand hat, sind keine Seltenheiten. Jeder erfahrene Chirurg wird über solche verfügen.

Schon auf dem Congress selbst wurden aber Stimmen laut, welche diese Zeit für zu kurz hielten, um mit Sicherheit von bleibender Heilung zu sprechen. Petersen¹⁾ berichtete über einen Fall, in welchem es zehn Jahre nach der Exstirpation der carcinomatösen Zunge zu einem Recidiv in der Zungenwurzel kam, und Hahn²⁾ stellte einen Kranken vor, den er im Jahre 1880 wegen Larynxcarcinom operirt hatte, und der 9 Jahre später ein Recidiv bekam. Auch wir haben ähnliche Erfahrungen machen müssen. Ich vermute, dass mancher der damals auf dem Congresse als geheilt vorgestellten erfolgreichen Fälle noch nachträglich einem Recidiv erlegen ist, das bei der Vorstellung überhaupt noch nicht bestanden hatte oder nicht nachweisbar war. In solchen Fällen von Spätrecidiv das zweite Carcinom als eine neue, von der ersten ganz unabhängige Erkrankung aufzufassen, halte ich nicht für zulässig.

Einwandsfrei geheilte und bis zu dem aus anderer Ursache erfolgten Tode geheilt gebliebene Fälle von Carcinom konnte ich zwei beobachten. In beiden Fällen war durch die klinische Beobachtung und die mikroskopische Untersuchung die Diagnose „Carcinom“ sichergestellt worden. Sie lebten, der eine 4, der andere 8 Jahre nach der Operation. Als sie einer anderen Krankheit erlegen waren, konnte die Section vorgenommen werden, bei der sich alle Organe, Lymphdrüsen und innere Organe, auch bei der mikroskopischen Untersuchung frei von Carcinom fanden. Eine grössere Anzahl anderer Fälle, in denen mehr als vier Jahre seit der geglückten Operation vergangen sind, wage ich nicht mit derselben Sicherheit den geheilten zuzuzählen. Unter ihnen befinden sich Lippen-, Gesichts-, Penis- und Mammacarcinome.

Der erste ist ein Fall von Larynxcarcinom, geheilt durch Total-exstirpation.

C. Fl., 43 Jahre alt, Handarbeiter. Exstirpation des Kehlkopfes am 2. April 1880. Der Operirte hat 4 Jahre nach der Operation gelebt und ist seiner Beschäftigung als Waldarbeiter nachgegangen. Im Jahre 1884 Tod an Pneumonie. Bei der Section wurde sowohl die Operationsstelle, als auch Lymphdrüsen und innere Organe frei von Carcinom befunden. Das Präparat befindet sich im Besitz der chirurgischen Klinik.

Im zweiten Falle handelte es sich um ein Lippencarcinom bei einem 65 jährigen Landwirth. Von dem Präparat gebe ich eine photo-

1) l. c. S. 19.

2) l. c. S. 23.

graphische Abbildung, Figur 19 (Taf. I). An der Diagnose Carcinom kann kein Zweifel sein. Der Krebs befindet sich noch im Anfangsstadium. Er geht vom Lippenroth, und zwar vom Rete Malpighi aus, das diffus erkrankt ist. Wie in die Tiefe dringende Epithelzapfen und schon abgeschnürte Knoten erkennen lassen, ist anzunehmen, dass er sich zu den tieferen unterminirenden Formen des Lippenkrebses entwickelt haben würde. Operation am 15. Juli 1882 durch Entfernung der erkrankten Unterlippe. Die Lymphdrüsen waren noch nicht inficirt. Die Heilung erfolgte in kürzester Zeit. Der Kranke blieb recidivfrei bis zu seinem im Jahre 1890 erfolgten Tode an Apoplexie. Die Section, die vorgenommen werden konnte, lehrte, dass auch in den Lymphdrüsen und den inneren Organen sich Carcinome nicht gebildet hatten.

In einigen Fällen, die wir schon den bleibend geheilten zuzurechnen geneigt waren, wurden wir durch das späte Auftreten von Recidiven zu einer anderen Ansicht bekehrt.

1. Frau R. A., 43 Jahre alt, Carcinoma ventriculi. Operirt am 6. Juli 1884. Resectio pylori. Glatte Heilung. Die Kranke erholt sich nach der Operation ausserordentlich und erfreut sich mehrere Jahre eines ausgezeichneten Gesundheitszustandes. 1890 erkrankt sie mit Appetitmangel und Abmagerung. Sie lässt sich von Neuem in das Krankenhaus aufnehmen. Es wurden einige Knoten in der Leber festgestellt. Tod am 5. Sept. 1890. Metastatisches Lebercarcinom. Die Narbe am Magen kaum kenntlich, ohne Recidiv.

2. M. B. Carcinoma laryngis. Totalexstirpation am 22. Jan. 1880. Bleibt nach der Operation mehrere Jahre gesund und recidivfrei. Er trägt Canüle und künstlichen Kehlkopf. Im Jahre 1883 wegen Beschwerden beim Schlucken und Auftreten eines Knotens Spaltung der Narbe. Es zeigt sich ein Recidiv von grösserer Ausdehnung, dem der Kranke erliegt.

3. W. Sch., 52jährige Schneidersfrau. Carcinoma mammae dextr. Am 22. April 1882 Amputatio mammae mit Ausräumung der Achselhöhle. Die Kranke bleibt bis zum Jahre 1889 recidivfrei und fühlt sich völlig gesund. In diesem Jahre, also 7 Jahre nach der Operation, bemerkt sie eine Anschwellung über dem linken Schlüsselbein. Da dieselbe an Grösse zunimmt, sucht sie unsere Hülfe auf. Exstirpation aller Halsdrüsen vom Schlüsselbein bis zur Fossa jugularis. Resection der Vena jugularis, die mit dem Drüsenpacket verwachsen ist. Die Kranke erholt sich zwar noch einmal von dem schweren Eingriff, 1 Jahr später aber geht sie an Marasmus zu Grunde.

4. M. H., 50 Jahre alt, Gutsbesitzer aus Dögnitz. Carcinom der Unterlippe und der Kieferdrüsen.

Erste Operation am 18. October 1877. Entfernung der carcinomatösen

Unterlippe und einiger Lymphdrüsen am linken Kieferwinkel. Deckung des Defectes durch einen Kinnlappen nach v. Langenbeck. Der Kranke bleibt recidivfrei bis zum Jahre 1889. In diesem Jahre bricht ein Knoten vor dem linken Ohr auf. Am 28. Februar 1889 Excision des Knotens, der mit der Parotis verwachsen ist. Die grosse Wunde wird durch Hautverpflanzung geschlossen und kommt reactionslos zur Heilung. Parotis und Nervus facialis mussten zum grösseren Theil geopfert werden. Im Herbst desselben Jahres entwickelt sich ein wallnussgrosser Knoten am vorderen Rande der transplantierten Haut, der am 24. September wiederum excidirt wird. Die damals vorgenommene Transplantation misslingt. Die Wunde heilt nicht vollständig. Im August 1891 entwickelt sich ein ähnlicher Knoten wie links auch auf der rechten Wange, und zugleich bildet sich ein Knötchen, das aufbricht, an der rechten Ohrmuschel. Trotz dieser mehrfachen Carcinomknoten lassen sich Metastasen in den inneren Organen und den entfernteren Lymphdrüsen nicht nachweisen. Der Allgemeinzustand des Kranken ist gut. Am 29. Januar 1892 Operation des aufgebrochenen Knotens auf der linken, am 10. Februar 1892 auf der rechten Seite. Hauttransplantation nach Thiersch, die beide Male zu einem sehr guten Resultate führt.

Das Carcinom ist durch die Wangenmusculatur bis auf das Jochbein gedrungen, auf dem es fest sitzt, und das beiderseits zum grössten Theile mit entfernt werden muss.

Die mikroskopische Untersuchung der neuerdings extirpirten Knoten ergibt: Carcinom mit sehr reichlichen Mitosen. An einzelnen Stellen sind die Krebszellen entsprechend dem Ausgangspunkt des Carcinoms noch deutlich als Platten erkennbar, während sie zumeist allerdings polymorphen Charakter haben.

Bemerkenswerth in dem mitgetheilten Falle ist besonders, dass es bis jetzt am primären Sitze des Carcinoms, an der Unterlippe, zu einem Recidive nicht gekommen ist. Es muss also bei der ersten Operation im Jahre 1877 geglückt sein, alles Krankhafte zu entfernen, und dennoch 12 Jahre später diese ausgedehnten und schweren Carcinomrecidive!

Zum Schlusse theile ich noch eine Beobachtung über die Vererbung von Geschwülsten, resp. der Prädisposition für dieselben mit.

Im November 1889 stellt sich mir ein 57-jähriger Landwirth S. vor mit einem kleinen Carcinom an der Unterlippe. Entfernung desselben durch Operation, Naht der Wunde. Die mikroskopische Untersuchung bestätigt die aus dem klinischen Verhalten gestellte Diagnose. Gewucherte Epithelzapfen reichen bis zwischen die Muskelbündel und haben sich zum Theil abgeschnürt. Der Kranke gab an, schon seit längerer Zeit eine kleine Warze auf dem Lippenrand zu haben, die sich in den letzten Wochen auffallend rasch vergrössert habe.

Einige Wochen später kommt der 21-jährige Sohn in meine Behandlung. Derselbe hat an der Unterlippe, an der Stelle, wo sich

bei dem Vater ein Carcinom entwickelte, eine kleine Warze. Da er fürchtet, dass dieselbe gleichfalls bösartig werden könnte, lässt er sie entfernen.

Sie zeigt auf dem Durchschnitt gewucherte Papillen und verdicktes Rete Malpighi neben gleichfalls verdickter, in grösseren Schollen auf der Unterlage liegender Hornschicht.

Dieser Fall schliesst sich, wie ich glaube, den Beobachtungen von Paget über die Vererbung der Disposition für bösartige Neubildungen an, der, wie er sagt, mit zunehmender Erfahrung zu der Ueberzeugung gekommen ist, dass in mehr als einem Drittel aller Fälle von Carcinom ein ererbtes constitutionelles Element vorliege.

Erklärung der Abbildungen.

(Tafel I—X.)

Fig. 1. Einwandernde Pigmentzellen in das Epithel transplanterter Haut. Zeiss apochrom. 8 Mm. Projectionsocular 4. Vergrösserung = 300. *a* Epidermis, *b* Cutis, *c* Cutispapillen, *d* Pigmentzellen, *e* Ausläufer der Pigmentzellen zwischen den Epithelien, *f* Knopfförmige Endigungen der Pigmentzellenausläufer, *g* Epithelzellen mit Pigment, *h* Pigmentzellen in der Cutis, nicht verästelt.

Fig. 2. Papillom am Oberschenkel. In das Epithel einwandernde Bindegewebszellen. Zeiss apochrom. 8 Mm. Projectionsocular 2. Vergrösserung = 180. *a* Epithel, *b* Cutis, *c* Cutispapillen, *d* Epithelzapfen zwischen den einzelnen Cutispapillen, *e* körnchenhaltige, mit Carbofuchsin lebhaft rothgefärbte Bindegewebszellen in den Papillen und an der Grenze von Cutis und Epithel, die mit Ausläufern in das Epithel zwischen die einzelnen Zellen des Rete hineinragen.

Fig. 3. Klossia in der Niere von *Helix hortensis*. Zeiss apochrom. 8 Mm. Projectionsocular 4. Vergrösserung = 300. Das Präparat ist gefärbt mit Methylenblau. *a* Klossia, *b* Kern derselben mit starkem Kernkörperchen, *c* Stiel, *d* Bürstenbesatz, *e* Harnsteine.

Fig. 4. Klossia in Sporenbildung. Zeiss apochrom. 8 Mm. Projectionsocular 4. Vergrösserung = 300. Färbung mit Methylenblau. *a* Sporen, eine Sporocyste bildend. *b* Keime in den Sporen, *c* Nierenepithelien, *e* Harnsteine.

Fig. 5. Klossia aus Niere von *Helix hortensis*. Zeiss homog. Immersion 3 Mm. Projectionsocular 2. Vergrösserung = 750. Das Präparat ist gefärbt nach der

Methode von Gram. Die Körnchen der Protoplasmaleiber der *Klossia* erscheinen tief blauviolett. *a* Klossien, *b* Bläschenförmiger Kern mit starkem Kernkörperchen, *c* gekörnertes Protoplasma, *d* Hülle, stammend von der ehemaligen Epithelzelle, in welcher sich die *Klossia* entwickelt hat, *e* Hülle mit noch deutlichem Zellkern, *f* Nierenepithelien normal, *g* Harnsteine.

Fig. 6. *Molluscum contagiosum*. Sublimatpräparat. Zeiss apochrom. 16 Mm. Projectionsoocular 2. Vergrößerung = 100. *a* Epidermis, *b* Cutispapillen, *c* Hornschicht, *d* Molluscumkörperchen, *e* mit Hämatoxylin blaufärbte, den Eleidinkörnern entsprechende Bestandtheile der Zellen der oberen Schichten des Rete Malpighi.

Fig. 7. Paget's Erkrankung der Brustwarze. Erstes Stadium. Sublimatfixirung. Hämatoxylinfärbung. Zeiss apochrom. 16 Mm. Projectionsoocular 2. Vergrößerung = 100. *a* Epidermis, Rete Malpighi, *b* Hornschicht, zum Theil abgehoben von der Unterlage, *c* Cutis, zellig infiltrirt, *d* Epithelzellen mit aufgelockertem Protoplasma, vergrößertem und dunkel gefärbtem Kern (Wickham's „Protozoen“), *e* Kerntheilungsbild in diesen Epithelien.

Fig. 8. Paget's Erkrankung der Brustwarze. Zweites Stadium, wucherndes Epithel der basalen Zellschicht. Sublimatfixirung. Zeiss apochrom. 8 Mm. Projectionsoocular 4. Vergrößerung = 250. *a* Epidermis, *b* Hornschicht, *c* Cutis, zellig infiltrirt, *d* basale Zellschichten des Rete Malpighi, *e* Kerntheilungsbild.

Fig. 9. Paget's Erkrankung. Drittes Stadium. Einbruch des wuchernden Epithels in die Cutis. Sublimatfixirung. Zeiss apochrom. 8 Mm. Projectionsoocular 2. Vergrößerung = 150. *a* Hornschicht, *b* Rete Malpighii, *c* wuchernde Zellen desselben, *d* noch erhaltene basale Cylinderzellenschicht, *e* Einbruch des Epithels, *f* Epithelzapfen, *g* Cutis hochgradig kleinzellig infiltrirt.

Fig. 10. Paget's Erkrankung. Kerntheilungen an der wuchernden Zelle des Rete Malpighi. Sublimat. Hämatoxylin. Zeiss apochrom. 3 Mm. Projectionsoocular 2. Vergrößerung = 500. *a* Epidermis, *b* Cutispapille, *c* Kerntheilungsbild: Sternform, *d* desgleichen Tochtersteinform, *e* Cutis.

Fig. 11. Wickham'sche Carcinomkörperchen in einem Carcinom der Ohrmuschel. Das Präparat stellt einen Carcinomalveolus mit in der Mitte deutlichen Plattenepithelien und noch kenntlichen Riffzellen, am Rande durch Carbofuchsin dunkel gefärbten basalen Zellen dar. Alkoholhärtung. Färbung mit Hämatoxylin und Carbofuchsin. *a* basale Zellen des Carcinomalveolus, *b* Plattenepithelien mit Riffen, *c* Kerne derselben, *d* Carcinomkörperchen mit Kern, dunkelroth gefärbt. Dieselben liegen in Hohlräumen und drücken den Zellkern zur Seite, *e* Kerne der Zellen, in welchen Carcinomkörperchen liegen.

Fig. 12. Dasselbe. Eine grössere Anzahl von einer Hülle umgebener, tiefroth gefärbter Carcinomkörperchen. Zeiss apochr. Immersion 3 Mm. Projectionsoocular 2. Vergrößerung = 500. *a* Carcinomalveolus, *b* basale Zellen desselben, *c* centrale Epithelplatten, *d* Stroma, *e* Carcinomkörperchenanhäufung.

Fig. 13. Carcinomalveolus aus einem metastatischen Lymphdrüsen carcinoma nach Larynxcarcinom. Sublimatfixirung. Zeiss apochrom. 8 Mm. Ocular 4. Vergrößerung = 350. *a* Carcinomalveolus, *b* Stroma, *c* jugendliche Krebszellen, *d* Platten im Centrum, *e* Carcinomkörperchen, in einem Hohlraum liegend, mit Kernfragment und einem Faden, mit dem es an der Wand haftet, *f* Hülle desselben, *g* Zelle mit zwei Kernen ohne Zeichen einer durchgemachten mitotischen Theilung.

Fig. 14. Carcinomzapfen aus einem Plattenepithelkrebs. Zeiss apochrom. 8 Mm. Projectionsoocular 4. Vergrößerung = 300. *a* Carcinomzapfen, *b* bindegewebiges Stroma, *c* Plattenepithelien des Carcinomalveolus mit bläschenförmigen Kernen, die deutlich Membran und Kernkörperchen erkennen lassen, *d* Anhäufung einer Anzahl mit Hämatoxylin dunkel gefärbter Körnchen im Carcinomalveolus, wahrscheinlich Leukocytenrümpfer, *e* concentrisch um diese Anhäufung gelagerte Epithelien, *f* in den Alveolus eingewanderte, zwischen den Plattenepithelien liegende Leukocyten und Trümmer solcher. Wegen der äusseren Aehnlichkeit sind derartige Gebilde, wie *e*, mehrfach als Sporocysten, umgeben von einer Membran, gedeutet worden.

Fig. 15. Der centrale Theil eines Alveolus bei einem Hornkrebs der Haut mit den verschiedensten Veränderungen des Epithels, bald ähnlich den Molluscumkörperchen, bald Carcinomkörperchen. *a* Epithelien am Rand mit noch deutlichen Riffen, *b* den Molluscumkörperchen ähnliche Gebilde, *c* Carcinomkörperchen, *d* in den Carcinomzapfen eingewanderte weisse Blutkörperchen und Trümmer solcher. Vergrößerung wie Fig. 14.

Fig. 16. Aus einem Carcinom der Unterlippe. Sublimat. Hämatoxylin. Carbofuchsin. Carcinomkörperchen (beginnende Hornperle). Zeiss apochrom. 8 Mm. Projectionsoocular 2. Vergrößerung = 180. *a* Epithel, *b* Stroma (Cutispapillen), *c* Carcinomkörperchen, *d* Kerne der plattgedrückten Zellen (concentrische Schichtung um *c*), *e* einwandernde Leukocyten.

Fig. 17. Aus einem Sarkom des Oberkiefers. Körner in einer Zelle mit Fuchsin roth gefärbt. Russel's fuchsine bodies. Zeiss apochrom. 3 Mm. Projectionsoocular 2. Vergrößerung = 750. *a* grosse Zelle mit Kertheilungsbild, *b* Chomatinschleifen, *c* Körner im Protoplasma der Zelle, *d* Sarkomzellen.

Fig. 18. Russel'sche Körperchen bei Tuberculose der Zunge. Färbung mit Carbofuchsin und Jodgrün. Zeiss apochrom. 3 Mm. Projectionsoocular 2. Vergrößerung = 500. *a* Russel'sche Körperchen, leuchtend roth gefärbt, *b* Kern der Zelle, in welcher dieselben liegen, *c* Hülle (Zellmembran?), *d* Zellkerne.

Fig. 19. Beginnendes Carcinom der Unterlippe. Sublimatfixirung, Hämatoxylin. Zeiss apochrom. 16 Mm. Projectionsoocular 2. Vergrößerung = 75. *a* Epithelzapfen, in die Tiefe gewuchert, *b* Hornschicht, *c* abgeschnürte Epithelmassen, Epithelperlen bildend, *d* Musculatur der Lippe, *e* kleinzellige Infiltration.

Fig. 20. Lupus verrucosus am Unterschenkel. Ausgedehnte papilläre Wucherung mit abgeschnürten Epithelnestern. Zeiss apochrom. 35 Mm. Vergrößerung = 20. *a* normales Epithel, *b* Cutis, *c* gewuchertes Epithel, *d* gewucherte Papillen, *e* Epithelnester in der Tiefe, Hornperlen bildend, *f* kleinzellige Infiltration, *g* Tuberkelknötchen mit nekrotischem Centrum und Riesenzelle, *h* Schweissdrüsen, *i* Venen.

Fig. 21. Melanosarkom der Haut des Vorderarmes. Zeiss apochrom. 75 Mm. Ohne Ocular. Vergrößerung = 12. *a* Epidermis, *b* gewucherte Epidermis, theils abgeschnürte Epithelnester bildend, theils Zapfen, die weit in die Tiefe gedrungen sind. In den Epithelnestern fanden sich „Carcinomkörperchen“ von Wickham, *c* Pigment, besonders reichlich an der Grenze des Tumor gegen das gesunde Gewebe, *d* Haarschaft, *e* Talgdrüsen, *f* Gefässquerschnitt.

Fig. 22. Beginnendes papilläres Carcinom der Kopthaut. Zeiss apochrom. 35 Mm. Ohne Ocular. *a* Epidermis, *b* vergrößerte Papille, *c* Hornmassen, *d* Talgdrüsen, *e* schräg- und quergetroffene Haare, *f* gewucherte Epithelzapfen, *g* gewucherte Papillen im Carcinom, *h* kleinzellige Infiltration auf der Grenze der Einbruchsstelle des Carcinom in das Bindegewebe.

Fig. 23. Beginnendes unterminirendes Carcinom der Zunge. Zeiss apochrom. 35 Mm. Ohne Ocular. *a* Epithel, *b* Papillen, *c* Zungenmusculatur, *d* Carcinomzapfen, *e* Gefässe.

Fig. 1.

Fig. 2.

Karg, Carcinom.

Verlag von F.C.W. Vogel in Leipzig.

Lichtdruck von Julius Klinkhardt, Leipzig.

Fig. 5.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 8.

Fig. 9.

Fig. 10.

Fig. 11.

Fig. 12.

Fig. 13.

Karg, Carcinom.

Verlag von F.C.W. Vogel in Leipzig.

Lichtdruck von Julius Klinkhardt, Leipzig.

Fig. 14.

Fig. 15.

Fig. 23.

Fig. 18.

Fig. 17.

Fig. 16.

Fig. 19.

Fig. 20.

Karg, Carcinom.

Verlag von F.C.W. Vogel in Leipzig.

Lichtdruck von Julius Klinkhardt, Leipzig.

Fig. 21.

Fig. 22.