Über die maßanalytische Bestimmung des Bleis.

Von

H. Bollenbach.

(Mitteilung aus dem chemischen Institut der Universität Münster i. W.)

Zur maßanalytischen Bestimmung des Bleis ist schon eine ganze Reihe von Methoden vorgeschlagen worden. Ihre Ausführung ist aber fast durchweg wenig bequem und die Endreaktion nicht mit wünschenswerter Schärfe erkennbar. So versetzt Domonte¹⁾ die warme Bleilösung mit Kalilauge im Überschuss und lässt Natriumsulfid zufließen, bis sich kein Niederschlag von Bleisulfid mehr bildet. Mohr²⁾ titriert das Blei in neutraler Lösung mit Kaliumsulfat und erkennt das Ende der Reaktion durch Tüpfelproben auf Jodkaliumpapier am Ausbleiben der Bildung von Bleijodid. Gräger³⁾ verwendet Kaliumferrocyanid und tüpfelt mit Ferrichlorid. Schwarz und Diehl⁴⁾ fällen mit titrierter Kaliumchromatlösung das Blei in essigsaurer Lösung aus und erkennen das Ende der Operation an der gelbroten Farbe des überschüssigen Chromates. Schindler⁵⁾ empfiehlt Ausfällen des Bleis mit Ammoniummolybdat, ebenfalls in essigsaurer Lösung, wobei Tüpfelproben mit Tannin, welches mit Ammoniummolybdat eine orangerote Färbung hervorruft, den Schluss anzeigen. Haswell⁶⁾ oxydiert das Blei in schwach saurer, beziehungsweise alkalischer Lösung durch Kaliumpermanganat. Letzteres Verfahren ist der Mangan titration nach Volhard analog, doch sollen hier zwei Moleküle Kaliumpermanganat in neutraler Lösung, abweichend von allen andern Fällen, fünf Atome Sauerstoff abgeben, nach folgender Gleichung:

Haswell gibt zur neutralen, heißen Bleilösung Zinkoxyd und dann Kaliumpermanganat, bis die über dem Niederschlage stehende Flüssigkeit durch einen kleinen Permanganatüberschuss schwach violett gefärbt ist. Auch dieses Verfahren, welches auf den ersten Blick sehr einfach erscheint, konnte sich in der Praxis nicht einbürgern, und die

1) Schwarz, Maßanalyse.

2) Mohr, Titrimethoden.

3) Journal f. prakt. Chem. **96**, 330 (1865).

4) Diese Zeitschrift **19**, 306 (1880).

5) Diese Zeitschrift **27**, 137 (1888).

6) Diese Zeitschrift **21**, 264 (1882).

meisten Lehrbücher (zum Beispiel Treadwell, Lunge) erwähnen es gar nicht. Es mag dies seinen Grund darin haben, dass einmal die Gegenwart von Chloriden und Sulfaten die Methode ungenau und direkt unbrauchbar gestaltet. Bleichlorid gibt, abgesehen von der Schwerlöslichkeit, in der heißen Lösung Veranlassung zur Chlorentwicklung, Bleisulfat wird durch Kaliumpermanganat nicht angegriffen. Weiterhin setzt sich der Niederschlag sehr langsam ab, und Nebenprodukte, wie Bleiplumbat und Bleimanganit, scheinen den glatten Verlauf der Reaktion zu stören. Ausserdem bemerkt Haswell selbst, dass die letzten Anteile Blei, 1,3 *mg* im Kubikzentimeter, nicht mehr gefällt werden. Bei 100 *cc* Flüssigkeit würde sich demnach schon ein Fehlbetrag von 0,13 *g* einstellen. Da dies dem Verfasser selbst wohl etwas zu ungeheuerlich erscheint, empfiehlt er, nach dem Eintreten der Violettfärbung schwach alkalisch zu machen und bis zum Auftreten einer zweiten Rotfärbung weiter zu titrieren. Es tritt hier aber, wie ich gefunden habe, ein ganz anderer Reaktionsverlauf ein.

Mit Versuchen über Titrationsen mit Kaliumpermanganat in alkalischer oder neutraler Lösung beschäftigt, studierte ich auch, im Anschluss an das Haswell'sche Verfahren, das Verhalten von Kaliumpermanganat zu Natriumplumbitlösungen, in welche sich auch Bleichlorid und Bleisulfat leicht überführen lassen. Ich übersättigte zunächst eine heiße Bleilösung mit Natronlauge, so dass sich der Niederschlag von Bleihydroxyd wieder löste, und liess dann tropfenweise Kaliumpermanganatlösung unter Umschütteln zufließen. Es zeigte sich nun, dass die Konzentration der Natronlauge von erheblichem Einfluss auf den Verlauf der Titration war. Wandte ich nur so viel Natronlauge an, als zur Lösung des Bleihydroxydes gerade erforderlich ist, so erreichte ich einen Punkt, bei dem ein oder zwei Tropfen Kaliumpermanganatlösung die über dem braunen Niederschlage stehende Flüssigkeit violett färbten; für gleiche Bleimengen wurden stets gleiche Mengen Kaliumpermanganat verbraucht. Wurde aber zu viel Natriumhydroxyd zugegeben, so trat statt der violetten Permanganat- die grüne Manganatfarbe auf, und die Resultate schwankten ganz bedeutend. Aber auch im ersten Falle, wenn ein Überschuss von Natronlauge vermieden war, befriedigten mich die Resultate nicht vollständig. Wohl stimmten die Titrationsen, so lange weniger als 0,5 *g* Bleinitrat angewandt wurden, überein, und für proportionale Mengen Bleilösung wurden entsprechende Mengen Permanganat verbraucht; wandte ich aber 0,5--1 *g* zu einem Versuche an, so

zeigte ſich, daſſ mit zunehmendem Bleigehalt die Löſung weniger als die erwartete Menge Permanganat verbrauchte. Es mußte ſich alſo Bleioxyd der Oxydation entzogen haben. Und in der Tat bildet, wie weitere Verſuche zeigten, daſ bei der Titration entſtehende Mangansuperoxyd mit dem Bleioxyd ein Manganit. So wurde einer Natriumplumbitlöſung durch Kochen mit überſchüſſigem, gefällttem Mangansuperoxyd daſ Blei inſolge Manganitbildung vollſtändig entzogen. Im Filtrate konnte durch Schwefelwaſſerſtoff und nach dem Anſäuern mit Eſſigſäure durch Kaliumchromat kein Blei mehr nachgewieſen werden. Wurde zu einer beſtimmten Menge Natriumplumbitlöſung zuerſt Mangansuperoxyd gegeben und dann mit Kaliumpermanganat titriert, ſo fielen die Reſultate ſtets zu niedrig aus. Immerhin lieſſ ſich, da man zu Titrationen doch in den meiſten Fällen weniger als 0,5 g Subſtanſ verwendet, auf dieſe Weiſe ganz gut arbeiten, und ich erhielt mit Kaliumpermanganatlöſungen, die gegen Bleinitrat eingeſtellt waren, auch in unbekannten Löſungen gute Reſultate. Ich verlieſſ aber dieſe Art zu arbeiten, da die Reaktion zwiſchen Kaliumpermanganat und Natriumplumbitlöſung inſolge der Nebenreaktionen nicht nach einer einfachen Gleichung verlaufen konnte, und verfuhr nunmehr umgekehrt, indem ich in eine heiſſe alkalische Kaliumpermanganatlöſung tropfenweiſe die Bleilöſung zugab biſ zur völligen Entfärbung. Die Titration verlief in dieſem Falle weſentlich raſcher, der Niederſchlag bildete ſich und ſetzte ſich ſofort ab, zumal wenn man der Permanganatlöſung einige Gramme reiſes Baryumſulfat zuſetzte. Eine Manganitbildung fand offenbar nicht ſtatt, da die oben geſchilderten Differenzen ſich nicht mehr zeigten. Zur Oxydation derſelben Menge Blei wurde ungefäh'r der zehnte Teil der Kaliumpermanganatlöſung mehr verbraucht als nach dem erſten Verfahren. Es lieſſ ſich nun eine einfache Reaktionsgleichung aufſtellen, die aber überräſchender Weiſe weder der Haſwell'ſchen noch der Gleichung:

die eher erwartet wurde, entſprach. Behandelte ich nämlich den abfiltrirten und ausgewaſchenen Niederſchlag mit verdünnter Salpeterſäure, ſo trat eine ſtarke Violettſärbung durch Bildung von Übermanganſäure auf. Ich nahm alſo an, daſ ſich durch Einwirkung deſ übermanganſauren Kaliums auf die Natriumplumbitlöſung Bleisuperoxyd gebildet habe, welches in bekannter Weiſe oxydierend auf Manganoxyde einwirkt. Es zeigte ſich aber, daſ die Bildung von Bleisuperoxyd

sekundär erfolgte. Es oxydierte nämlich ein Molekül Kaliumpermanganat drei Moleküle Bleioxyd, so dass sich die Reaktionsgleichung folgendermaßen gestalten dürfte:

Aus dem abfiltrierten, Mangansuperoxyd und Bleisesquioxyd enthaltenden Niederschlag konnte das Bleisesquioxyd, welches durch Salpetersäure in Bleisuperoxyd und Bleinitrat übergeführt wird, abgesondert werden. Hierüber gedenke ich an anderer Stelle ausführlicher zu berichten, zumal da das Bleisesquioxyd noch wenig studiert ist. Meine Methode ist anwendbar bei Gegenwart von Chloriden, Bromiden und Sulfaten. Jodide dürfen nicht zugegen sein, da sie durch Kaliumpermanganat in Jodate übergeführt werden, ebensowenig reduzierende Substanzen wie Sulfide, Sulfite, Nitrite, Arsenite, Azetate, Mercurio-, Stanno- und Wismutsalze. In der Praxis kann diesen Bedingungen leicht Rechnung getragen werden.

Titerstellung.

Zur Darstellung der Kaliumpermanganatlösung löst man zweckmäßig in der üblichen Weise 3,2 g zum Liter und stellt die Lösung am besten gegen reines Bleinitrat ein, da Einstellungen gegen saure Lösungen wie Ferroammoniumsulfat oder Oxalsäure etwas zu hohe Wirkungswerte ergeben. Das Bleinitrat ist chemisch rein im Handel und wird gewichtsanalytisch auf seine Reinheit geprüft. Eine $\frac{n}{10}$ -Lösung des Salzes bereitet man sich durch Lösen von 16,5495 g zum Liter. Statt einer $\frac{n}{10}$ -Pb(NO₃)₂-Lösung kann natürlich eben so gut eine andere Bleinitratlösung von genau bekanntem Gehalte benutzt werden.

20 cc der einzustellenden Permanganatlösung pipettiert man in einen Stehkolben von 400—500 cc Inhalt, gibt 300—400 cc heisses, destilliertes Wasser, zirka 5 cc $\frac{2}{n}$ -NaOH und eventuell einige Gramme reines Baryumsulfat zu. Dann lässt man aus einer Bürette tropfenweise unter Umschütteln $\frac{n}{10}$ -Pb(NO₃)₂-Lösung zufließen, bis die Permanganatfarbe vollständig verschwunden ist. Der Niederschlag ballt sich besonders gegen das Ende der Reaktion fest zusammen und setzt sich infolge seiner grossen Schwere sehr rasch ab. Bei genauen Arbeiten zieht man die geringe Menge Permanganat in Rechnung, welche von den 400 cc Wasser, dem Baryumsulfat und den 5 cc Natronlauge verbraucht und in einem blinden Versuche ermittelt werden. Je nach der Reinheit der angewandten Natronlauge müssen hier 0,1—0,4 cc in Abzug gebracht

werden. Der Berechnung legt man die Gleichung: $6 \text{ Pb}(\text{NO}_3)_2 + 2 \text{ KMnO}_4 + 12 \text{ NaOH} = 2 \text{ MnO}_2 + 3 \text{ Pb}_2\text{O}_3 + 2 \text{ KOH} + 12 \text{ NaNO}_3 + 5 \text{ H}_2\text{O}$ zu Grunde.

Ausführung der Titration.

Die zu untersuchende Bleilösung oder das in Lösung gebrachte Metall oder Salz versetzt man in einem 250 cc-Messkolben mit so viel Natronlauge, bis der zuerst entstandene Niederschlag von Bleihydroxyd sich wieder aufgelöst hat, füllt mit destilliertem Wasser zur Marke auf und schüttelt tüchtig um. 50 cc dieser Lösung lässt man dann langsam aus der Pipette in eine genau abgemessene Menge der gegen Bleinitrat eingestellten Kaliumpermanganatlösung, welche sich mit 300—400 cc heissem Wasser und 5 cc $\frac{2}{n}$ -NaOH in einem 500 cc-Kolben befindet, unter kräftigem Schütteln einfließen. Die Kaliumpermanganatlösung muss im Überschuss angewandt werden, die über dem Niederschlage stehende Flüssigkeit also noch stark violett gefärbt sein. Den Überschuss an Kaliumpermanganat titriert man dann am bequemsten im nämlichen Kolben mit $\frac{n}{10}$ - $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ -Lösung (oder einer anderen Bleilösung von genau bekanntem Gehalt), welche man aus einer Bürette in rasch aufeinander folgenden Tropfen so lange zugibt, bis die violette Farbe völlig verschwunden ist.

Statt die Resttitration mit Bleinitrat auszuführen, kann man auch die ganze Operation in einem geeichten 500 cc-Kolben vornehmen, nach dem Eintragen der Bleilösung abkühlen, mit destilliertem Wasser zur Marke auffüllen und absetzen lassen. Von der über dem Niederschlage stehenden, klaren oder durch Asbest filtrierten Flüssigkeit pipettiert man dann einen aliquoten Teil ab und bestimmt darin jodometrisch die unverbrauchte Menge Kaliumpermanganat.

Experimentelles.

Analyse des angewandten Bleinitrates.

2,2000 g chemisch reines Bleinitrat gaben vorsichtig erhitzt 1,4800 g PbO, entsprechend $2,1976 \text{ g Pb}(\text{NO}_3)_2 = 99,89\%$.

1. Versuchsreihe mit weniger genauen Resultaten.

12,7464 g $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ wurden zum Liter gelöst, eine bestimmte Menge mit der Pipette entnommen, mit Natronlauge bis zur Auflösung des zuerst entstandenen Bleihydroxydes versetzt und dann mit zirka 300 cc heissen, destillierten Wassers verdünnt. Zu dieser Lösung liess

ich aus einer Bürette Permanganatlösung vom Gehalte $\frac{3,6365}{1000}$

(Oxalsäureeinstellung) unter stetigem Schütteln zufließen. Es schied sich sofort ein Niederschlag ab, der sich gegen das Ende der Reaktion dichter zusammenballte und rasch absetzte. Schliesslich färbte sich die über dem Niederschlag stehende Flüssigkeit violett und behielt diese Farbe auch bei, wenn der Kolben dann noch einige Minuten auf ein siedendes Wasserbad gesetzt wurde. Auf Zusatz von 1 oder 2 Tropfen Bleinitratlösung verschwand die Violett-färbung wieder. Wurde der Niederschlag abfiltriert und ausgewaschen, so konnte im Filtrate nach dem Ansäuern mit Essigsäure durch Kaliumchromat kein Blei nachgewiesen werden.

Zur Oxydation von

10 cc Bleinitratlösung wären nötig 5,3 cc Permanganatlösung.

10 „ „ „ „ 5,25 „ „

20 „ „ „ „ 10,1 „ „

20 „ „ „ „ 10,1 „ „

40 „ „ „ „ 20 „ „

40 „ „ „ „ 20 „ „

Legt man den letzten Versuch der Berechnung zu Grunde, so oxydierten unter diesen Arbeitsbedingungen 1 Mol KMnO_4 3,35 Mole $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$.

2. Versuchsreihe mit genauen Resultaten.

Bleinitratlösung und Kaliumpermanganatlösung waren dieselben wie in der ersten Reihe.

Eine bestimmte Menge Permanganat wurde in einen Kolben pipettiert, etwa 300 cc heisses destilliertes Wasser, 5 cc $\frac{2}{n}$ -NaOH und einige Gramme BaSO_4 zugegeben. Zu diesem Gemenge liess ich aus einer Bürette tropfenweise unter ständigem Schütteln die Bleinitratlösung einfließen, bis die Permanganatfarbe über dem Niederschlage vollständig verschwunden war.

1 cc Permanganatlösung oxydierte 1,8 cc Bleinitratlösung.

5 „ „ „ 8,95 „ „

10 „ „ „ 17,9 „ „

15 „ „ „ 26,9 „ „

20 „ „ „ 35,8 „ „

20 „ „ „ 35,8 „ „

Die entfärbte Lösung wurde in allen Versuchen durch 1—2 Tropfen Permanganatlösung wieder violett, ein Zeichen, dass nicht über-titriert war.

Nach diesem Verfahren oxydiert, wenn man die letzten Versuche berechnet, 1 Mol KMnO_4 2,999 Mole $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$.

Da nun 2 Moleküle Kaliumpermanganat in alkalischer Lösung 3 Atome Sauerstoff abgeben, dürfte die Reaktionsgleichung

$2\text{KMnO}_4 + 6\text{Pb}(\text{ONa})_2 = 2\text{MnO}_2 + 3\text{Pb}_2\text{O}_3 + \text{K}_2\text{O} + 6\text{Na}_2\text{O}$ bewiesen sein.

Analysen.

$$\text{Bleinitratlösung} = \frac{16,9365}{1000}. \quad \text{Permanganatlösung} = \frac{3,5078}{1000}.$$

Zur Entfärbung von 10 cc Permanganatlösung waren in mehreren Versuchen 13 cc Bleinitratlösung, entsprechend 0,2202 g $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$, erforderlich, zur Entfärbung von 20 cc Permanganatlösung 26 cc Bleinitratlösung. 10 cc Permanganatlösung wurden mit 300 cc heissem Wasser, 5 cc $\frac{2}{n}$ -NaOH, einigen Gramm BaSO₄ in einen 500 cc-Kolben gebracht. Die zu bestimmende Menge Bleinitrat wurde in wenig Wasser gelöst, durch Natronlauge in Natriumplumbit übergeführt und, da ich hier nur mit kleinen Mengen arbeitete, vollständig zu dem Permanganat in den Kolben gegeben.

Die zur Resttitration verbrauchte Menge Bleinitrat von 0,2202 g $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$, welche den 10 cc Permanganatlösung entsprachen, subtrahiert, gibt den Wert der gesuchten Bleimenge.

Angew. KMnO_4	Ber. resp. ges. $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$	Zur Resttitration verbr. $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$	Gef. $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$	Gef. $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ in Prozenten
cc	g	cc g	g	
10	0,0085	12,5 = 0,2117	0,0085	100
10	0,0252	11,5 = 0,1948	0,0254	100,8
10	0,0339	11 = 0,1863	0,0339	100
10	0,0375	10,8 = 0,1829	0,0373	99,5
10	0,0474	10,2 = 0,1727	0,0475	100,2
10	0,0559	9,7 = 0,1642	0,0560	100,2
10	0,0628	9,3 = 0,1575	0,0627	99,8
10	0,0846	8 = 0,1355	0,0847	100,1
10	0,1660	3,2 = 0,0542	0,1660	100
10	0,1881	1,9 = 0,0320	0,1882	100,05