Ephemeride für den *d'Arrest'schen* Cometen, berechnet von Herrn *Pape*.

Da meine in № 1072 mitgetheilten Elemente den Lauf des Cometen noch hinreichend nahe darstellen, so habe ich es für überflüssig gehalten sie zu verbessern u. gebe hier nur eine Fortsetzung der Ephemeride, die hoffentlich ausreichen wird, den Cometen bis zu seinem Verschwinden zu verfolgen.

Ephemeride für 12^h Berlin.

1857	α	δ	log. Δ	Lichtst.
April 14	4 ^h 41 ^m 48 ^s	+33° 26' 5	0,0543	1,86
15	4 48 14	32 21,8		
16	4 54 23	31 18,2		
17	5 0 16	30 15,9		
18	5 5 52	29 15,0	0,0794	1,52
19	5 11 12	28 15,6		
20	5 16 14	27 17,4		
21	5 21 0	26 20,5		
22	5 28 30	25 24,7	0,1059	1,22
23	5 29 47	24 30,3		
24	5 33 55	23 37,0		
25	5 37 55	22 44,9		
26	5 41 45	21 53,9	0,1355	0,97
27	5 45 22	21 4,1		
28	5 48 51	20 15,5		
29	5 52 15	19 27,9		
30	5 55 32	18 41,3	0,1618	0,79
Mai 1	5 58 37	17 55,7		
2	6 1 37	17 11,2		
3	6 4 34	16 27,7		
4	6 7 24	15 45,2	0,1851	0,64
5	6 10 8	15 4,4		
6	6 12 46	+14 25,2		

1857	α	δ	log. Δ	Lichtst.
Mai 7	6 ^h 15 ^m 21 ^s	+13° 47' 2		
8	6 17 50	13 10,3	0,2082	0,53.
9	6 20 13	12 34,5		
10	6 22 30	+12 0,0		

Als Einheit der Lichtstärke ist die vom 23. Febr. angenommen. Am 8^{ten} Mai geht der Comet 3 Stunden später unter als die Sonne; wegen der herannahenden hellen Dämmerung wird man ihn bei einer Lichtstärke, die dann nur halb so gross ist als am Tage der Entdeckung, in unseren Breiten gegen diese Zeit wohl aufgeben müssen.

Mit den in № 1076 gegebenen Elementen des *Brorsen'schen* Cometen habe ich noch die Beobachtungen März 29 zu Bonn und März 31 zu Berlin verglichen. Sie geben folgende Abweichungen:

R-B	$\Delta\alpha$	$\Delta\delta$
März 29	+13"	+22"
31.	+11	+30

Ich benutze diese Gelegenheit, um eine irrige Angabe zu berichtigen, welche sich in meiner Notiz über die Wiedererscheinung des *Brorsen'schen* Cometen (№ 1076) befindet. Der *Brorsen'sche* Comet ist gegenwärtig nicht der dritte, sondern der vierte der Cometen von kurzer Umlaufszeit, deren Bahnen durch ihre Wiedererscheinung völlig sicher bekannt sind. *Faye's* Comet ist bekanntlich bei seiner Rückkehr zum Perihel im Winter 1850⁵¹ wiederholt beobachtet, wobei *Le Verrier's* Rechnungen sich glänzend bewährten.

Altona, 1857 April 4.

C. F. Pape.

Beobachtung des Cometen I. 1857, von Herrn *G. B. Donati* in Florenz.

1857	T. m. di Firenze	in AR ($\odot$ -*)	in Decl.	AR app. $\odot$	Decl. app. $\odot$	№ di confr.
Marzo 6	17 ^h 13 ^m 39 ^s	+7 ^m 32 ^s 03	-13° 10' 45	22 ^h 11 ^m 5 ^s 70	+32° 14' 58" 0	5

Posizione media della stella di confronto par il 1857,0

π^2 Pegasi $\alpha = 22^h 3^m 34^s 91$ $\delta = +32^\circ 28' 19'' 8$.

Firenze 1857 Marzo 8.

G. B. Donati.

Beobachtung des Cometen II. 1857, auf der Hamburger Sternwarte, von Herrn *G. Rümker*.

1857	Mittl. H. Z.	AR $\odot$	Decl. $\odot$	Vergl.	Scheinbare Oerter der Vergleichsterne.		
März 20	8 ^h 8 ^m 35 ^s	2 ^h 10 ^m 12 ^s 01	+10° 19' 44" 3	a. b	a (8)	2 ^h 15 ^m 33 ^s 77	+10° 11' 2" 0 B. Z.
20	8 8 35	2 10 11,60	+10 19 43,8	c	b ξ Arietis (6)	2 17 8,83	9 57 39,3 B. A. C.
					c (7)	2 18 29,97	9 59 57,4 B. A. C.

Der Stern *a* ist auch in B. A. C. angegeben, dort aber um 1^m in AR zu klein.

Der Comet glich einem runden Nebel von beiläufig 1 $\frac{1}{2}$ ' bis 2' Durchmesser und war nach der Mitte zu etwas condensirt, aber sehr blass. Die Luft war bei der Beobachtung sehr unrein und der Wind sehr heftig.

G. Rümker.