mit einer Quecksilberdampfquarzlampe ausgeführt. Der Sterilisierungseffekt war, wenn das Wasser genügend langsam durchfloß, gut. Er wurde aber ungenügend, wenn die Geschwindigkeit über eine bestimmte Grenze gesteigert wurde.

Chemisch wird das Wasser in keiner Weise verändert. Die Ansicht, daß durch die Bestrahlung Wasserstoffsperoxyd oder Ozon gebildet würde und daß diese Körper die Sterilisation veranlassen, ist unrichtig. Nitrite, Nitrate, Stickstoffverbindungen und die sonstigen Salze des Wassers werden in keiner Weise verändert. Nur erfährt das Wasser eine geringe Erhöhung der Temperatur um wenige Zehntelgrade.

Langandauernde Tierversuche mit bestrahltem Wasser haben ferner dargetan, daß es vollständig gesundheitlich ungefährlich ist.

Der schwächste Punkt der Methode ist die Kostenfrage. Während *Courmont* und *Nogier* der Ansicht sind, daß es in dieser Richtung mit allen sonstigen Wasserreinigungsverfahren konkurrieren kann, berechnen *Weldert* und *Grimm* aus ihren Versuchen, daß bei demselben Effekt das Ultraviolettverfahren etwa 10—15mal so teuer ist als die übrigen Wasserreinigungsverfahren.

Nach *Erlwein* fehlt ferner noch der wichtigste Punkt für einen Vergleich der Kosten mit denen der übrigen Wasserreinigungsverfahren, nämlich die genaue Kenntnis der Lebensdauer und der Reparaturkosten der einstweilen noch sehr teuren Quarzlamphen.

von *Recklinghausen* hat aber eine Lampe konstruiert, welche mit 500 Volt Spannung (gegen 220 bei den sonstigen Lampen) betrieben wird. Diese Lampe soll, da sie elfmal so viel ultraviolette Strahlen erzeugt, bedeutend wirtschaftlicher sein.

M. W. ist in Deutschland noch kein Großbetrieb zur Ultraviolettbestrahlung des Wassers übergegangen. Indessen sollen nach von *Recklinghausen* eine ganze Reihe von französischen Städten das Verfahren benutzen oder im Begriffe stehen, es einzuführen. Hausapparate für den Kleinbetrieb werden in der Praxis schon verwendet.

Die Bedeutung der Speicheldrüsen für die Aufnahme und Verarbeitung der Nahrung bei den Tieren¹⁾.

Von Prof. Dr. H. Jordan, Tübingen.

Die Natur bedient sich oft mannigfaltiger Mittel zu einem einzigen Zwecke. Nicht selten aber bedient sie sich des gleichen Mittels, um mannigfaltige Zwecke zu erreichen. Viele Wege stehen ihr offen, um zu einem Ziele zu gelangen, viele

Wege, um ein einziges „Mittel“ (also etwa ein Organsystem) je nach Bedarf zu verschiedenen Zielen dem Organismus nutzbar zu machen. In dieser Mannigfaltigkeit liegt der Hauptreiz biologischer Studien; einer Mannigfaltigkeit, die also immer durch ein gemeinsames Ziel oder eine gemeinsame Basis, engste Beziehungen erkennen läßt, Beziehungen der sie bildenden Einzelercheinungen untereinander.

Die *Beziehung*, der Kern aller Wissenschaft, läßt uns innerhalb der Mannigfaltigkeit jede Einzelercheinung als Glied des Ganzen erkennen und macht sie zum Gegenstand allgemeinsten Interesses. Die *Mannigfaltigkeit* aber, durch jene Beziehung vereinheitlicht, zeigt uns den Umfang des Naturgeschehens, des Naturkönnens, das, sich vom Einheitsschema entfernend, frei schafft, was zur Erreichung des Zieles „Leben“ notwendig ist.

Unter dem angedeuteten Gesichtspunkte wollen wir in den folgenden Zeilen ein Beispiel dafür kennen lernen, wie die Natur mit einem einzigen Organsystem eine ganze Reihe verschiedener Zwecke erreicht.

Es gibt bei den Tieren wohl keine Erscheinungsreihe von solcher Vielgestalt, wie der Erwerb und die Aufnahme der Nahrung. Entsprechend sind die Tiere denn auch mit mancherlei Organen ausgerüstet, diesen Aufgaben gerecht zu werden. Unter diesen Organen spielen „*Speicheldrüsen*“ eine große Rolle. Wir verstehen unter Speicheldrüsen durchweg solche, einen Saft (ein Sekret) bereitende Organe, deren ausführende Kanäle in, oder in der Nähe der Mundhöhle münden.

I. Bestandteile des Speichels, welche die Aufnahme oder den Erwerb der Nahrung erleichtern.

A. Schleim (*Mucin*).

a) *Schleim als Schmiermittel*. Wie erstmalig der Saft bestimmter Drüsen innerhalb der Tierreihe in den Dienst der Nahrungsaufnahme getreten sein mag, können wir uns wie folgt denken: Vielen niederen Tieren geht ein nennenswertes Vermögen, die Beute in kleine Bissen zu zerlegen, vollkommen ab. Die Nahrung muß daher in vielen Fällen in Form verhältnismäßig großer Stücke, oft ganzer Beutetiere, eingeschlungen werden. Das gilt z. B. für die Seeanemone, die erstaunlich große Jagdbeuten durch ihren Schlund zu zwingen vermag. Die Muskelbewegung, mit Hilfe derer solch ein Schlingakt ausgeführt wird, hat uns nicht zu beschäftigen; wohl aber die Tatsache, daß dieser Akt unterstützt wird durch *Schleim*, der das *Gleiten der Bissen* erleichtert.

Wir können bei Seeanemonen nicht von Speicheldrüsen reden. Allein die Oberfläche des Körpers, die Wand von Schlund und Magen sind reich an einzelligen Drüsen, die Schleim absondern. Schon wenn die Beute mit den Fangarmen gefangen wird, ergießt sich Schleim auf sie, den die Drüsen der Arme selbst bereiten. Von den Armen dem Munde übergeben, gelangt sie hier in eine Region, die besonders reich an Schleimzellen ist. Aber auch im

¹⁾ Nach einem Vortrag erweitert. Das Tatsachenmaterial wurde entnommen: *Jordan*, Die vergleichende Physiologie der wirbellosen Tiere. Bd. 1 Ernährung. Jena 1913, G. Fischer. Bezüglich der Wirbeltiere siehe größtenteils *Biedermann*, Die Aufnahme, Verarbeitung und Assimilation der Nahrung in *Wintersteins* Handb. d. vergl. Physiol. Jena 1911, G. Fischer.

Innern des Magens wird diese Substanz ab-
geschieden¹⁾.

Auch bei den *Strudelwürmern* ist es zweifelhaft, ob wir von Speicheldrüsen schon reden dürfen. In ihrem Rüssel finden wir einzellige Hautdrüsen, die wahrscheinlich solch einen, das Einschlingen der Nahrung erleichternden Schleim liefern. Ähnliches gilt für die *Fische*, denen echte Speicheldrüsen fehlen, die dafür aber in der Mundschleimhaut sog. Becherzellen, das sind einzellige Schleimdrüsen, besitzen.

Bei vielen Tieren finden wir (teilweise neben einzelligen Drüsen) echte *vielzellige Speicheldrüsen*, die sehr oft, unter anderem, Schleim abscheiden.

Zum ersten Male in der Tierreihe begegnen wir kompakten Speicheldrüsen mit ausgiebiger Schleimsekretion bei den Lungenschnecken. Diese Drüsen liegen einer Erweiterung der Speiseröhre, dem Kropf, auf. Es sind zwei lappige, langgestreckte Drüsenblätter, die mit je einem der Speiseröhre parallel laufenden Ausführungsgang in den Schlundkopf münden. Sie ergießen ihren Saft also dahin, wo mit Hilfe der Raspelzunge (*Radula*) die Bissen gebildet werden. Der Saft ist fadenziehend und reich an Schleim.

Schleimhaltiger Speichel spielt bei Wirbellosen²⁾ noch weiterhin eine Rolle, es seien Tintenfische (*Octopus vulgaris*, *Eledone moschata*), Insekten (*Gryllus*, *Gryllotalpa*) genannt. Allgemeinste Verbreitung aber findet er bei *Wirbeltieren*: Gewisse Drüsen der Mundschleimhaut, der Zunge, viele der großen Speicheldrüsen liefern Schleim. Seine Bedeutung ist auch hier die Bissen schlüpfrig zu machen. Das läßt sich nach *Pawlow* auf folgende Weise zeigen: Bei Säugetieren richtet sich die Beschaffenheit des Speichels jeweilig nach der Art der aufgenommenen Nahrung. Füttert man einen Hund mit trocknen Substanzen, so wird ein besonders schleimreicher Speichel abgeschieden („Schmier-speichel“).

b) *Schleim als Fangmittel*. Die „fadenziehende“ Eigenschaft des Schleimes deutet schon auf seine Klebrigkeit hin, die bei entsprechender Konsistenz sehr bedeutend werden kann. So finden wir bei vielen Tieren Schleim im Dienste des Beutefangs. Schon manche Protozoen (z. B. *Choanoflagellaten*³⁾) nähren sich von kleinen Beuteobjekten, die sich in einem von der Protozoenzelle ausgeschiedenen zähen Schleim fangen. Nicht anders manche Steinkorallen, die periodisch den Schleimbelag, den sie auf der Körperoberfläche bilden, mit den darin gefangenen Kleinlebewesen einschlucken. Auch der Schleim der Fangarme unserer Seeanemonen, von dem wir sprachen, ist sehr klebrig. Was hier nun

für den Schleim der Körperoberfläche gilt, ist in ähnlicher Weise zutreffend für den schleimreichen Speichel mancher Wirbeltiere.

Die hier in Betracht kommenden Tiere fangen Insekten derart, daß sie ihre Zunge gegen die Beute ausschleudern oder vorschnellen. Die Beute haftet dann an der mit zähem Schleim überzogenen Zunge, wie an einer Leimrute. Hier sind zu nennen die Frösche, das Chamäleon, die Spechte; unter den Monotremen: *Proechidna*, *Echidna*; unter den Edentaten: *Myrmecophaga*, *Dasypus*, *Manis*. Die Zunge von *Echidna* ist lang und wurmförmig, mächtige Speicheldrüsen, die vorderen Submaxillardrüsen liefern den Schleim. Ich fand in ihrem starken Ausführungsgang einen glashellen, gallertartigen, sehr klebrigen Schleim, aus dem außerordentlich lange Fäden gezogen werden konnten. Zerreibt man die Drüse mit Wasser, so erhält man eine sehr zähe schleimige Masse, die nahezu gesteht! (*Proechidna*).

B. Das Wasser.

„Es unterliegt keinem Zweifel, daß der Speichel vor allem die Rolle von Wasser zu spielen hat. Dieses ist aber in der Mundhöhle dann nötig, wenn ein Tier feste trockene Nahrung aufnimmt . . .“ (*Pawlow*). Das kann naturgemäß nur von Landtieren gelten, da Wassertieren ja Wasser ohnehin in genügenden Mengen zur Verfügung steht. Bei Säugetieren aber wissen wir, daß z. B. das Schlucken trockener Stoffe (wie Hafer oder Heu) einem Pferde die größte Mühe macht, bei dem zwar der Schleim, nicht aber die Gesamtmenge des Speichels in den Mund gelangen kann (Ausschaltung der Ohrspeicheldrüse — *Claude Bernard*). „Je trockener, fester die Nahrung, desto mehr Speichel ergießt sich auf sie aus allen Speicheldrüsen“ (*Pawlow*). Ferner dient das Wasser bei Aufnahme scharfer oder schlecht schmeckender Stoffe zu deren Verdünnung: es wird nach Verfütterung solcher Stoffe ein besonders wasserreicher Speichel abgesondert (Verdünnungsspeichel — *Pawlow*).

Wahrscheinlich spielt auch bei *wirbellosen* Landtieren das Wasser des Speichels eine große Rolle als Schwemm- und Lösungsmittel. Wir wissen hierüber nur einiges bei gewissen Insekten: Füttert man Bienen mit trockenem Zucker (eingetrockneter Zuckerlösung) so bringen sie auf den Zucker einen Speicheltropfen, um die entstandene Lösung dann aufzulecken. Ähnlich verhalten sich Fliegen.

Absonderlich erwähnen müssen wir bei den Säugetieren noch die Bedeutung wässriger (seröser) Sekrete von Drüsen, die sich am Grunde jener Furchen befinden, deren Seitenwände die Geschmacksknospen beherbergen: Die Sekrete sollen die Furchen von eingedrungenen Nahrungsstoffen reinigen, die Geschmacksknospen stets wieder für ihre Funktion freimachend.

C. Eiweißlösende Fermente.

Der Speichel vieler Tiere enthält Stoffe, die, gleich den verdauenden Magen- und Darmsäften, gewisse Bestandteile der Nahrung aufzulösen imstande sind. Am bekanntesten ist das Verdauungsvermögen etwa des Menschenspeichels für

¹⁾ Der Schleim, den die Magenwand der Seeanemone abscheidet, hat verschiedene Aufgaben, u. a. ein leichtes Gleiten der Abfallstoffe zu ermöglichen, die den Magen durch die Mundöffnung verlassen müssen.

²⁾ Die Cirripeden besitzen einen Speichel, von dem zwar nicht bekannt ist, ob er Schleim enthält, der aber, als eine zähere Masse, die gekaute Nahrung zu einem Bissen zusammenballt.

³⁾ Auch viele andere Protozoen fangen ihre Beute mit Hilfe klebriger Sekrete. Ob es sich dabei aber um Schleime handelt, ist unbekannt.

Stärkemehl. Allein hierbei handelt es sich nicht um eine Unterstützung der Nahrungsaufnahme, mit der wir uns zunächst beschäftigen; wir werden später darauf zurückkommen. Anders in der Regel die Speichellarten, die Eiweiß auflösen; sie kommen bei einigen Wirbellosen vor. Wir nennen zuerst eine Meeresschnecke *Sycotypus canaliculatus*, Tintenfische (*Octopus*) und Spinnen. Diese Tiere sind einer besonderen Art der Nahrungsaufnahme fähig: *Sycotypus* frißt Austern und bemächtigt sich des Beutefleisches durch ein kleines Loch, das es in die Schale raspelt. Hat ein *Octopus* eine Krabbe verzehrt, so findet man auch die, an sich unverletzten Beine des Krusters, ihres Fleisches beraubt. Eine Spinne „saugt ihre Beute, z. B. eine Fliege, aus“ pflegt man zu sagen. Aber durch dieses „Aussaugen“ wird die Chitinhülle der Fliege aller ihrer Muskeln und anderer Organe beraubt! Kurz die in Frage stehenden Tiere bemächtigen sich des Beutefleisches dadurch, daß sie es durch einen Verdauungssaft in seiner eigenen Schale, seinem eigenen Panzer, verdauen, auflösen; die Lösung saugen sie dann ein¹⁾. Bezüglich der Art der Nahrungsaufnahme stehen die genannten Tiergruppen nicht vereinzelt da: Viele Insekten usw. verdauen ihre Beute bis zu einem gewissen Grade gleichfalls schon außerhalb des Körpers („Außenverdauung“), derart die mechanische Zerkleinerung des Kauens durch chemische Lösung ersetzend oder ergänzend. Ja die Larven von *Dytiscus*, *Myrmeleon* und *Lampyrus* bedienen sich der Außenverdauung in gleicher Weise wie Spinnen, *Octopus* und wohl auch *Sycotypus*: um nämlich das Beutefleisch aus dem schützenden Panzer herauszulösen. Aber, während im allgemeinen die Außenverdauung durch ausgespienen Mitteldarmsaft bewerkstelligt wird, bereiten Tintenfische, Spinnen und *Sycotypus* die notwendigen eiweißlösenden Fermente in *Speicheldrüsen*. Tatsächlich liefern die „hinteren“ Speicheldrüsen von *Octopus* und *Eledone*, die Speicheldrüsen von *Sycotypus canaliculatus*, die Unterkiefer- oder Pedipalpendrüsen²⁾ der Spinnen ein wirksames eiweißverdauendes Ferment.

Eiweißverdauende Speichel sollen noch bei einigen anderen Tieren vorkommen. So bei Bienen, deren Speichel neben anderen Eigenschaften, angeblich Eiweiß zu lösen vermag. Es handelt sich hierbei um das Eiweiß des Pollens, das während des Kauaktes schon verdaut oder doch angedaut wird. *Ankylostoma duodenale*, der Fadenwurm, der die sog. Gotthardkrankheit verursacht, lebt vornehmlich von der Schleimhaut des Menschen darmes, in dem er sich aufhält. *Loof* nimmt an, daß der Saft aus Speicheldrüsen des Wurmes das Gewebe der Schleimhaut auflöst. Endlich wird auch dem Speichel der Stechmücken eiweißlösende Wirkung zugeschrieben (*Schaudinn*)³⁾.

1) Bei *Sycotypus* ist der Vorgang noch nicht erwiesen.

2) Das sind Drüsen, die im Unterkiefer selbst liegen und an der zum Kauen dienenden Kante münden.

3) Der Weidenbohrer (*Cossus ligniperda*) bereitet einen Speichel, von dem man glaubte, er löse das zur Nahrung dienende Holz auf. Die Annahme hat sich nicht bestätigt.

D. Freie Säure.

Bei der Außenverdauung der Spinnen, Tintenfische usw. lernten wir die Art kennen, wie Speicheldrüsen den Schutz überwinden, den eine Chitinhaut oder ein Kalkpanzer dem Beutefleisch gewährt. Nunmehr beschäftigt uns eine ähnliche Einrichtung, die wohl vornehmlich da zur Anwendung kommt, wo der schützende *Kalkpanzer* besonders hart ist: Dann bedeutet schon das Anbringen einer ersten Öffnung in den Panzer eine für die mechanisch wirkenden Werkzeuge der Tiere unlösliche Aufgabe. Wieder sind es die Speicheldrüsen, die jene Werkzeuge unterstützen: Man kennt zahlreiche Seeschnecken, deren Speicheldrüsen freie Säure produzieren. Teils handelt es sich dabei um *Asparaginsäure*, teils um *Schwefelsäure*. Von *Dolium galea* kann man beträchtliche Mengen (von einem Tiere mehr als 50 ccm) solchen Speichels gewinnen. Er enthält an freier Schwefelsäure ungefähr 3 %, daneben etwa 0,5 % Salzsäure. Der Kalk des Stachelhäuterpanzers oder der Muschelschale wird unter der Einwirkung dieser Säuren brüchig und kann dann leicht von der *Radula* der Raubschnecke bearbeitet werden.

E. Speichel, der die Blutgerinnung hemmt.

Eine ganz andersgeartete Schwierigkeit haben Blutsauger bei der Nahrungsaufnahme zu überwinden. Das Säugetierblut, dessen sich solche Parasiten bemächtigen, würde an und für sich gerinnen und die Wunde verschließen, welche die stechenden Werkzeuge des Saugers verursachen. Man hat nun bei fast allen daraufhin untersuchten blutsaugenden Parasiten einen Speichel gefunden, der Blut, dem er zugesetzt wurde, am Gerinnen verhindert. Das gilt für den Blutegel, die Zecken und andere. Das wirksame Prinzip des Speichels vom Blutegel ist dargestellt worden und ist im Handel zu haben. Der Speichel dieser Parasiten wird durch zahlreiche einzellige Drüsen bereitet, die auf den Kieferschneiden zwischen den Zähnen münden und deren eigentlicher Körper zwischen den Saugmuskeln des Schlundkopfes (Saugpumpe) liegt. Derart wird durch den Saugakt selbst der Speichel in die durch die Kiefer verursachte Wunde getrieben. Das Blut wird ungerinnbar und kann ohne weiteres gesogen werden¹⁾.

F. Giftspeichel.

Wir können hier giftige Speichelsekrete anschließen, da es ja auch ihre Aufgabe ist, die Nahrungsaufnahme zu erleichtern: den (hier aktiven) Widerstand der Beute auszuschalten. Die „Oberkiefer“ (Cheliceren) der Spinnen, die „Kieferfüße“ der chilopoden Tausendfüßer sind Giftzangen, welche Giftdrüsen bergen, die wir ja auch zu den

1) Mücken (*Culex*) entleeren in die Stichwunde, die sie verursachen, Stoffe, welche die Gewebe des Wirts reizen, so daß mehr Blut zur Stichwunde zufließt, und welche wohl auch das zu saugende Blut ungerinnbar machen. Allein um Speichel handelt es sich hierbei nach *Schaudinn* nicht, sondern um einen Saft, den gewisse Sproßpilze abscheiden. Die Sproßpilze leben als „Commensalen“ in Vorderdarmverweiterungen der Mücke.

„Speicheldrüsen“ allgemeiner Definition rechnen können. Der Ausführungsgang der Drüsen mündet je an der Spitze der beiden Zangenäste. Die uns schon bekannten (hinteren) Speicheldrüsen der Octopoden liefern, neben eiweißverdauendem Saft, ein Gift, das die Beute (meist krebsartige Tiere) schnell tötet. Die Toxoglossen (Schnecken) haben eine Speicheldrüse, deren Gift sich durch die Rinne eines langen spitzen Radulazahnes in die Wunde ergießt, welche der Zahn sticht. Auch an die Giftdrüsen der Schlangen kann in diesem Zusammenhang erinnert werden.

II. Bestandteile des Speichels, welche an der eigentlichen Verdauung teilnehmen.

A. Eiweißverdauung.

Wir erwähnten Tiere, deren Speichel Eiweiß verdaut. Wir erkannten die Bedeutung dieser Verdauung in einer Erleichterung der Nahrungsaufnahme. Nichtsdestoweniger spielen diese Fermente auch eine Rolle bei der Verdauung. Sicher gilt das für die Schnecke *Sycotypus canaliculatus*, die abgesehen vom Speichel keinerlei eiweißverdauende Säfte bereitet.

B. Stärke- und Zuckerverdauung.

Die erste verdauende Wirkung eines Speichels, die man kennen lernte, war Stärkeverdauung durch Säugetier- (Menschen-) Speichel. Wir sind über die Verbreitung dieses Vermögens bei den verschiedenen Säugetieren merkwürdig ungenau unterrichtet. Es steht fest, daß der „gemischte“ Speichel¹⁾ von Mensch, Kaninchen und Schwein sehr energisch Stärke in Malzzucker verwandelt; daß dieses Vermögen bei Einhufern wenig, bei Wiederkäuern noch weniger ausgesprochen ist, und bei den Carnivoren (z. B. dem Hunde) gänzlich fehlt. Die angedeutete Wirkung kommt erst im Magen zur vollen Geltung. Wir haben daher allen Grund zu folgender Annahme: Das Ferment (das „Ptyalin“) ergießt sich zu dem Zwecke in den Mund, um durch den Kauakt gründlich mit den stärkehaltigen Pflanzenstoffen vermengt zu werden²⁾. Ohne uns hier auf eine Spekulation darüber einlassen zu können, warum stärkelösender Speichel bei diesem Pflanzenfresser vorhanden ist, während er jenem fehlt, wollen wir nur feststellen, daß bei einigen Wirbellosen ähnliches Verhalten nachweisbar ist, wie etwa beim Menschen. Die Lungenschnecken sondern einen Speichel ab, der neben dem besprochenen Schleim und Wasser, *Stärke*, *Rohrzucker*, *Cellulose* und noch andere Kohlehydrate verdaut. Ganz analoge Fermente finden sich aber auch im Magensaft. Es unterliegt also keinem Zweifel, daß hier ebenfalls der Speichel während der Nahrungsaufnahme durch die Radula, innig — durch den Raspelakt selbst — mit der Nahrung

vermengt werden soll. Das wird uns noch deutlicher, wenn wir erfahren, daß die Seeschnecke *Aplysia* (der Seehase), bei der die Nahrung in einem „Kau Magen“ durch starke Zähne ohnehin innig mit dem Magensaft verknetet wird, nur ganz unbedeutende Speicheldrüsen besitzt, deren Funktion kaum in Betracht kommen dürfte.

Speichel, der auf Zuckerarten und Stärke wirkt, findet sich noch bei anderen Wirbellosen: bei Isopoden (*Ligia oceanica*), Orthopteren (Küchenschabe). Die Bienen verdauen („invertieren“) den Rohrzucker des Nektars bei der Honigbereitung mit Hilfe eines Speichels, der auch, allerdings in geringem Grade, Stärkemehl verdaut.

III. Speichelsekrete, die anderen Zwecken als der Ernährung dienen.

A. Der Speichel dient zum Bauen.

Daß der Coconfaden, mit Hilfe dessen z. B. die *Schmetterlingsraupen* sich vor der Verpuppung einspinnen, ein Sekret von Munddrüsen ist, dürfte allbekannt sein¹⁾. Aber noch in anderer Weise wird Speichel zum Bauen der Wohnung benutzt. Er dient den *Ameisen* als Bindemittel bei Herstellung ihrer Erdbauten, oder bei der Bereitung des „Cartons“, aus dem manche das Nest formen (z. B. *Lasius fuliginosus*, dessen entsprechende Drüse, die „Mandibulardrüse“, besonders gut entwickelt ist). Das Weibchen von *Julus terrestris* baut aus Speichel und Erde eine Art Nest für seine Eier. Endlich kommt Nestbau, Ankleben des Nestes und der Eier in ihm mit Speichel bei den *Cypseliden* (Seglern) vor. Insbesondere *Collocalia esculenta* baut ihr eßbares Nestchen ganz aus Speichel²⁾.

B. Speichelsekrete, die als Nahrung für fütterungsbedürftige Individuen der Insektenstaaten Verwendung finden.

Die eigentliche Nahrung für die Jugendstadien der *Termiten*, die noch kein Holz fressen können, sowie für diejenigen Larven, aus denen Ersatzkönige und -königinnen gezogen werden sollen, ist das Sekret einer Speicheldrüse, die an der Unterlippe mündet. Ähnliches soll für die Ameisen, ja nach manchen Autoren auch für die Bienen gelten.

Hiermit wollen wir unsere Übersicht abschließen. Bedenkt man, wie wenig das ungeheure Gebiet der vergleichenden Physiologie bisher durch-

¹⁾ D. h. das gemischte Sekret aller Speicheldrüsen, wie es im Munde zur Wirkung kommt.

²⁾ Für Stärkemehl, das sich in der Natur bekanntlich in den Cellulosehüllen der Pflanzenzellen eingeschlossen zu finden pflegt, dürfte jene Vermengung mit Ferment durch den Kauakt von besonderer Wichtigkeit sein. Daher die relative Verbreitung stärkeverdauender Speichel.

¹⁾ Manche Ameisen bauen ihr Nest dadurch, daß sie Blätter durch Gespinstfäden miteinander verweben. Als „Webeschiffehen“ bedienen sie sich ihrer Larven, die gleich den Schmetterlingsraupen Spinnndrüsen besitzen. Die Larven werden von den Arbeiterinnen zwischen die Kiefer genommen, und der zum Larvenmund austretende Gespinstfaden von einem Blatt zum andern hin und hergezogen. *Chun* beschreibt diese Drüsen bei *Oecophylla* Larven als vier auffällig große Schläuche, die den Körper der Länge nach durchziehen. Sie münden an der Unterlippe. (*Chun*, Aus den Tiefen des Weltmeeres. 1903, A. 2, S. 129.)

²⁾ Nach Ansicht mancher Autoren soll das Bienenwachs für seine Verwendung zum Wabenbau durch Kauen mit Speichel vorbereitet werden.

forscht ist, so wird man die hier angeführten Beispiele als Ausdruck einer überraschenden Mannigfaltigkeit ansehen wollen. Wie weit die Möglichkeit vielseitiger Verwendung dieses einen Organs geht, wer vermag es heute auch nur zu erraten?

Die neueren Vorstellungen von der Struktur der Atome¹⁾

Von Dr. Kasimir Fajans, Karlsruhe i. B.

Die Untersuchungen der letzten zwanzig Jahre über das Wesen der neu entdeckten Strahlenarten und das Verhalten, das sie bei ihrem Durchgang durch Materie zeigen, haben außerordentlich wichtige Aufschlüsse über eines der interessantesten Probleme der Physik und Chemie — die Struktur der Atome der chemischen Elemente — geliefert.

Bekanntlich faßt man die Teilchen der Kathodenstrahlen, die *Elektronen*, auf als die weiter unteilbaren Atome freier negativer Elektrizität mit einer Ladung von $1,59 \cdot 10^{-20}$ E. M. E.²⁾ der Elektrizitätsmenge und einer Masse, die nur zirka $\frac{1}{1800}$ der des Wasserstoffatoms beträgt. Diese Masse der Elektronen denkt man sich als nur von ihrer Ladung herrührend. Es muß bemerkt werden, daß ein elektrisch *geladenes* Teilchen eine größere Masse haben muß als das gleiche *ungeladene* Teilchen, denn beim geladenen gehört zur Erzeugung derselben Beschleunigung eine größere Kraft als beim ungeladenen; bei seiner Bewegung entsteht nämlich im äußeren Raum ein magnetisches Feld, dessen Energie ja nur auf Kosten der Arbeitsleistung der Kraft erzeugt werden kann. Es zeigt sich, daß diese Vergrößerung der Masse eines als Kugel vom Radius a gedachten Teilchens, das eine Ladung e trägt,

gleich ist $m = \frac{2}{3} \cdot \frac{e^2}{a}$. Die spezielle Annahme,

die man bei den Elektronen macht, ist, daß man ihre *ganze* Masse als von der Ladung herrührend ansieht, d. h., daß sie nur eine sog. elektromagnetische Masse besitzen. Aus der obigen Formel läßt sich auf Grund dieser Auffassung der Radius der kugelförmig, gedachten *Elektronen* berechnen zu

$$a = \frac{2}{3} \frac{e}{m} \cdot e = \frac{2}{3} 1,78 \cdot 10^7 \cdot 1,59 \cdot 10^{-20} = 1,9 \cdot 10^{-13} \text{ cm}^3)$$

während der Radius der *Atome* zu zirka 10^{-8} cm angenommen wird.

Wenn diese kleinen Elektronen, als Kathoden- oder β -Strahlen, große Geschwindigkeiten besitzen, haben sie die Fähigkeit größere Dicken von Materie zu durchqueren. Sie teilen diese Eigenschaft

mit den Röntgen- und γ -Strahlen und auch mit den α -Strahlen der radioaktiven Substanzen, die sehr schnell bewegte positiv geladene Heliumatome darstellen, und man ist bei der Deutung dieser Erscheinungen zu der Annahme gelangt, daß diese Strahlen bei ihrem Durchgang durch die Materie nicht nur in den freien Räumen zwischen den Atomen sich bewegen, sondern durch die Atome selbst zu fliegen imstande sind¹⁾.

Man konnte deshalb hoffen von ihrem Verhalten innerhalb der Atome Aufschlüsse über die Struktur dieser selbst zu erhalten.

Nun zeigten die eingehenden Forschungen, daß von einem Schwarm von Kathodenstrahlteilchen es durchaus nicht allen gelingt ungehindert eine gegebene noch so dünne Materieschicht zu durchdringen. Ein Teil von ihnen wird aufgehalten oder, wie man sagt, absorbiert, ein anderer von ihrer geradlinigen Bahn abgelenkt oder, wie man sagt, zerstreut. Untersucht man nun genauer, wie sich verschiedene Substanzen in bezug auf diese ihre Wirkung verhalten, so findet man, wie *P. Lenard*²⁾ zuerst gezeigt hat, ein äußerst einfaches Gesetz: gleiche Gewichtsmengen der verschiedensten Substanzen von verdünntem gasförmigem Wasserstoff bis zu metallischem Gold zeigen in erster Annäherung gleiche absorbierende oder zerstreuende Wirkung auf die Kathodenstrahlen.

Die Wirkung gleicher Zahl von Atomen, und deshalb auch eines Atoms der verschiedenen Elemente, ist also ungefähr proportional dem Atomgewichte. Dieses von *Lenard* gefundene Gesetz zeigte deutlich, daß dasjenige, was in der Materie auf die Kathodenstrahlen wirkt, in den verschiedenen Atomen in Quantitäten vorhanden ist, die proportional dem Atomgewichte sind. Was wirkt nun in den Atomen auf die Kathodenstrahlteilchen ein? Ein solches Teilchen stellt ja eine freie negative elektrische Ladung vor. Auf die Bewegung einer solchen können aber nur elektrische und magnetische Kraftfelder einen Einfluß haben. Da aber ein magnetisches Feld auf bewegte Elektrizität zurückzuführen ist, muß man schließen, daß ein nach außen neutrales Atom in seinem Innern elektrische Ladungen und zwischen ihnen elektrische Felder enthalten muß. Aus dem besprochenen Verhalten der verschiedenen Atome gegenüber den Kathodenstrahlen wird man auch gleich schließen können, daß diese Felder und Ladungen bei schwereren Atomen stärker sein werden als bei denen von kleinerem Gewicht.

Wie soll man sich nun diese innerhalb eines Atoms vom Radius 10^{-8} cm eingelagerten elektrischen Felder denken? Was sind die negativen und positiven Ladungen, zwischen denen die Kraftlinien des Feldes laufen? Dies waren nun und sind es auch jetzt noch die wichtigsten Fragen, die die Erforschung des Atombaues zu lösen hatte.

Ein Teil des Problems ließ sich nun leicht beantworten, denn die negative freie Elektrizität haben wir ja in den Elektronen kennen gelernt.

¹⁾ Vergl. *W. H. Bragg*, Studies in Radioactivity, London 1912.

²⁾ Vergl. *P. Lenard*, Über Kathodenstrahlen, Leipzig 1906.

¹⁾ Bearbeitet nach dem zweiten Teil der am 17. Dezember 1912 an der Techn. Hochschule Karlsruhe i. B. gehaltenen Habilitationsvorlesung. Vgl. Verhandl. des Naturwissenschaftlichen Vereins in Karlsruhe.

²⁾ Die elektromagnetische Einheit (E. M. E.) der Elektrizitätsmenge ist gleich 10 Coulomb oder 3×10^{19} elektrostatische Einheiten der Elektrizitätsmenge.

³⁾ $1,78 \times 10^7$ E. M. E. ist der Wert des Verhältnisses der Ladung zur Masse $\left(\frac{e}{m}\right)$ der Elektronen.