Schreiben des Herrn *E. Becker* an den Herausgeber.

In № 1195 d. Bl. ist von *Powalky* gezeigt, dass der am 11. März 1825 von *Bessel* in Zone 280 beobachtete Stern

$$(9^m) \ 9^h 51^m 59^s 82, \ +16^\circ 45' 12'' 5$$

sehr wahrscheinlich der Planet ⁽²⁹⁾ *Amphitrite* gewesen. Die Berechnung der allgemeinen Störungen dieses Planeten, welche ich behufs Construction von Tafeln ausgeführt, hat die Entscheidung dieser Frage ermöglicht und zwar *Powalky's* Vermuthung bestätigt. Ich habe die Berechnung der allgemeinen Störungen auf die Planeten Jupiter, Saturn und Mars ausgedehnt; bei den Jupitersstörungen sind in der mittleren Anomalie und dem Log. Rad.Vector die Glieder vom Quadrate der störenden Kraft, sowie die von den Säcularänderungen der Jupitersbahn herrührenden Glieder berücksichtigt; in den Störungen der Breite habe ich die Glieder von höherer als der ersten Ordnung übergangen, da dieselben, den Gliedern der ersten Ordnung nach zu urtheilen, nur wenig Merkliches geben konnten. Ausser dem *Bessel'schen* Orte wurden der definitiven Bahnverbesserung 12 Normalörter der Erscheinungen 1855—1868 incl. zu Grunde gelegt; die Auflösung der Bedingungsgleichungen für die Incremente der sechs elliptischen Elemente, und den Verbesserungsfactor der den Störungen zu Grunde liegenden *Bessel'schen* Jupitersmasse, unter Annahme gleichen Gewichtes ergab kein genügendes Resultat, da die Summe der Fehlerquadrate nur bis auf nahe 170" sank; der *Bessel'sche* Ort liess freilich nur resp. 4"1 und 1"5 Fehler übrig, indess überstiegen die übrigbleibenden Fehler von mehreren andern Normalörtern weit diejenigen wahrscheinlichen Fehler, welche sich aus der inneren Uebereinstimmung der den Normalort constituirenden Beobachtungen ergeben hatten; namentlich zeigte der Normalort der Erscheinung 1868, welcher aus 16 trefflich harmonirenden Beobachtungen der Sternwarten Greenwich, Leiden, Paris und Warschau gebildet war, die beträchtliche Abweichung von resp. +7"5 und 2"7. Durch Ausschluss entweder des *Bessel'schen* Ortes oder des Ortes für 1868 sank die Summe der Fehlerquadrate zwar auf nahe die Hälfte; indess lag, weder den einen, noch den andern Ort auszuschliessen, genügender Grund vor. Die Richtigkeit der Störungswerthe der in Betracht gezogenen Planeten war mir, zumal bei den vielen Controllen, welche *Hansen's* Methoden gewähren, ziemlich unzweifelhaft; es lag

daher nahe zu vermuthen, dass die Einwirkung der nicht in Rechnung gezogenen Planeten, vorzüglich der Erde und Venus, während des langen Zeitraumes von 1825—1868 merklich sei. Die directe Berechnung der Störungen dieser Planeten schien mir in ökonomischer Hinsicht und in Anbetracht des zu erlangenden Resultates nicht rathsam, um so mehr als ich aus der früheren Auflösung bereits den Schluss ziehen konnte, dass dem Werthe des Verbesserungsfactor der Jupitersmasse ein sehr geringes Gewicht zukommen würde; ich schlug daher den Weg der empirischen Bestimmung der hauptsächlich in Betracht kommenden Störungsglieder ein.

Die Vergleichung der mittleren Bewegungen der *Amphitrite* und der Erde zeigte, dass möglicherweise dem Argumente $4g - 1g'$, wo g und g' die mittleren Anomalien von *Amphitrite* und Erde bezeichnen, ein merkliches Störungsglied der mittleren Anomalie entsprechen würde, da $4 - \frac{1n'}{n} = -0.083068$. Da die Periode desselben 49,2 Jahren, so konnte der Einfluss desselben in dem Zeitraum von 1825—1868 durch eine Aenderung der mittleren Bewegung nicht beseitigt werden. Auf demselben Wege liess sich erkennen, dass in den durch Venus erzeugten Störungen kein irgend merkliches periodisches Störungsglied vorhanden. Ausserdem war aber ein Einfluss derjenigen Glieder zu befürchten, welche ausser mit der Zeit mit dem Sinus resp. Cosinus der Anomalie des gestörten Planeten multiplicirt werden, und welche hier aus der vereinigten Einwirkung von Erde und Venus hervorgehen konnten. Indem ich diese Glieder in Form von

$$h.t_1 \cos \varepsilon + k.t_1 \sin \varepsilon + l \cos (4g - 1g') + m \sin (4g - 1g')$$

wo t_1 in Jahren ausgedrückt und ε die excentrische Anomalie der *Amphitrite* bezeichnet, in die 26 Bedingungsgleichungen einführte, erhielt ich durch Auflösung derselben für obige vier Unbekannte die Werthe

$$\begin{aligned} h &= -0''1556 \pm 0''0676 \\ k &= -0,0277 \pm 0,0847 \\ l &= +5,78 \pm 2,38 \\ m &= +4,51 \pm 0,85 \end{aligned}$$

womit die Darstellung der Orte die folgende:

	$\Delta \alpha \cos \delta$	$\Delta \delta$
1825	+1''25	+2''62
1854	-1,86	-1,82
1855	+0,12	-1,07
1856	+1,15	-0,62
1858	+1,34	-0,05
1859	-0,54	+1,64
1860	-0,94	-1,82
1862	-1,74	-1,75
1863	+1,16	+0,93
1864	+0,23	+0,02
1866	-0,02	-0,51
1867	-0,96	-2,58
1868	+0,72	-0,67

Die Summe der Fehlerquadrate beträgt 44''20 und der wahrscheinliche Fehler eines Normalortes $\pm 1''16$. Ich bemerke hier, dass dem *Bessel*'schen Orte eine aus Vergleichung mit anderen Catalogen abgeleitete allgemeine Correction der Zone von resp. $+1''35$ und $+1''65$ zugefügt worden ist.

Der Grösse der wahrscheinlichen Fehler nach zu urtheilen, kommt den obigen Werthen der mit der Zeit multiplicirten Glieder nur ein geringer Grad von Realität zu; grösser scheint diese bei den periodischen von der Erde erzeugten Glieder zu sein; wie dem aber auch sei, immerhin ist eine wenigstens graphische Ausgleichung dadurch erreicht, welche wohl für längere Zeit genügen dürfte. Der Verbesserungsfactor der *Bessel*'schen Jupitersmasse ergab sich zu $\mu = +0,000488$, womit die Masse dem von *Krüger* aus der Themis gefolgerten

Werthe nahe kommen würde, $m' = \frac{1}{1047.37}$; indess ist das Gewicht der Verbesserung ein so geringes ($r(\mu) = +0,00124$), dass derselben wohl kaum Realität zuerkannt werden kann. Unter Ausschluss dieser Unbekannten habe ich daher das Gleichungssystem nochmals aufgelöst, und die folgenden Werthe der obigen Unbekannten erhalten:

$$\begin{aligned} h &= -0''1567 \quad \pm 0''0651 \\ k &= -0,0230 \quad \pm 0,0797 \\ l &= +5,17 \quad \pm 1,60 \\ m &= +4,45 \quad \pm 0,84 \end{aligned}$$

welche nur wenig von den obigen Werthen abweichen.

Die Darstellung war in diesem Falle

	$\Delta \alpha \cos \delta$	$\Delta \delta$
1825	+1''20	+2''55
1854	-1,96	-1,76
1855	+0,30	-1,06
1856	+1,12	-0,63
1858	+1,48	-0,13
1859	-0,78	+1,61
1860	-1,01	-1,84
1862	-1,62	-1,77
1863	+1,13	+0,94
1864	+0,42	+0,10
1866	-0,09	-0,46
1867	-0,87	-2,58
1868	+0,66	-0,73

gleichfalls wenig von der früheren verschieden. Die Summe der Fehlerquadrate beträgt 44''27, woraus der wahrscheinliche Fehler eines Normalortes zu $\pm 1''12$ folgt.

Auf dem aus dieser Auflösung hervorgegangenen Elementensystem beruhen die Tafeln, welche ich in Kürze zu publiciren gedenke. In Betreff der Störungstafeln bemerke ich noch, dass die grösseren Glieder in Tafeln mit einfachem Eingange gebracht sind, die kleineren Glieder in Tafeln mit doppeltem Eingange, so zwar, dass bei sämmtlichen das Horizontalargument, aus welches die Zeit nach dem jedesmal letzten Periheldurchgange gewählt ist, dasselbe, das Verticalargument für eine jede Tafel während eines Umlaufes des Planeten um die Sonne constant ist. In Folge des ersteren Umstandes braucht bekanntlich die Interpolation in horizontaler Richtung erst am Schlusse der ganzen Störungsrechnung über die Summe der sämmtlichen gleichartigen Glieder zu geschehen, und zwar wenn man sich bei Berechnung von Ephemeriden des Intervalles der Tafeln (= 16 Tage) bedient, mit constantem Interpolationsfactor.

Die Zahl der Störungstafeln beträgt für die mittlere Anomalie und den Log. Rad. Vector je 17, für die Störungen der Breite 14, wozu noch bei der mittleren Anomalie eine die empirisch bestimmte periodische Ungleichheit enthaltene Tafel kommt, da das mit der Zeit multiplicirte Glied der die gleichartigen Glieder enthaltenden Tafel einverleibt werden kann.

Berlin, 1869 April 7.

E. Becker.