dann 5 ccm basische Bleiacetatlösung zu und fällt im Filtrat das überschüssige Blei durch Natriumsulfat aus. 25 ccm des Filtrates werden zur Beseitigung der Birotation zum Sieden erhitzt, nach dem Abkühlen zu 50 ccm aufgefüllt und polarisiert. Weitere 25 ccm des genannten Filtrates werden invertiert, indem man sie über Nacht mit 2,5 ccm Salzsäure stehen läßt. Nach der Neutralisation der Säure werden auch sie auf 50 ccm aufgefüllt und polarisiert. Alle Ablesungen sind mit 4 zu multiplizieren. Zur Berechnung des prozentualen Saccharosegehaltes (S) dient die Formel:
$$S = \frac{(a - b) 1,05 \cdot x}{144 - \frac{1}{2} t},$$
 in der x das bei der Auflösung des vorhandenen Zuckers in 100 ccm Wasser entstehende Volumen bedeutet. Lactose wird berechnet nach der Formel: $4,662 \cdot c \cdot X = \% \text{ Lactose}$; x hat hier dieselbe Bedeutung, c ist die Ablesung bei 86°. — Das Butterfett in Milkschokolade kann annähernd aus der Reichert-Meißl'schen Zahl des extrahierten Fettes ermittelt werden. Da Kakao-butter nur eine sehr niedrige Reichert-Meißl-Zahl hat (0,45), ist deren Gegenwart ohne erheblichen Einfluß. Selbstverständlich ist es nicht möglich, auf diese Weise die Menge des zur Herstellung der Schokolade verwendeten Milchpulvers zu ermitteln; dies ist auch nicht von Bedeutung, da es festzustellen genügt, daß die vorhandene Menge Butterfett annähernd der zur Herstellung solcher Schokolade üblichen Menge von Milchpulver entspricht.

C. A. Neufeld.

H. Matthes und Fr. Müller: Die Bestimmung der Rohfaser in Kakaowaren. (Zeitschr. öffentl. Chem. 1907, 13, 1—3.)

H. Matthes: Erwiderung: „Zur Kakaofrage“. (Zeitschr. öffentl. Chem. 1907, 13, 3—6.)

A. Goris und L. Arnould: Konservierung und Sterilisierung der frischen Kolanüsse. (Bull. Sciences Pharmacol. 1907, 14, 159—161.)

E. Perrot und A. Goris: Über die chemische Zusammensetzung der Kolanuß. (Bull. Sciences Pharmacol. 1907, 14, 576—593.)

A. Goris: Über die chemische Zusammensetzung der Kolanuß. (Bull. Sciences Pharmacol. 1907, 14, 645—648.)

A. Goris und J. Chevalier: Die pharmakodynamischen Eigenschaften des Kolatins. (Bull. Sciences Pharmacol. 1907, 14, 648—650.)

H. Mastbaum: Über ein fettspaltendes Enzym der Kolanuß. (Chem. Rev. Fett- u. Harzindustrie 1907, 14, 5—7, 31—34 u. 44—46.) — Vergl. Z. 1907, 14, 236.

Gärungserscheinungen.

Ferdinand Stockhausen: Ökologie, „Anhäufungen“ nach Beijerinck. Beiträge zur natürlichen Reinzucht. (Wochenschr. Brauerei 1907, 24, 285—289, 301—304, 313—316 u. 325—331.) — Ein zusammenfassender Bericht, in welchem Verf. die hervorragenden, teilweise bahnbrechenden Forschungen Beijerincks auf dem Gebiete der „Anhäufungen“ unter dem Gesichtswinkel der „natürlichen Reinzucht“ gesichtet und verarbeitet hat. Der Bericht ist auch in Buchform erschienen. — Durch Auswahl geeigneter Lebensbedingungen (Änderung der Nährflüssigkeit, Luftabschluß oder -zutritt, verschiedene Temperaturen usw.) bringt Beijerinck aus dem gleichen natürlichen Material unter den verschiedenartigsten Mikroorganismen die jedesmal gewünschte Art zur vorherrschenden Entwicklung, zur praktischen Reinkultur. Die Forschungen verfolgen also ganz unabhängig das gleiche Ziel wie die von Delbrück begründete Lehre von der „natürlichen Reinzucht“. Im ersten Teil wird die räumliche Sonderung bei beweglichen Bakterien durch Niveaubildung und durch Atmungsfiguren besprochen, wobei außer der Zusammensetzung der Nährlösung Luft und teilweise auch Licht als Hauptfaktoren in die Erscheinung treten. Der zweite Teil behandelt die Anhäufungsversuche, bei welchen die Sonderung der Rassen und Arten

durch Unterdrückung der unter den gegebenen Kulturverhältnissen schwächeren Rasse vermöge schnellerer Entwicklung der stärkeren erfolgt. Auch hier sind zunächst Zusammensetzung der Nährlösung und Lüftungsverhältnisse von bestimmendem Einfluß. Dazu tritt noch als wesentlicher Faktor die Temperatur. In einem Nachtrag wird noch die Anhäufung von Cellulose zersetzenden aeroben Mikroorganismen, die Anhäufung von denitrifizierenden Meeresbakterien und anderen Mikroben, ferner die Trennung der Mycoderma von Essigkakterien, sowie die gleichzeitige Anhäufung von Schizosaccharomyces Pombe und octosporus mitgeteilt.

H. Will.

Th. Bokorny: Über die Trennung von Leben und Gärkraft in der Hefe. (Pflüger's Arch. 1906, 14, 535—544.) — Die Versuche des Verf.'s erstrecken sich auf die Einwirkung von Schwefelsäure, Formaldehyd und Sublimat auf Hefe. Die Ergebnisse sind die folgenden: 1. Die Zymase kann durch 0,5 %ige Schwefelsäure unwirksam gemacht werden; sie wird dadurch getötet ebenso wie das Protoplasma der Hefe. 2. Man kann die Menge der 0,5 %igen Schwefelsäure so wählen, daß dadurch das Hefeprotoplasma getötet wird, die Zymase zum größten Teil aber noch wirksam bleibt. 2 ccm der 0,5 %igen Schwefelsäure haben diese Wirkung auf 2 g Brauereipreßhefe; 3 ccm töten auch die Zymase ab. Zu erklären ist dies nur aus der quantitativen Wirkung der Gifte unter der Annahme, daß das Protoplasmaeiweiß das Gift rascher in sich aufnimmt als die Zymase. 3. Es zeigte sich, daß 0,025 g Formaldehyd, die 2 g Preßhefe völlig abtöten, noch eine Spur Gärkraft übrig lassen, während 0,015 g zwar töten, aber die Gärkraft zum Teil noch bestehen lassen. Beim Sublimat genügen 0,005 g, um die gänzliche Abtötung von 10 g Preßhefe zu bewirken, die Gärkraft bleibt jedoch erhalten.

Max Müller.

J. Lebedeff: Zur Wirkung von Oxalsäure auf Brauerei- und Preßhefe. (Wochenschr. Brauerei 1907, 24, 182—184 und 197—199.) — Die Untersuchungen wurden mit reinen gewaschenen und gepreßten Heferassen, zwei untergärigen Hefen aus der Hefezuchtanstalt des Instituts für Gärungsgewerbe in Berlin, Rasse II und XII, durchgeführt. Sie bestanden sowohl in Gärkraft- wie auch in Triebkraftbestimmungen mit nachfolgender Kontrolle, durch welche der Prozentsatz der zur Triebkraftbestimmung verwendeten Hefen an toten Zellen nach zweistündiger Gärung ermittelt wurde. Ergab der mikroskopische Befund 100 % tote Zellen, so wurde eine Öse der hefehaltigen Flüssigkeiten in 10—15 ccm Würze geimpft, um festzustellen, ob unter den toten Zellen noch einzelne lebende waren. Verf. kommt zu folgenden Schlußfolgerungen: 1. Die Oxalsäure in sehr geringen Mengen (bis 0,05 %) dient für die Hefe in Würze als Erreger, in größeren Mengen schädigt sie zunächst die Zymase der Hefe und die Vermehrungsfähigkeit; bei 0,4 bis 0,5 % tötet sie alle Hefezellen nach 2 Stunden. 2. Die Oxalsäure übt in Zuckerlösung schon von 0,001 % an eine schädliche Wirkung auf die Hefe aus und bei 0,1 bis 0,2 % werden alle Hefezellen getötet. 3. Die Oxalsäure in gebundenem Zustande (oxalsaurer Kalk) ist bei 0,25 % für die gärende Hefe schädlich, doch in schwächerem Grade als freie Oxalsäure. 4. Gips und Asparagin schwächen die schädliche Oxalsäurewirkung und zwar erhöhen sie beide weit mehr die Lebensfähigkeit und die Angärungskraft als die schließliche Gärleistung der Hefe. 5. Auf die Zymase in Hefepreßsaft (nach Buchner) hat die Oxalsäure in Mengen bis einschließlich 0,03 % keinen Einfluß; 0,04 bis 0,05 % Oxalsäure vernichten die Zymase vollständig.

H. Will.

H. Lange: Über den physiologischen Zustand der Hefe. (Wochenschr. Brauerei 1907, 24, 417—421, 433—436, 445—449, 457—463, 474—476, 489—491, 505—515 u. 521—524.) — Verf. studierte die Veränderungen in der Enzymbilanz und damit des physiologischen Zustandes der fertigen Hefe

unter Ausschluß des Wachstums und nach Möglichkeit der Ernährungseinflüsse. Die Arbeit gliedert sich in Untersuchungen: a) über die Veränderungen des Enzymbestandes der Hefe unter dem Einfluß der Temperatur, Luft und Ernährung; b) über enzymatische Veränderungen (Gärkraft) der Hefe durch Reizstoffe; c) über Giftwirkungen von Getreideschrot auf Hefen, Bakterien und Schimmelpilze. Verf. hebt aus den Versuchsergebnissen folgendes hervor: 1. Der physiologische Zustand der Hefe ist, bedingt durch den Bestand und die Tätigkeit ihrer Enzyme. 2. Auf die Veränderungen des Enzymbestandes und die Arbeitsleistung der Enzyme sind von Einfluß: a) Temperatur sowohl in ruhender wie in gärender Hefe; b) Lüftung; c) Ernährung; d) Reizwirkungen. 3. Durch die genannten Einflüsse kann die Gärleistung einer bestimmten Zellenzahl in dem gleichen Zeitraum um ein mehrfaches erhöht werden. 4. Die Hefe wird durch Reizwirkungen zur Zymasebildung veranlaßt. 5. Durch Schrot oder Mehl von Weizen, Roggen und Gerste wird eine starke Giftwirkung auf Hefe hervorgebracht. Gewisse Heferassen werden in kürzester Frist bis über 95 % der Zellen durch den Giftstoff getötet. (Mais und Hafer zeigten die Giftwirkungen nach den bisherigen Versuchen nicht.) 6. Am empfindlichsten gegenüber diesem Giftstoff sind die untergärigen Brauereihefen in Saccharoselösungen mit destilliertem Wasser unter Zusatz von Getreideschrot. Weniger empfindlich sind die Brennereihefen. 7. Die bisherigen Untersuchungen weisen darauf hin, daß der Giftstoff unter den eiweißartigen Stoffen zu suchen ist.

H. Will.

René Devloo: Über die Reindarstellung des „Bios“ von Wildiers. (La Cellule 1906, 23, 361; Wochenschr. f. Brauerei 1907, 24, 68—71.) — Verf. kommt zu folgenden Schlüssen: Das aktive Prinzip des Bios von Wildiers ist ein Molekül, das sich in den Lecithinen, so wie man sie bislang dargestellt hat, vorfindet. Es ist eine Stickstoffbase, die keine Beziehung zum Cholin hat, wahrscheinlich eine Monostickstoffverbindung, ein Amin mit noch einem freien Wasserstoffatom des Ammoniakradikals. Dies geht aus seinen unzweifelhaften Eigenschaften hervor, mit $\text{HgCl}_2 + \text{Ba(OH)}_2$ fällbar und in Phosphormolybdänsäure löslich zu sein. Die chemischen Eigenschaften sind folgende: 1. Es ist leicht löslich in Wasser; 2. nicht destillierbar; 3. das Chlorhydrat, Sulfat und Oxalat ist in Wasser und 75 %-igem Alkohol löslich; es ist mit Sublimat, das mit Barythydrat neutralisiert ist, als weißer Niederschlag fällbar, dessen Quecksilber nur schwer ganz zu entfernen ist. Es läßt sich nur zum Teil fällen mit über 80 % Alkohol und durch folgende Gemische: 2 Volumen Alkohol von 80 % und 1 Volumen Äther, Aceton oder Chloroform; 4. Alkohol unter 80 %, Bleiacetat, Bleiessig, Silberlösung, neutral, sauer oder alkalisch, Quecksilber in saurer Lösung, Phosphormolybdänsäure, Phosphorwolframsäure, alkoholische Platinchloridlösung und Jodkaliumquecksilber fällen es nicht; 5. es ist in der Natur sehr weit verbreitet und ist keines von den Alkaloiden oder Glykosiden, die bislang dargestellt wurden; 6. es findet sich stets neben dem Cholin, ohne in chemischer Beziehung zu diesem zu stehen, denn weder das Handelscholin noch dessen Zersetzungsprodukt können es in Mineral-Zuckerlösungen ersetzen, um ein Wachstum der Hefe zuwege zu bringen; 7. es ersetzt in den bis jetzt vorliegenden Handelslecithinen das Cholin etwa zur Hälfte der stickstoffhaltigen Substanz. Wahrscheinlich ist es die Base eines phosphorhaltigen Fettkörpers, der dem Lecithin ähnlich ist.

H. Will.

Carl Bergsten: Wie verschafft man sich leicht zwei der interessantesten aller Gärungserreger, *Schizosaccharomyces Pombe* und *octosporus*? (Wochenschr. Brauerei 1907, 24, 99.) — Als Ausgangsmaterial für die Beschaffung der beiden *Schizosaccharomyceten* dienen asiatische Korinthen. Man gibt eine Anzahl der Korinthen in ein mit 10 %-iger steriler Würze zur Hälfte gefülltes Kölbchen von 100—150 ccm Inhalt und setzt soviel sterile chemisch reine

Milchsäure zu, daß die Säuerung 8—11 % Normalsäure beträgt. Das mit einem Wattepfropfen verschlossene Kölbchen wird bei 35° C aufgestellt, bis Gärung eingetreten ist. Die Konkurrenten gehen zugrunde und es bleiben nur *Schizosaccharomyces Pombe* und *octosporus* übrig. Sind die Gärungserscheinungen unzweifelhaft eingetreten, so werden Würzeagarplatten gegossen. *H. Will.*

H. Will: Beiträge zur Kenntnis der Sproßpilze ohne Sporenbildung, welche in Brauereibetrieben und deren Umgebung vorkommen. III. (Zentralbl. Bakteriöl. II. Abt. 1906, **17**, 3—11, 75—90, 137—151, 331—344, 428—445, 604—614, 693—712 und Zeitschr. ges. Brauw. 1907, **30**, 81—85 u. 104—108.) — Nachdem in den beiden ersten Mitteilungen ausschließlich die für die Brauereipraxis bedeutsamen Untersuchungsergebnisse mitgeteilt worden waren, folgt in der dritten Mitteilung eine umfassende Beschreibung der in drei Gruppen geordneten Organismen hinsichtlich der Zellformen, ferner der Wachstumserscheinungen in und auf flüssigen sowie festen Nährböden. Das Verhalten der 14 Arten gegenüber den Zuckerarten ist ein verschiedenes. Milchzucker konnte keine der 14 Arten vergären; von wenigen wird Maltose und nur langsam zerlegt. Am energischsten werden im allgemeinen Glykose und Fruktose vergoren und zwar von den Organismen der zweiten und dritten Gruppe rascher als von denjenigen der ersten Gruppe. Von der Mehrzahl wird auch noch die Saccharose durchschnittlich rasch in Alkohol und Kohlensäure gespalten und zwar wieder von der zweiten Gruppe im allgemeinen rascher als von der ersten und dritten; viel langsamer erfolgt die Zerlegung der Galaktose durch die gleichen Organismen. Das Gärvermögen der *Torula*-Formen im Sinne von Hansen ist ein sehr geringes. In gehopfter Bierwürze vermögen die Organismen alkoholische Gärung hervorzurufen; die erzeugten Alkoholmengen bewegen sich zwischen 1,09 und 0,07 %. Sie sind in erster Linie auf die Glykose und Fruktose in der Würze zurückzuführen. Glykogenbildung zeigt sich in verschiedenen Abstufungen. Bei den Organismen der ersten Gruppe überwiegen bei der Vermehrung in Würze die Säureverzehrer, in der zweiten Gruppe die Säuremehrer. In noch höherem Grade als bei der gehopften Bierwürze als Nährlösung kam das Säureverzehrungsvermögen der meisten der vorliegenden Organismen bei Anwendung von Sauerkrautwasser zum Ausdruck. 0,99 g Säure in 100 ccm, auf Milchsäure berechnet, vertrugen noch mehrere der Organismen. Die Säureverzehrer sind in der zweiten Gruppe häufiger als in der ersten. Bei einer Acidität des Sauerkrautwassers, auf Milchsäure berechnet, von 0,36 g auf 100 ccm, entwickelten sich nur zwei der Organismen nicht. In allen übrigen Kulturen war die Säure zurückgegangen, in vielen völlig verzehrt worden; in einzelnen Fällen reagierte die Nährflüssigkeit sogar schwach alkalisch. Gelatine wird von allen Organismen verflüssigt und zwar von denjenigen der zweiten Gruppe im allgemeinen rascher als von denjenigen der ersten Gruppe. Schwefelwasserstoff aus Bierwürze war in keinem Fall zu beobachten; bei Zusatz von pulverisiertem Schwefel zu Würze trat sie jedoch bei vielen auf. Als Schwefelwasserstoffbildner im Brauereibetrieb können die Organismen kaum in Frage kommen. Dagegen vermochten mit Ausnahme eines einzigen alle aus einer mineralischen Nährlösung mit Zusatz von pulverisiertem Schwefel das Gas zu bilden. *H. Will.*

Oldrich Miskovsley: Über Sarcinen, welche Bierkrankheiten verursachen. (Zeitschr. ges. Brauw. 1907, **30**, 81—85 und 104—108.) — Verf. hat die gegen *Sarcina* besonders widerstandsfähigen böhmischen Biere von Pilsener Charakter studiert. Er benutzte hierzu drei *Pediokokken*: A und B wurden aus einem durch *Sarcina* und wilde Hefe verdorbenen Bier, F aus schwach getrübbtem dunklen, angenehm riechenden Lagerbier isoliert. Nach ihrem morphologischen und physiologischen Verhalten sind die drei Mikroorganismen den von Claussen als *Pediococcus damnosus* und *perniciosus* beschriebenen sehr ähnlich. Eine Identifizierung

konnte nicht durchgeführt werden. Es ist eine bekannte Tatsache, daß die Biere aus schlecht verzuckerten, also Stärke- bzw. Dextrinjodreaktion aufweisenden Würzen der Sarcinakrankheit früher anheimfallen, als solche aus normal verzuckerten Würzen. Nach den Erfahrungen der Praxis ist jedoch anzunehmen, daß es noch andere Würzebestandteile als Stärke sind, welche das Wachstum der Bierpediokokken unter Umständen mehr zu fördern vermögen als das der Hefe. Verf. hat deshalb die stickstoffhaltigen Substanzen nach dieser Richtung hin studiert. Um auch deren Einfluß mit demjenigen der ungenügend verzuckerten Stärke vergleichen zu können, bereitete er sich aus demselben Malze und demselben Wasser durch verschiedenes Maischen chemisch verschiedene Würze von „Amido“- und „Peptoncharakter“ mit und ohne Stärkereaktion. Die Anwesenheit von Stärkepartikelchen übte keinen merklichen Einfluß auf das Sarcinawachstum aus, dagegen die stickstoffhaltigen Substanzen. Die Acidität in den Würzen mit Peptonzusatz stieg bedeutend mehr als in denjenigen von Amidocharakter. Versuche mit glykosehaltigen Mineralsalzlösungen, in welchen der Stickstoff durch verschiedene Verbindungen vertreten war, ergaben, daß die höheren Verbindungen das Wachstum fördern. Die besten Ergebnisse wurden mit Witte's Pepton und Bayer's Somatose erzielt. In Würze mit Peptonzusatz stieg die Acidität bedeutend schneller als in normaler Würze. Dabei entstand gleichzeitig nicht nur eine stärkere, längere Zeit sich haltende Trübung als in der gewöhnlichen Würze, sondern auch ein intensiverer Geruch und Geschmack. Der Charakter einer Sarcinakrankheit ist also mehr von der chemischen Zusammensetzung der Würze abhängig. Je weniger das Bier vergoren war, desto kleiner war die von den Pediokokken erzeugte Acidität, desto schwächer das Wachstum und desto schwächer der Geruch und der Geschmack. Die durch Autolyse der Hefe in das Bier übergegangenen Stoffe fördern zwar das Wachstum der Pediokokken, aber in keiner auffallenden Weise. Hefenukleinsäure kann nicht nur für die Pediokokken, sondern auch für andere Mikroorganismen als Stickstoffquelle betrachtet werden.

H. Will.

W. Bettges: Zum Nachweis von Sarcinen. (Wochenschr. Brauerei 1907, 24, 149—152.) — Die vom Verf. empfohlene Methode zum Nachweis von Sarcina (Z. 1906, 12, 680) hat von verschiedenen Seiten eine Nachprüfung erfahren und kann als allgemein brauchbar bezeichnet werden. Nur in zwei Fällen war anfangs ein Mißerfolg zu verzeichnen. Während in dem einen Fall der Grund hierfür noch nicht ermittelt werden konnte, ist in dem anderen ein zu hoher Alkoholgehalt der verwendeten Nährlösung gefunden worden. Diese Beobachtung hatte zur Folge, Biere mit verschiedenen Alkoholmengen nach der Sterilisation unter Druck auf ihren Alkoholgehalt zu prüfen, um an der Hand der gefundenen Werte eine genaue Arbeitsweise festzulegen, welche bei der Herstellung des Nährbodens die Erhaltung eines bestimmten Alkoholgehaltes gewährleistet. Die neue Arbeitsweise wird folgendermaßen ausgeführt: 1 l abgekochte, ungehopfte Würze aus hellem Malz von etwa 18 % B., deren Gehalt genau zu ermitteln ist, wird mit 1—2 % abgepreßter, frischer und hochvergärender Hefe zur Gärung angestellt und schließlich im Thermostaten zur Endvergärung gebracht. Das so erhaltene endvergorene Bier wird durch Filtrieren von der Hefe getrennt, entkohlensäuert und sein scheinbarer Extrakt festgestellt, so daß aus den beiden Daten, Stammwürze und scheinbarem Extrakt, sein Alkoholgehalt ohne weiteres zu ersehen ist. Zur Abscheidung der überschüssigen Eiweißstoffe werden nicht zu dünnwandige, möglichst mit Patentverschluß versehene Flaschen mit dem Bier etwa zu drei Viertel gefüllt und geschlossen im Autoklaven etwa 15 Minuten bei 1,5 Atm. erhitzt. Nach dem Erkalten werden die abgeschiedenen Eiweißstoffe abfiltriert und die übrig gebliebene Flüssigkeitsmenge am besten durch Wägen bestimmt. Zur Reduktion der Alkoholmenge auf die gewünschte Höhe von 4 oder 5 % wird ein Teil des blank filtrierten Bieres, welcher rechnerisch genau zu

ermitteln ist, zum Kochen gebracht und gleichzeitig durch Zusatz einer genügenden Menge Malz- oder Gerstenstärke kleistertrüb gemacht. Beide Teile werden innigst gemischt und einige Stunden zum Absetzen stehen gelassen. Hierauf wird filtriert und die Flüssigkeit mit einer 1 : 10 verdünnten Ammoniaklösung neutralisiert. Durch den geringen Zusatz von Ammoniak setzt das Bier in den meisten Fällen nach einigen Stunden unter gleichzeitiger Klärung ziemlich gut ab, worauf es von neuem filtriert wird. Die Sterilisation der so erhaltenen Nährflüssigkeit wird wiederum in dreiviertel vollen, gut verschlossenen Flaschen entweder unter schwachem Druck oder auch im strömenden Dampf ausgeführt. Die alsdann noch notwendige Überführung der Nährlösung in sterile Freudenreich-Kölbchen geschieht unter entsprechenden Vorsichtsmaßregeln. Für die Anfertigung von Vaselineinschlußpräparaten ist es nicht nötig, besondere Anforderungen in bezug auf Glanzfeinheit zu stellen, die Kölbchenmethode erfordert dagegen im allgemeinen ein bodensatzfreies Bier. Aus diesem Grunde empfiehlt es sich, die Flaschen nach der zweiten Sterilisation noch einige Zeit behufs Klärung stehen zu lassen, bevor der Inhalt in Freudenreich-Kölbchen übergeführt wird oder aber die Nährlösung, wenn sich nach direkter Einfüllung später Bodensätze gebildet haben, vor dem Gebrauch in leere, sterile Kölbchen umzugießen. Die beschriebene Vorschrift soll nicht als eine unantastbare Norm, sondern nur als Richtschnur für die Bereitung des empfohlenen Substrates aufgestellt sein. Für das Vaselineinschlußpräparat empfiehlt sich die Verwendung einer Nährlösung mit einem Gehalt von 4 % Alkohol. Es eignet sich diese Arbeitsweise für die Untersuchung aller Materien, sofern sie in einem solchen untergebracht werden können. Bei Anwendung der Kölbchenmethode ist dagegen die Verwendung eines Substrates mit einem etwas höheren Alkoholgehalt angebracht, dessen Höhe 5 %, gegebenfalls bis 6 % betragen kann. Dieser Nachweis setzt einen gewissen Reinheitsgrad der zu untersuchenden Hefe in bezug auf luftliebende Bakterien voraus.

H. Will.

L. F. Rettger: Studien über Fäulnis. (Journ. of Biol. Chem. 1906/07, 2, 71—85.) — Die Fäulnis wird nur durch anaerobe Bakterien verursacht, so zersetzen *Bac. putrificus*, *Bac. des malignen Ödems* und der *Anthraxbacillus* Blutfibrin und ein Eier-Fleisch-Gemisch sehr schnell, wobei faulig riechende Stoffe, namentlich Mercaptane gebildet werden. Wendet man jedoch Reinkulturen der genannten Bakterien an, so werden Indol, Skatol und Phenol nicht oder doch nur in geringen Mengen gebildet. Mit Ausnahme weniger Fälle sind fäulniserregende Bakterien der genannten Art in den Fäces nicht nachgewiesen worden, dennoch üben die Fäces meist auf Eier-Fleisch-Gemische eine faulende Wirkung aus.

Max Müller.

H. Schnegg: Das neue Montanin. (Zeitschr. ges. Brauw. 1907, 30, 407—412 u. 420—424.) — Das früher als Desinfektionsmittel verwendete Montanin, dessen wirksamer Bestandteil Kieselfluorwasserstoffsäure ist, war ein Abfallprodukt der keramischen Industrie. In neuerer Zeit wurde versucht, es auf Grund der in der Praxis gemachten Erfahrungen zu verbessern. Vor allem wurde die Fabrikation als Abfallprodukt aufgegeben. Damit war aber die Möglichkeit gegeben, nicht nur den Gehalt an wirksamer Substanz besser einzuhalten und größeren Schwankungen, wie sie früher vorkamen, vorzubeugen, sondern auch den Eisengehalt so zu verringern, wie er eben bei einem technischen Fabrikat herabgesetzt werden kann. Dieses als Hauptprodukt hergestellte neue Montanin hat bei einem spez. Gew. (15° C) von 1,25 bis 1,26 einen konstanten Gehalt von 28—30 % Kieselfluorwasserstoffsäure, von der 0,90 % als freie Kieselfluorwasserstoffsäure vorhanden sind. Eisen ist nur mehr in einer Spur von 0,07 % vorhanden. Verf. hat die Wirksamkeit dieses neuen Präparates unter möglichster Anpassung an die Verhältnisse der Praxis geprüft. Er kommt zu dem Schluß, daß das neue Montanin, wenn es auch das ältere Präparat in seiner

keimtötenden und entwicklungshemmenden Kraft nur wenig übertrifft, durch seine Konstanz in der Zusammensetzung und seine nahezu völlige Eisenfreiheit als Desinfektionsmittel an Wert entschieden gewonnen hat.

H. Will.

F. Schönfeld: Präzisions-Saccharometer nach Lohnstein. (Wochenschr. Brauerei 1907, 24, 45—50.) — Verf. hat in Verbindung mit Dehnike vergleichende Untersuchungen mit dem Lohnstein'schen Apparat und der üblichen Methode zur Ermittlung des Endvergärungsgrades angestellt. Bei Versuchen mit den untergärigen Bierhefen D und K, welche frisch dem Bottich entnommen waren, ergaben sich mit dem Lohnstein'schen Apparat ausnahmslos erheblich höhere Endvergärungen als nach der alten Methode (im Mittel um 0,8% B). Bei Versuchen mit einer dritten untergärigen Brauereihefe und mit frischer Brennereihefe (Rasse II und XII) gingen die Abweichungen vielfach um mehr als 10% über die nach der üblichen Methode erhaltenen Werte hinaus. Bei der Verwendung von gelagerter, glykogenfreier und an Gärkraft ärmerer Hefe wurden erheblich geringere Ergebnisse und teilweise sogar annähernde Übereinstimmung mit der üblichen Methode erhalten. Indes war die Zahl der Versuche, bei welchen eine solche Übereinstimmung festgestellt wurde, sehr gering. Der Lohnstein'sche Apparat ergab jedoch nicht immer höhere, sondern auch niedrigere Werte. Höher waren sie stets bei Verwendung von untergärigen Brauereihefen, während längere Zeit gelagerte obergärige Brauereihefen teils höhere teils niedrigere Werte ergaben und zwar mit dem Unterschiede, daß bei der einen Rasse die Endvergärung niedriger, bei der anderen wieder höher war. Die obergärigen Brauereihefen sind noch am meisten geeignet, um Annäherungswerte zu ergeben, weniger die Brennereihefen und am wenigsten die untergärigen Brauereihefen, welche die größten Abweichungen gaben. Ferner trat unverkennbar eine Beziehung zwischen der Dauer der Lagerzeit der Hefe und der Höhe des erhaltenen Endvergärungsgrades beim Lohnstein'schen Apparat zutage, welche sich in der Weise äußerte, daß bei der Zunahme der Lagerzeit die Hefen die Tendenz zu niedrigerer Vergärung zeigten. Bei den verwendeten untergärigen Brauereihefen ging die Erniedrigung des Endvergärungsgrades fast bis zur Erreichung der bei den üblichen Verfahren erhaltenen Zahlen, bei den obergärigen Brauerei- und Brennereihefen fiel allmählich der Endvergärungsgrad sogar erheblich darunter. Eine Regelmäßigkeit und Gesetzmäßigkeit trat dabei jedoch nicht hervor. Bei der Reduktion der Gärzeit von anfänglich 24 Stunden auf 8 Stunden wurden ebenfalls keine in zulässigen Grenzen sich haltenden Übereinstimmungen gefunden. Indessen stimmen mit dem Lohnstein'schen Apparat ausgeführte Parallelversuche unter sich sehr gut überein. Verf. kann also auf Grund seiner Untersuchungen der Bestimmung des Endvergärungsgrades bzw. der vergärbaren Zuckermenge in Würze mit Hilfe des Apparates von Lohnstein keine Zuverlässigkeit zusprechen und darum die Benutzung des Apparates in der bis jetzt bestehenden Form für diese Zwecke nicht empfehlen.

H. Will.

H. Pringsheim: Über gährungsfeindliche Stickstoffsubstanzen. (Wochenschr. Brauerei 1907, 24, 67—71.)

F. Ehrlich: Über die Bedingungen der Fuselölbildungen. (Wochenschr. 1907, 24, 343—346, 357—360 u. 369—371.)

P. Mumme: Gärversuche mit Malzextrakt. (Wochenschr. Brauerei 1907, 24, 277—278.)

Zubereitung der Nahrungsmittel. — Nahrungsmittelkontrolle. Verschiedenes.

Zweck und Gesichtspunkte der Entscheidungen über Nahrungsmittelkontrolle. (U. S. Dep. of Agricult. Bur. of Chem. Food Inspection