also eine Verbindung von Sulfaminsäure mit Sarkosin unter Wasser-
austritt. Hier ist nun die Sulfaminsäure der Körper, den das Sarkosin
vorgefunden hat; unter normalen Verhältnissen gibt die im Albumin prä-
formirte Sulfaminsäure Schwefelsäure und Ammoniak, welches letztere sich
mit der Carbaminsäure zu Harnstoff verbindet. Der mit Schwefelsäure
versetzte Rückstand, aus welchem der Aether die eben beschriebenen Sub-
stanzen aufgenommen hat, enthält nun noch eine Menge anderer wohlcharak-
terisirter Körper, über deren Zusammensetzung Schultzen weitere Mit-
theilungen verspricht. Voraussichtlich sind dieses ebenfalls Verbindungen
des Sarkosins mit anderen Producten der regressiven Metamorphose.

Reicht man grössere Gaben von Sarkosin bei Hühnern, welche be-
kanntlich den grössten Theil ihres N der Nahrung in Form von
harnsaurem Ammon ausscheiden, so verschwindet die Harnsäure aus dem
Harn vollständig und es entstehen leicht lösliche, wohlcharakterisirte
Verbindungen, mit deren Untersuchung der Verf. noch beschäftigt ist.
Sie werden wahrscheinlich wichtige Aufschlüsse über die Constitution der
Harnsäure geben.

Wir haben also im Sarkosin ein Mittel, um die wichtigsten Stoff-
wechseleränderungen des thierischen Organismus, allem Anschein nach
in ganz unschädlicher Weise hervorrufen zu können. Unzweifelhaft sind
hier auf wissenschaftlicher Grundlage die wichtigsten Fingerzeige für
praktisch ärztliches Handeln gegeben.

Zur Bestimmung der Harnsäure. R. Maly *) hat die Substanz
untersucht, welche bei der Harnsäurebestimmung nach E. Salkowski's
Methode, durch eine ammoniakalische Silberlösung bei Gegenwart von
viel überschüssigem Ammon aus harnsäurehaltigen Flüssigkeiten gefällt
wird und gefunden, dass der unter den genannten Bedingungen entstehende
flockige Niederschlag kein harnsaures Silber sein kann, da dieses bei
Gegenwart von viel freiem Ammon löslich ist, dass er vielmehr eine
Doppelverbindung von harnsaurem Silber mit harnsaurem Alkali (oder
Erdalkali) ist.

Bringt man zu dem klaren Gemisch von harnsaurem Ammon und
ammoniakalischer Silberlösung einige Tropfen salpetersaures Kali oder
Natron, oder auch Salmiak-, Kochsalz-, Glaubersalzlösung oder Magnesia-

*) Archiv d. Physiol. 6, 201.

mischung etc., so entsteht sofort (überschüssiges Ammoniak vorausgesetzt) ein in allen Fällen gleich aussehender, leichter, grossflockiger bis gelatinöser weisser Niederschlag, der sich nach einiger Zeit absetzt, dann meist schmutzigweiss oder gelblich erscheint, und fast alle Harnsäure enthält. Dieselbe Fällung erscheint, wenn man aus einer harnsäurehaltigen Flüssigkeit die Harnsäure wie gewöhnlich mit starker Salzsäure ausfällt, nach 24 oder 48 Stunden filtrirt und das nun ammoniakalisch gemachte Filtrat mit ammoniakalischer Silberlösung und einigen Tropfen von einer Lösung der oben genannten Salze versetzt. Letzterer Zusatz ist hier meist nicht nöthig, da schon durch das Absättigen der freien Salzsäure genug Salze in der Flüssigkeit sind, ebenso dann nicht, wenn vorher die Lösung bereits ein Kali-, Natron-, Magnesiasalz etc. enthält. Dieser Fall trifft aber beim Harn immer zu.

Die Darstellung und Analyse grösserer Mengen dieses Niederschlags war nicht ganz glatt und ohne Schwierigkeit auszuführen, wegen seiner leichten Zersetzlichkeit, die zwar nicht so gross ist wie bei dem aus Harn gefällten Körper, aber doch immer eine Dunkelfärbung bedingt. Auch ein anhaltendes Waschen verträgt der Niederschlag nicht, und wird er auf einmal mit viel Wasser übergossen, so tritt sichtlich Zersetzung ein, er wird feinpulverig und geht oft ganz durchs Filter. Er wurde deshalb nur mit kleinen Wassermengen gewaschen, zwischen dicken Papierlagen gepresst und im Vacuum getrocknet, stellte dann schwere klingende Stücke dar von braunem Glanz, nicht ganz ohne eingetretene Reduction, aber doch ausreichend rein, um durch die Analyse ihn als ein Silberdoppelsalz zu erkennen.

1. Etwa 3 Liter einer Lösung von Harnsäure in Ammoniak wurden mit ammoniakalischer Silberlösung versetzt und mit Gypswasser der Niederschlag hervorgerufen. Letzterer war schmutzig weiss, flockig, und stellte trocken bronceartig glänzende spröde Stücke dar.

Zur Analyse wurde er wie die folgenden in verdünnter Salpetersäure gelöst, was, durch Erwärmen unterstützt, unter Gasentwicklung und Zersetzung der Harnsäure leicht stattfindet, verdünnt, das Silber mit Salzsäure und im Filtrat der Kalk mit Oxalsäure und Ammon gefällt.

0,7712 Grm. Substanz gaben 0,3710 Grm. Chlorsilber, und 0,0860 Grm. kohlensuren Kalk, und kleine Mengen Ammoniak, die nicht direct bestimmt wurden.

Er enthält daher 36,3 Proc. Silber und 4,4 Proc. Calcium, während ein Doppelsalz von harnsaurem Silber-Kalk ($C_5 H_2 Ag Ca N_4 O_3$) 36,7 Proc.

Ag und 6,7 Proc. Ca verlangt. Eine kleine Menge Kalk war durch Ammon vertreten.

2. Harnsaures Silber-Kali. Eine Lösung von Harnsäure in Ammon wurde mit ammoniakalischer Silberlösung und dann mit Salpeterlösung versetzt. Niederschlag flockig-schleimig weiss, schrumpft ungemein stark beim Trocknen, und sieht dann wie der vorige aus.

0,4138 Grm. Substanz gaben 0,2545 Grm. AgCl und 0,0313 Grm. K_2SO_4 nebst etwas Ammoniak.

Er enthält daher 46,27 Proc. Ag, 3,40 Proc. K und ist also ein sehr silberreiches Urat, das beiläufig einer Doppelverbindung von harnsaurem Silberoxyd mit harnsaurem Silber-Kali: $C_5H_2Ag_2N_4O_3 + C_5H_2AgKN_4O_3$ entspricht, welche verlangt 46,6 Proc. Ag und 5,6 Proc. K. Eine kleine Menge Kalium war auch hier durch Ammonium ersetzt, das beim Uebergiessen der getrockneten Verbindung mit verdünnter kalter Natronlauge leicht nachgewiesen wurde. Direct bestimmt wurde das Ammoniak in folgendem Niederschlag.

3. Harnsaure Silbermagnesia. Giesst man zu einer ammoniakalischen Harnsäurelösung Magnesiamischung, so fällt (wenn die Flüssigkeit nicht zu verdünnt) ein weisser Niederschlag von harnsaurer Magnesia; das klare Filtrat davon gibt dann auf Zusatz von ammoniakalischer Silberlösung noch einen reichlichen flockig-schleimigen Niederschlag. Er hielt das Aussüssen besser aus als die übrigen, wurde aber dann noch beim Trocknen im Vacuum dunkelfarbig.

0,6120 Grm. gaben 0,2765 Grm. Chlorsilber, 0,0805 Grm. pyrophosph. Magn. und Ammoniak entsprechend dem Aequivalent von 0,0875 Grm. Platin.

Er enthielt daher 34,0 Grm. Silber, 2,84 Grm. Magnesium und 1,59 Proc. Ammonium, war demnach ein Gemenge von harnsaurer Silbermagnesia und harnsaurem Silberammon.

4. Harnsaures Silberammon. Es ist schon erwähnt, dass die Lösung von Harnsäure in Ammoniak nach Silberzusatz auch durch Salmiak in gleicher Weise wie mit Salpeter etc. gefällt wird. Dieser Niederschlag enthält getrocknet sehr viel Ammoniak und ist im Wesentlichen ein Gemenge von harnsaurem Ammon, aber er hält auch noch immer einen Rest Chlor, so dass er beim Auflösen in Salpetersäure etwas Chlorsilber zurücklässt.

Es wären darnach folgende Punkte hervorzuheben:

1. Harnsaurer Silberoxyd scheint ein für sich nicht existenzfähiger Körper zu sein.
2. In viel freiem Ammoniak ist Harnsäure zugleich mit Silberoxyd als klare Flüssigkeit löslich, wenn andere Salze darin nur in kleiner Menge sich vorfinden.
3. Bei Gegenwart von Salzen der Alkalien und alkalischen Erden und freiem Ammoniak gibt die Harnsäure mit Silber in verschiedenen Verhältnissen Doppelsalze, die weiss, gelatinös-flockig und sehr schwer (viel schwerer als freie Harnsäure) löslich sind. Sie sind vorzüglich geeignet, kleinere Mengen Harnsäure, welche durch Salzsäure nicht mehr ausgefällt werden, auszufällen und nachzuweisen.

3. Auf gerichtliche Chemie bezügliche Methoden.

Von

C. Neubauer.

Ueber den Arsengehalt der Zimmerluft. H. Fleck *) hat durch eine Reihe interessanter und wichtiger Versuche den Beweis geliefert, dass Arsenikwasserstoffgas in der Luft eines Zimmers, in welchem Schweinfurter Grün als Anstrich der Wandfläche oder der Tapete verwendet wird, vorkommt, so dass nicht allein die staubförmigen, mechanischen Beimengungen des Arsens in der Zimmeratmosphäre, sondern auch gasförmig diffundirter Arsenwasserstoff, ein Zersetzungsproduct der freien arsenigen Säure in dem Schweinfurter Grün, als Ursache chronischer Arsenikvergiftungen zu erkennen ist. Seine sinnreich angestellten Versuche beweisen ferner, dass die Entwicklung des Arsenwasserstoffgases vorwaltend unter Mitwirkung der Zimmerfeuchtigkeit und organischer Materien und zwar hauptsächlich der organischen Bindemittel stattfindet, sowie, dass überall da, wo organische Stoffe mit freier Arsensäure zusammentreten, die Entwicklung des Gases möglich ist, eine Consequenz die sich nun auch auf die arsenhaltigen Anilinfarben bei Tapeten übertragen lässt. Was die von Fleck in Anwendung gezogenen Methoden betrifft, so müssen wir auf das Original verweisen, da ein Auszug nicht wohl möglich ist.

Ueber die Verwendbarkeit des Chloroforms als Lösungs- und Trennungsmittel für giftige Pflanzenstoffe bei forensischen Unter-

*) Zeitschr. f. Biologie, 8, 444.