Plantes Récoltées A L'Ile Miquelon

M. E. Delamare

To cite this article: M. E. Delamare (1887) Plantes Récoltées A L'Ile Miquelon, Bulletin de la Société Botanique de France, 34:3, 138-141, DOI: [10.1080/00378941.1887.10830220](https://doi.org/10.1080/00378941.1887.10830220)

To link to this article: <http://dx.doi.org/10.1080/00378941.1887.10830220>

Published online: 08 Jul 2014.

Submit your article to this journal [↗](#)

Article views: 5

View related articles [↗](#)

PLANTES RÉCOLTÉES A L'ILE MIQUELON, par M. E. DELAMARE.

RENONCULACÉES.

- Thalictrum Cornuti* L.
Ranunculus acris var. *multifidus* DC.
 — *Flammula* var. *filiformis* Hook.
 — *Cymbalaria* DC.
Coptis trifolia Salisb.

NYMPHÉACÉES.

- Nuphar americanum* Provencher.

SARRACÉNIÉES.

- Sarracenia purpurea* L.

CRUCIFÈRES.

- Cochlearia officinalis* L.

CISTINÉES.

- Hudsonia ericoides* Lamk.

VIOLARIÉES.

- Viola blanda* Willd.
 — *cucullata* Ait.
 — *Muhlenbergii* Torr. et Gr.
 — *tricolor* L. a. *arvensis* DC.

DROSÉRACÉES.

- Drosera rotundifolia* L.
 — *longifolia* L.

CARYOPHYLLÉES.

- Silene acaulis* L.
Sagina decumbens Ell.

HYPERICINÉES.

- Hypericum virginicum* L.

LÉGUMINEUSES.

- Trifolium repens* L.
Lathyrus maritimus Bigel.
 — *palustris* L.

ROSACÉES.

- Rubus acaulis* Michx.
 — *arcticus* L.

- Rubus triflorus* Richards (*Rubus saxatilis* Michx.).
 — *canadensis* L.
 — *Chamaemorus* L.
Potentilla Anserina L.
 — *fruticosa* L.
 — *tridentata* Ait.
 — *Comarum* Scop.
Geum rivale L.
Sanguisorba canadensis L.
Spiraea salicifolia L.
Fragaria virginiana Duch. (*Fragaria canadensis* Michx.).
Sorbus americana Pursh.
Pirus arbutifolia var. *melanocarpa* Willd.
Amelanchier canadensis var. *oligocarpa* T. et Gr.
Prunus borealis Pursh.
 — *serotina* Ehrh.
Malus communis Juss. (indigène ??).
Rubus idaeus L.

ONAGRARIÉES.

- Hippuris vulgaris* L.
Myriophyllum verticillatum L. a. *spicatum*.
Epilobium palustre L.
 — *tetragonum* L.
 — *spicatum* Lamk.

CRASSULACÉES.

- Sedum Rhodiola* DC.

GROSSULARIÉES.

- Ribes oxycanthoides* Lin.
Ribesia prostrata L'Herm.

OMBELLIFÈRES.

- Archangelica officinalis* Hoffm.
Ligusticum scoticum L.
Heracleum lanatum L.
Conioselinum canadense Torr. et Gr.

ARALIACÉES.

- Aralia nudicaulis* L.

CORNÉES.

- Cornus alba* L. (*C. stolonifera* Michx.).
— *canadensis* L.
— *suecica* L.

CAPRIFOLIACÉES.

- Viburnum nudum* Lin. α. *cassinoides*.
Diervilla canadensis Willd.
Lonicera caerulea β. *canadensis* Lamk.
Linnaea borealis Gronov.

RUBIACÉES.

- Perdicesea repens* Provencher.

COMPOSÉES.

- Taraxacum Dens-leonis* Desf.
Leontodon autumnale L.
Achillea Millefolium var. *occidentalis* L.
Senecio Pseudarnica Sw.
Hieracium canadense Michx.
Cirsium muticum Michx.
Prenanthes alba L. (*Nabalus alba* Hook.).
Diplopappus amygdalinus Hook.
Solidago neglecta Torr. et Gr.
— *thyrsoides* Meyer...??
Aster panicus L.
— *memoralis* β. *uniflorus* Nees.

LOBÉLIACÉES.

- Lobelia Dortmanna* Lin.

CAMPANULACÉES.

- Campanula rotundifolia* L.

VACCINIÉES.

- Vaccinium pensylvanicum* Lamk.
— *uliginosum* L.
— *Vitis-idea* L.
Oxycoccus palustris Pers.
— *macrocarpus* Pers.
Gaultheria hispidula Michx.

ÉRICACÉES.

- Arctostaphylos alpina* Spreng.
Gaultheria procumbens L.

- Andromeda polifolia* L.
Cassandra calyculata Don.
Rhodora canadensis L.
Azalea procumbens L.
Kalmia glauca Ait.
— *angustifolia* L.
Ledum palustre α. *latifolium* Ait.
Diapensia japonica.

PYROLACÉES.

- Pirola secunda* L.

MONOTROPÉES.

- Monotropa uniflora* L.

UTRICULARIÉES.

- Pinguicula vulgaris* L.
Utricularia intermedia Hayn.
— *cornuta* Michx.

PRIMULACÉES.

- Trientalis americana* Pursh.
Lysimachia racemosa Michx.

GENTIANÉES.

- Menyanthes trifoliata* L.
Swertia corniculata Michx.

BORRAGINÉES.

- Mertensia maritima* G. Don. (*Lithospermum* Lehman).

SCROPHULARINÉES.

- Euphrasia officinalis* L.
Rhinanthus Crista-galli L.

LABIÉES.

- Brunella vulgaris* L.
Lycopus virginicus L.

PLANTAGINÉES.

- Plantago maritima* L.
— *major* (indigène ?).
— *lanceolata* (indigène ?).

POLYGONÉES.

- Rumex Acetosella* L.
Polygonum Convolvulus L.
— *viviparum* L.

Polygonum amphibium L. α. natans.
— *aviculare* L.

EMPÉTRACÉES.

Empetrum rubrum. — Commun.
— *nigrum*.

CUPULIFÈRES.

Corylus americana α. *rostrata* Walt.

BÉTULACÉES.

Betula nana Willd.
— *papyrifera* Michx.
— *lenta* ?
Alnus glutinosa Gærtn.
— *serrulata* Willd.

CONIFÈRES.

Abies balsamifera Michx.
— *nigra* Michx.
— *alba* Michx.
Tsuga canadensis Provencher.
Larix americana Michx.
Juniperus communis Lin.
— *virginiana* α. *prostrata* L.

ORCHIDÉES.

Platanthera fimbriata Lindl.
— *hyperborea* Lindl.
— *psychodes* Lindl.
— *blephariglottis* Lindl.
— *orbiculata* Lindl.
Microstylis ophioglossoides Nutt.
Arethusa bulbosa Nutt.
Pogonia ophioglossoides Nutt.
Calopogon pulchellus Br.
Spiranthes cernua Rich.
Cypripedium humile.

IRIDÉES.

Iris versicolor L.
Sisyrinchium anceps L.

LILIACÉES.

Streptopus roseus Michx.
— *amplexifolius* Pers.
Clintonia borealis Rafn.
Smilacina stellata Desf.
— *trifoliata* Desf.
— *bifolia* Torr. et Gr.

MÉLANTHACÉES.

Tofieldia glutinosa Michx.

JONCÉES.

Luzula pilosa Willd.
— *campestris* var. *congesta* DC.
— *melanocarpa* Desv.
— *multiflora* Lejeune.
Juncus balticus Willd.
— *glaucus* Ehrh.
— *lamprocarpus* Ehrh.
— *filiformis* Lin. (*Juncus setaceus*
Torr. et Gr.).
— *tenageia*.
— *effusus*.

TYPHACÉES.

Sparganium natans Michx.

ALISMACÉES.

Triglochin maritimum L.

ÉRIOCAULONÉES.

Eriocaulon septangulare Willd.

NAIADÉES.

Potamogeton natans L.
— *perfoliatus* L.

CYPÉRACÉES.

Eriophorum vaginatum L.
— *polystichum* var. *latifolium* L.
— *virginicum* L.
Carex panicea L.
— *xanthophysa* Wahlb.
— *aquatilis* Wahlb.
— *pauciflora* Light.
— *Oederi* Ehrh.
Scheuchzeria palustris L. (*Rhynchospora alba*
Willd.).
Scirpus cespitosus L.
— *atrovirens* Willd.
— *pusillus*.

GRAMINÉES.

Triticum repens L.
Elymus arenarius L.
Ammophila arenaria Lindl.

Poa pratensis L.

(Plusieurs autres, mais introduites).

FOUGÈRES.

Osmunda cinnamomea L.

Pteris aquilina L.

Polystichum Thelypteris DC.

— *Callipteris* DC.

— *spinulosum* DC.

Polypodium vulgare Lin.

— *Phegopteris* L.

LYCOPODIACÉES.

Lycopodium annotinum L.

— *complanatum* L.

— *clavatum* L.

— *inundatum* L.

— *virginicum* ??

ÉQUISÉTACÉES.

Equisetum silvaticum L.

— *limosum* L.

A PROPOS D'UNE RÉCENTE COMMUNICATION DE M. COLOMB, par M. P. VUILLEMIN.

Je viens de lire, dans le dernier numéro du Bulletin (t. XXXIII, p. 506), une note de M. Colomb *Sur l'ochrea des Polygonées*. J'avais traité incidemment le même sujet dans un Mémoire présenté au mois d'août dernier à l'Association française pour l'avancement des sciences (les Unités morphologiques en Botanique. — Congrès de Nancy). Malheureusement les travaux de cette session ne sont pas encore publiés. La valeur de l'ochrea nous paraît facile à saisir d'après notre manière d'envisager la feuille.

Primitivement la feuille est unifasciculée. La concrescence d'un verticille de feuilles élémentaires, tel qu'on l'observe chez les *Asterophyllites*, a donné une gaine analogue à celle des *Equisetum* ou des *Casuarina*. Puis cette gaine, qui n'est pas un membre défini, mais une forme transitoire, comme l'est par exemple une cellule à noyaux multiples ou une tige à plusieurs cylindres conducteurs indépendants, tend à reprendre la symétrie foliaire; le faisceau d'une des feuilles élémentaires deviendra prédominant et fonctionnera comme nervure médiane. Ainsi va naître une feuille agrégée, premier stade et première condition d'une haute différenciation. « Chez les Platanacées et les Polygonées, disons-nous dans cette étude, nous voyons une feuille d'un type nouveau et compliqué dériver de ce groupe de feuilles juxtaposées. Aux nœuds supérieurs d'une tige florale de *Polygonum*, la gaine est aussi rudimentaire que chez les Casuarinées. Le voisinage des fleurs semble avoir soustrait les appendices de cette région à l'adaptation qui a déterminé le perfectionnement de la feuille. A mesure que l'on considère des nœuds plus éloignés de l'inflorescence, on voit une nervure faire saillie, puis le faisceau voisin lui envoyer de petites branches. Plus bas, ces branches deviennent si fortes que le point de convergence constitue un membre puissant, tandis que la gaine primitive se réduit à une membrane tra-