Ueber den heutigen Stand der Physiologie und Pathologie der Milzfunktion.

Von G. Lepehne in Königsberg.

Durch die Forschungen der letzten Jahrzehnte sind wir über die Funktion der Milz in Physiologie und Pathologie weitgehend aufgeklärt worden, sodaß die Milz heute weit mehr im Mittelpunkt klinischen Interesses steht als früher. Wenn wir die verschiedenen Funktionen überblicken, so können wir sie *cum grano salis* in 2 Hauptgruppen einteilen: Einmal die Funktionen der Milz als „regionäre Lymphdrüse des Blutes“ (Helly) und zweitens die Funktionen als endokrines Organ.

Als regionäre Lymphdrüse des Blutes beteiligt sich die Milz einerseits an der Produktion, andererseits an der Zerstörung und dem Abbau von Bestandteilen des Blutes. Lassen wir die verschiedenen Elemente des Blutes an uns vorbeipassieren, so wissen wir seit Köllikers Untersuchungen, daß die Milz vorzüglich als Stätte der Lymphozytenbildung anzusehen ist, indem aus den Lymphfollikeln Lymphozyten an das durchströmende Blut abgegeben werden. Die Milzvene enthält mehr weiße Blutkörper als die Milzarterie, und zwar vorwiegend mehr Lymphozyten. Frey hat versucht, diese Milzfunktion durch Untersuchung des Blutes auf seinen Lymphozytengehalt nach Adrenalininjektion zu prüfen. Durch Adrenalin kontrahieren sich die glatten Muskelfasern der Milz und pressen Lymphozyten aus. Spätere Untersuchungen ließen erkennen, daß die Reaktion nicht allein von der Milz abhängt. Auch große mononukleäre Zellen sollen der Milz entstammen, wobei es sich wohl um abgestoßene Retikuloendothelien handeln dürfte. Zellen der myeloischen Reihe werden in der Milz nur unter pathologischen Bedingungen gebildet, wenn es zu einer myeloischen Metaplasie des Milzgewebes kommt, z. B. bei Infektionskrankheiten, bei perniziöser Anämie, bei sekundären Anämien und vorzüglich bei der myeloischen Leukämie. Eine Bildung von roten Blutkörperchen wird physiologischerweise nur der jugendlichen Milz zugeschrieben, in der sich mitunter Normoblasten finden. Bei den oben genannten Erkrankungen dagegen sowie nach Röntgenbestrahlung und bei Störung der erythroblastischen Funktion des Knochenmarkes durch Tumorbildung dürfte auch in der Milz des Erwachsenen eine Erythropoese vor sich gehen. Eine Bildung von Blutplättchen in der Milz wird ebenfalls behauptet, ist aber ungewiß (cf. Le Sourd und Pagniez). Sicherer sind unsere Kenntnisse über die Bildung gewisser humoraler Bestandteile des Blutes in der Milz. So ist nach den interessanten experimentellen Untersuchungen von Isaac und Bieling die Milz als „Hauptstätte der Komplementsekretion im Körper“ anzusehen. Nach Injektion von hämolytischem Serum spielt sich in den Gewebemaschen der Milz eine starke, bis zur Methämoglobinbildung führende Hämolyse ab, als deren Folge ein beträchtlicher schwarzer Milztumor entsteht. Weiterhin gibt die Milz an das Blut in ihr gebildete Agglutinine und Antikörper ab. So ist bei immunisierten Tieren nach der Splenektomie eine Abnahme des Agglutiningehaltes des Blutes nachweisbar und ist die Antikörperbildung beim entmilzten Tier verzögert; erloschen ist diese nicht, da auch in anderen Organen eine Immunkörperbildung

stattfindet. Stephans Ansicht, daß die Milz bzw. das retikuloendotheliale System als Produktionsstätte des Fibrinfermentes anzusehen sei, wird vielfach bestritten. Stephan hatte gefunden, daß Röntgenreizbestrahlung der Milz eine vorübergehende Beschleunigung der Blutgerinnung zur Folge habe. Nonnenbruch und Scyska fanden die gleiche Erscheinung auch nach Diathermie der Milz. Wöhlisch konnte aber zeigen, daß die Milzexstirpation keine Veränderung der Blutgerinnung nach sich ziehe. Er führt die Gerinnungsbeschleunigung nach Milzbestrahlung auf den Zerfall von Leukozyten und Lymphozyten zurück, zumal Szenes auch nach Lungenbestrahlung eine Beschleunigung der Gerinnung feststellte (s. a. Feissly).

Weit mehr Bedeutung als als Produktionsstätte kommt der Milz als Abbauorgan der körperlichen Elemente des Blutes zu. Eine Zerstörung von weißen Blutkörperchen dürfte wohl nur in beschränktem Maße vor sich gehen. Immerhin liegen auch solche Beobachtungen vor, z. B. Phagozytose von Leukozyten (Steudemann, Lepehne bei Icterus infectiosus). Mit Recht weist Eppinger darauf hin, daß dieser Frage etwa bei den Leukämien noch nicht genügend nachgegangen sei. In größerem Maßstabe scheinen dagegen Blutplättchen sowohl in physiologischen wie besonders in pathologischen Zuständen in der Milz abgefangen zu werden und unterzugehen. Cori konnte zeigen, daß sich im Blut der Vena cubitalis weit mehr Blutplättchen befanden als im Blut der Milzvene. Im Kaninchenversuch sahen Port und Akiyama nach Splenektomie einen erheblichen, allerdings vorübergehenden Anstieg der Blutplättchen, was auch bei operativer Entfernung der an sich normalen Milz beim Menschen (etwa infolge Milzruptur usw.) mehrfach beobachtet werden konnte. Gewisse Purpuraformen mit Thrombopenie führt Kaznelson auf einen pathologisch vermehrten Unter- gang der Blutplättchen in der Milz zurück, in der eine Anhäufung von Thrombozyten mikroskopisch nachgewiesen werden konnte. Die von Kaznelson deshalb vorgeschlagene operative Entfernung der Milz führte in einer Anzahl von Fällen zur Heilung, was von verschiedenen Seiten bestätigt wurde.

Vorzüglich sind es die roten Blutkörperchen, die in der Milz die Stätte ihres physiologischen und pathologischen Unterganges finden. Schon das mikroskopische Bild mit der Phagozytose der roten Blutkörperchen durch die Retikuloendothelien weist darauf hin. Hirschfeld sah ferner in Milzabstrichen einen Detritus von roten Blutkörperchen, sodaß also auch der Modus der extrazellulären Erythrorhexis in Betracht kommt. Eine eigentliche Auflösung der roten Blutkörper durch Hämolsine, die etwa in der Milz gebildet werden und zum Freiwerden von im Blut der Milzvene nachweisbarem Hämoglobin führen, dürfte dagegen nur in seltenen pathologischen Zuständen eintreten. Als weiteres Zeichen des Unterganges der roten Blutkörper in der Milz ist ihr Eisengehalt zu betrachten. Allerdings ist dieser sehr wechselnd und kann sogar trotz sicher vermehrter Hämolyse gering sein, wie z. B. bei perniziöser Anämie (Hunter, Lubarsch u. a.). Das Eisen dürfte von der Milz wohl zur Leber und zum Knochenmark gelangen, wo es zum Neuaufbau der roten Blutelemente verwandt wird (siehe auch unten). Diejenigen Erythrozyten, die in der Milz nicht zugrundegehen, werden so geschädigt, daß die Resistenz der Erythrozyten im Milzvenenblut herabgesetzt ist (Strisower und Goldschmidt, Eppinger u. a.). Allerdings wird dies von anderen Autoren bestritten (Hirschfeld, E. Frey). Im Tierexperiment zeigt sich nach Splenektomie eine erhöhte Resistenz der roten Blutkörper (Pel, Port u. a.). Jedenfalls bereitet die Milz die roten Blutkörper zum völligen Abbau zu Bilirubin in der Leber vor. Pugliese konnte im Tierversuch nachweisen, daß nach Splenektomie eine farbstoffärmere Galle gebildet wird. Wurde umgekehrt die hämolytische Funktion der Milz durch Stauung erhöht, so stieg die Gallenfarbstoffproduktion an, was durch verstärkte Urobilinurie kenntlich wurde (Pribram). Der Bilirubingehalt der Galle bzw. der Farbstoffgehalt des Stuhles ist somit als das Maß dieser in der Milz stattfindenden Blutmauserung anzusehen (Eppinger). Diese Funktion der Milz wird bei Fortfall derselben durch die Sternzellen der Leber und die Retikuloendothelien der Lymphdrüsen und des Knochenmarks, den im Körper verbleibenden Rest des sogenannten retikuloendothelialen Stoffwechselapparats übernommen. Splenektomie bei Ratten, die eine besonders große Milz haben, hatte Erythrophagie und Eisenablagerung in den Sternzellen der Leber zur Folge, die vorher fehlte (Lepehne, bestätigt von Hirschfeld). Bei splenektomierten Mäusen sah M. B. Schmidt förmlich ein Milzgewebe in der Leber entstehen. Diese Experimente an Ratten und Mäusen wurden neuerdings von Nishikawa und Takayi nachgeprüft und bestätigt. Auch Bittner hatte schon nach Milzexstirpation lymphomähnliche Herde in Leber, Nierenrinde und Lunge gesehen, Gabbi Vermehrung von blutkörperhaltigen Zellen im Knochenmark. So ist es verständlich, daß die Entfernung der Milz bei einem gesunden Individuum keine ins Auge springenden Ausfallssymptome zeitigt, zumal auch die anderen Milzfunktionen anscheinend durch das im Körper zerstreute „Milzgewebe“ übernommen werden können.

Von besonderer Bedeutung ist nun die bei gewissen Krankheiten des Menschen auftretende vermehrte und überstürzte Hämolyse in der Milz. Hier ist in erster Linie der hämolytische Ikterus zu nennen, bei dem schon Minkowski die Milz in den Mittelpunkt der Pathogenese stellte. Der hämolytische Ikterus ist durch Milzexstirpation

heilbar; nach der Splenektomie steigt die herabgesetzte Resistenz der roten Blutkörper in der Regel wieder zur Norm, verschwinden die Pleiochromie der Galle, der Ikterus und die Anämie. Eppinger fand in der Milz dabei neben reichlicher Erythrophagoytose die Milzpulpa mit roten Blutkörperchen überladen, wo sie dem deletären Kontakt mit dem Milzgewebe ausgesetzt sind. Hierbei kommt es schon in der Milz direkt zur Bilirubinbildung, da Hijmans van den Bergh im Milzvenenblut mehr Bilirubin als im Blut der übrigen Körpervenien fand. Wie stark die intralienale Bilirubinbildung sein kann, zeigten die Durchblutungsversuche der Hundemilz von Ernst und Szapanyos. Der Rest der nicht ganz abgebauten Erythrozyten wird in den Sternzellen der Leber und den Leberzellen zu Bilirubin verarbeitet. So bildet also beim hämolytischen Ikterus eine ins Pathologische gesteigerte Hämolyse in der Milz die Ursache der Erkrankung. Allerdings ist diese Theorie nicht allseitig anerkannt (cf. Naegeli, Schmincke).

Auch bei der perniziösen Anämie kommt es zu einem solchen übermäßigen Untergang des Blutes in der Milz. Bei dieser Krankheit bringt jedoch die Splenektomie nur eine vorübergehende Besserung. Einmal scheinen die Sternzellen und Hämolympfdrüsen vikariierend um so stärker in hämolytische Funktion zu treten, sodann dürfte bei der perniziösen Anämie auch der Zustand des Knochenmarks, der Bildungsstätte der roten Blutkörperchen, irgendwie verändert sein. Wie weit der heilende Einfluß der Milzexstirpation bei der Bantischen Krankheit und bei der hypertrophischen Leberzirrhose (Eppinger) auf die Ausschaltung der Milzhämolyse oder andere Vorgänge zu beziehen ist (siehe unten), muß dahingestellt bleiben.

Eine pathologische Herabsetzung der hämolytischen Milzfunktion bei gleichzeitig erhöhter Knochenmarkstätigkeit glaubt Eppinger im Krankheitsbilde der genuinen Polyzythämie zu erblicken. Auch die Polyzythämie der isolierten Milztuberkulose dürfte zum Teil hierauf zu beziehen sein.

Im Anschluß hieran sei kurz die Funktion des Abfanges aller körperfremden Elemente aus dem Blut erwähnt. Diese mögen durch Verbrennung oder Vergiftung geschädigte und so körperfremd gewordene rote Blutkörper sein (Ponficks spodogener Milztumor) oder wirkliche Fremdkörper, wie Parasiten (Malaria), Bakterien oder wie in E. Freys Experimenten, artfremde Blutkörper.

Wenden wir uns jetzt zu den Funktionen der Milz als endokrines Organ, so sei zuerst die hormonale Beziehung zur Knochenmarksfunktion besprochen. Nach Ansicht zahlreicher Forscher übt die Milz neben einem ständigen regulatorischen Einfluß auf den Grad der Erythrozytenbildung je nach Stärke der Bluterstörung einen Hemmungstonus auf das Knochenmark aus. Die Milzexstirpation „entfesselt“ das Knochenmark und zieht eine Steigerung der erythroblastischen, leukoblastischen und thromboplastischen Funktion nach sich. Hierfür spricht das Erscheinen von Normoblasten und Jolly-Körpern (G. Klempner, Hirschfeld und Weinert u. a.) der so rapide Anstieg der Blutplättchenzahlen, die höhere Leukozytose nach Nukleininjektionen beim entmilzten Tier (Rosenow). Auch darf wohl die beim Tier und auch beim Menschen nach Entmilzung beobachtete Polyzythämie hier einzureihen sein (siehe die neue Beobachtung von Brieger). Die Leukopenie gewisser Erkrankungen (Morbus Banti, Gauchersche Krankheit, Typhus usw.) glaubt Frank auf die hemmende Wirkung solcher „Leukosplenine“ zurückführen zu können. Ein Fortfall dieser hemmenden Milzfunktion mag auch mit zu der genuinen Polyzythämie und der Erythramie der isolierten Milztuberkulose beitragen (Hirschfeld und Weinert).

Von großer Bedeutung ist die Funktion der Milz als Organ des Eisenstoffwechsels. Die Untersuchungen von Asher und seinen Schülern Großenbacher, Zimmermann und Vogel waren hier bahnbrechend. Entmilzte Tiere und, nach den Untersuchungen Bayers, auch entmilzte Menschen zeigen erhöhte Eisenausscheidung, vorzüglich im Stuhl. Die Milz erhält dem Organismus das im Stoffwechsel, besonders beim Zerfall der roten Blutkörper, freiwerdende Eisen und führt es dem Knochenmark wieder zu (von Pearce und Austin bestritten). Die Milz ist, wie auch mikrochemische Untersuchungen von M. B. Schmidt erkennen ließen, der Speicher des im Blut- und Gewebsabbau entstehenden Eisens, die Leber vorzüglich des Nahrungs Eisens, bei gesteigertem Abbau aber die Milz unterstützend. Nach Entmilzung wird die Galle eisenärmer (Pugliese), der Gesamteisengehalt des Körpers nimmt ab. Bei entmilzten Ratten versuchen die Sternzellen die Eisen retinierende Funktion zu ersetzen; trotzdem kommt es zu einer mikrochemisch erkennbaren Eisenausscheidung durch die Nieren (Lepehne). Bayer konnte weiterhin zeigen, daß bei myeloischer Leukämie und beim Morbus Banti die Milz zwar Eisen retiniert, aber die Verwertung des Eisens für den Organismus eingebüßt habe.

Weiterhin ist die Milz am Cholesterinstoffwechsel beteiligt. Nach der Splenektomie steigt der Gehalt des Blutes an Cholesterin (Eppinger, Soper). Cholesterinfütterung zieht eine Cholesterinablagerung in den Retikuloendothelien der Milz und der anderen Organe nach sich (Anitschkow und Chalataw). Zerstörung allein der Milzfollikel durch Mesothorium ändert die Höhe des Blutcholesterinspiegels nicht (Soper). Wie weit der Milztumor der Gaucherschen Krankheit mit seinen großen Fettzellen mit einer Störung des Cholesterinstoffwechsels zusammenhängt, ist unsicher.

Frühere experimentelle Untersuchungen über die Beziehung der Milz zum Eiweißstoffwechsel erbrachten kein positives Resultat. Erst neuerdings konnten Asher und Bernet zeigen, daß entmilzte Kaninchen mehr Stickstoff ausscheiden, daß also ihr Eiweißumsatz vergrößert sei. Hier ist auch Umbers Beobachtung einzureihen, daß beim Morbus Banti mit seiner fibrös veränderten Milz der Stickstoffumsatz erhöht ist und nach Splenektomie zur Norm absinkt. In diesem Zusammenhang mag auch die Beziehung der Milz zur Amyloidbildung erwähnt sein. Nach Davidsohn bildet ein entmilztes Tier kein Amyloid mehr. Zur Entstehung des Amyloides aus der amyloidogenen Substanz bedürfe der Körper eines in der Milz entstehenden Fermentes. Bei entmilzten Meerschweinchen fehlt auch der nach Sensibilisierung mit Pferdeserum sonst einsetzende autolytische Eiweißabbau in der Leber (Pick und Hashimoto). In der Milz gebildete Fermente seien für die Autolyse verantwortlich. Ähnlich zu deuten mögen die Beobachtungen von Joannovicz sein, daß splenektomierte Tiere die Toluylendiaminvergiftung besser ertragen und nach Injektion hämolytischer Sera weniger Lebernekrosen aufweisen. Jedoch mag es sich hierbei auch um die Ausschaltung einer Schädigung der Leber durch überreichlich aus der Milz zuströmende Blutzerfallsprodukte handeln, die nun weniger konzentriert auf dem arteriellen Wege zur Leber gelangen (Pugliese). Es ist nicht von der Hand zu weisen, daß auch die Krisen des hämolytischen Ikterus, bei denen es ja zu einer Leberschädigung mit verstärkter Gelbsucht, Bilirubinurie, Leberkolik usw. kommt, auch auf plötzlich übermäßige Ueberschwemmung der Leber mit Blutzerfallsprodukten zurückzuführen sind. Andererseits könnten auch autolytisch wirkende Fermente im obigen Sinn eine Rolle spielen, auf deren Ausschaltung durch Splenektomie auch die günstigen Erfolge beim Morbus Banti und bei der hypertrophischen Leberzirrhose beruhen könnten.

Schließlich sei noch kurz auf die Beziehung der Milz zum Tumorwachstum und zur Verdauung hingewiesen. Viele Autoren nehmen auf Grund ihrer Experimente eine immunisierende Beeinflussung des Körpers gegenüber dem Entstehen von Impftumoren an. Entmilzte Tiere starben nach Impfung mit Krebsmaterial, während gesunde Tiere am Leben blieben. Die Milz sei die Hauptbildungsstätte für Antikörper gegen die Tumorbildung (Braunstein). So erweist sich auch die Milz selbst refraktär gegen Tumorwachstum: Tumormetastasen und besonders primäre Tumoren in der Milz sind sehr selten. — Die Beeinflussung der Verdauung durch die Milz ist noch umstritten, besonders ihr Einfluß auf die Trypsinbildung. Jedenfalls schwillt die Milz zur Zeit der Verdauungsperiode an. Entmilzte Tiere zeigen eine vermehrte Peristaltik und eine erhöhte Kotmenge (Bayer). In einem gewissen Widerspruch hierzu steht die Verwendung von Milzektrakt zur Anregung der Peristaltik in Form des Zülzerschen Hormons, dem ja eine stark abführende Wirkung nicht abzustreiten ist.

Anitschkow, Ziegler's Beitr. 57, S. 543 1912. — Asher, D. m. W. 1911 Nr. 27. — Asher und Sollberger, Biochem. Zschr. 1913, 55, S. 13. — Asher und Bernet, Biochem. Zschr. 1912, 128, S. 251. — Bayer, Mitt. Grenzgeb. 1909, 21, S. 338; 1910, 22, S. 111 u. 532; 1913, 27, S. 311. — Bittner, Fol. haemat. 15. — Braunstein, B. kl. W. 1911 Nr. 45. — Brieger, Klin. Wschr. 1922 Nr. 17. — Cori, Zbl. f. klin. M. 1922, 94, S. 356. — Davidsohn, Verh. D. path. Ges. 1904 S. 39. — Ernst und Szapanyos, Klin. Wschr. 1922 Nr. 13. — Eppinger, Hepato-lieae Erk. Berlin 1920. Verh. D. path. Ges. 1921 S. 33; B. kl. W. 1913 Nr. 33 u. 52. — Feissly, M. m. W. 1921 Nr. 44. — Frank, Ziegler's Beitr. 67, 1920; B. kl. W. 1915 Nr. 18/19, 37, 41; 1916 Nr. 21. — Frey, Zschr. f. d. ges. exper. M. 1914, 3, S. 416; Zschr. f. klin. M. 1921, 92, S. 450. — E. Frey, D. Arch. f. klin. M. 133, S. 223 1920. — Gabbi, Ziegler's Beitr. 14, S. 351 1893. — Grossenbacher, Biochem. Zschr. 1909, 17. — Helly, Verh. D. path. Ges. 1921 S. 6; Ziegler's Beitr. 49, S. 6 1910. — Hijmans van den Bergh, Der Gallenfarbstoff im Blut, Leipzig 1918. — Hirschfeld, Zschr. f. klin. M. 1919, 87, S. 165; D. m. W. 1915 Nr. 37. — Hirschfeld und Klempner, Ther. d. Gegenw. 1913 S. 385. — Hirschfeld und Weinert, B. kl. W. 1914 Nr. 22. — Isaac und Bieling, Zschr. f. d. ges. exper. M. 1921, 25, S. 1. — Joannovicz, Zschr. f. exper. Path. u. Ther. 1910, 7, S. 185. — Kaznelson, W. kl. W. 1916 Nr. 46; Zschr. f. klin. M. 87. — Klempner, Ther. d. Gegenw. 1914 S. 1. — Kölliker, Mitteil. d. Zürcher Naturforscherges. 1847 S. 120. — Lepehne, D. m. W. 1914 Nr. 27; Ziegler's Beitr. 64, S. 55 1917; 65, S. 163 1919. — Lubarsch, B. kl. W. 1921 Nr. 28; Verh. D. path. Ges. 1921 Diskuss. S. 34. — Minkowski, Deutsch. Kongr. f. Inn. Med. 1900 S. 316. — Nägeli, Blutkrankheiten, Berlin u. Leipzig 1919. — Nishikawa und Takai, D. m. W. 1922 Nr. 32. — Nonnenbruch und Scyska, M. m. W. 1920 Nr. 37. — Pearce und Austin, Journ. of exp. Med. 1914, 20, S. 122. — Pel, D. Arch. f. klin. M. 106, S. 592 1912. — Pick und Hashimoto, Arch. f. exper. Path. u. Pharm. 76, S. 89 1914. — Ponfick, Virch. Arch. 48, S. 1 1869. — Port, Arch. f. exper. Path. u. Pharm. 73, S. 251 1913. — Port und Akiyama, D. Arch. f. klin. M. 1912, 106, S. 362. — Pugliese, Arch. f. Anat. Phys. Phys. Teil S. 60 1899; Biochem. Zschr. 1913, 52, S. 423. — Pribram, W. kl. W. 1913 Nr. 40. — Rosenow, Deutsch. Kongr. f. Inn. Med. 1921 S. 487. — M. B. Schmidt, Verh. D. path. Ges. 1912 S. 91; 1914 S. 156; Sitzungsber. d. physik. med. Ges. Würzburg 1916. — Schmincke, M. m. W. 1916 Nr. 28/29. — Soper, Ziegler's Beitr. 60, S. 232 1915; Zschr. f. exper. Path. u. Ther. 1914, 16, S. 467. — Le Sourd und Pagniez, Cpt. rend. hebdomadaire des séances de la soc. de biol. 1911, 72, S. 611. — Stephan, M. m. W. 1920 Nr. 11. — Steudemann, Fol. haemat. 1914, 18, S. 140. — Strisower und Goldschmidt, Zschr. f. d. ges. exper. M. 1916, 4, S. 236. — Szenes, M. m. W. 1921 Nr. 8. — Umber, Zschr. f. klin. M. 1904, 55 S. 1. — Vogel, Biochem. Zschr. 1912, 43. — Wöhlisch, M. m. W. 1921 Nr. 30. — Zimmermann, Biochem. Zschr. 1909, 17, S. 297.