dunklen Verbreiterung hell). Die Linie D_3 war in den Flecken selbst nicht zu sehen, dagegen zeigte sie sich in der Umgebung der Flecke, wo C und F unsichtbar waren, als dunkles, etwas verwaschenes, an beiden Enden spitz auslaufendes Band, und zwar nicht schwarz, sondern matt grau.

Die Erscheinung war sehr augenfällig; Herr Dr. Starke, Privatdozent am physikalischen Institut zu Berlin, der zufällig hinzukam, sah die dunkle Linie auf den ersten Blick. Leider

Berlin, 1905 März 6.

wurde die Beobachtung durch Bewölkung vielfach unterbrochen, sodaß eine genauere Okularbeobachtung der Flecken und ihrer Umgebung, besonders mit Rücksicht auf die Anwesenheit von Fackeln nicht angestellt werden konnte.

Juni 13 war D_3 noch dunkel zu sehen, allerdings nur schwierig, weil sehr matt. Das Aussehen der Linien C und F war von ihrem gewöhnlichen Anblick nicht mehr verschieden. Fackeln von besonderer Helligkeit waren an diesem Tage in der Umgebung der Flecken nicht zu bemerken.

Zu erwähnen wäre noch der Umstand, daß sowohl Youngs Beobachtung 1870 in die Zeit der maximalen Flecken-tätigkeit fiel, als auch, daß meine Wahrnehmung nicht lange vor dem augenblicklichen Maximum stattfand. Indessen müssen wohl erst weitere Beobachtungen lehren, ob es sich hier nur um ein zufälliges Zusammentreffen handelt, oder ob die Umkehr der D_3 -Linie in engerem Zusammenhang mit den Maxima der Sonnenflecke steht.

H. Kreusler.

Über die Temperatur der Sonne.

Von Dr. Richard Lucas, Assistent der technischen Hochschule in Braunschweig.

Die großen Errungenschaften, welche die Physik der hohen Temperaturen in den letzten Jahren davontrug, hat uns in den Stand gesetzt, auf verschiedenen unabhängigen Wegen das schwierige Problem der Ermittlung der Sonnentemperatur erfolgreich anzugreifen und diese Temperatur in ein relativ kleines Intervall einzuschließen. In neuester Zeit ist nun zur Bestimmung hoher Temperaturen ein Verfahren verschiedentlich¹⁾ angewendet worden, welches sich durch große Einfachheit der Handhabung auszeichnet und fundamentale Bedeutung für die Beleuchtungstechnik besitzt. Das Prinzip dieser Methode besteht darin, aus der photometrischen Gesamthelligkeit auf die Temperatur des glühenden Körpers zu schließen. Während man sich zuerst damit behalf, das rapide Ansteigen der Helligkeit mit der Temperatur

durch eine interpolatorische Potenzregel auszudrücken (bei Weißglut sei die Helligkeit etwa der 15^{ten} resp. 14^{ten} Potenz der absoluten Temperatur proportional) ist neuerdings durch E. Rasch das Gesetz der photometrischen Strahlung gefunden und an den experimentellen Daten geprüft worden²⁾. Das Gesetz lautet:

$$\log \text{nat } \Phi = C - \frac{K}{T} \quad I$$

wobei C und K Konstante, Φ , T Helligkeit und Temperatur in absoluter Zählung bedeuten.

Für die Gesamtlichtstärke des schwarzen Körpers bei verschiedenen Temperaturen, ausgedrückt in Hefner-Kerzen (HK) liegen folgende Daten vor:

1 Quadratmillimeter schwarzer Strahlung sendet aus:

	bei 1175°	0.0024 HK	Beobachter
	» 1325	0.0220 »	Lummer
	» 1435	0.0635 »	und
	» 1780	0.91 »	Pringsheim
			Nernst

(Platin-Schmelzpunkt)

Die Helligkeit Φ des schwarzen Körpers in Hefner-Kerzen pro Quadratmillimeter beträgt bei der absoluten Temperatur T danach:

$$\Phi = e^{12.943 - \frac{26750}{T}} \quad I\alpha \text{ (Rasch)}$$

Berücksichtigt man nur die ersten drei Daten, da der Schmelzpunkt des Platins noch etwas unsicher ist, so ergibt sich, berechnet nach der Methode der kleinsten Quadrate:

$$\Phi = e^{12.384 - \frac{26131}{T}} \quad I\beta$$

Es erscheint daher von Interesse, unter Benutzung dieses Gesetzes aus der Gesamthelligkeit der Sonne die effektive Sonnentemperatur zu berechnen.

Allerdings haben nur wenige Forscher die Ermittlung der photometrischen Helligkeit der Sonne zum Gegenstand einer Untersuchung gemacht und die erhaltenen Resultate sind nicht einwandfrei³⁾. Neuerdings hat jedoch Charles Fabry⁴⁾ in der Erkenntnis der großen Unsicherheit und Ungenauigkeit des vorhandenen Materials unter Benutzung der modernen exakten Methoden ausführliche Messungen ange-

¹⁾ Holborn und Kurlbaum, Akad. d. Wiss., Berlin 1901, 712. — Lucas, Diss. 1903, p. 8. — Nernst, Phys. Zeitschr. 4, 733 (1903).

²⁾ E. Rasch, Annalen der Physik 14, 194 (1904).

³⁾ cf. G. Müller, Die Photometrie der Gestirne.

⁴⁾ Comptes Rendus 87, 973 (1903).

stellt. Hiernach ergibt sich das Resultat, daß 1 Quadratmillimeter der Sonnenscheibe normal eine Lichtintensität aussendet, welche nach der Absorption durch die Atmosphäre der von 1800 Dezimalkerzen⁵⁾ gleicht. Die Helligkeit der Sonnenscheibe ist hierbei als gleichmäßig betrachtet; offenbar stellt der obige Wert ein Minimum dar und damit auch der unten angegebene Wert für die Sonnentemperatur.

Braunschweig, 1905 Jan. 20.

Setzt man den von Fabry gefundenen Wert von 1800 Dezimalkerzen, gleich 2034 Hefner-Kerzen, in die obige Formel ein, so ergibt sich aus $1\beta\ 5023^\circ$ Celsius, aus dem Raschschen Wert 1α eine etwas kleinere Zahl, im guten Einklang mit den auf anderen, davon unabhängigen Wegen gefundenen Werten.

Dr. Richard Lucas.

⁵⁾ Die Dezimalkerze DK wurde mit der Hefnerkerze HK verglichen und $1\text{ DK} = 1.13\text{ HK}$ gefunden.

Beobachtungen von Sternbedeckungen

angestellt am Refraktor (Objektiv Merz 18.6 cm) der Düsseldorfer Sternwarte von Dr. W. Luther.

Stern	Beobachtete Erscheinung	Datum	Sternzeit	Mittlere Ortszeit
α Tauri	Austritt am dunklen Rande	1903 Okt. 10	22 ^h 50 ^m 10 ^s .5	9 ^h 37 ^m 0 ^s .9
α Tauri	Eintritt am dunklen Rande	1904 Febr. 24	4 46 58.8	6 34 11.3
α Tauri	Austritt am hellen Rande	1904 » 24	6 4 43.1	7 51 42.8
γ Tauri	Eintritt am dunklen Rande	1904 Dez. 20	0 27 51.9	6 32 18.5
α Tauri	Eintritt am dunklen Rande	1904 » 20	9 46 15.0	15 49 10.0
α Tauri	Austritt am hellen Rande	1904 » 20	10 37 1.2	16 39 47.9

Bemerkungen.

1903 Okt. 10. Beobachtung durch Wolkenschleier. Vorher und nachher dichte Cumuli. Austritt plötzlich. Beobachtung befriedigend. Eine Meridianbeobachtung gelang Okt. 10 nicht, doch dürfte der Uhrstand leidlich sicher sein, da Okt. 7 die Instrumentalkonstanten durch Nivellement und Beobachtung von 76 Drac. (O.K.), 1 Hev. Drac. (U.K.), eines Zenit- und eines Südsterne bestimmt worden waren.

1904 Febr. 24. In beiden Momenten war es heiter und ich halte die Beobachtungen für befriedigend sicher. Febr. 24 gelang wegen eintretender Bewölkung nur die Beobachtung von zwei Zeitsternen; doch bestimmte ich Febr. 25 die Instrumentalfehler durch Nivellement und Beobachtung von δ Ursae (U.K.), 51 H. Cephei (O.K.), zwei Zenit- und drei Südsterne.

1904 Dez. 20. γ Tauri. Der Eintritt erfolgte bei dunstiger Luft am dunklen Rande des nahezu vollerleuchteten Mondes. Der Stern war schwach, aber deutlich. Die Beob-

achtung dürfte auf 0^s.5 sicher sein. — α Tauri. Der Stern verschwand bei klarer Luft plötzlich. Die Beobachtung des Eintritts wird voraussichtlich auf 0^s.3 sicher sein. Die Beobachtung des Austritts ist weniger sicher. Das Auge war durch längeres Anvisieren des hellen Mondrandes geblendet; auch erschien das Bild Aldebarans beim Austritt zunächst länglich. Am alten kleinen Passageninstrument gelang Dez. 20 eine Zeitbestimmung durch Nivellement und Beobachtung von α Ursae (O.K.), 4 Ursae (U.K.), zwei Zenit- und zwei Südsterne.

Erwähnt sei noch, daß 1904 Dez. 20 der Versuch, bei klarer Luft den Eintritt von θ_1 Tauri, welcher eine sehr kleine Sehne beschrieb, zu beobachten, wegen der Bildbeschaffenheit mißlang, während vorher bei dunstiger Luft die Beobachtung des Eintritts des nahezu gleichhellen Sterns γ Tauri keine Schwierigkeiten bereitet hatte.

Düsseldorf, Martinstraße, 1905 Jan. 12.

Wilhelm Luther.

Sternschnuppen am 13. Dezember 1904.

Im Jahre 1904 machte ich systematische Beobachtungen der Sternschnuppen von 10 bis 11 Uhr abends. Ich beobachtete die Himmelsgegend um α Ursae minoris in einem Kreise von etwa 90° Durchmesser. Die Anzahl der Sternschnuppen ist im Mittel zwei bis drei für das Feld und Stunde. Am 13. Dezember 1904 war die Anzahl der Sternschnuppen auffallend groß. Ich zählte während einer Stunde 25 Meteore, von denen ich 15 in eine Karte zeichnete. Die Anzahl für den ganzen Himmel schätze ich auf über 100. Die Erscheinung war sehr auffallend, da die Sternschnuppen meistens hell und von blendend weißer Farbe waren. Sie

wurde von vielen Personen wahrgenommen, die sonst kein Interesse für Astronomie aufweisen.

Von den 15 gezeichneten Sternschnuppen waren 4 erster Größe, 8 zweiter Größe, 1 dritter und 2 vierter Größe, 10 von ihnen waren weiß, 1 gelb, 1 orangefarbig und 3 rosafarbig. Alle beschrieben kurze Bahnen mit einer Dauer von etwa 0^s.3. Die Koordinaten des Radiationspunktes sind etwa $\alpha = 120^\circ$, $\delta = +45^\circ$. Es waren jedenfalls Geminiden, und ich glaube, daß sie in diesem Jahre ihr Maximum hatten. Leider gestattete das Wetter nicht die Beobachtung fortzusetzen.

Lemberg, Observatorium, 1905 Jan. 24.

Dr. M. Ernst.