H. Thoms: Zur Gerbstoffforschung. (Ber. Deutsch. Pharm. Ges. 1905, 15, 303—347.) — Verf. gibt einen Überblick über die Entwicklung der Gerbstoffchemie und kommt zu der Schlußfolgerung, daß die bisher gegebenen Definitionen für den Ausdruck „Gerbstoffe“ nicht befriedigen können, daß vielmehr diese Bezeichnung für in ihrem Verhalten so verschiedenartige Verbindungen keine Berechtigung mehr besitzen sollte. Er bespricht dann sein Verfahren der Aussalzung des Gerbstoffs des Belladonna-Extraktes mit Ammoniumsulfat und macht Mitteilung über seine Untersuchungen des Tannins. Diese Substanz läßt sich in Fraktionen von verschiedener Drehung zerlegen, ist also, wie schon von anderen Forschern behauptet worden ist, kein einheitlicher Körper. Der Verf. kritisiert dann des weiteren die von Glücksmann (Pharm. Post 1904, 429) angegebene Methode der Wertbestimmung des Tannins mit Formaldehyd, welcher eine Bedeutung nicht beizumessen sei, da auch die Begleitkörper des Tannins, wie Pyrogallol und Gallussäure, mit Formaldehyd reagieren.

A. Hebebrand.

C. Virchow: Über die Ausfällbarkeit von Gerbstoffen durch Ammoniumsalze. (Ber. Deutsch. Pharm. Ges. 1905, 15, 348—352.) — Gegenüber den Angaben von Glücksmann (Die moderne naturwissenschaftliche Inquisition, Wien 1905) kommt der Verf. auf ältere Arbeiten zurück, welche in Bestätigung der von Thoms beim Belladonnaextrakt gemachten Beobachtungen zeigen, daß gewisse aus dem Galläpfeltannin gebildete Umsetzungsprodukte durch Ammoniumsalze gefällt werden.

A. Hebebrand.

Emil Abderhalden und Yutaka Ternuchi: Das Verhalten einiger Peptide gegen Organextrakte. (Zeitschr. physiol. Chem. 1906, 47, 466—470.)

Th. Osborne und J. F. Harris: Über die Grenzen der Fällung mit Ammoniumsulfat bei einigen vegetabilischen Proteinen. II. (Zeitschr. analyt. Chem. 1906, 45, 693—703.) — Vergl. Z. 1906, 12, 543.

Th. Osborne und J. F. Harris: Über die Löslichkeit des Globulins in Salzlösungen. (Zeitschr. analyt. Chem. 1906, 45, 733—741.) — Vergl. Z. 1906, 12, 543.

G. Patein: Beitrag zum Studium der Eiweißkörper des Bluteserums. (Journ. Pharm. Chim. 1906, [6] 24, 16—21.)

A. Bach: Peroxydasen als spezifisch wirkende Enzyme. Herrn R. Chodat zur Antwort. (Ber. Deutsch. chem. Gesellsch. 1906, 39, 3329—3331.)

Th. Weyl: Historische Notiz über die Bindung von Ozon durch Ölsäure. (Ber. Deutsch. chem. Gesellsch. 1906, 39, 3347—3348.)

A. Kldiaschwili: Über den Dichloressigsäureester des Dextrins. (Journ. russ. phys.-chem. Ges. 1905, 37, 421—423; Chem. Zentrbl. 1905, II, 401.)

Forense Chemie.

Casimir Strzyzowski: Über ein einfaches Veraschungsverfahren zur raschen Ermittlung von Arsen in Lebensmitteln und Tierobjekten. (Pharm. Post 1906, 39, 677—678.) — Das Verfahren beruht auf der Fähigkeit des Magnesium- oder Calciumoxydes, beim Veraschen mit arsenhaltigen organischen Substanzen das Arsen festzuhalten. — Erforderlich sind: 1. Arsenfreies Magnesiumoxyd; die Handelsware ist oft mit Arsen verunreinigt; der Arsengehalt der untersuchten Proben schwankte in 100 g zwischen 0,1—5 mg As_2O_3 . 2. Arsenfreie rauchende (1,48—1,52) oder konzentrierte (1,40—1,48) Salpetersäure. 3. Reine Schwefelsäure 1:7 und 1:1. 4. Ein kleiner Apparat nach Marsh. (Z. 1904, 7, 674.) — In einem Porzellan Tiegel von 20—25 ccm mischt man 1 g Magnesiumoxyd sorgfältig mit 10 ccm des flüssigen Untersuchungsgegenstandes und fügt bei Harn 0,5 ccm, bei Blut, Milch, Wein, Bier u. s. w. 1 ccm Salpetersäure zu. Von halbfesten Massen (Erbrochenes, Exkremente, Organe u. s. w.) werden 5—10 g, von festen Gegenständen (Brot,

Farben) 1 g zerkleinert, unter Zusatz von 10 ccm Wasser mit 1 g Magnesiumoxyd gemischt und 1 ccm Salpetersäure zugefügt. Dann wird auf dem Wasserbade oder der Asbestplatte eingetrocknet und im zuletzt offenen Tiegel allmählich bis zur Weißglut erhitzt; wenn der Tiegelinhalt nach 15—30 Minuten nicht weißgebrannt ist, wird er fein zerrieben, mit 4—5 ccm Wasser angefeuchtet, getrocknet und weißgebrannt. Der Glührückstand wird darauf in ein Becherglas gebracht, der Tiegel mit 10 ccm Wasser nachgespült, nach Zusatz von 5,5 ccm Schwefelsäure (50 %) durch ein kleines Filter gegossen, das farblose Filtrat unter Nachwaschen mit Schwefelsäure (12,5 %) auf 20—25 ccm verdünnt und in den Apparat nach Marsh gebracht. C. Mai.

A. Hubert und F. Alba: Nachweis des Arsens, Kupfers, Bleis und Zinks in den Weinen. (Monit. scientif. 1906, [4] 20, 799—802.) — Arsen. In einem schief gestellten Kjeldahl-Kolben von 200 ccm werden 20 bis 50 ccm Schwefelsäure über freier Flamme zum Sieden erhitzt und aus einem Hahntrichter 200—1000 ccm des zu prüfenden, je nach dem Zuckergehalt mit 20—40 % Salpetersäure vermischten Weines tropfenweise zugesetzt. Zur Zerstörung der organischen Substanz und Verdampfung der Flüssigkeit sind für 1 Liter Wein 2—3 Stunden erforderlich. Man gibt schließlich zu dem Kolbeninhalt, dessen Volum etwa das gleiche ist, wie am Anfang, noch einige Tropfen Salpetersäure, erhitzt weiter bis zum Auftreten weißer Schwefelsäuredämpfe über der Kolbenmündung und bis zum völligen Verschwinden jeder Spur Salpetersäure, verdampft dann die Schwefelsäure bis auf 5—10 ccm im Sandbad, läßt erkalten und bringt nach Zusatz des gleichen Raumteiles kalten Wassers in einen durch Abbildung erläuterten Marsh'schen Apparat. Dieser besteht aus einem Entwicklungsgefäß von 250—300 ccm mit Trichter-, Gasableitungs- und Trockenrohr. Der Wasserstoff wird aus Zink- und Schwefelsäure unter Zusatz von Platinchlorid oder Goldsulfat [? — Ref.] entwickelt, an der Spitze der Trockenröhre entzündet, eine Porzellanschale in die Flamme gehalten und die darauf entstehenden Flecken näher identifiziert. Es sollen so noch leicht 0,0001 g Arsen erkennbar sein. [Ein etwas „mittelalterliches“ Verfahren. — Ref.] — Kupfer und Blei. Man behandelt 250—500 ccm Wein in obiger Weise, verdampft den Schwefelsäurerückstand in einer Platinschale von 25—30 ccm auf etwa 1 ccm, macht mit verdünntem Ammoniak schwach alkalisch, setzt 1 ccm Salpetersäure zu, füllt die Schale fast ganz mit Wasser und elektrolysiert in einem durch Abbildung erläuterten Apparat, bei 60—70° 2 Stunden lang unter Anwendung eines Akkumulatorenstromes von 2 Volt bei 1—1,5 Ampère. Darauf werden ohne Stromunterbrechung mit einem Heber unter Nachgießen von Wasser 80—100 ccm Flüssigkeit (α) aus der Platinschale in ein Becherglas abgezogen. Dann wird die aus einer Platindrachtspirale bestehende Kathode herausgenommen, an der sich das Kupfer niedergeschlagen hat und die schon bei Gegenwart von 0,05 mg davon rotgefärbt ist. Zur Identifizierung des Kupfers wird die Spirale durch einige Tropfen Salpetersäure gezogen und die Lösung mit Ammoniak und mit Ferrocyankalium geprüft. Das Blei ist als Peroxyd auf der Schale niedergeschlagen, das in folgender Weise identifiziert wird. Man löst 0,5 g Tetramethyldiamidodiphenylmethan in 100 ccm Wasser, fügt 10 ccm Essigsäure zu und bewahrt das Reagens in gut verschlossenen dunklen Flaschen auf; die Flüssigkeit darf nicht blau gefärbt sein und sich auch beim Kochen nicht blau färben. Ein Tropfen des Reagenses gibt noch mit weniger als 0,01 mg Bleisuperoxyd eine tiefe Blaufärbung. — Zink. Bei der Untersuchung auf Zink allein werden 100—500 ccm Wein wie oben bei Arsen behandelt. Bei gleichzeitiger Prüfung auf Kupfer und Blei wird die nach der Elektrolyse abgeheberte Waschflüssigkeit (α) stark mit Ammoniak übersättigt, 25 ccm gesättigter Ammoniumchloridlösung zugesetzt, abfiltriert, Becherglas und Filter einmal ausgewaschen, das Filtrat mit Ammoniumsulfid versetzt, der Niederschlag nach 24 Stunden abfiltriert, auf dem Filter nach dem Auswaschen mit 1 %-iger

Salzsäure behandelt, die Lösung im Schälchen auf 10 ccm verdampft und nach dem Erkalten im Reagensglas mit verdünntem Ammoniak überschichtet, wobei bei Gegenwart von Zink an der Berührungszone ein weißer, beim Schütteln verschwindender Niederschlag entsteht. Bei weniger als 1 mg Zink entsteht in dieser ammoniakalischen Lösung mit Ammonsulfid nach dem Stehen ein Niederschlag.

C. Mai.

Alfred C. Chapman und H. D. Law: Über den Nachweis geringer Mengen Arsenik. (Zeitschr. angew. Chem. 1907, **20**, 67—68.) — Es wurde untersucht, welchen Einfluß die Legierung von Zink mit geringen Mengen anderer Metalle auf seine Empfindlichkeit beim Arsennachweis nach Marsh ausübt. Alle benutzten Metalle, mit Ausnahme von Zinn, Cadmium und Blei setzen die Empfindlichkeit des Zinkes wesentlich herab und führen dadurch zu teilweise sehr beträchtlichen Arsenverlusten.

C. Mai.

Eli Crespolani: Wie verhält sich Kaliumnitrat bei der Fäulnis in bezug auf die Toxikologie der Salpetersäure und der Nitrate. (Boll. Chim. Farm. 1905, **44**, 697—700.) — 300 g Pferdefleisch wurden nach Zusatz der gleichen Menge Wasser und von etwa 1 g Kaliumnitrat 7 Monate lang der Fäulnis überlassen. Dabei ging das Nitrat und zwar sofort nach Beginn der Fäulnis vollständig in salpetrige Säure und schließlich in Ammoniak über. Diese Reduktion, die wohl durch den infolge Zersetzung der Hydrolyseprodukte (Leucin, Tyrosin) sich bildenden Wasserstoff bzw. durch Schwefelwasserstoff zu erklären ist, verläuft auch bei größeren Mengen Nitrat stets quantitativ selbst bei gewöhnlicher Temperatur.

W. Roth.

Doménico Ganassini: Noch einmal über den toxikologischen Nachweis der Blausäure. (Boll. Chim. Farm. 1905, **44**, 519—525 und 558 bis 564.) — Wenn Blausäure dem Organismus durch die Schleimhäute zugeführt wird, ohne daß diese angegriffen werden und ohne daß das Tier die Dämpfe einatmen kann, so läßt sich Blausäure, wie Verf. bereits früher (Boll. Chim. Farm. 1904, **43**, 715), gezeigt hat, weder im Blut noch in irgend einem Organ nachweisen. Bei Vergiftung durch Inhalation findet sich Blausäure meist in Spuren im Blut, aber selten in den Organen und nie im Gehirn. Bei Vergiftungen auf subkutanem und gastrischem Wege findet sich Blausäure weder im Blut noch in den Organen, wenn sie in Mengen eingeführt ist, die gerade hinreichen, den Tod zu bewirken. Bei größeren Mengen findet sie sich manchmal auch im Blut und in den Organen, aber niemals im Gehirn. In diesem tritt entgegen der Ansicht von de Dominicis (Boll. Chim. Farm. 1905, **44**, 337) Blausäure niemals auf, außer bei etwaiger direkter Verunreinigung der Gehirnmasse durch Blausäure oder wenn, was für die Praxis kaum in Betracht kommt, kurz vor dem eintretenden Tode ein Teil der Brechflüssigkeit in die Luftröhre und in die Lungen und von dort durch das Blut sofort dem Gehirn zugeführt wird. Jedenfalls erleidet die Blausäure im Organismus, schon während sie ihre giftigen Eigenschaften äußert, eine vollständige Umwandlung. So ließ sich bei Tieren, denen Blausäure durch den Magen zugeführt wurde, in der aus den Lungen ausgeatmeten Luft keine Spur Blausäure mehr nachweisen. Zur Bestimmung der Blausäure selbst empfiehlt Verf., die feingeschnittenen Eingeweide mit viel Wasser aufzunehmen, den sehr flüssigen Brei mit Weinsäure anzusäuern, 40 ccm des Destillates nach Zusatz von etwas Eisensulfatlösung zur Trockne zu verdampfen, mit etwas konzentrierter Salzsäure aufzunehmen und mit 15—20 ccm Wasser zu verdünnen. Bei Gegenwart minimaler Mengen Blausäure prüft man mikroskopisch.

W. Roth.

Ed. Schaer: Über die Alkalinität der Pflanzenbasen und ihre Bedeutung bei chemischen und toxikologischen Arbeiten. (Vortrag

auf der 78. Versammlung Deutscher Naturforscher und Ärzte zu Stuttgart 1906.) — Vortragender und dessen Schüler (Springer, Feder und Simmer) haben eine Reihe von Arbeiten veröffentlicht, die sich beziehen auf: I. die Basizität der Alkaloide gegenüber Indikatoren; II. die fällende Wirkung freier Alkaloide bei Schwermetallsalzen; III. den „aktivierenden“ Einfluß der freien Pflanzenbasen bei verschiedenen Oxydationsprozessen; IV. das Verhalten der Alkaloidsalze zu den mit Wasser nicht mischbaren Lösungsmitteln. Inbezug auf die Bedeutung der Alkalinität der Pflanzenbasen sind besonders zu beachten: 1. die richtige Auswahl der empfindlichsten und sichersten Indikatoren; 2. die Einflüsse der Alkalinität auf das Verhalten von Alkaloidsalzen zu verschiedenen Lösungsmitteln; 3. die Anwendung von Pflanzenbasen zu Neutralisationen in Fällen, in denen die Verwendung der gewöhnlichen Alkalien weniger empfehlenswert ist; 4. die Verwertung der „aktivierenden“ Wirkung der Alkaloide auf Oxydationsvorgänge.

P. Buttenberg.

A. Simmer: Über das Verhalten der Alkaloidsalze und anderer organischer Substanzen zu den Lösungsmitteln der Perforationsmethode, insbesondere Chloroform, sowie über Reduktionswirkungen der Alkaloide. (Arch. Pharm. 1906, **244**, 672—684.) — Die Halogenwasserstoffsäuren und die Salpetersäure sind bei gerichtlichen Untersuchungen zum Ansäuern unbrauchbar; dagegen ist Ansäuern mit Weinsäure, Citronensäure, Phosphorsäure oder Schwefelsäure zu empfehlen. — Die Einwirkung der Alkaloide auf Chloroform ist so gering, daß sie praktisch außer acht gelassen werden kann.

C. Mai.

C. Reichard: Beitrag zur Kenntnis der Alkaloidreaktionen (Narcein). (Pharm. Zentralh. 1906, **47**, 1028—1031 und 1048—1051.) — Mit Schwefelsäure gibt Narcein sofort eine grünlich-gelbliche Färbung, die ganz schwach nachdunkelt und nach 5—15 Minuten an der Luft verbleicht. Bei vorsichtigem Erhitzen nimmt die Lösung darauf von den Rändern her blut- bis braunrote Färbung an, die nach 12-stündigem Stehen an der Luft schwach braunrot wird. — Mit Salpetersäure entsteht sogleich Gelbfärbung; läßt man die gelbe Lösung von Filtrierpapier aufsaugen und betupft darauf mit 40%-iger Kalilauge, so entsteht zuerst eine vorübergehende rote und dann eine beständige gelblichgrüne Färbung. — Erwärmt man Narcein mit Quecksilberchlorid und etwas Wasser, so tritt keine Reaktion ein; der Trockenrückstand gibt mit Salzsäure eine beim Eintrocknen an der Luft allmählich verschwindende gelbliche Färbung; letzterer Trockenrückstand färbt sich mit Schwefelsäure tief eigelb, welche Färbung beim Stehen an der Luft verschwindet. — Zu je einem Tropfen konzentrierter saurer Lösung von Wismuttrichlorid, Zinnchlorür und Antimontrichlorid bringt man eine Spur Narcein; die Wismutlösung färbt sich sofort tief gelb und trocknet zu einem glänzenden, gelblichen Firnis ein, während die beiden anderen Salztropfen einen farblosen Trockenrückstand geben. Wird zu den drei Rückständen ein Tropfen Schwefelsäure gefügt, so nimmt der Antimonfleck sofort eine gelbliche, nach längerem Stehen verschwindende Färbung an, der gelbe Wismutfleck wird farblos, während der farblose Zinnchlorürfleck zunächst eine schwach gelbliche Färbung annimmt, die bald in Rötlichgrau und bei vorsichtigem Erhitzen in Rötlichschwarz übergeht. Letztere Farbe verschwindet beim 12-stündigen Stehen an der Luft und erscheint beim Erwärmen wieder. — Ein Gemenge von Natriumorthoarsenat und Narcein färbt sich mit Schwefelsäure gelblich; beim Erwärmen über gelblichgrün tief rot bis braunrot, schwarz, rot und purpur. — Wird ein Tropfen Zinnchlorürlösung mit Narcein und einem Tropfen 40%-iger Kalilauge versetzt, so färbt sich die erst farblose Mischung beim Erwärmen gelblich bis gelblichgrün und der Trockenrückstand bei weiterem Erhitzen fast schwarzgrün. — Wird ein feinzerriebenes Gemisch von Narcein und Ammoniummolybdat wiederholt mit Wasser eingetrocknet, so färben sich die Ränder schwach gelblich; mit 30%-iger Essigsäure anstelle von Wasser tritt keine

Färbung auf; mit 25 %-iger Salzsäure an Stelle des Wassers zeigt sich wie bei diesem zuerst die gelbliche und nach $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ Stunden eine leichte hellblaue Färbung, die beim Eintrocknen nach 12 Stunden an Tiefe zunimmt; mit Schwefelsäure an Stelle des Wassers bildet sich sofort eine tief dunkelblaue, fast schwarze Färbung. Beim Stehen der Mischung bildet sich eine dunkelblaue Flüssigkeit mit einer tief gelbgrünen Zone, die allmählich stärker wird und dann wieder verschwindet. — Gibt man zu Narcein einen Tropfen konzentrierter Natriumjodidlösung, die durch Stehen an der Luft infolge von Jodausscheidung gelb geworden ist, so bildet sich um das Alkaloid ein blauer Rand und die Masse erscheint je bei auf- oder durchfallendem Licht blau oder weißlichtrüb. Auf Zusatz eines Tropfens Zinkchloridlösung wird die Masse tief dunkelblau.

C. Mai.

C. Reichard: Beiträge zur Kenntnis der Alkaloidreaktionen (Narkotin). (Pharm. Zentralh. 1907, 48, 44—51.) — Narkotin färbt sich mit 30 %-iger Salpetersäure fast augenblicklich gelb; der Trockenrückstand ist glänzend und behält die Gelbfärbung. — Mit Schwefelsäure entsteht in der Kälte auch nach 24 Stunden keine Färbung; beim Erhitzen entsteht Blauviolett-färbung, die beim Erkalten in undefinierbare Mischfarben übergeht und beim Erhitzen wieder erscheint. — Mit Mercuronitrat bei Gegenwart von Schwefelsäure entsteht sofort tiefe Schwarzfärbung, die nach 24 Stunden an der Luft in Gelbroth übergeht. — Beim Erhitzen mit Salzsäure entsteht Gelbfärbung. — Beim schwachen Erhitzen eines feingeriebenen Gemenges von wasserhaltiger, krystallisierter Borsäure und Narkotin entsteht eine bleibende schwefel- bis eigelbe Färbung. — Gegen Natriumarsenat verhält sich das Narkotin wie Morphin. — Eine Mischung von Narkotin mit Zinnchlorür und Schwefelsäure färbt sich beim Erhitzen schwärzlich-gelbgrün; beim Stehen an der Luft wird die Masse heller schmutziggelb bis gelbgrün, von schwärzlichen Pünktchen durchzogen. Mit Zinnchlorür allein ohne Schwefelsäure entsteht beständige Gelbfärbung. — Ein Tropfen durch freies Jod gelb gefärbter Natriumjodidlösung färbt sich beim Erhitzen mit Narkotin gelb; Zusatz von Chlorzinklösung beim Erhitzen verstärkt die Gelbfärbung. — Wird ein Tropfen konzentrierter wässriger Methylaminchlorhydratlösung mit Narkotin vorsichtig erhitzt, so entsteht beständige tiefe Gelbfärbung. — Ein zerriebenes Gemenge von Narkotin und Diphenylamin färbt sich bei schwachem Erwärmen mit Schwefelsäure schmutziggelb und schwärzlich.

C. Mai.

C. Reichard: Über den Nachweis und die Reaktionen des Santonins. (Pharm. Ztg. 1907, 52, 88—89.) — Beim Erwärmen von Santonin mit Alkohol und gepulvertem Ätzkali entsteht karminrote Färbung, die nach einigen Stunden in beständiges Gelb übergeht; bei Anwendung von Ammoniak an Stelle von Ätzkali erhält man eine schwach rötliche Flüssigkeit, die beim Erkalten wieder farblos wird. — Beim Erwärmen mit Schwefelsäure entsteht Blaufärbung, die bei weiterem Erhitzen in beständiges Gelb übergeht. — Ein feinzerriebenes Gemenge von Santonin und Quecksilberchlorid färbt sich mit Schwefelsäure in der Kälte nicht; in der Wärme gelblich-schwärzlich. Mit Mercuronitrat an Stelle des Quecksilberchlorids entsteht mit Schwefelsäure schon in der Kälte sogleich Schwarzfärbung. Wird das Gemenge von Santonin und Quecksilberchlorid mit starker Kalilauge versetzt, so geht die in der Kälte entstehende Gelbfärbung beim Erwärmen in Orange, und dies beim Erkalten wieder in das ursprüngliche Gelb über. — Fügt man zu etwas Santonin einige Kupfersulfatkryställchen, so färben sich letztere bei Zugabe von Schwefelsäure tief blau; beim Erwärmen entsteht schwärzlichrote Färbung. — Ein Gemenge von Santonin und Wismutsubnitrat färbt sich mit Schwefelsäure sofort tief blau. — Ein Gemenge von Santonin und Diphenylamin färbt sich mit Schwefelsäure in der Kälte nicht; beim Erwärmen entsteht tief rotbraune Färbung, die nach 12 Stunden in Gelb und schließlich in Dunkelgrün übergeht.

C. Mai.