Über eine neue Form des Keilphotometers.

Von H. Rosenberg.

Trotzdem die Theorie des Keilphotometers die denkbar einfachste ist und die Reduktion der mit ihm angestellten Beobachtungen ein Minimum von Rechenarbeit erfordert, hat dieses Instrument neben den Polarisationsphotometern nicht die ihm gebührende Anwendung gefunden. Den Grund findet man in der übermäßigen Anstrengung, die dem Auge des Beobachters zugemutet wurde, der veränderlichen Empfindlichkeit des Auges und dem nicht zu eliminierenden Einfluß der Helligkeit des Himmelsgrundes; auch daß man sich nur von einer Seite der Auslöschungsgrenze nähern konnte, war von Nachteil für die Beobachtungen.

In folgendem möchte ich eine völlig neue Anordnung für die Verwendung des Keilphotometers vorschlagen, die die guten Eigenschaften dieses Instruments voll auszunutzen gestattet und auch einige Vorteile vor den anderen Photometern bietet.

Der Keil wird bei dieser Methode nicht bis zur völligen Auslöschung des Sternenlichts benutzt, sondern nur zur Abschwächung auf Gleichheit mit einem künstlichen Sternbildchen. Ein nach meinen Angaben gebautes Instrument zeigt folgende einfache Einrichtung. Den Grundstock bildete mein altes Toepfersches Keilphotometer mit Registriervorrichtung (Beschreibung siehe G. Müller: Die Photometrie der Gestirne, pg. 184). An die Stelle der Okularröhre tritt ein Kubus, dessen Anordnung aus nebenstehender Figur leicht ersichtlich ist. a ist eine Lichtquelle, in unserem Falle eine kleine Osmiumlampe, die ein schönes weißes Licht gibt, und durch Einschaltung eines veränderlichen Widerstandes während einer längeren Zeit konstant gehalten werden kann. Ein sternartiges Bild der Öffnung b , die durch einschiebbare Blenden jeden gewünschten Durchmesser erhalten kann, entsteht auf der mit Quecksilber gefüllten Glaskugel c und wird von hier auf die unter einem Winkel von 45° gegen die Absehlenslinie geneigte planparallele Glasplatte reflektiert. Die hier durch Reflexion an der Vorder- und Rückwand entstehenden virtuellen Bilder werden durch ein schwaches Okular von großem Bild- und Augenabstand betrachtet. Durch passende Wahl der in Betracht kommenden Abmessungen läßt es sich leicht erreichen, daß die Bilder in die Keilebene fallen, daß also bei scharfer Einstellung des natürlichen und des künstlichen Sterns der Keil in der Brennebene des Fernrohres liegt. Vor Beginn der Beobachtungen hat man nur dafür zu sorgen, daß der künstliche Stern schwächer ist, als das schwächste zu messende Objekt, was durch Einschieben von Blendgläsern vor die Lichtquelle bewirkt wird.

Die Vorteile dieser Anordnung sind in die Augen springend. Was zunächst die Einstellsicherheit betrifft, so

ist sie bei völlig analoger Beobachtungsweise die gleiche, wie bei dem Zöllnerschen Astrophotometer. Dagegen werden einige systematische Fehlerquellen vermieden, die diesem Instrumente eigentümlich sind. Zunächst halte ich es für einen Vorteil, daß man von dem $\sin^2$ -Gesetz frei wird. Denn während bei allen Polarisationsphotometern der mittl. Fehler einer Einstellung bei kleinen Ablesungen viel geringer sein

muß, als bei größeren, ist er bei dem Keil an allen Stellen der gleiche. Dadurch ist auch bedingt, daß man mit dem Keilphotometer viel größere Helligkeitsintervalle messen kann, als z. B. am Zöllnerschen Photometer. Bei letzterem ist nach Müller ein Intervall von drei Größenklassen als Grenze anzusehen. Dagegen umfassen die vom Mechaniker Toepfer hergestellten Keile bei einer Länge von 6–8 cm und einer

Keilkonstante von etwa 0.20 Größenklassen ca. 14 Größenklassen. Sehen wir nun von der Benutzung der äußersten Enden des Keiles ab, die sich naturgemäß nicht so korrekt herstellen lassen, so können wir mit einem sorgfältig untersuchten Keil ein Helligkeitsintervall von etwa acht Größenklassen ruhig messen.

Der größte Vorzug der neuen Anordnung besteht darin, daß nicht die Intensität des künstlichen, sondern die des natürlichen Sterns geändert wird. Auf diese Weise geschieht die eigentliche Messung aller Sterne bei derselben absoluten Helligkeit, während beim Zöllnerphotometer gerade die verschiedene Helligkeit der zu messenden Objekte eine systematische Fehlerquelle bildet, deren Einfluß sich darin äußert,

Straßburg i. E., 1906 Mai 13.

Nachschrift vom 18. Juni. Wie ich nachträglich von Herrn G. Müller erfahre, existiert auf dem Astrophysikalischen Observatorium zu Potsdam bereits seit einigen Jahren ein von ihm konstruiertes Photometer, das im wesentlichen auf

daß die schwachen Sterne verhältnismäßig zu hell, die hellen zu schwach gemessen werden.

Die Beobachtungsarbeit bei Benutzung des Keilphotometers wird gegenüber dem Zöllnerschen bei gleicher Genauigkeit auf die Hälfte herabgedrückt. Denn während bei letzterem zur Eliminierung der Exzentrizität des Intensitätskreises mindestens zwei Einstellungen erforderlich sind, liefert hier schon jede einzelne Einstellung einen unabhängigen Wert.

Zum Schluß möchte ich noch darauf hinweisen, daß auch der bei weitem geringere Preis — das Instrument kostet etwa halb so viel, wie ein Zöllnersches Photometer — zu Gunsten des Keilphotometers in die Wagschale fällt.

H. Rosenberg.

dem gleichen Prinzip beruht, und sich vortrefflich bewährt hat. Eine Beschreibung des Instruments, welches sich als eine Vereinigung des Keilphotometers mit dem Zöllnerschen Astrophotometer darstellt, findet sich in Astr. Nachr. Nr. 3693.

H. R.

Observations de petites planètes

faites à l'Observatoire d'Alger à l'Equatorial coudé de 0.318 m d'ouverture par MM. Rambaud et Sy.

1905	T.m.d'Alger	$\Delta\alpha$	$\Delta\delta$	Cp.	Obs.	α app.	$\log p.A$	δ app.	$\log p.A$	Red. ad l. app.	*	
(37) Fides.												
Mai	10	10 ^h 11 ^m 41 ^s	+0 ^m 28 ^s 33	+ 8' 22".3	12,12	R	14 ^h 52 ^m 39 ^s 98	9.278 _n	-19° 36' 34".0	0.856	+2 ^s 17 — 2".9	1
	10	10 43 55	+0 26.91	+ 8 26.9	12,10	S	14 52 38.56	9.089 _n	-19 36 29.4	0.862	+2.17 — 2.9	1
	11	10 7 19	+0 26.88	- 1 6.5	12,12	R	14 51 45.34	9.276 _n	-19 33 8.5	0.856	+2.17 — 3.0	2
	11	10 41 47	+0 25.51	- 1 2.0	12,12	S	14 51 43.97	9.068 _n	-19 33 4.0	0.862	+2.17 — 3.0	2
	12	9 18 34	-0 26.13	+ 2 11.6	12,12	R	14 50 52.34	9.438 _n	-19 29 50.5	0.842	+2.18 — 3.1	2
	12	9 46 32	-0 27.08	+ 2 15.6	12,12	S	14 50 51.39	9.344 _n	-19 29 46.5	0.851	+2.18 — 3.1	2
	13	9 25 6	-1 20.84	+ 5 37.1	12,10	R	14 49 57.64	9.403 _n	-19 26 25.0	0.846	+2.19 — 3.1	2
	13	9 54 47	-1 21.81	+ 5 41.9	12,10	S	14 49 56.67	9.289 _n	-19 26 20.2	0.854	+2.19 — 3.1	2
	23	10 19 13	+1 3.66	-11 31.2	12,10	R	14 41 20.46	8.611 _n	-18 51 46.7	0.862	+2.19 — 4.1	3
	23	11 7 7	+1 2.05	-11 24.2	12,10	S	14 41 18.85	8.804	-18 51 39.7	0.861	+2.19 — 4.1	3
(47) Aglaja.												
Mai	29	10 12 57	-2 6.23	- 0 39.7	15,10	S	16 21 50.31	9.366 _n	-28 51 54.1	0.887	+2.57 + 2.8	4
	29	11 4 4	-2 8.45	- 0 39.3	15,10	R	16 21 48.09	9.073 _n	-28 51 53.7	0.901	+2.57 + 2.8	4
	30	8 58 29	-3 1.17	+ 0 24.7	15,10	S	16 20 55.38	9.565 _n	-28 50 49.8	0.853	+2.58 + 2.7	4
	30	9 40 44	-3 2.86	+ 0 25.9	15,10	R	16 20 53.69	9.460 _n	-28 50 48.6	0.876	+2.58 + 2.7	4
Juin	8	9 12 54	-2 28.63	- 5 39.3	15,10	S	16 12 22.30	9.407 _n	-28 36 31.3	0.882	+2.65 + 1.5	5
	8	10 17 50	-2 31.28	- 5 33.5	15,10	R	16 12 19.65	9.050 _n	-28 36 25.5	0.900	+2.65 + 1.5	5
	10	8 48 21	-1 52.63	- 9 52.8	14,10	S	16 10 34.40	9.456 _n	-28 32 34.4	0.875	+2.66 + 1.2	6
	10	9 26 49	-1 54.03	- 9 50.8	15,10	R	16 10 33.00	9.312 _n	-28 32 32.4	0.890	+2.66 + 1.2	6
	13	9 16 50	-1 0.82	- 0 29.7	13,10	S	16 7 55	9.290 _n	-28 26	0.891	+2.67 + 0.5	7
	13	10 25 43	-1 3.49	- 0 23.5	15,10	R	16 7 52	8.573 _n	-28 26	0.903	+2.67 + 0.5	7
(386) Siegena.												
Mai	30	10 48 47	-2 1.17	+ 3 14.4	15,10	S	15 57 39.65	8.894 _n	+ 7 41 27.0	0.632	+2.01 + 1.7	8
	30	11 37 5	-2 2.65	+ 3 17.5	15,10	S	15 57 38.17	8.345	+ 7 41 30.1	0.631	+2.01 + 1.7	8
Juin	8	10 56 30	+1 54.87	+ 5 21.7	15,10	R	15 51 3.61	8.398	+ 7 51 26.2	0.629	+2.03 + 3.7	9
	8	11 28 35	+1 53.89	+ 5 22.0	15,10	S	15 51 2.63	8.961	+ 7 51 26.5	0.631	+2.03 + 3.7	9
	11	9 53 43	+0 34.54	+ 4 43.1	12,12	R	15 49 43.29	8.894 _n	+ 7 50 48.0	0.630	+2.04 + 4.1	9
	11	10 24 40	+0 33.28	+ 4 41.2	12,12	S	15 49 42.03	8.147 _n	+ 7 50 46.1	0.629	+2.04 + 4.1	9