XIV. Therapeutische Mittheilungen.

Aus der Heidelberger chirurgischen Universitätsklinik des
Herrn Geheimrath Prof. Dr. Czerny.

Europen, ein Ersatzmittel für Jodoform.

Von Dr. O. Vulpius, Volontärassistenten der Klinik.

Trotz häufiger und schwerer Stürme hat sich das Jodoform nicht nur über Wasser gehalten, sondern es hat sich eine überaus weit verbreitete Anerkennung als Wundmittel erworben, welche durch die wohl überall mehr oder weniger häufig beobachteten toxischen Eigenschaften desselben nicht wesentlich hat erschüttert werden können. Fehlte es doch bisher an einem Mittel, das sich ähnlich günstigen Einflusses auf die Wundheilung und dabei geringerer Gefährlichkeit zu rühmen vermochte.

Wenngleich in hiesiger chirurgischer Klinik Jodoformintoxicationen trotz der ausgedehnten Anwendung desselben entschieden zu den Seltenheiten gehören, gingen wir doch gern an die Prüfung eines von der Farbenfabrik Bayer & Co. uns zugeschickten Ersatzmittels für das Jodoform.

Das Europen stellt ein sehr feines, wenig zusammenbackendes, gelbes, weder unangenehm noch stark riechendes Pulver dar, das 5 mal leichter als grobes, $2\frac{1}{2}$ mal leichter als das fein gepulverte Jodoform ist. Von den sonstigen Eigenschaften des Europens kommen für unsere Zwecke hauptsächlich die Löslichkeitsverhältnisse in Betracht. Dieselben liegen ungünstiger als beim Jodoform, denn nicht nur Weingeist, Aether, Chloroform und Benzin, sondern auch Fette und Mineralöle (Paraffin) vermögen bedeutende, bei einzelnen dieser Lösungsmittel bis zu deren gleichem Gewicht steigende Mengen Europen aufzunehmen, allerdings mit Hinterlassung eines gewissen Rückstandes, der dem Europen durch Wasser entzogen werden kann. Wir haben es also in demselben nicht etwa wie beim Jodoform mit einem chemisch einheitlichen Körper, sondern mit einem Stoff zu thun, welcher in seiner Hauptmenge zwar aus Kresoljodid (Isobutylorthokresoljodid) besteht, daneben aber nicht ganz unerhebliche Antheile einer wasserlöslichen Jodverbindung enthält. Die vorzügliche Löslichkeit des Europens in Benzin machten wir uns zu Nutzen, um die Haut rasch von dem ihr sehr innig anhaftenden Pulver zu reinigen. Durch Stärkemehl wird das Europen unter Bildung von blauer Jodstärke zersetzt, es darf also nicht in Amylum enthaltende Arzneimittel eingebracht werden.

Unsere bacteriologischen Versuche mit dem Europen führten im wesentlichen zum gleichen Resultat wie die von Siebel und Goldmann mitgetheilten. Zur Prüfung wurden Milzbrandbacillen, Staphylococcus pyogenes aureus und Bacillus pyocyaneus in der einen Versuchsreihe auf schräg erstarrte Agarröhrchen geimpft und die Impfstiche dann mit Europen resp. Jodoform bestreut, bei der zweiten Versuchsanordnung wurde die Impfung auf Nährböden gemacht, die gleichmässig mit dem betreffenden Pulver vermengt waren.

Anthrax kam dabei einmal zu geringem Wachsthum, das sonst stets aufgehoben schien, die Staphylococci waren wesentlich in der Entwicklung gehemmt, wenn auch vielleicht nicht ganz so beträchtlich wie unter der Einwirkung des Jodoforms, der Pyocyaneus dagegen schien durch das Europen so gut wie gar nicht beeinflusst zu werden.

Das Urtheil über die antibacterielle Wirksamkeit des Europen wird ein noch weit günstigeres, wenn man die Leichtigkeit des Pulvers in Betracht zieht, das bei den obigen Versuchen in wesentlich geringeren Gewichtsmengen angewendet wurde, als das Jodoform bei den Parallelversuchen.

Nachdem auf diese Weise sowohl die chemischen wie die antibacteriellen Qualitäten das Europen dem Jodoform mehr als ebenbürtig hatten erscheinen lassen, versuchten wir uns durch Thierexperimente Gewissheit zu verschaffen über das von Goldmann behauptete „Fehlen toxischer Eigenschaften“ des neuen Mittels, das auch von Eichhoff als „ungiftig“ angesehen wurde.

Wir gaben das Europen in Pulverform und als ölige Lösung sowohl subcutan wie per os Mäusen, Meerschweinchen, Kaninchen und Hunden. Als Grundlage der Beurtheilung benutzten wir die in der Litteratur gefundenen Angaben über die Giftigkeit des Jodoforms und bestätigten durch eigene Nachprüfung, dass Dosen desselben von 0,02 g für Mäuse, 2 g für Meerschweinchen, 3 g für Kaninchen, 4 g für kleinere Hunde tödtlich sind.

Wenn auch das halbe Dutzend Versuche, die wir bei jeder der erwähnten Thierclassen etwa anstellen konnten, eine sichere Angabe des Giftigkeitsgrades noch nicht ermöglicht, so liess sich doch soviel feststellen, dass das Europen weniger giftig ist als das Jodoform, dass dagegen ein völliges Fehlen toxischer Eigenschaften nicht behauptet werden darf. Mehrmals trat schwere Erkrankung und selbst der Tod ein unter zunehmender Mattigkeit und Schlafsucht. Freilich aber wäre selbst bei gleicher Giftigkeit des Jodoforms und des Europens die Intoxicationsgefahr bei der praktischen Verwerthung des letzteren eine wesentlich verminderte deswegen, weil die Leichtigkeit desselben eine viel geringere Gewichtsmenge zur Wundbehandlung erforderlich macht, als sie von dem 5 mal schwereren Jodoform in Anwendung kommen müsste.

In der That traten bei den im ganzen gegen 50 Fällen, die in unserer Klinik mit Europen in Pulver- und Salbenform wie auch in Gestalt im prägnirter Gaze behandelt wurden, nie die geringsten Intoxicationserscheinungen auf. Auch Schmerzen oder Ezeme wurden durch dasselbe so gut wie nie hervorgerufen. Nur in 1 Falle, wo ein Verband mit 2% Europensalbe 3 Tage lang gelegen hatte, zeigte sich blasige Abhebung der darunter liegenden Haut. Bei einem weiteren Patienten, der wegen Jodoformeczems fernerhin mit Europen verbunden werden sollte, trat darauf Verschlimmerung des Eczems ein.

Das feine Pulver ermöglichte eine vorzügliche Vertheilung auch über ausgedehnte Wundflächen ohne grossen Materialverbrauch, nur bildete es ab und zu ähnlich wie Jodoform harte Krusten, ein Nachtheil, der durch Verwendung einer 1—2% Salbe leicht auszuschalten war.

Die uns von der Fabrik zugeschickte 5% und 10% Europengaze ist aus trefflichem Stoff hergestellt, der namentlich wesentlich weniger fasert als die bei uns bisher eingeführte Jodoformgaze.

Auf genauere Mittheilung von Krankengeschichten verzichtend, will ich nur summarisch berichten, dass hauptsächlich solche Fälle zur Prüfung benutzt wurden, bei denen durch Verletzung oder Operation entstandene mehr oder weniger tiefe Haut- und Weichtheildefekte zu benarben oder Höhlenwunden mit Granulationen auszufüllen waren. Nicht nur aseptische Wunden wurden der Einwirkung des Europens ausgesetzt, sondern auch solche, die durch phlegmonöse, osteomyelitische und tuberculöse, einmal vielleicht auch durch gummöse Processe entstanden, eine geringe Heiltendenz erwarten liessen.

So ziemlich in allen Fällen war ein günstiger Einfluss des Mittels auf den Heilverlauf zu erkennen. Schon nach wenigen Tagen zeigte sich ein rasches Aufschliessen kräftiger Granulationen, die in mehreren Fällen mit geradezu erstaunlicher Geschwindigkeit grosse Defekte ausfüllten, ja das Niveau der Haut überwucherten und so die Ueberhäutung schwierig gemacht hätten, wäre nicht zur rechten Zeit das Europen weggelassen worden.

Es wurde dabei reichlich Granulationen abgedeckt, der einen öfteren Verbandwechsel nöthig machte.

Auch fiel wiederholt eine erhöhte Neigung der Granulationen zur Blutung auf, die unter dem Pulver öfter als unter der Salbe beobachtet wurde. Auf diese kleinen Uebelstände ist es vielleicht zurückzuführen, dass die bei der Ueberhäutung vom Rande her vordringenden Epidermisränder mehrmals nur lose auf den Granulationen aufsetzend oder geradezu von denselben abgehoben getroffen wurden. Da aber die Ueberhäutung im ganzen doch in erwünschter Weise von statuten ging, konnten wir diese kleinen Nachteile gering achten, so dass das Europen bereits in mehreren unserer Abtheilungen Anwendung und Anerkennung gefunden hat.

Es reicht zwar die immerhin noch geringe Anzahl mit Europen von uns behandelter Fälle und das bei diesen erzielte günstige Resultat noch durchaus nicht hin, um dem Jodoform den Fehdebrief zu schreiben, schon deswegen nicht, weil die wichtige letzterem zugeschriebene antituberculöse Kraft von dem Europen bislang nicht bekannt ist. Soviel aber darf bereits behauptet werden, dass sowohl der unbedeutende Geruch und die günstigen Löslichkeitsverhältnisse als auch die durch seine geringere Giftigkeit und seine Leichtigkeit verminderte Intoxicationsgefahr Vorzüge des Europens sind, die es dem Jodoform überlegen und seine Anwendung vorläufig dann besonders empfehlenswerth erscheinen lassen, wenn rasche, kräftige Granulationsbildung angeregt werden soll.

— Dr. Otto Zuckerkandl macht in No. 43 des Centralblattes für Chirurgie über eine **Modification des Chloroformirens**, welche auf der chirurgischen Station des Prof. v. Dittel in Wien geübt wird, folgende Mittheilung: Das Chloroform wird nicht, wie bis jetzt üblich, in grösserer Masse auf die Maske gegossen, um nach dem Verdunsten wiederholt erneuert zu werden, sondern es wird von vornherein das Chloroform in Tropfen stetig auf die Maske geträufelt, und zwar bis zur Narkose. Die sonst auftretenden störenden Erscheinungen fehlen bei diesem modus procedendi. Im Durchschnitt werden 0,6 g Chloroform in der Minute verbraucht im Gegensatz zu 1 g bei der gewöhnlichen Methode des Aufgiessens.

— Seit einem Jahre wendet Dr. Treuthardt in Cossonay, wie die Semaine médicale mittheilt, bei **Distorsionen des Fusses und Brüchen des Wadenbeins** folgendes Verfahren an: Die verletzte Stelle wird mit einer Paste von essigsaurer Thonerde umhüllt, welche auf die blossen Haut zu liegen kommt und deren Consistenz genügend ist, um das betreffende Glied zu fixiren, ohne es so vollständig zu immobilisiren wie ein Gypsverband. Unter dieser Paste verkleinert sich oder verschwindet gänzlich selbst die beträchtlichste Schwellung in 12—18 Stunden; nach dieser Zeit wird, wenn nöthig, die Paste erneuert, bis die Abschwellung eine vollständige ist. Jetzt tritt an die Stelle der Paste ein elastischer comprimirender Verband, mittels Watte und einer Flanellbinde hergestellt, unter dem der Kranke alle Bewegungen ausführen soll, die der Verband gestattet. Am Ende von 3—5 Tagen wird der letztere entfernt, und der Kranke macht unter dem Schutze eines Schnürstiefels die ersten Gehversuche. Fibulabrüche, welche auf diese Weise behandelt wurden, heilten in 14 Tagen vollständig, ohne eine Spur von Hinken zu hinterlassen.

— Zur Behandlung der **Psoriasis palmaris**. Von den syphilitischen Manifestationen ist die Psoriasis palmaris eine der hartnäckigsten, welche sehr häufig der allgemeinen, wie der örtlichen Behandlung widersteht. Die amerikanischen Aerzte Wells und J. Hunter empfehlen als ein absolut sicheres und schnell wirkendes Mittel **Verdampfungen von Calomel**. Der Modus procedendi ist der folgende: Man macht in einer grossen Schachtel, am besten einer Hutschachtel, eine genügend grosse Oeffnung am oberen Theile derselben, um die Hand hineinhalten zu können. Auf dem Boden der Schachtel bringt man einen kleinen Dreifuss an, auf welchem eine kleine, 2—4 g Calomel enthaltende Porzellanschüssel sich befindet, welche durch eine kleine Spirituslampe erhitzt wird. Das Calomel sublimirt sich und bedeckt in unsichtbarer Schicht die von der Psoriasis gebildeten Plaques.

— Zur Darreichung von **Jodpräparaten**. Im Medical Record empfiehlt Mann, die Mixturen, welche Jodsalze enthalten, mit Syrupus communis (Melassesyrup) zu versetzen, weil die darin enthaltene Glykose den Geschmack der Jodsalze am besten verdecken und insbesondere letztere vor chemischen Veränderungen schützen soll.

— **Antipyrin gegen Diarrhoe der Kinder**. St. Philippe empfiehlt im Journ. méd. de Bordeaux, Kindern im Alter von 1—6 Monaten gegen Diarrhoe zweistündlich einen Kaffelöffel einer $\frac{1}{2}$ proc. Antipyrinlösung zu verabreichen, während bei Kindern bis zu 1 Jahre 1 procentige, bis zu 3 Jahren 1,5 proc. Lösungen in gleichen Dosen zu verordnen sind.