Ces dates et les époques de faible éclat s'accordent bien entre elles, supposant la période égale à 0.75 de l'année. Dans ce cas, l'étoile doit être dans son maximum actuellement (dans la seconde moitié de Juin) et le maximum prochain aura lieu en Mars 1901.

Moscou, 1900 Juin 8/21.

S. Blajko.

Sur la période de la variable ... Cephei

$21^h 3^m 38^s.5 + 82^\circ 39' 50''3$ (1900), v. A. N. 3512.

Pour déterminer la période de cette variable, je me suis servi des observations photographiques et oculaires de cette étoile.

I. Observations photographiques
(d'après les photographies obtenues à Moscou).

1) 1896 Oct. 2 et 5, la variable est absente; l'étoile la plus faible qu'on y trouve est BD. +82°635.

2) 1897 Sept. 26, elle est invisible, et la plus faible étoile qu'on distingue est celle dont la distance à la variable est 7'-8' et l'angle de position 45°.

3) 1897 Oct. 20, aucune trace de la variable, tandis qu'on voit quatre petites étoiles formant une losange, vers le nord-ouest de la variable.

4) 1898 Mai 11, 13 et 16, elle est presque égale à BD. +82°635, peut être un peu plus faible.

5) 1899 Avril 10 et Mai 7, point de variable; les quatre étoiles vers le nord-ouest sont à peine visibles.

II. Observations oculaires.

1898 Juin 13, le prof. Ceraski a taxé la variable égale à l'étoile BD. +82°628 et le 17 Juin elle était un peu plus

Moscou, 1900 Juin 8/21.

faible; le 18 Juin, je l'ai classée, quant à l'éclat, entre BD. +82°638 et BD. +82°635. Mes observations ultérieures ont montré qu'elle devenait toujours moins brillante et en Novembre 1898 elle était hors de visibilité dans une lunette de 270 mm d'ouverture, c'est-à-dire qu'elle était devenue plus faible que les quatre étoiles mentionnées plus haut, ce qui s'accorde parfaitement avec les observations de M. Parkhurst (v. A. J. No. 457). Elle était encore invisible dans cette même lunette le 25 Avril 1899. En 1899 Juin 10 et Juillet 12, elle n'était pas encore observable dans une lunette de 4 1/2 p., et je ne l'ai vue que le 27 Septembre de la même année.

Une série de mes observations, à partir de cette époque, et l'observation de M. Parkhurst, dans l'A. J. No. 475, font voir que le maximum a eu lieu en Septembre ou bien au commencement d'Octobre.

En vertu de ces données, je conclus que la période est égale à 1.4 de l'année environ; alors, le maximum le plus proche aura lieu en février ou en Mars 1901.

S. Blajko.

Eclisse di Sole del 28 Maggio 1900 ad Arcetri.

Soltanto il primo contatto fu possibile di cogliere all' Equatoriale di Amici, diaframmato, ed avente il solito ingrandimento 124, e ciò squarciandosi le nubi davanti il sole poco tempo prima del fenomeno, e facendosi allora quel tratto di cielo splendidamente sereno. Tre minuti prima del tempo calcolato fu posto in moto il cronografo del pendolo siderale Manetti adetto all' Equatoriale, poscia, senza prevenzioni, furono dati, col tasto, sulla striscia cronografica, due segnali, il primo quando si reputò incominciata l' intaccatura del disco del sole all' angolo di posizione 259°, nel qual punto, ed in quell' istante, il contorno solare era netto, tranquillo e perfettamente convesso; il secondo, quando l' intaccatura fu affatto manifesta malgrado che, subito, il contorno andasse perdendo la sua bella precisione e si facesse brulicante. Dai due segnali si calcolarono i seguenti due tempi medî dell' Europa centrale,

Arcetri, 1900 Luglio.

$16^h 6^m 7^s.4$

$16 6 25.0$,

essendo Arcetri all' ovest del meridiano dell' Europa centrale $14^m 58^s.66$. Dopo il primo contatto le nubi vaganti interruppero la visione continua del sole, ed impedirono totalmente la stima della fine dell' eclisse, tanto all' Equatoriale, quanto in altri due cannocchiali minori. Fu però vista bene la massima fase, e si notò, da me, e da altri, dalla terrazza nord dell' Osservatorio alta 150 metri circa su Firenze, la diminuzione di luce sulla vallata dell' Arno, sugli Appennini, sui colli circostanti, sulla città, e su tutti gli oggetti terrestri; la scena pareva veduta attraverso un vetro leggermente scuro per tinta color fumo; ognuno di noi sentì anche un abbassamento di temperatura, momentaneo, ché, poscia, il sole riacquistò subito il suo calore.

A. Abetti.

Eclipse de soleil du 28 Mai 1900.

A Genève, l'éclipse a été observée dans de bonnes conditions. La première moitié a été parfaitement visible; peu à peu elle a été cachée par un rideau de nuages ne permettant que des observations intermittentes. Le ciel s'est

éclairci vers la fin du phénomène et le dernier contact a été observé sans difficulté.

Deux groupes de taches étaient visibles sur le disque du soleil et le premier groupe avait une tache assez grande.

Voici les instants notés par mon collègue M. *Schär* et par moi d'une façon tout à fait indépendante.

Instruments: M. *Schär*, une lunette de 6 pouces de

sa construction et un grossissement de 90. De mon côté, l'équatorial de 10 pouces, diaphragmé à 6 pouces et un grossissement de 180.

	T. m. Genève	Remarques
Premier contact	P 3 ^h 23 ^m 9 ^s	Le contact se produit bien à l'endroit attendu
„ „	S 3 23 15	Le soleil vient d'être entamé
Grande tache du premier groupe	P 3 48 9	Milieu de la tache
„ „ „ „	S 3 48 7	Premier bord de la tache
Première tache du second groupe	S 4 5 54	
Deuxième tache	P 4 10 10	
Dernier contact	P 5 32 32	
„ „	S 5 32 32	

Genève, 1900 Août 12.

J. Pidoux.

Beobachtung der Sonnenfinsterniss 1900 Mai 28 zu Königsberg.

Anfang und Ende der Finsterniss wurden bei wolkenlosem Himmel, jedoch ziemlich stark wallendem Sonnenrande wie folgt beobachtet:

	Beobachter	Instrument	Freie Oeffnung	Vergr.	M. Z. Königsberg	
					Eintritt	Austritt
1)	Dr. <i>Cohn</i>	13 z. Refractor	5 Zoll	130	4 ^h 26 ^m 23 ^s .0	6 ^h 10 ^m 36 ^s .8
2)	Prof. <i>Struve</i>	6 z. Heliometer	4 Zoll (Halbkreis)	145	26 24.1	10 40.1
3)	Dr. <i>Rahls</i>	4 z. Fraunhofer	3 1/2 Zoll	50	26 37.7	10 32.7
4)	Prof. <i>Rühl</i>	4 1/2 z. Cometensucher	3 Zoll	40	26 24.9	10 32.6
5)	Stud. <i>Postelmann</i>	4 z. Dialyt Plössl	2 Zoll	55	26 29.0	10 37.4
6)	Stud. <i>Glage</i>	3 1/2 z. Fraunhofer	2 1/2 Zoll	65	—	10 37.6
7)	Stud. <i>Bergau</i>	3 z. Collimator	2 Zoll	100	26 24.0	10 39.8

Bemerkungen.

- 1) Eintritt vielleicht 2^s zu spät notirt.
- 2) Erste Wahrnehmung beim Eintritt 3^s früher. Beim Austritt war der Mondrand 3^s früher noch sicher zu sehen. Beobachtung im Ganzen befriedigend.
- 3) Beim Eintritt der Sonnenrand wallend; etwas zu spät bemerkt. Austritt ziemlich gut.
- 4) Eintritt ziemlich gut. Beobachtung des Austritts unsicher, wahrscheinlich zu früh.

Am 13 zölligen Refractor wurden ausserdem von Dr. *Cohn* zu Anfang und zu Ende der Finsterniss folgende Positionswinkel der Chorde mit dem Fadenmikrometer gemessen:

M. Z. Kön.	ρ	M. Z. Kön.	ρ	M. Z. Kön.	ρ	M. Z. Kön.	ρ
4 ^h 27 ^m 20 ^s .2	149° 35'	4 ^h 31 ^m 13 ^s .2	146° 46'	6 ^h 3 ^m 48 ^s .2	37° 42'	6 ^h 8 ^m 31 ^s .2	35° 0'
27 54.2	148 42	31 42.2	146 32	4 26.2	37 15	8 41.2	34 55
28 10.2	148 8	31 55.2	146 21	5 21.2	36 52	8 56.2	34 47
28 32.2	147 59	32 9.2	146 24	5 51.2	36 40	9 9.2	34 43
28 56.2	148 0	32 56.2	145 44	6 10.2	36 1	9 20.2	34 22
29 20.2	147 50			6 21.2	36 5	9 29.2	34 22
29 36.2	147 47	6 1 7.2	39 24	6 45.2	35 47	9 40.2	34 20
29 52.2	147 34	1 48.2	39 2	7 5.2	35 39	9 58.2	34 20
30 10.2	147 36	2 8.2	38 51	7 30.2	35 27	10 7.2	34 13
30 37.2	147 10	2 30.2	38 34	7 52.2	35 16		
30 53.2	147 2	2 59.2	38 30	8 17.2	34 57		

Königsberg, Juni 1900.

H. Struve.

Ueber die Unsichtbarkeit von Cometen für den Aequator und für höhere geographische Breiten.

Unter vorstehendem Titel hat am 21. Juni 1900 Herr Dr. *J. Holetschek*, Adjunct der k. k. Sternwarte in Wien, der Wiener Akademie eine Abhandlung überreicht, aus welcher auf Wunsch des Verfassers der folgende Auszug (vgl. Akademischer Anzeiger Nr. XVI) hier wiedergegeben wird.

»Die Abhandlung ist eine Vervollständigung der im 94. Bande der Sitzungsberichte der Wiener Akademie enthaltenen Abhandlung: »Ueber die Richtungen der grossen Axen der Cometenbahnen«^{*)} in welcher eine Beziehung zwischen der heliocentrischen Perihellänge und der Perihel-

^{*)} Siehe Astr. Nachr. Bd. 120, p. 137.