sophie aus betrachtet, indem er zum Schlusse seiner eigenen Anschauung über die Grenzen des Pflanzen- und Thierreiches und den Ursprung des Weltalls in zündenden Worten beredten Ausdruck verleiht.

J.

Correspondenz.

Roveredo, am 24. Juli 1888.

Für die Leser Ihrer Zeitschrift wird es gewiss von Interesse sein, wenn ich Ihnen mittheile, dass Anfangs September d. J. dem verewigten Botaniker Joh. Ant. Scopoli in seinem Geburtsorte Cavalese in Südtirol eine Marmorbüste zur bleibenden Erinnerung von seinem Vaterlande gewidmet und feierlich enthüllt wird. Ausser der Stadtverwaltung von Cavalese, der Aerztegesellschaft Südtirols, dem alpinen Club und dem städtischen Museum von Roveredo trägt die Commune von Fiemme den grössten Theil der Kosten, um ihrem Landeskinde ein ehrendes Denkmal für die Nachwelt zu schaffen.

Prof. Giovanni de Cobelly.

Lemberg, am 5. August 1888.

Im Walde bei Krzywczyce nächst Lemberg fand ich unlängst an einer Stelle in beträchtlicher Anzahl *Hieracium tridens* Fr. (*H. rigidum* Hartm. p. p.), sowie ein Exemplar der *Salix caprea* × *aurita*, und am nächstliegenden buschigen Kalkabhange „Chómić“ sammelte ich am selben Tage ausser den vor einigen Jahren in der „Oesterr. botan. Zeitschr.“ verzeichneten, noch folgende interessante Pflanzen: *Achillea pannonica* Scheele, *Carlina intermedia* Schur (*C. longifolia* auct. nonnul., non Rehbch.), neu für Galizien, *Inula super-salicina* × *ensifolia*, *I. superensifolia* × *salicina*, *Thalictrum simplex* L. und *Veronica orchidea* Cr. (*V. crassifolia* W. K.) — Zwischen Kasperowce und Dobrowlany bei Zaleszczyki (Südostgalizien) entdeckte ich im vorigen Jahre unter den an einem sonnigen Kalkabhange neben einander wachsenden Stammeltern in ziemlich vielen Exemplaren zwei ganz neue *Salvia*-Bastarte, nämlich: *S. Kernerii* m. (*S. supernutanti* × *dumetorum*), die habituell der *S. nutans* L. höchst ähnlich ist, jedoch durch tiefere Zahnung der Wurzelblätter, durch stärker runzlige Blätter, sowie durch längere Behaarung der Blattunterseite, des Stengels und der Kelche an *S. dumetorum* Andr. allsoogleich erinnert — und *S. Skofitzii* m. (*S. superdumetorum* × *nutans*), welche von *S. dumetorum* nur durch die viel dichteren und nickenden Inflorescenzäste sich unterscheidet. Auch einen dritten, meines Wissens bisher unbekannt gewesenen *Salvia*-Bastart habe ich in Podolien entdeckt, nämlich *S. Andrzejowskii* m. (*S. supersilvestri* × *pratensis*), welche ich in Werenczanka (Nordbukowina) in zahlreichen Exemplaren unter den Stammeltern sammelte. Von *S. elata* Host (*S. superpratensi* × *silvestris*) weicht *S. Andrzejowskii* m.