DEUTSCHE MEDICINISCHE WOCHENSCHRIFT.

Mit Berücksichtigung des deutschen Medicinalwesens nach amtlichen Mittheilungen, der öffentlichen Gesundheitspflege und der Interessen des ärztlichen Standes.

Begründet von Dr. Paul Börner.

Vierundzwanzigster Jahrgang.

Redaction: Geh. Med.-Rath Prof. Dr. A. Eulenburg und Dr. J. Schwalbe, Berlin. — Verlag: Georg Thieme, Leipzig.
Lichtensteinallee 3. Am Karlsbad 5. Seeburgstr. 31.

INHALT.

I. Neuere zur Entzündungslehre. Von Prof. Dr. O. Lubarsch in Rostock.

II. Bemerkungen über reinliche Wundbehandlung. Von Geh. Med.-Rath Prof. Dr. Hirschberg in Berlin.

III. Aus der medicinischen Universitätsklinik in Göttingen: Ueber eine neue Albumosemilch. Von Dr. Schreiber und Dr. Waldvogel, Assistenten der Klinik.

IV. Aus der chirurgischen Abtheilung des städtischen Krankenhauses am Urban in Berlin: Zur chirurgischen Behandlung der Pericarditis. Von Dr. Brentano.

V. Körperform und Lage der Nieren. Von W. Becher und Dr. R. Lennhoff in Berlin.

Feuilleton: Londoner Brief. Von Dr. J. P. zum Busch (London).

Öffentliches Sanitätswesen: Impfschutz und Variolavaccine. Von Oberimpfarzt Dr. L. Voigt in Hamburg.

Militärmedicinalwesen: Nicolai, Neue Trage; Gerdeck, Formalin bei der Fusspflege der Truppen. Ref. Ob.-Stabsarzt Dr. Scholl (Berlin). — R. Schröter, Beobachtung von Militärpersonen in Provinzialirrenanstalten. Ref. Dr. Lewald (Kowanowko).

Correspondenzen und Erwidern: Ueber Beri-Beri. Von Dr. C. Däubler (Berlin).

Zur Curpfuscherei. Springfield, Die Ueberwachung der Curpfuscher in Berlin. Ref. Dr. J. Schwalbe. — Reichsgerichtsentscheidung, betreffend Curpfuscherei. Von Rechtsanwalt Biberfeld (Berlin). — Verschiedenes.

Kleine Mittheilungen.

I. Neuere zur Entzündungslehre*).

Von Prof. Dr. O. Lubarsch in Rostock.

Die in unserer Wissenschaft so häufige Erscheinung, dass unter dem Eindruck einer grossen wissenschaftlichen Entdeckung wichtige und gesicherte Thatsachen in Vergessenheit gerathen und zu Gunsten der neuen Auffassung völlig verdrängt werden, ist bekanntlich auch bei der Entzündungslehre zu Tage getreten. Die natürliche Folge pflegt dann eine Reaction zu sein, die, gegen die Uebertreibungen der neuen Auffassung gerichtet, in ihrer Bekämpfung wieder zu weit geht. So sehen wir, dass von dem Moment an, wo die Bedeutung der Zellwucherungserscheinungen bei der Entzündung wieder zu grösserer Anerkennung gelangte, auch die Bestrebungen begannen, die Bedeutung der Leukocytenauswanderung einzuschränken. Es kann deswegen nicht überraschen, dass augenblicklich kaum ein Punkt der Cohnheim'schen Entzündungslehre unangefochten bleibt und der Streit der Geister fast ebenso erregt tobt, wie im Beginn der siebenziger Jahre. Die Controversen, welche augenblicklich im Vordergrund des Interesses stehen, beziehen sich auf folgende Punkte: 1) Die Herkunft der zelligen Elemente des entzündlichen Tumors. 2) Die Entstehung der Pseudomembranen bei den fibrinösen und diphtherischen Entzündungen. 3) Die Betheiligung von Wanderzellen bei der Organisation der Entzündungsproducte. Von der Beantwortung dieser Fragen wird es abhängen, welche Stellung man 4) zu den Entzündungstheorien einzunehmen hat.

1. Die Herkunft der zelligen Elemente des entzündlichen Tumors.

Die Frage, ob die Zellansammlung in dem entzündlichen Tumor ausschliesslich auf eine Einwanderung von leukocyten Elementen zurückzuführen ist, kann wohl kaum mehr im Sinne Cohnheim's¹⁾ und seiner Schüler beantwortet werden. Freilich ist nicht zu bezweifeln, dass bei einer grossen Anzahl von Entzündungen durch die Leukocytenauswanderung zum mindesten die Hauptmasse des zelligen Tumors geliefert wird, bei manchen Entzündungen ist das aber keineswegs der Fall. Und bei vielen Entzündungen betheiligen sich an der Zellansammlung noch andere Zellen. Darüber herrscht auch kaum eine erhebliche Meinungsverschiedenheit; nur wollen manche Autoren, wie Weigert²⁾, Marchand³⁾ und seine Schüler, die Zellwucherungsvorgänge nicht

zu den eigentlich entzündlichen Vorgängen rechnen, eine Auffassung, auf die erst weiter unten näher eingegangen werden wird. Stellen wir, ganz abgesehen von allen theoretischen Erwägungen, einfach vom morphologischen Standpunkt aus die Frage, welche Zellen sich im entzündlichen Exsudat vorfinden, so können wir sie im grossen und ganzen folgendermaassen beantworten: 1) finden sich im Exsudat geschädigte und aus ihrem Zusammenhang gelöste (abgestossene), fixe Gewebszellen. 2) Leukocyten und Wanderzellen. 3) Junge (neugebildete) Abkömmlinge der fixen Gewebszellen. Erstere Thatsache lässt sich leicht bei der Untersuchung jedes Schnupfens feststellen, wo man namentlich im Beginn in dem dünnflüssigen Exsudat weit mehr abgestossene Epithelien, als ausgewanderte Leukocyten findet. Aber auch bei zahlreichen anderen Entzündungen kann man besonders auf der Höhe des entzündlichen Processes das Gleiche constatiren. Dass dies auch für die Entzündungen der serösen Häute gilt, hat neuerdings Borst⁴⁾ genauer nachgewiesen. Injicirte er Meerschweinchen Bouillonculturen von Bacterium coli und von Streptococci in die Bauchhöhle und untersuchte 4, 8, 12, respective 20—24 Stunden später die gebildeten fibrinös-eitrigen Beläge des Peritoneums und die Peritonealflüssigkeit, so ergab sich folgendes: Der Process beginnt mit intensiver Schwellung und körniger Trübung des Endothels, in das bald Mikroorganismen einwandern und das Protoplasma und Kern zum Zerfall bringen, so dass man schliesslich reichlich abgestossene, verfettete Serosae epithelien in der Peritonealflüssigkeit findet. In den Falten und Nischen des serösen Sackes kann man daneben anfangs spärlich, später etwas reichlicher Proliferationserscheinungen an den Endothelien wahrnehmen. Auch Cornil⁵⁾ beschreibt im wesentlichen gleiche Veränderungen bei experimenteller Peritonitis des Meerschweinchens und aseptischer Pleuritis des Hundes; die Endothelien schwellen an, lösen sich ab, wandern im Exsudat umher und vermehren sich dort meist durch direkte Theilung. Dass auch bei der Pneumonie des Menschen ähnliche Veränderungen der Deckepithelien vorkommen, wird ebenfalls von Cornil erwähnt; übrigens hat bereits Orth (Lehrbuch der pathologischen Anatomie) Wucherungserscheinungen an den Alveolarepithelien — freilich erst gegen Beginn der Resolution — beschrieben. Die nachstehende Abbildung (Fig. 122, S. 502), die von einem Fall von experimenteller Pneumonie vom Kaninchen stammt (24 Stunden nach intratrachealer Injection von Streptococci), zeigt aber, dass eine Proliferation von Alveolarepithelien bereits viel früher beginnen kann. — In allen herangezogenen Fällen besteht aber neben dem Zerfall und der Neubildung von fixen Gewebelementen eine ausgeprägte Auswanderung

*) Nach einem im Rostocker Aerzteverein gehaltenen Vortrage.

von Leukocyten; es giebt aber auch Fälle, wo sie während des ganzen Processes stark zurücktritt oder wenigstens nur sehr kurze Zeit andauert.

Fig. 122.

Bei der Endocarditis verrucosa schildert Veraguth⁶⁾ die Vorgänge folgendermaassen: Im ersten Stadium des Processes findet man nur in der Strecke rings um den Thrombus, der sich an der Stelle des lädirten Endothels gebildet hat, Veränderungen, die wesentlich in einer Wucherung des subendothelialen Bindegewebes bestehen, wobei alle Zellen ihre Längsachsen nach der Läsionsstelle zu richten. Im Thrombus finden sich spärlich Leukocytenstränge, während das Klappengewebe fast frei von Leukocyten ist. Diese Schilderung trifft nach meinen Erfahrungen ganz besonders auch für die ganz kleinen Erhebungen der Mitralklappe zu, wie man sie bei Lungentuberkulose nicht selten antrifft. Bei der experimentellen Keratitis der Taube hat Goecke⁷⁾, ein Schüler von Marchand, die Leukocytenwanderung zeitlich und räumlich eng begrenzt gefunden; sie beginnt ungefähr 12 Stunden nach Vornahme der Aetzung und hat bereits 24 Stunden danach ihren Höhepunkt erreicht, worauf die weissen Blutzellen sich wieder aus dem Aetzbezirk entfernen und bereits nach 36 Stunden fast völlig wieder verschwunden sind. Räumlich ist die Leukocytenansammlung im Anfang auf das periphere Gebiet der Hornhaut beschränkt, so dass im Aetzbezirk bereits eine ausgedehnte Zellwucherung stattgefunden hat, bevor auch nur ein einziges Eiterkörperchen ihn erreicht hat. Ein Theil der weissen Blutzellen geht nun durch Zerfall zugrunde, ein anderer Theil vermehrt sich an Ort und Stelle durch mitotische Theilung; zu gleicher Zeit — also schon am zweiten Tage — beginnt eine energische Proliferation der Hornhautzellen. Diese neugebildeten Hornhautzellen verhalten sich nun völlig wie Wanderzellen. Sie zeigen auffallende Gestaltsveränderungen, besonders an den Protoplasmafortsätzen, wobei vor allem die nach dem Aetzbezirk gerichteten Ausläufer länger werden; pseudopodienähnliche Gebilde am Rande des Protoplasmas sprechen für eine amöboide Beweglichkeit; auch bezüglich der Fortschaffung von Zerfallsmaterial verhalten sich diese Zellen völlig wie Phagocyten und andere Wanderzellen.

Aus allen diesen Angaben geht hervor, dass die Schwellung des Gewebes bei der Entzündung nicht ausschliesslich durch Ansammlung von Leukocyten hervorgerufen wird, und da es ferner bekanntlich für viele Zellformen schwierig ist, ihre Herkunft mit Sicherheit zu bestimmen, so hat Grawitz⁸⁾, der früher den Nachweis erbrachte, dass auch im Eiter Abkömmlinge fixer Gewebszellen nicht fehlen, den Versuch gemacht, die Bedeutung der Leukocytenauswanderung, die er ja freilich nicht ganz leugnen kann, auf ein Minimum zu reduciren. Zu diesem Zwecke hat er alle diejenigen Punkte herausgegriffen, die schon bei Aufstellung der Cohnheim'schen Lehre gegen ihre Allgemeingültigkeit eingewendet waren (besonders von Böttcher⁹⁾ und Stricker¹⁰⁾), und durch neue Gegengründe zu vermehren gesucht. Seinen Hauptangriff hat er dann in den Untersuchungen über die Entzündung der Hornhaut concentrirt. Seine Argumentation beruht im wesentlichen auf folgenden Ueberlegungen: 1) Die bei der experimentellen und natürlichen Keratitis im Läsionsbezirk auftretenden Wanderzellen sind keine Leukocyten, wenn sie auch morphologisch einige Aehnlichkeit mit ihnen haben können. 2) Der Ausfall der Senftleben'schen Versuche, dass nämlich abgetödtete Hornhäute, in die Bauchhöhle eines anderen Thieres transplantiert, dieselben Veränderungen darbieten wie entzündete Hornhäute, beruht darauf, dass in den Senftleben'schen Versuchen die implantirten Hornhäute gar nicht todt waren, sondern im lebenden Zustand übertragen wurden. 3) Das Vorkommen einer centralen Keratitis spricht gegen die Emigrationstheorie.

Der erste Punkt ist in besonders eingehender Weise von Grawitz's Schüler Buddee¹¹⁾ behandelt worden. Ich berichte zunächst über diejenigen seiner Angaben, denen man Zustimmung kaum versagen kann. Buddee führt aus, dass Leukocyten weder durch ihr Lichtbrechungsvermögen, noch durch Beweglichkeit und Färbbarkeit, noch durch die Form von anderen Wanderzellen mit Sicherheit unterschieden werden können, ein Satz, den schon Arnold¹²⁾ in der Form ausgesprochen hatte, dass er sagte, es gäbe weder

tinctorielle, noch structurelle Merkmale, mit deren Hilfe man hämatogene und histiogene Wanderzellen von einander unterscheiden könne. Dass in der That manche Wanderzellen von manchen Arten von Leukocyten nicht mit Sicherheit zu unterscheiden sind, wird eigentlich von keiner Seite geleugnet, und dass namentlich die Fähigkeit der Locomotion und Phagocytose kein ausschliessliches Characteristicum der weissen Blutzellen ist, sondern wohl allen jungen Gewebszellen zukommt, habe ich an den verschiedensten Stellen hervorgehoben. Der Werth dieser Argumentation für die Beurtheilung der bei der Keratitis auftretenden Zellformen ist freilich kein sehr grosser; denn wenn man auch anerkennt, dass eine ganze Reihe von Zellen, die bei der Hornhautentzündung auftreten, keine Leukocyten zu sein brauchen, so ist damit noch keineswegs bewiesen, dass es Hornhautzellen sein müssen. Eine besondere Bedeutung müssen wir deswegen Buddee's Auseinandersetzungen über die sogenannten Spiessfiguren und die Vergoldbarkeit von Wanderzellen und Leukocyten beimessen. Im Verlaufe der Keratitis treten bekanntlich mehr oder weniger reichlich spiessförmige Gebilde auf, über deren Genese noch keine Einigung erzielt ist. Es kommen kleinere und grössere Spiesse vor, solche mit mehreren Kernen und kernlose, endlich auch gewölbte, schalenartige, die nach Buddee häufig unter einander verbunden sind und oft einen spiraligen Verlauf um die Hornhautfibrillen zeigen. Von den wenigsten Autoren wird bezweifelt, dass wenigstens ein grosser Theil dieser Gebilde nicht Leukocyten sein können; das ist bereits von Eberth¹³⁾ und Senftleben¹⁴⁾ zugestanden worden. Nur Klemensiewicz¹⁵⁾ und Goecke¹⁷⁾ glauben die so ausserordentlich abweichende Form auf ein Anpassungsvermögen der Leukocyten zurückführen zu dürfen, welche eben ihre Form den engen Spalten, in denen sie wandern, anbequemen müssen. Buddee hat hiergegen eingewendet, dass man gerade in überlebenden, in den Lymphsack von Fröschen transplantierten Hornhäuten, deren Interfibrillärspalten weit und leer sind, reichlich Spiessfiguren findet, während man in der geätzten, in situ gelassenen Froshornhaut nach 24—48 Stunden vorwiegend rundliche Wanderzellenformen findet, obgleich hier besondere Lockerung der Hornhaut nicht besteht. Ich muss zwar bemerken, dass meine bezüglichen weiteren noch zu erwähnenden Versuche nicht das gleiche Resultat gehabt haben — ich habe in den meisten Versuchen in weiten Interfibrillärspalten keine Spiesse, sondern rundliche, deutlich leukocytaire Elemente gefunden, trotzdem muss ich aber zugeben, dass die angeführten Resultate Buddee's beweisen, dass jedenfalls die Engigkeit der Spalten nicht die einzige Ursache der Spiessformbildung ist. Während diese Argumente immer nur negative Bedeutung besitzen und noch nicht beweisen, dass die Spiessfiguren von Hornhautzellen herrühren, sucht Buddee durch seine Untersuchungen über das Verhalten von Leukocyten und Hornhautzellen zur Vergoldung einen direkten Beweis zu liefern. Zahlreiche Versuche (z. B. Einspritzung von frischem Eiter in frische Schweinehornhäute) brachten ihm nämlich den Beweis, dass die Fähigkeit, Gold zu reduciren, „eine den zelligen Elementen der Hornhaut innewohnende Eigenthümlichkeit ist, die weder Leukocyten, noch Eiterkörperchen, noch Gewebszellen aus anderen Geweben in dem Maasse und in der Form zukommt.“ Weitere Versuche sollen noch sicherer beweisen, dass die vergoldbaren Spiesse keine Leukocyten sein können. In Hornhäuten, die durch längeren Aufenthalt ausserhalb des Körpers ihre Vergoldbarkeit verloren hatten, erschienen, nachdem man sie in den Lymphsack von Fröschen eingebracht hatte, reichlich vergoldbare Spiesse. Transplantiert man central geätzte Hornhäute in den Lymphsack von Fröschen, so tritt zunächst in den ersten Tagen ein Verbrauch der vergoldbaren Elemente der Hornhautkörperchen auf, worauf dann an der Oberfläche der Hornhautbündel zahlreiche vergoldbare Spiessfiguren entstehen. Tödtet man dagegen Hornhäute durch Kochen oder genügend langes Erwärmen ab, so bleiben die Hornhautkörperchen noch vergoldbar, und nach der Transplantation in den Lymphsack treten keine Spiesse auf. — Aus allen diesen Versuchen schliesst Buddee, dass die Spiesse in der Hornhaut autochthon entstehen, und zwar aus der Hornhautsubstanz unter dem Einfluss der umspülenden Lymphe. „Lebendes Gewebe und lebende Lymphe sind die beiden Factoren, die bei der Erzeugung der Wanderzellen unerlässlich sind, die Leukocyten spielen hier gar keine und die vorhandenen Gewebszellen vielfach eine untergeordnete Rolle.“ Auch hier vermag ich meine Untersuchungsergebnisse nicht in Einklang mit denen Buddee's zu bringen. Richtig ist es freilich, dass Eiterzellen nicht oder nur sehr unvollkommen vergoldbar sind; gewöhnliche polynucleäre Leukocyten sind dagegen der Vergoldung schon etwas besser zugänglich, wenn sie freilich auch keine so schöne blaugraue Färbung wie die Hornhautkörperchen annehmen, sondern mehr braun gefärbt erscheinen. Doch kann man nach meinen Erfahrungen auf die Farbennuancen keinen so grossen Werth legen, da auch in guten

Präparaten die Hornhautkörperchen mehr eine Rosafarbe annehmen, wie sie, wenn auch sehr matt, Buddée selbst sogar an Eiterkörperchen gefunden hat. Dass aber auch andere Zellen als Hornhautzellen in typischer Weise vergoldbar sind, geht aus folgenden Beobachtungen hervor. Legt man kleine Kork- oder Hollundermarkstückchen in den Lymphsack von Fröschen und schneidet nach einigen Tagen, nachdem sie durch ein Exsudat mit der Rückenhaut gut verklebt sind, sammt der Haut heraus, so findet man namentlich in der Peripherie der transplantierten Stück-

Fig. 123.

Paula Günther del.

chen lang ausgezogene, spießförmige, schön vergoldbare Gebilde vor, die jedenfalls Wanderzellen sind. (Vgl. Fig. 123.) Auch in dem bindegewebigen Theil der Froshaut findet man schön vergoldbare Zellen, die theils von sternförmiger Gestalt als fixe Bindegewebszellen, theils von länglicher Gestalt als histiogene Wanderzellen anzusehen sind. Ich kann daher Buddée nur in so weit zustimmen, dass auch ich die

Spießfiguren nicht für eingewanderte Leukocyten oder Eiterzellen anzusprechen vermag; dass sie aber aus der Substanz der Hornhautbündel sich bildeten — also wohl „erwachte Schlummerzellen der Hornhaut“ wären —, das scheint nicht nur nicht bewiesen, sondern wird durch die oben erwähnten Beobachtungen und die Resultate gleich zu erwähnender Versuche direkt widerlegt.

Den Hauptangriff haben Grawitz und seine Schüler in letzter Zeit bekanntlich auf die Senftleben'schen Versuche in richtiger Werthschätzung ihrer Bedeutung gerichtet. Senftleben¹⁴⁾ hatte bekanntlich Hornhäute todtler Thiere, nachdem er sie mitunter noch fünf Minuten auf 50° erhitzt hatte, in die Bauchhöhle von Kaninchen transplantiert und nach einiger Zeit in ihnen die gleichen Veränderungen wie in der entzündeten lebenden Hornhaut, d. h. das Auftreten vergoldbarer Spiesse nachgewiesen. Da er annahm, dass die Hornhaut todt gewesen, schloss er aus seinen Versuchen, dass das Auftreten der Spiesse nur durch eine Zelleinwanderung herbeigeführt sein könne. Der Schluss ist stringent, aber die Voraussetzung, dass die transplantierten Hornhäute wirklich todt gewesen, bestreitet Grawitz. Man muss zugeben, dass wir keine völlig sicheren Kriterien für den Tod eines Gewebes besitzen und dass unsere Anschauungen über Leben und Tod einigermaßen conventionelle sind. Wenn Grawitz¹⁵⁾ auf Grund von älteren und neueren Beobachtungen betont, dass es einen Scheintod auch der einzelnen Gewebe giebt und scheinbar todt Zellen sich wieder erholen können, so wird man auch dem beistimmen können. Alle diese Argumente beweisen aber noch keineswegs, dass Senftleben's Hornhäute wirklich noch lebend gewesen sind. Grawitz sieht den Beweis dafür in den Ergebnissen folgender Versuche. Tödtete er Hornhäute von Kaninchen, Hasen, Schweinen etc. mit Sicherheit durch Kochen oder längeres Einlegen in starke Sublimatlösungen und transplantierte sie dann in den Rückenlymphraum von Fröschen, so verhielten sich die verlagerten Hornhäute völlig passiv; weder Spießfiguren, noch Rundzelleninfiltration ist sichtbar, auch sind, wenn man die Hornhäute vorher hatte eintrocknen oder partiell hatte faulen lassen, keine vergoldbaren Hornhautkörperchen mehr vorhanden. Erwärmt man dagegen die Hornhäute nur auf 50° (etwa fünf Minuten lang), oder behandelt sie mit dünnen Lösungen von Desinficientien (Sublimat, Chlorzink), oder lässt sie einige Tage eintrocknen, oder entnimmt sie von einem bereits zehn bis zwölf Tage lang todt Thier, so verhalten sich die transplantierten Stücke ganz anders; es treten in ihnen alle die Veränderungen auf, wie sie bei der Randkeratitis beschrieben sind, Spieß- und Gitterfiguren sind mehr oder weniger reichlich vorhanden; oft ist noch die Cornea in grosser Ausdehnung vergoldbar. — Diese Versuchsergebnisse deutet Grawitz dahin, dass die von todt Thieren entnommenen Hornhäute oder die nur auf 50° erwärmten oder mit schwachen Desinficientien behandelten überhaupt nicht todt waren, sondern noch mehr oder weniger reichlich lebende Zellen enthielten, aus denen sich dann die Wanderzellen (vergoldbaren Spiesse) entwickelten. In diesem Sinne deutet er auch die Thatsache, dass Senftleben bei seinen Versuchen die Keratitiserscheinungen gerade dann vermisste, wenn in der Umgebung der transplantierten Hornhaut Eiterung entstand. Ebenso weist er darauf hin, dass Senftleben's Versuch über die centrale Keratitis nichts beweist. Senftleben hatte die Kaninchen cornea im Auge mit Chorzink tief geätzt, dann durch den Aetzbezirk einen Faden hindurchgezogen und beobachtet, wie von dem centralen Loche aus ein Schwarm von Wanderzellen, die er aus dem Conjunctivalsack ableitete, in die völlig todt Cornea einwanderte. Grawitz machte zur Widerlegung folgenden Versuch: Legt man Froshornhaut zwei Tage lang in 50%ige

Chlorzinklösung oder Sublimatlösung von 1:10000, spült ab, legt einen Faden hindurch und transplantiert das Ganze in den Lymphsack eines lebenden Frosches, so findet man selbst nach 48 Stunden auch noch nicht eine einzige Wanderzelle in der Hornhaut. Lässt man dagegen nach Durchlegen eines Fadens Chlorzink oder Sublimat „nur für einen Augenblick“ einwirken und transplantiert, so finden sich Wanderzellen auch an solchen Stellen der Hornhaut, wo keine willkürliche Eröffnung des Gewebes stattgefunden hatte. — Da man nun ferner sehen kann, dass Hornhäute, die durch Fäulniss ihre Vergoldbarkeit verloren, im Lymphsack eines Frosches wieder vergoldbar werden, andere, die vier Tage lang eingetrocknet waren, nach mehrtägigem Lymphbade Mitosen im Hornhautkörperchen aufwiesen, so glaubt sich Grawitz zu dem Schluss berechtigt, dass die an geschädigten Hornhäuten nach ihrer Transplantation in einen anderen Thierkörper auftretenden Veränderungen nicht durch Zelleinwanderung, sondern durch Erholung der Hornhautzellen und Bündel hervorgebracht sind. Für ihn ist eine transplantierte Hornhaut, wenn sie nicht gerade durch Hitze oder Chemikalien völlig ertödtet ist, gleichbedeutend mit einer nicht geschädigten, im normalen Gewebzusammenhang stehenden, und alle die in ihr auftretenden Veränderungen sind ausschliesslich auf Lebensthätigkeit der die Hornhaut zusammensetzenden Elemente zurückzuführen.

Ich habe schon an anderer Stelle gegen Grawitz bemerkt, dass man seine Schlussfolgerungen nur dann anzunehmen genöthigt sei, wenn die von ihm gefundenen Thatsachen in keiner anderen Weise und durch keine andere Annahme zu erklären wären. Sieht man sich nun aber Grawitz's Beweismaterial ohne Voreingenommenheit an, so wird ohne weiteres klar, dass alle seine Befunde auch durch die Annahme zu erklären sind, dass in die durch Kochen oder starke Desinficientien getödteten Hornhäute die Wanderzellen nur deswegen nicht eindringen, weil durch die vorgenommene Procedur die Porosität der Hornhaut aufgehoben wird und eventuell auch andere Momente das Eindringen von Wanderzellen verhindern. Dass diese Annahme die allein richtige ist, ist inzwischen durch die Versuche von Saxer,¹⁷⁾ Orth,¹⁸⁾ Lange¹⁹⁾ und mir²⁰⁾ auch experimentell nachgewiesen worden. Die Versuche von Saxer haben freilich nur ergeben, dass auch in gekochte Hornhäute Leukocyten und andere Wanderzellen eindringen können, und insofern beweisen sie noch nicht genügend gegen Grawitz; denn dass in todt Material überhaupt keine Zellen einwandern können, hat er doch wohl nicht bestreiten wollen und auch nicht können, da dies schon durch die bekannten Hollundermarkplättchenversuche Arnold's und viele nachfolgende Arbeiten zur Genüge bewiesen ist. Um Grawitz ganz zu widerlegen, war es noch nöthig zu zeigen, dass auch in sicher getödteten Hornhäuten die Bilder der Randkeratitis, d. h. die vergoldbaren Spieß- und Gitterfiguren auftreten. Das hat zuerst Lange unter Orth's Leitung gezeigt, welcher bei seinen Versuchen so vorging, dass er die in Formol gekochten und hierbei stark geschrumpften Hornhäute in Essigsäure wieder zur Aufquellung und Lockerung brachte. Da Grawitz gegen die Befunde Saxer's und Lange-Orth's bemerkt hat, dass „möglicherweise derartige unter ganz besonderer Anordnung der Versuche“ eintritt, so will ich hier auf meine mannichfach variirten Experimente, über die ich schon kurz in meinen „Ergebnissen“ berichtet habe, etwas näher eingehen.

Meine Versuche bezweckten im wesentlichen die Beantwortung folgender Fragen: 1) Verhält sich aus dem Körper entnommenes, in Lymphräume anderer Thiere übertragenes Gewebe passiv oder activ? 2) Können an in verschiedener Weise sicher getödteten Hornhäuten nach ihrer Transplantation in Lymphräume Keratitiserscheinungen auftreten? 3) Treten an überlebenden transplantierten Hornhäuten Keratitiserscheinungen auf, wenn man die Einwanderung von Leukocyten und Wanderzellen nach Möglichkeit verhindert? Ad 1. Zur Beantwortung dieser Frage wurden die verschiedensten Gewebe von Kaninchen in den Lymphsack von Fröschen transplantiert; vor allem wurden solche Gewebe benutzt, die möglichst wenig Spalten besitzen, durch die Wanderzellen in sie eindringen können. Am besten eignen sich dazu Knorpel, Zunge, Magenwand, auch Niere. Knorpel kann man sehr lange (bis zu 14 Tagen) im Lymphsack belassen, ohne dass überhaupt erhebliche Veränderungen an den Knorpelzellen auftreten; die Kerne bleiben noch lange gut färbbar, nur Ablagerung von Kalksalzen tritt mitunter schon frühzeitig ein; Kerntheilungen sind nie wahrzunehmen, wohl aber — namentlich in den peripheren Schichten — Zerfall der Kerne zu kleinen Bröckeln; eine Einwanderung von Zellen wird ganz vermisst, mögen die Knorpelzellen auch noch so reichlich von Eiterzellen umgeben sein. Sobald man dagegen vor der Transplantation kleine Einschnitte oder Einstiche vornimmt, so findet man in den Lücken regelmässig Wanderzellen vor, was ganz besonders deutlich ist, wenn man vorher Carminpulver in den Lymphsack injicirt hat; dann haben sich alle in den Lücken liegenden Zellen — aber auch nur diese — mit Farbstoff beladen. — Sehr instructiv sind auch die Bilder, die man an transplantierten

Zungenstückchen erhält. Hier bleibt der dicke Epithelbelag etwa fünf Tage völlig unverändert, weder Mitosen, noch Zerfallserscheinungen an den Kernen treten auf; etwa schon vorher vorhandene Mitosen werden klumpig und undeutlicher. Vom sechsten Tage an treten regressive Erscheinungen an den Kernen der Epithelzellen auf; sie erscheinen zunächst dunkler färbbar (Hyperchromatose) und weisen successive alle Stadien der Karyorhexis bis zum Zerfall in kleine Bröckel auf. An den Muskel- und Bindegewebszellen, auch an den Zellen der Gefäßwandungen sind zu dieser Zeit noch keine Veränderungen aufzufinden; Zelleinwanderung ist in sehr geringem Maasse und nur in der Peripherie der transplantierten Stückchen vorhanden. — Ähnliche Befunde finden sich an Magen- und Nierenstückchen. An letzteren sind selbst nach acht Tagen, wenn die Uebertragung möglichst aseptisch gelang, nur sehr geringe Veränderungen aufgetreten, die hauptsächlich an den Epithelzellen der gewundenen Harncanälchen — weniger der geraden und der Glomeruli — sich abspielen. Sie bestehen in starker Granulierung des Zellprotoplasmas und einer Anschwellung und stärkeren Färbbarkeit der Kerne, an die sich dann auch Karyorhexis mit allen ihren verschiedenen Formen anschliesst. Eine Zelleinwanderung ist hier in etwas stärkerem Maasse vorhanden; gelappt- und mehrkernige Leukocyten liegen im interstitiellen Gewebe, nur selten auch im Lumen von Harncanälchen und Glomerulis. In späteren Stadien treten reichliche Fibroblasten und eigenthümliche, lang ausgezogene Zellen auf, von denen noch später die Rede sein wird.

Das Ergebniss dieser Untersuchungen ist dahin zusammenzufassen, dass zu keiner Zeit und an keinem Gewebe der transplantierten Organstückchen progressive Veränderungen auftreten, dass die Zellen sich freilich relativ lange unverändert halten, schliesslich aber doch durch Karyorhexis zugrunde gehen, wobei die biologisch am stärksten differenzirten Zellen den Anfang machen. Nun wird man freilich einwenden können, dass die am transplantierten Knorpel etc. gewonnenen Resultate noch nicht beweisen, dass nicht die Zellen der transplantierten Hornhaut active Veränderungen eingehen können, und wenn Grawitz²¹⁾ direkt angiebt, Mitosen in Hornhautkörperchen der transplantierten Häute gesehen zu haben, so wird man sich zu fügen haben. Allein einen gewissen Zweifel vermag ich trotz aller Achtung vor der Autorität von Grawitz, Bonnet und Waldeyer, welche die Präparate Grawitz' gesehen haben, nicht zu unterdrücken. Ich habe in über 50 Hornhäuten, die 24 Stunden bis 3½ Wochen im Lymphsack von Fröschen belassen wurden, überhaupt nur ganz ausnahmsweise Mitosen gefunden; diese waren nie am Cornealepithel, das sich überraschend lange unverändert erhielt, vorhanden, niemals mit Sicherheit in Hornhautkörperchen, sondern nur in solchen Zellen, die sich von Fibroblasten in nichts unterschieden. In solchen Fällen, wo in überpflanzten normalen (nicht geschädigten) Hornhäuten so gut wie keine Zelleinwanderung eintrat (s. darüber weiter unten), war es

Fig. 124.

besonders eclatant, dass auch hier ausschliesslich regressive Veränderungen an den Hornhautkörperchen auftraten, die freilich, auch mit Umlagerungen des Chromatins verbunden, zu mitoseähnlichen Bildern Anlass geben (vgl. Fig. 124). Sollten also wirklich die von Grawitz gesehenen Mitosen an Hornhautkörperchen sich abgespielt haben, so wäre das zum mindesten als ein seltener

usnahmefall zu betrachten. — Würden wirklich transplantierte Hornhäute von Säugethieren im Froschlymphsack progressive Veränderungen eingehen, so würde damit die Hornhaut ein von allen übrigen Geweben des Säugethierkörpers abweichendes Verhalten zeigen. Ich habe in zahlreichen Versuchen alle möglichen Gewebsarten und Organstücke von Kaninchen in den Froschlymphsack übertragen, ohne ein einziges Mal an den Parenchymzellen dieser Stückchen Mitosen gefunden zu haben, obgleich wenigstens ein Theil dieser Gewebe bei ihrer Verlagerung im Säugethierkörper Wucherungserscheinungen aufweisen können, wie zuerst die Versuche von Ribbert,²²⁾ ferner von meinem Schüler Lengemann²³⁾ und zahlreiche eigene Experimente bewiesen haben. Eine derartige Ausnahmestellung der Hornhaut würde besonders auffallend sein, da die Hornhaut nicht zu den Organen gehört, die bei Verlagerung in dem Körper des gleichen Individuums proliferative Vorzüge erkennen lassen. Wollte man nun auch alle Argumentationen Grawitz' anerkennen und zugeben, dass geschädigte und dem Absterben nahe Gewebe unter bestimmten Bedingungen sich wieder erholen können, so müsste man doch verlangen, dass diese Bedingungen günstige (d. h. den früheren Lebensbedingungen der Zellen einigermaassen adäquate) sind. Auch die eingefrorenen, erstarrten Thiere, scheinotode Menschen erholen sich nur dann, wenn sie unter neue günstige Lebensbedingungen versetzt werden. In den Grawitz'schen Ver-

suchen ist eher das Gegentheil der Fall. Hornhäute von todtten Warmblütern werden zunächst abnorm hohen Temperaturen oder schädigenden Agentien ausgesetzt und dann in den Lymphsack eines Kaltblüters übertragen, also möglichst ungünstigen Bedingungen ausgesetzt. Unter diesen Umständen sollen sie zu Leistungen befähigt werden, die sie bei Verlagerung unter günstigen Bedingungen (im Körper des gleichen Individuums) nicht auszuüben imstande sind! — Es sind demnach unsere negativen Resultate um so bedeutungsvoller, weil sie den gegen Grawitz' Angaben vorliegenden aprioristischen Bedenken positive Unterlage geben.

(Fortsetzung folgt.)