Versuche.	Ergebniss.	Schluss.
6. Wie 5., aber mit 1 Ammontartrat. 10 Min. auf 100°. — Erkalte. — Inficirt wie in 5. — Verschluss. Gebrütet.	Trübe. Voll Bacterien nach 1—2 Tagen.	Eingebrachte Bacterien entwickeln sich in saurer Flüssigk. vollkommen gut.
7. 100 Salzlös., 1 Rohrzucker, 0,5 Harnstoff, 1 Ammontartrat. 3 Tropfen einer bacterienhalt. Flüssigkeit. — 10 Min. auf 100°. Verschluss. Gebrütet.	Keine Bacterien nach 8 Tagen.	Eine Temperatur von 100° während 10 Min. in saurer Lösung tödtet die Bacterien.
8. 100 Salzlös., 1 Rohrzucker, 0,5 Harnstoff. 3 Tropfen Bacterien. — Verschluss. — 10 Min. auf 102°. — Gebrütet.	Keine Bacterien nach 8 Tagen.	Eine Temperatur von 102° während 10 Min. in neutraler Lösung tödtet die Bacterien. Die in 2. erhaltenen Bacterien entstanden nicht aus in der Flüssigkeit anwesenden Keimen.
9. 100 Salzlös., 1 Rohrzucker, 0,5 Harnstoff. — 10 Min. auf 100°. — Verschluss. — Gebrütet.	Keine Bacterien nach 8 Tagen.	Die Thonplatten lassen keine Keime aus der Luft durch. (Dieser Schluss ergibt sich auch aus 3., 4., 7., 8.)

Allgemeiner Schluss: Unter den angegebenen Versuchsbedingungen können Organismen entstehen ohne der directen Mitwirkung präexistirender Organismen.

Groningen, Januar 1874.

Beiträge zur Kenntniss der Einwirkung des galvanischen Stromes auf das menschliche Auge.

Von

Dr. **H. Schliephake.**

Wenn das Auge der Einwirkung eines galvanischen Stromes ausgesetzt wird, so ist, wie seit Le Roy bekannt, eine subjective Erregung des Gesichtssinnes die Folge. Dieselbe ist verschieden je nach der Anordnung der Electroden, verschieden bei Schliessung und Oeffnung des Stromes. Sie scheint auch nicht dieselbe bei verschiedenen Beobachtern zu sein, wenigstens finden wir über Intensität und Färbung des subjectiven Lichtbildes, noch mehr

aber über seinen Einfluss auf die Wahrnehmung äusserer Objecte differirende Angaben, demzufolge dann auch verschiedene Erklärungsweisen über die Art, in welcher der constante electrische Strom das menschliche Auge afficirt.

Behufs Vervollständigung anderweitiger Untersuchungen habe ich in den letzten Wochen den Einfluss constanter Ströme auf meine Augen vielfach studirt, und, da ich sehr ausgesprochene und durchaus beständige Resultate erhielt, diese Beobachtungen weiter ausgedehnt als ursprünglich in meiner Absicht lag.

Das Ergebniss derselben lässt sich kurz in Folgendem zusammenfassen:

Wenn, nachdem in der Regel 6—8 Elemente des Störerschen Apparates verbunden waren, die positive Electrode dem oberen Augenhöhlenrand, die negative dem Nacken angelegt wurde, so zeigte sich bei Schliessung der Kette das dunkle Sehfeld bläulich-violett erleuchtet, wie dies von vielen Beobachtern geschildert wird ¹⁾. Im Moment der Schliessung war, wie gesagt, das ganze Sehfeld erleuchtet, nach wenigen Secunden verkleinerte sich das Phänomen zu einer im Centrum des dunklen Sehfeldes gelegenen hellen Scheibe von der angegebenen Farbe. Bei der Oeffnung der Kette zeigte sich das umgekehrte Verhalten: im bläulich-violetten Sehfeld zeigte sich eine dunkle Scheibe von unbestimmbarer Farbe.

Wurde die Stellung der Electroden so geändert, dass an die Stirn die negative, die positive Electrode dagegen an den Nacken zu liegen kam, so schien bei Schliessung der Kette sich anfangs das ganze Sehfeld zu verdunkeln ²⁾, alsbald konnte jedoch inmitten des violett erhellten Sehfeldes eine dunkle Scheibe wahrgenommen werden, deren Schwarz deutlich etwas Gelb beigemischt erschien.

Oeffnung der in der angegebenen Weise angelegten Kette ergab auch hier, im ersten Moment und noch einige Secunden nachher anhaltend, die entsprechende Umkehrung der Farbenvertheilung: violette Scheibe auf dunkeln Grunde.

Während des Schlusses der Kette dauerte das Phänomen, wie es sich einige Secunden nach der Schliessung dargestellt

1) Vgl. insbesondere Helmholtz, *physiol. Optik*, p. 202.

2) Helmholtz, l. c.

hatte, noch gegen zwei Minuten lang unverändert fort; die einzelne Beobachtung auf noch längere Zeit auszudehnen wurde aus naheliegenden Gründen unterlassen.

Einschaltung einer, soweit dies der recht unangenehm werdende Hautschmerz zuliess, grösseren Zahl von Elementen (bis zu 20 des Stöhrer'schen Apparates) hatte Verstärkung der Intensität aller dieser Erscheinungen, aber nicht die mindeste Aenderung ihrer Qualität zur Folge. Ob bei stärksten „Dosen“ alle Erscheinungen sich umkehren, muss ich desshalb nach meinen Versuchen dahingestellt sein lassen.

Aus diesen folgt, so weit sie bis jetzt besprochen wurden, vorläufig nur, was schon von den früheren Beobachtern festgestellt war: der Galvanisirung des Auges entspricht eine bestimmte Lichterscheinung, welche einerseits bei Schliessung des aufsteigenden ¹⁾ und Oeffnung des absteigenden, andererseits bei Oeffnung des aufsteigenden und Schliessung des absteigenden Stromes dieselbe ist.

Wenden wir uns nun zu der weiteren Frage: Beeinflusst diese im dunkeln Sehfeld auftretende subjective Farbenempfindung die Wahrnehmung objectiver Farben? Bekanntlich wurde dieses schon von Ritter behauptet ²⁾, andere wollten Aehnliches beobachtet haben, eine eingehendere unsere Frage bejahende Arbeit gab Schelske ³⁾, in neuerer Zeit wurde dann die Frage von Brenner ⁴⁾ und Brunner ⁵⁾ ausdrücklich verneint.

Für mein Auge ist eine solche Veränderung der Farbewahrnehmung unzweifelhaft, und zwar geschieht sie in der Weise, dass während der Schliessung der Kette zu der Farbe der äusseren Objecte sich die Färbung des oben als centrale farbige Scheibe bezeichneten Theiles des Gesichtphänomens gleichsam hinzuaddirt, der objectiven Farbe bei aufsteigendem Strom mit hin violett, bei absteigendem gelb hinzugefügt wird. Auch die

1) Es braucht hier wohl nicht hervorgehoben zu werden, dass die Bezeichnung der Stromesrichtung hier und später vorerst nichts weiter als die Stellung der Electroden angeben soll, keineswegs mit derselben aber ein bestimmter Standpunkt in der Erklärung dieser Erscheinungen eingenommen ist.

2) Gilbert's Annalen, Bd. VII, p. 448 ff.

3) Arch. f. Ophth. IX, 3, 49.

4) Untersuch. u. Erfahr. etc. p. 41.

5) Beitr. z. electr. Reiz. d. N. opt. 1863.

Oeffnung des Stromes zeigt für einen Moment die ihrer Farbenerscheinung entsprechenden Mischfarben. Diese sind ganz dieselben, wie wenn einer in der betreffenden Weise gefärbten rotirenden Scheibe ein Sector Violett oder Gelb hinzugefügt würde. Ich bekam (sowohl bei der Untersuchung mit Pigmenten als mit spectralem Lichte) so ziemlich dieselben scheinbaren Veränderungen der objectiven Farben, wie sie Schelske beschreibt, und begnüge mich desshalb sie einfach anzuführen:

Die positive Electrode an der Stirne, die negative am Nacken:

	Schliessung	Oeffnung
Roth	schmutzig Purpur	gelbroth.
Orange	heller Purpur	fast gelb.
Gelb	weisslich	satt gelb.
Gelbgrün	hellgrün	gelblich.
Blaugrün	bläulich	gelbgrün.
Blau	dunkelblau	weisslich.
Violett	stärker violett	weisslich.

Die negative Electrode an der Stirne, die positive am Nacken:

	Schliessung	Oeffnung
Roth	gelbroth	Purpur. .
Orange	gelb	Purpur.
Gelb	gesättigt gelb	weiss.
Gelbgrün	gelblich	weisslich.
Blaugrün	weisslich grün	bläulich.
Blau	weisslich	dunkelblau.
Violett	weisslich	dunkelviolet.

Das heisst: wenn die positive Electrode an die Stirne, die negative an den Nacken gesetzt wird, so wird bei der Schliessung der Kette die rothe Farbe purpur- (carmin-) farbig, bei der Oeffnung gelblichroth u. s. f.

Ich will nur noch bemerken, dass diese Erscheinung der Farbenveränderung vollkommen constant und sehr augenfällig war. Mehrmals machte ich folgenden Versuch: Während ein Stück farbigen Papiere von mir betrachtet wurde, legte ein Assistent mir die Electroden, deren Anordnung mir unbekannt war, an Stirn und Nacken, und sofort konnte ich ihm aus der Veränderung, welche in meiner Farbenempfindung vor sich ging, richtigen Aufschluss über die Stellung der positiven und negativen Electrode geben. So oft auch der Assistent die Stromesrichtung ohne mein Vorwissen änderte, nie irrte ich mich in meinen Angaben.

Begegneten wir bei der Frage: wird die Wahrnehmung objectiver Farben durch die galvanische subjective Farbenempfindung geändert, grossen Meinungsverschiedenheiten, so ist dies in noch höherem Grade der Fall bei der uns jetzt beschäftigenden Frage: Wird die Wahrnehmbarkeit kleinster äusserer Objecte, mit anderen Worten, wird der kleinste Schwinkel in irgend einer Weise durch Galvanisirung des Auges beeinflusst? Die meisten Beobachter erwähnen einen solchen Einfluss nicht, diejenigen, die es thun, schreiben bald dem positiven Pol (aufsteigendem Strom) ¹⁾, bald dem negativen ²⁾ (absteigendem Strom) ein „deutlicher erscheinen lassen“ äusserer Objecte zu.

Ich stellte mehrere Versuche mit den bekannten Jäger'schen Schriftproben an, und kam zu folgendem Resultat: War die positive Electrode der Stirn, die negative dem Nacken aufgesetzt, so bewirkte Schliessung der Kette ein deutlicheres Hervortreten der schwarzen Buchstaben auf ihrem hellen Hintergrunde, Oeffnung dagegen hatte weniger deutliche Sichtbarkeit derselben zur Folge. Entgegengesetzte Application der Electroden war auch hier von umgekehrter Einwirkung bei Schliessung und Oeffnung begleitet. Ich kann nicht behaupten, dass die Distinctionswinkel in messbarer Weise zu- oder abgenommen haben, wer jedoch mit derlei Untersuchungen sich befasst hat, wird einerseits kaum verlangen dürfen, dass diese kleinen Veränderungen ihren geformten Ausdruck in Zahlen finden müssen, und wird andererseits gewiss zugeben, dass man nach einiger Uebung mit Sicherheit die Begriffe „Deutlicher-“ und „Undeutlichersehen“ abschätzen kann. Das Resultat dieser ersten Versuche war constant, es würde sich den Beobachtungen derjenigen anschliessen, welche der Schliessung des aufsteigenden und der Oeffnung des absteigenden Stromes eine Erhöhung der Sehschärfe zuschreiben.

Der Gedanke lag nahe, dass es sich bei diesem Mehr- und Minderdeutlichsehen nicht sowohl um eine Steigerung und Abnahme der Erregbarkeit des Sehorganes, als um jene schon besprochene subjective Farbenempfindung handle, welche, zur Empfindung objectiven Lichtes tretend, in einzelnen Fällen den

1) Aubert, *Physiol. d. Netzhaut* p. 386.

2) Ritter, Schelske, Ueber den Irrthum, den Purkinje in der Erklärung der Ritter'schen Beobachtung begangen, vergl. Brenner, l. c. pag. 31.

Helligkeitsunterschied verstärkte, in anderen denselben verringerte und so auf indirectem Wege eine Zu- und Abnahme der Deutlichkeit erzeuge.

Diese Vermuthung wurde durch den Versuch durchaus bestätigt: Mischte ich mit Maxwell'schen Scheiben 115° Gelb mit 245° Violett, so zeigte sich bei rascher Rotation als Mischfarbe ein leicht ins Violett spielendes Hellgrau, dessen Helligkeit durch eben diese farbige Beimischung wesentlich beeinträchtigt wurde. Betrachtete ich die so zusammengestellten, sich drehenden Scheiben, während ich die negative Electrode an die Stirne, die positive an den Nacken legte, so verschwand diese Beimischung von Violett zu Gunsten der Helligkeit der Mischfarbe. Oeffnete ich die Kette, oder schloss ich sie nach Umkehrung der Stromesrichtung, so trat zu dem schon in der ursprünglichen Anordnung vorhanden gewesenen Plus von Violett noch eine weitere Quantität dieser Farbe; die Färbung der rotirenden Scheibe entfernte sich nun noch mehr von einem unreinen Weiss, d. h. sie wurde noch dunkler.

Waren hingegen ein gelber Sector von 185° mit einem violetten von 175° combinirt, so zeigte sich wieder kein reines Hellgrau — die gelbe Farbe war jetzt überwiegend. Der aufsteigende Strom, durch welchen, wie mehrfach erwähnt, äussere Gegenstände in violettem Lichte erschienen, bewirkte bei seiner Schliessung eine Combination dieser letztgenannten Farbe mit dem in der Scheibe vorhandenen Ueberschuss von Gelb zu Weiss und steigerte dadurch die Helligkeit der Farbe, während die Oeffnung dieses Stromes oder die Schliessung des entgegengesetzt gerichteten, aus dem gelben Teint der Milchfarbe ein gesättigtes Gelb hervorgehen liess. Natürlich wurde bei dieser letzten Art des Versuches die Helligkeit der rotirenden Scheibe, deren Hellgrau sich noch eine satte Farbe zugesellt hatte, sehr merklich abgeschwächt.

Benutzte ich nun diese in ihrer scheinbaren Farbe und Helligkeit durch den galvanischen Strom modificirbaren Maxwell'schen Scheiben als Hintergrund kleiner dunkler Objecte, z. B. der Gitterfäden eines Optometers, so trat, was zu erwarten war, je nach der Combination der Scheiben und der Richtung des Stromes bald deutlicheres, bald undeutlicheres Sehen der genannten Objecte ein. Auch ein mit Tusche durch die ganze Scheibenzu-

sammenstellung gezogener, derselben concentrischer, einige Millimeter breiter, schwarzer Ring zeigte ganz dasselbe Verhalten: d. h. wenn der electriche Strom die complementäre zu der in der Scheibe in geeigneter Quantität überwiegenden Farbe bildete und somit den Hintergrund erhellte, so traten die dunkeln Objecte deutlicher hervor, wurde dagegen durch die entgegengesetzte Application der Electroden die Färbung der Scheibe intensiver, so waren auch die auf düsterem Grunde befindlichen dunkeln Objecte weniger deutlich.

Dieser Helligkeitsunterschied wird natürlich dadurch vermindert, dass erstens die den schwarzen Objecten entsprechenden Netzhautstellen ebenso der subjectiven Erregung unterworfen sind, wie der dem Hintergrunde entsprechende übrige Theil der empfindenden Fläche, und dass ferner jenes Schwarz bei Weitem kein absolutes Dunkel darstellt, sondern immerhin Lichtstrahlen zurücksendet, unter welchen sich eine gewisse Menge befinden kann, welche mit der subjectiven Farbe combinirt Weiss giebt, dadurch die Dunkelheit der Objecte vermindern den Contrast beeinträchtigt. Der letztere ist jedoch bei allen Versuchen gross genug um die geschilderten Erscheinungen deutlich zu zeigen.

Aus dem Gesagten ergibt sich auch die Erklärung, warum bei meinen ersten Versuchen mit den Jäger'schen Schriftproben constant die Schliessung des aufsteigenden und die Oeffnung des absteigenden Stromes die Buchstaben deutlicher hervortreten liess, bei umgekehrtem Verhalten des Stromes dieselben dagegen weniger scharf erschienen: das für die Jäger'schen Proben verwendete Papier zeigt auch für in der Unterscheidung von Farbenuntüancen wenig geübte Augen deutlich einen „Stich ins Gelbe“, verhielt sich also wie jene mit einem Ueberschuss von Gelb versehene Scheibenzusammenstellung der späteren Beobachtungen.

Aus diesen letzteren folgere ich: Durch Combination der subjectiven Farbenempfindung mit einer durch objectives farbiges Licht hervorgerufenen Erregung ist der constante Strom unter gewissen Umständen geeignet, Helligkeitsunterschiede zu erhöhen und dadurch gewissermassen eine Vermehrung der Sehschärfe hervorzubringen, während unter entgegengesetzten Umständen dann dieselbe Anwendung des Stromes Helligkeitsunterschiede vermindert und in Folge dessen die Deutlichkeit des Sehens herabsetzt.

Schliesslich glaube ich noch einige Worte über eine bedeutende Verstärkung der Wirkung des aufsteigenden und Abschwächung des Einflusses des absteigenden Stromes vermittelt eines auf die Farbenempfindung in spezifischer Weise wirkenden Stoffes, der Santonsäure, anfügen zu dürfen ¹⁾. Als erstes Stadium der Santoninvergiftung fasse ich einen Zustand auf, in welchem das dunkle Gesichtsfeld schwach violett erhellt erscheint. Diese Violettempfindung wird verstärkt durch mässige Quantitäten objectiven Lichtes (Halbdunkel) und gerade, wie für mein Auge der aufsteigende Strom äussere Objecte in mit Violett gemischter Farbe erscheinen lässt, so thut dies in noch höherem Grade das genannte Arzneimittel. Setze ich nun, einige Minuten nachdem ich 0,5 Natr. sant. genommen habe, die positive Electrode oberhalb des Augenbrauenbogens, die negative an den Nacken, so erscheint bei geschlossenen Augen das electrische Phänomen in verstärkter, wahrhaft brillanter Weise. Auch die Veränderungen der objectiv vorhandenen Farben (Pigmente und Spectrum) zeigen sich in viel ausgesprochenerem Maasse, als sie durch die electrische Erregung oder die Santoninvergiftung allein hervorgerufen werden können. Wird nun der Strom geöffnet, oder tauschen die beiden Electroden ihren Platz und wird dann der Strom geschlossen, so ist es nur im Anfang der Santoninwirkung möglich, die jener Anwendung des Stromes eigenthümliche subjective Gesichterscheinung hervorzurufen. Wenn, nur einige Minuten später, eine grössere Menge des Giftes resorbirt ist, so bleibt diese letzte Anordnung des electrischen Stromes ohne nachweisbare Einwirkung auf Eigenlicht und Farbenwahrnehmung.

1) In nächster Zeit werde ich Gelegenheit haben ausführlichere Beobachtungen über den Einfluss, den Genuss von Natrum santonicum auf das Sehorgan ausübt, zu veröffentlichen.