Bien que les dernières espèces indiquées avant celle-ci aient déjà le dessous des feuilles assez glauque, aucune ne l'a au même point que *P. hypomelaena* qui fait le passage aux beaumiers par ce détail, comme quelques-unes des précédentes par le contour des feuilles turionales.

Europe nord-orientale, Asie nord-occidentale.

LXXX. H. Lévêillé, *Pieris* genus novis speciebus chinensibus auctum.

(Ex: Bull. Soc. Bot. France, LIII [1906], p. 202—201.)

1. *Pieris buxifolia* Lévl. et Vant., l. c. p. 203.

Frutex humillimus et procumbens 10—15 cm longus, ramosus; foliis illa *Buxi sempervirentis* vel *Alyciae sinensis* perfecte referentibus, integerimis, margine conspicue revolutis, supra corrugatis, subtus maculato-punctatis, nervo unico, simul ac brevi petiolo pilosa; pedicellis et calycibus villosis; corolla glabra; floribus rubris; antheris conspicue biaristatis.

Bien curieuse espèce à feuilles de Buis ou d'*Alyxia sinensis*; naine et très pauciflore.

Kouy-Tchéou: Mo-chie; Tchang-t'sai, mai 1904, no. 33 (J. Esquirol).

2. *Pieris Henryi* Lévl., l. c. p. 204.

Frutex humilis, ramis rubescentibus; foliis griseo-rufis, integris, obtusis vel retusis, ad basim cuneatis, conspicue nervatis, margine revolutis, illa *Salicis cinereae* referentibus; racemis paucifloris, brevibus erectis; calyce sparse hispido et rubescente; corolla villosa; floribus albis; staminibus brevibus; antheris muticis; stylo staminibus longiore.

Cette espèce, étiquetée par M. Augustine Henry *Pieris ovalifolia*, ne peut selon nous se rapporter à cette espèce dont elle se différencie nettement par ses feuilles très analogues à celles du *Salix cinerea*, obtuses ou rétuses, ni ponctuées ni roulées aux bords et surtout nullement acuminées. Les inflorescences sont en outre dressées et non étalées, feuillées et courtes. La plante est un arbuste peu élevé et non un arbre.

Yunnan: Mongtze, montagnes vers 2000 m; no. 9681.

3. *Pieris Ulbrichii* Lévl., l. c. p. 205.

Frutex, ramis validis et crassis; foliis petiolatis, integris ovatis, margine revolutis, acuminatis, supra lucidis; nervis subtus parum conspicuis; racemis numerosis, confertifloris, plerumque terminalibus efoliatis; floribus erectis albis; calyce et corolla sparse villosis; staminibus breviter vel brevissime aristatis, aristis geniculatis; stylo crasso et pubescente.

Se différencie nettement des autres espèces par ses fleurs dressées et non penchées vers la terre comme dans les diverses espèces du genre.

Les feuilles sont celles du *kouyangensis* mais elles ont un aspect luisant qui les différencie de celles-ci au premier abord.

Kouy-Tchéou, 15 mai 1904, no. 42 (J. Esquirol).

4. **Pieris Esquirolii** Lévl. et Vant., l. c. p. 206.

Frutex; ramis griseis; foliis lanceolatis glabris, utrinque attenuatis, apice acuminatis repandae dentatis, supra lucidis; calycis rubris lobis acuminatis; corolla et calyce glabris; staminibus integre villosis cornibus antherarum illis vel duplo longioribus glabris, apice tridentatis aut lacinatis; stylo exserto floribus albis, apice rubris.

Espèce très remarquable par ses étamines totalement velues à cornes plus longues qu'elles et parfois même d'une longueur double, exsertes après l'anthèse. Les fleurs blanches sont bordées de rouge à leur sommet. Les feuilles sont membraneuses et d'un vert luisant.

Kouy-Tchéou: route de So-Jao, face à Pa-Pen, 3 avril 1904, no. 12 (J. Esquirol).

var. α . **leuocalyx** Lévl., l. c. p. 206.

Calyce albido et dense pilis munito.

Bien curieuse variété à calyce tomenteux blanchâtre, qui se distingue en outre du type par ses feuilles plus courtes et vertes et par l'aspect rougeâtre des rameaux.

Kouy-Tchéou: route de So-Jao, face à Pa-Pen, no. 11 (J. Esquirol).

var. β . **discolor** Lévl., l. c. p. 206.

Foliis subtus dense pubescentibus et glaucescentibus; corolla ad medium tubum dilatata.

Feuilles discolores et corolle renflée en son milieu.

Kouy-Tchéou: route de So-Jao, face à Pa-Pen, no. 10, 3 avril, no. 13, 4 avril 1904. Arbrisseau de 2 à 3 mètres croissant sur un coteau schisteux (Jos. Esquirol).

5. **Pieris lucida** Lévl., l. c. p. 207 (*P. ovalifolia* var. *denticulata* Lévl. et Vant.).

Frutex omnino et perfecte nitens, etiam in inferiore pagina foliorum; calyce et corolla exceptis; rami tortuosi; folia obscure et repandae arguto-dentata, ovalia, longe acuminata; calyce et corolla breviter pubescentibus; staminibus muticis; stylo vix vel non exserto.

Kouy-Tchéou: Tsin-Gai (Kai-po), arbrisseau de 3 à 4 m de hauteur, 5 août 1903, no. 1235 (Jul. Cavalerie).

Très distinct par son aspect, extrêmement luisant qui le rapproche du *P. Ulbrichii*. Celui-ci s'en écarte par ses feuilles entières, luisantes seulement en dessus.