IV. Specielle analytische Methoden.

1. Auf Handel, Industrie, Agricultur und Pharmacie bezügliche.

Von

C. Fresenius.

Bestimmung der Härte des Wassers. Pierce B. Wilson (Annal. d. Chem. u. Pharm. 119. 318) hat die bekannte Clark'sche Methode, die Härtegrade des Wassers zu bestimmen, um deren Ausbildung sich namentlich auch Faisst und Knauss verdient gemacht haben, in der Art modificirt, dass man keiner Tabellen mehr bedarf. Letztere waren nothwendig, weil der Verbrauch an Seifenlösung nicht in demselben Verhältnisse steigt, in welchem der Gehalt an gelösten Salzen der alkalischen Erden zunimmt. Wilson fand, dass diess dann der Fall ist, wenn man der Normalkalklösung oder dem zu prüfenden Wasser eine gewisse Menge kohlensaures Natron zusetzt.

Sein auf dieser Grundlage modificirtes Verfahren ist das folgende. Als Normalkalklösung dient eine Auflösung von 1 Th. krystallisirtem Gyps in 2543 Th. Wasser. Diese Auflösung entspricht genau der Clark'schen von 16 Th. kohlensaurem Kalk in 70000 Thln. Wasser. Der von Clark angenommene Begriff eines Härtegrades, womit er den Gehalt von 1 Thl. kohlensaurem Kalk in 70000 oder von 1 Th. Kalk in 125000 Thln. Wasser bezeichnet, bleibt somit unverändert.

Die Seifenlösung bereitet Wilson nach dem von Faisst angegebenen Verfahren. Danach werden 30 Grm. Natronölseife in 3 Liter Weingeist von 90° Tralles gelöst, die trübe Lösung von dem etwa ausgeschiedenen kohlensauren Natron abfiltrirt und aufbewahrt. Beim Gebrauche werden 200 Grm. zunächst mit 150 Grm. Wasser vermischt, um den Weingeist auf 56° Tr. zu bringen, dann noch 130 Grm. Weingeist von 56° Tr. zugefügt. Die Lösung wird schliesslich so gestellt, dass 32 CC. genau hinreichen, um in 100 CC. obiger Normalgypslösung von 16° Härte, beim Schütteln einen fünf Minuten lang stehenbleibenden Schaum zu bilden. Der Versuch wird in einem etwa 400 CC. fassenden Glase mit eingeriebenem Stöpsel vorgenommen. Nachdem die 100 CC. der Normalgypslösung hineingebracht sind, fügt man 4 CC. einer kalt gesättigten Lösung von kohlensaurem Natron zu und lässt dann

aus einer Quetschhahnbürette von der Seifenlösung hinzufliessen, bis sich beim Schütteln ein leichter Schaum bildet. Jetzt setzt man die Seifenlösung tropfenweise zu, schüttelt nach jedem Tropfen und beendet den Versuch, sobald sich nach Zusatz des letzten Tropfens ein fünf Minuten lang stehenbleibender, feinblasiger Schaum bildet.

Um nun ein Wasser auf seinen Härtegrad zu prüfen, misst man 100 CC. desselben ab, setzt 4 CC. kalt gesättigte Lösung von kohlensaurem Natron zu, dann aus der Bürette von der titrirten Seifenlösung bis der eben besprochene bleibende Schaum auftritt. Der Schaum muss, wenn er zusammengesunken ist, durch blosses Schütteln, ohne Zusatz von Seifenlösung, wieder hervortreten. Die Anzahl der verbrauchten CC. Seifenlösung, getheilt durch 2, gibt den entsprechenden Härtegrad.

Bei Wasser von mehr als 16° Härte ist diese Prüfung nicht mehr anwendbar. Bei Wasser von 20° Härte entsteht bei Zusatz von kohlensaurem Natron schon ein sichtbarer Niederschlag von kohlensaurem Kalk. Solche Wasser sind durch entsprechendes Verdünnen mit destillirtem Wasser zu prüfbaren zu machen.

Magnesiumsalze wirken auf die Seifenlösung wie Kalksalze. Aus der Angabe der Härtegrade kann man daher nur den Gehalt an Kalk und Magnesia zusammen erschen, wobei die Magnesia in der äquivalenten Menge Kalk ausgedrückt wird.

Die Angabe D. Campbell's, dass Mischungen von Kalk- und Magnesiumsalzen etwas weniger Seifenlösung erfordern, als wenn man sie einzeln prüft (welche Angabe auch schon von Faisst und Knauss widerlegt wurde), fand Wilson nicht bestätigt.

Acidimetrie. Carey Lea (American Journal of Science, — Chem. News 1861. No. 97. S. 195) macht der bekannten acidimetrischen Methode von Kiefer (Annal. d. Chem. u. Pharm. 93. 386, — auch in meiner Anleit. zur quant. Analyse, 4. Aufl. S. 614) den Vorwurf, dass sie auf einem ganz falschen Principe beruhe, weil der bei Zusatz der ammoniakalischen Kupfervitriollösung zu der zu bestimmenden Säure entstehende Niederschlag von basischem Kupfersalz in dem entstehenden Ammonsalz nicht unlöslich sei, also erst entstehe, nachdem der Zustand der Sättigung eingetreten. Dieser aber sei nicht constant, sondern abhängig von dem Grade der Concentration, sowie davon, ob noch andere und welche andere Salze zugegen sind. Ammonsalze bezeichnet er natürlich als die gefährlichsten.