Ep.	SS = 9 ^m 35	Maximum	Gr.	Bb.	Dauer	Typus
	2420...	2420...				
74	493.2	496 = 1914	8 ^m 5	12	18 ^d	lang
75	571?	573? 1915	—	2	—	kurz
76	631?	635	8.5	10	> 16	lang
77	676	678	9.0	10	16	anormal
78	731.5	736	8.6	12	18	lang
79	795	797	8.8	4	12	kurz
80	848	852	8.6	8	19	lang

Bemerkenswert ist der sehr lange Zwischenraum zwischen den Maxima Nr. 74 und Nr. 75. Die Helligkeit blieb nahezu stationär bei 11^m4 oder 11^m5. Viel unruhiger benahm sich der Stern zwischen Nr. 79 und Nr. 80. Bei 819 trat eine deutliche Aufhellung (bis 11^m0) auf, bei 841 sank die Helligkeit bis 11^m6.

Das Maximum Nr. 77 verlief nahezu symmetrisch: In 9 Tagen (669—678) stieg der Stern von 11^m0 bis 9^m0 empor, während der Abstieg 7 Tage dauerte.

Utrecht, 1916 Mai 20.

A. A. Nijland.

Zusatz von Juni 1. Der von Herrn C. L. Brook, Director of the Variable Star Section of the B. A. A., erstattete Jahresbericht »SS Cygni in 1915« (J. B. A. A. 27.224) kam mir zu Händen, als das Obenstehende schon geschrieben war. Die zahlreichen gut unter sich stimmenden Beobachtungen lassen keinen Zweifel darüber bestehen, daß das Maximum Nr. 78 anormal war. Der Aufstieg war bedeutend langsamer, als es bei den langen Maxima der Fall zu sein pflegt. Ich selbst hatte den Anstieg nicht beobachtet, schloß aber aus dem allgemeinen Verlauf des Maximums auf langen Typus.

A. A. Nijland.

Eigenbewegungen aus der Umgebung von ι Leonis.

Nr.	α 1875	δ 1875	Gr.	Δs	φ	BD
236	11 ^h 6 ^m 17 ^s	+13° 9'7"	13 ^m	0.3(8)	245°	
237	6 26	13 36.0	13.5	0.84	130	
30*	9 40	8 41.5	12	0.8(8)	255	
238	10 1	11 46.0	12.5	0.42	240	
239	10 22	12 2.4	11	0.1(2)	240	
240	12 20	12 25.6	13.5	0.27	235	
241	13 56	9 27.4	11.5	0.3(1)	260	
242	15 8	10 29.3	13	0.1(7)	225	
243	15 9	14 12.6	10	0.22	170	
244	15 33	12 44.4	10.5	0.37	250	
245	15 50	15 7.7	9.5	0.5(4)	270	+15°2325
32*	17 21	9 14.8	10	1.06	280	
246	17 23	12 12.7	13	0.1(3)	190	
247	17 24	10 19.3	10.5	0.1(3)	195	
248	18 0	10 6.0	11	0.4(0)	190	
249	18 41	9 48.1	12.5	0.21	190	
250	19 59	11 6.6	8.5	0.3(6)	250	+11.2353
251	20 29	12 33.3	12.5	0.50	275	
252	21 11	13 19.7	9.5	0.37	275	+13.2410
253	22 31	10 51.1	11.5	0.99	300	
254	23 9	11 46.2	12	0.23	235	
255	23 46	10 59.7	10.5	0.15	235	
256*	25 17	15 3.8	6.5	0.42	230	+15.2345
257	26 6	11 35.9	9.5	0.35	225	+11.2369
258	26 36	14 0.0	9	0.2(2)	235	+14.2402
259	11 29 35	+12 3.5	9.5	0.17	225	

Bemerkungen. Eine größere Zahl schwach bewegter Sterne ist wegen kleiner Störungen an den Bildern unterdrückt worden. — 236 ist der vorangehende dreier in einer Linie stehender Sterne. — 30* war früher gefunden und ist in A. N. 4811 mit 0.81 (261.5) angegeben; die damals benutzten Bilder waren viel besser. — 238: *13^m sf 1'. — 240: *13^m5 n 1/2'. — 241: *10^m sf 2 1/2'. — 242: drei Sternchen 14^m np 1 1/2-2'. — 243: ein Doppelstern 11^m und 12^m p 2'. — 244: *11^m sp 1 3/4'. — 32*: früher gefunden; war in A. N. 4811 mit 1.05 (279°) angegeben; da dort andere Aufnahmen benutzt waren, so ist die Übereinstimmung besonders schön. — 246: *14^m mp 1', *11^m nf 2'. — 249: *13^m sf 1', *14^m f 3/4'. — 250: = Lpz I 4292. — 251: *11^m sf 1 1/4', *14^m5 p 11'; mit letzterem Stern tritt der bewegte Stern 251 in etwa 22 Jahren in nahe Konjunktion oder Bedeckung. — 252: *13^m5 sf 1'. — 253: *8^m (+10°2291) s 8'. — 255: *11^m mp 1/2'. — 256*: = Doppelstern Berl A 4450-51, auf den Platten länglich, randnahe; der Katalog Berl A gibt die EB. 0.43 (245°). — Außer von letzterem Stern ist nur noch vom Stern Berl A 4404-05 die Bewegung angegeben mit etwa 0.17 (175°). Sie dürfte in Sinn und Größenordnung stimmen, ist aber für mich wegen zu großer Helligkeit nicht meßbar. — 258: = Lpz I 4327.

Ich hebe den Stern 251 besonders hervor, weil er seinem schwachen Begleiter sehr nahe treten wird. Das Paar wird sich an großen Instrumenten vielleicht vorzüglich zur Untersuchung physikalischer Fragen eignen.

Königstuhl, 1916 Juni.

M. Wolf.

Jupiter. Am 10. Juli um fast genau 15^h M. E. Z. stand in der *NTrZ* Jupiters als einziges stark auffallendes Objekt der ganzen Scheibe ein großer, sehr heller Fleck von beiläufig 11000 km Länge. Er hat nichts mit den i. J. 1914 von mir gesehenen »Eiern« zu tun, die innerhalb des N-Randes des *NEB* standen, ist viel größer, als jene waren, und zeichnet sich durch eine ungewöhnliche Helligkeit aus. Es wäre zu wünschen, daß zahlreiche Längenbestimmungen des Objektes, das auch kleinen Fernrohren zugänglich ist, gelingen möchten.

Landstuhl, 1916 Juli 12.

Ph. Fauth.

Inhalt zu Nr. 4853. A. Abetti. Asteroidi osservati ad Arcetri nel 1915. 69. — A. Küh. Über die Sichtbarkeitsgrenze von Fixsternen in Fernrohren. 81. — A. A. Nijland. Beobachtungen von SS = V19 Cygni. 81. — M. Wolf. Eigenbewegungen aus der Umgebung von ι Leonis. 83. — Ph. Fauth. Jupiter. 83.