Zeitschr. 1915, 71, 226—236.) — II. Die Entstehung von Bernsteinsäure bei der Fäulnis von α -Ketoglutarinsäure. (Biochem. Zeitschr. 1915, 71, 237—244.)

C. Neuberg und J. Kerb: Über die Vorgänge der natürlichen Milchsäurebildung. (Biochem. Zeitschr. 1915, 71, 245—254.)

H. J. Waterman: Über einige Faktoren, welche die Entwicklung von *Penicillium glaucum* beeinflussen. Beitrag zur Kenntnis der Antiseptika und der Narkose. (Zentrbl. Bakteriell. II. Abt. 1914/15, 42, 639—688.)

H. Wüstenfeld: Gärbeschleunigung durch gewisse Stoffe — bewegte Gärung — gefesselte Gärung. (Wochenschr. Brauerei 1916, 33, 89—90.)

Wein.

R. Marcille: Über die stickstoffhaltigen Bestandteile des Mostes. (Compt. rend. 1914, 158, 1199—1201.) — Verf. hatte in einer früheren Abhandlung (Z. 1915, 32, 529) über Traubenmoste berichtet, die sehr lange Zeit zur völligen Vergärung brauchten, und die Ursache dafür dem Mangel dieser Moste an für die Hefe assimilierbarem Stickstoff zugeschrieben, da normale Gärung leicht durch Zusatz von Ammoniumsalzen zu erzielen war. Demgegenüber stand die Beobachtung Laborde's, wonach ein von flüchtigen Stickstoffverbindungen befreiter Most fast ebenso schnell vergärt wie der ursprüngliche Most. Die eigenen Untersuchungen und die Versuche von Laborde wurden daher wiederholt und haben nunmehr zu folgenden Schlußfolgerungen geführt: Die Traubenmoste enthalten Stickstoff in zwei Formen, nichtflüchtigen organischen Stickstoff und flüchtigen Ammoniak- oder Aminostickstoff, in sehr verschiedenen absoluten und relativen Mengen. Gegen Ende der Traubenreife findet Verminderung des Stickstoffgehalts statt. Im allgemeinen sind die Mengen des assimilierbaren Stickstoffs für eine regelrechte Gärung durchaus genügend. Es kommen aber Fälle vor, in denen die Hefe nicht den gesamten für ihre Ernährung erforderlichen Stickstoff im Most findet; diese Moste, die alsdann sehr schwierig vergären, zeichnen sich durch einen geringen Gehalt an flüchtigem Stickstoff aus. Ein Zusatz von 50 g Ammoniumsulfat auf 1 hl Most hilft dem Übelstand leicht ab.

G. Sonntag.

W. J. Baragiola und O. Schuppli: Der Gehalt an Weinsäure in Traubenmosten und Jungweinen der Schweiz. (Landwirtsch. Jahrbuch der Schweiz 1916, 455—479.) — Verff. stellten, um die Berechtigung der Weinsäuerung mittels kohlensauren Kalkes in Weinen aus der Schweiz nachzuweisen, an Hand von 595 Analysen fest, daß der Gehalt an Weinsäure zwischen 0,4—0,9% schwankt und unbedenklich um 0,2% durch Ausfällung herabgesetzt werden kann. Bei den Jungweinen, die bisher nur wenig in dieser Hinsicht untersucht sind, ergab sich ein Weinsäuregehalt, der zwischen dem der Traubenmoste und fertigen Weine lag; der Säurerückgang drückt sich aber nur wenig in den Prozentwerten der Weinsäure, bezogen auf die Gesamtsäure aus, weil ja durch die Ausscheidung des Weinsteines auch letztere zurückgeht. Immerhin ergab sich jedoch, daß im Herbst und zu Anfang des Winters die Weinsäure mindestens etwa ein Drittel, gegen Ende des Winters noch etwa ein Viertel der Gesamtsäure ausmacht. Es können also auch Jungweine, wenn sie geschmacklich zu sauer erscheinen, unbedenklich um etwa 0,2%, auch ohne vorherige Weinsäurebestimmung, entsäuert werden, ohne daß man ein Übergehen des Entsäuerungskalkes in den Wein zu befürchten braucht. Durch deklarationsfreies Zugestehen dieser Kellerbehandlung kann vielleicht die Gallisierung ganz ausgeschaltet oder durch Trockenzuckerung ersetzt werden.

J. Großfeld.

Cesare Finzi: Organische Phosphorsäureverbindungen in konzentrierten Mosten und Weinen. (Staz. sperim. agrar. ital. 1914, 47, 337—346.)

— Auf Grund seiner eingehenden Versuche kommt Verf. zu folgenden Schlüssen: Die organischen Phosphorsäureverbindungen in Mosten und Weinen sind fertig gebildet im Saft und Fruchtfleische der Beeren und entstehen nicht erst durch Einwirkung des gebildeten Alkohols auf die Tresterbestandteile, da sie schon im alkoholfreien Moste nachweisbar sind. Ein bestimmtes Verhältnis von organischen zu anorganischen Phosphorsäureverbindungen besteht nicht, dagegen scheint dies der Fall zu sein zwischen organischer Phosphorsäure und Stickstoffverbindungen. Die organische Phosphorsäure ist in Weinen geringer als im Moste. — Zur Bestimmung der organischen Phosphorsäureverbindungen werden folgende Methoden angegeben: I. In Most: 100 ccm Most werden im Vakuum bei 45—47° zum Sirup abgedampft und nach dem Vermischen mit Glasmehl oder Sand bei gleichen Verhältnissen stehen gelassen, bis eine pulverisierbare, trockne Masse entsteht. Man extrahiert zunächst 12 Stunden mit wasserfreiem Äther, darauf gleiche Zeit mit absolutem Alkohol im Vakuum bei 45—47°, verdampft die alkoholische Lösung im Vakuum und schmilzt den Rückstand mit der 10-fachen Menge einer Mischung von 3 Teilen Salpeter und 1 Teil Soda. Die Schmelze wird in verd. Salpetersäure gelöst und die Phosphorsäure mittels Doppelfällung mit Molybdänlösung und Magnesiamixtur bestimmt. $\text{Lecithin} = \text{Mg}_3\text{P}_2\text{O}_7 \times 7,2703$. — II. In Wein: 500 ccm Wein verdampft man im Vakuum bei 48° unter Überleiten trockner Luft, der Rückstand wird im Vakuum getrocknet und nach dem Vermischen mit Sand 5-mal mit je 70 ccm Äther und 5-mal mit je 50 ccm absolutem Alkohol bei 45° ausgezogen und die alkoholische Lösung nach I weiterverarbeitet.

C. Grimme.

C. Mensio und E. Garino Canina: Ursprung, Menge und Bedeutung der Milchsäure in einigen italienischen Weinen. (Staz. sperim. agrar. ital. 1914, 47, 385—409.) — Als Ursache der Bildung von Milchsäure im Wein können verschiedene Gründe wirken. Unter normalen Verhältnissen findet eine Zersetzung vorhandener Apfelsäure in Milchsäure und Kohlensäure statt. Hierbei bleibt ihr Gehalt in kleinen Grenzen. Anders liegen die Verhältnisse bei krankhaften Veränderungen des Weines. Unter der Einwirkung von Milchsäurebakterien greift die Zersetzung auf Zucker und andere Extraktivstoffe über unter Bildung von Milchsäure und Essigsäure, später auch von Buttersäure und anderen Fettsäuren, wobei im Gegensatz zur normalen Milchsäurebildung der Gehalt an nichtflüchtiger Säure steigt. Auf Grund ihrer Versuche mit mehreren Weinen folgern die Verff., daß Milchsäure als ständiger Weinbestandteil anzusprechen ist und zwar je nach Zusammensetzung des Weines und Aufbewahrung in einer Menge bis 4—5 g im Liter. Ihr Gehalt steigt mit dem Alter des Weines, ihre Bildung setzt erst mit dem Aufhören der alkoholischen Gärung ein. Bei der pathologischen Milchsäurebildung kommt vor allem für die italienischen Weine ein naher Verwandter des *Bacterium gracile* in Betracht. — Zur Bestimmung der Milchsäure werden 50 ccm Wein mit Wasserdampf destilliert (in 50 Minuten 200 ccm Destillat). Den Destillationsrückstand titriert man nach Zusatz von 5 ccm 10%iger Bariumchloridlösung mit Barytwasser gegen Azolitmin, alkalisiert durch Zusatz von 2—3 ccm Barytwasser, erhitzt 10 Minuten auf dem lebhaft siedenden Wasserbade und engt nach dem Neutralisieren mit verdünnter Salzsäure auf 10 ccm ein. Man spült in eine 100 ccm-Schüttelflasche (Volumen 25 ccm), füllt unter Umschütteln mit neutralem 95%igem Alkohol zur Marke auf, läßt $\frac{1}{2}$ Stunde bei 15° stehen, füllt abermals auf und läßt unter häufigem Umschütteln noch 2 Stunden stehen; dann wird filtriert. 75 ccm Filtrat werden unter Zusatz von etwas Wasser in einer Platinschale zur Trockne verdampft, der Rückstand wird verascht, die Asche in einer Mischung von je 20 ccm Wasser und $\frac{1}{4}$ N.-Salzsäure unter gelindem Erwärmen gelöst und die Lösung gegen Azolitmin mit $\frac{1}{4}$ N.-Kalilauge titriert. Berechnung: Verbrauchte Anzahl ccm Salzsäure $\times 0,590 = g$

Milchsäure in 1 Liter Wein bzw. verbrauchte Anzahl cem Salzsäure $\times 6,666 =$ Anzahl cem N.-Milchsäure in 1 Liter Wein.

C. Grimme.

G. Lopriore: Über die Citronensäure in den Weinen. (Staz. sperim. agrar. ital. 1914, 47, 431—439.) — Verf. konnte nach verschiedenen Verfahren in mehreren selbsthergestellten Weinen in allen Fällen einwandfrei Citronensäure nachweisen.

C. Grimme.

Ferdinando La Marca: Die Weinbereitung mit schwimmender und mit untergetauchter Tresterdecke. (Staz. sperim. agrar. ital. 1914, 47, 65—84.) — Bericht über technisch durchgeführte Weingärungsversuche. Die schwimmende Tresterdecke ergab wegen des besseren Abschlusses von willkürlichen äußeren Einflüssen einen gleichmäßigeren Gärungsverlauf, während bei untergetauchter Tresterdecke die innigere Berührung der gefärbten Schalen einen stärkeren Auszug des Schalenfarbstoffes und somit einen tiefer gefärbten Wein ergab.

C. Grimme.

W. J. Baragiola und Ch. Godet: Die Vergärung des Traubenmostes unter Paraffinöl. (Zeitschr. f. Gärungsphysiol. 1914, 4, 81—89.) — Verff. stellten Laboratoriumsversuche darüber an, ob ein Unterschied zu bemerken ist, je nachdem man einen frischen Traubenmost mit oder ohne Paraffinöldecke vergären läßt. Als Ausgangsmaterial benutzten sie frisch von der Kelter fließenden Traubensaft. Dieser wurde durch Faltenfilter möglichst rasch klar filtriert, das Filtrat auf zwei Gärflaschen verteilt, mit wenig Reihhefe versetzt, der Most in der einen Flasche mit Paraffinöl überschichtet und dann beide Flaschen mit Gärverschluß versehen. Die Moste wurden vergären und dann einfach auf dem Trub liegen gelassen. Später nach ein bis zwei Jahren wurden die völlig klaren Weine vom Trub abgehebert und sofort untersucht. Verff. fassen die Ergebnisse ihrer Untersuchungen folgendermaßen zusammen: 1. Besonders für Labatoriumsversuche ist das Überschichten des Mostes vor der Gärung mit Paraffinöl dazu geeignet, die Berührung mit Luft und Krankheitskeimen zu verhüten. 2. Die Untersuchung von Weinen aus Vorlaufmost, welche teils mit, teils ohne Paraffinöldecke lange auf dem Vergärungstrub lagen, ergab in fast allen Fällen die gänzliche Abwesenheit von Zucker oder von anderen Fehling'sche Lösung reduzierenden Bestandteilen. 3. Die Proben mit Paraffinöl erwiesen sich fast durchweg als ärmer an Ammonium-Stickstoff als die Proben ohne Paraffinöl. 4. Es wird auf einen Zusammenhang zwischen biologischem Säure- und Eiweißabbau im Weine hingewiesen, in dem Sinne, daß sich bei dem Säureabbau der Gehalt an Ammonium-Stickstoff auf Kosten des Eiweiß-Stickstoffs vermehren kann.

P. Neumann.

W. J. Baragiola: Die Säure der Obstweine. (Landwirtsch. Jahrb. der Schweiz 1916, 441—454.) — Die Säure der Äpfel und Birnen besteht zum größten Teil aus Äpfelsäure; schwankt aber von 0,2—1,5 ‰, meist 0,5—1,0 ‰ bei unvergorenen Äpfeln, von 0,2—1,2 ‰, meist 0,3—0,8 ‰ bei Birnensaft, ist in den verschiedenen Schichten der Frucht ungleichmäßig verteilt und nimmt beim Lagern des Obstes erheblich ab; daneben findet sich noch etwas Zitronensäure und Gerbsäure. Letztere, die beim Reifen erst zu, dann wieder besonders in den letzten Tagen der Reifung sehr rasch abnimmt, auch bei der Mahlung und Pressung zum Teil verschwindet, ist für Klärung und Geschmack der Weine von großer Bedeutung. Ihre Abnahme bei der Lagerung ergibt sich aus folgenden Zahlen: Rheinholzbirnen bei der Lese am 6. Oktober 0,65 ‰, gelagert bis zum 22. Oktober 0,39 ‰, im teigigen Zustande am 11. November 0,01 ‰; Äpfel bei der Lese am 15. Oktober 0,19 ‰, bis zum 29. November 0,15 ‰, bis zum 23. Dezember 0,13 ‰; auch die Art der Mahlung war von Einfluß: Birnen grob gemahlen und gepreßt ergaben einen Saft

von 0,52 ‰, feingemahlen 0,42 ‰, ganz fein zerrieben 0,21 ‰ Gerbsäure. Über den Gehalt der Obstweine an Bernsteinsäure ist noch wenig bekannt, man fand meist 1 ‰ des Alkoholgehaltes. Der Gehalt an flüchtiger Säure soll nach Verf. 1,8 g nicht überschreiten, Beanstandungen schon bei 1,2 oder 1,0 g, seien zu verwerfen. Bezüglich der Milchsäure ist zwischen Milchsäure, entstanden durch den biologischen Abbau der Äpfelsäure (etwa bis 0,8 ‰), und dem Milchsäurestich zu unterscheiden; letztere ist durch die dabei gebildeten Nebenprodukte, wie Essigsäure, Fettsäuren und vielleicht Ester charakterisiert. Während im Weine die starke Weinsäure den Hauptausschlag für den Geschmack gibt, wird bei den frischen Obstweinen derselbe in wesentlich höherem Maße von den einzelnen organischen Säuren beeinflusst, indes ist nach eingetretenem Säureabbau für den geschmacklichen Charakter fast nur noch die Milchsäure ausschlaggebend.

J. Großfeld.

W. J. Baragiola und O. Schuppli: Untersuchung eines Weines mit freier Schwefelsäure. (Zeitschr. analyt. Chem. 1916, **55**, 369—377.) — Weine mit freier oder auch nur halbgebundener Schwefelsäure kommen sehr selten vor. Daß sogar stark gegipste Weine keine freie oder halbgebundene Schwefelsäure enthalten, ist von verschiedenen Autoren durch physiko-chemische Messungen gezeigt worden. Aber selbst wenn einem Weine freie Schwefelsäure absichtlich zugegeben würde oder derselbe sie aus dem Holze eines unsachgemäß eingebrannten Fasses aufnehmen würde, bleibt die Schwefelsäure im allgemeinen nicht in freiem Zustande in demselben, sondern macht zunächst aus den Salzen der organischen Säuren die letzteren frei und geht dabei selbst in Sulfatform über. Erst wenn fast die Gesamtmenge der Kationen durch Schwefelsäure abgesättigt worden ist, bleibt der Überschuß an dieser in freiem Zustande im Wein zurück. Verf. hatten Gelegenheit, einen Wein zu untersuchen, der ausnahmsweise freie Schwefelsäure enthielt. Nach Prof. Kreis handelte es sich um einen 1889-er Elsässer Weißwein, der aus der Hinterlassenschaft eines wohlhabenden Privatmannes stammte und welcher einen Gehalt an Schwefelsäure, berechnet als Kaliumsulfat, von 4,22 ‰ aufwies. Verf. haben den Wein eingehend analysiert und an der auffallend niedrigen Alkalität sowie an dem physiko-chemischen Verhalten dargetan, daß der Wein tatsächlich freie Schwefelsäure enthielt.

P. Neumann.

Th. Paul: Beziehung zwischen saurem Geschmack und Wasserstoffionen-Konzentration. (Ber. Deutsch. Chem. Ges. 1916, **49**, 2124—2137.) — Die Versuche zeigen, daß der saure Geschmack der untersuchten Weine ihrem Säuregrad, d. h. der Konzentration der darin enthaltenen Wasserstoffionen (H^+ -Ionen) parallel läuft. Es handelt sich hierbei um Weine, bei denen außer dem Säuregrad im wesentlichen nur noch die Konzentrationen der primären und sekundären Weinsäure-Ionen ($C_4H_5O_6^-$ - und $C_4H_4O_6^{2-}$ -Ionen), der nicht dissoziierten Weinsäuremolekeln ($C_4H_6O_6$ -Molekeln) und der Kaliumionen (K^+ -Ionen) veränderlich sind. *Max Müller.*

W. J. Baragiola und Ch. Godet: Die analytische Unterscheidung von vergorenen Süßweinen und Mistellen. (Zeitschr. analyt. Chem. 1916, **55**, 561—577.) — Die in der Literatur angegebenen Unterscheidungsmerkmale der Mistellen gegenüber den vergorenen Süßweinen werden nachgeprüft und in einer Tabelle ein eingehendes Analysenbild beider Weine gegeben. Die Menge der ätherlöslichen Säure ergibt im Gegensatz zu den Angaben von Blarez kein Unterscheidungsmerkmal. Blarez ist wahrscheinlich durch den meist höheren Gehalt der vergorenen Süßweine an Essigsäure irregeleitet worden. Gleichfalls sind die Mengen der Milchsäure, Bernsteinsäure, des Glycerins und Ammoniumstickstoffs, das Verhältnis von Lävulose zu Dextrose, dessen genaue Bestimmung ja auch in der Praxis mancherlei Schwierigkeiten bietet, entgegen den bisherigen Ansichten zur Unterscheidung nicht

geeignet. Demnach ist es unmöglich, vergorene Süßweine von den Mistellen analytisch zu unterscheiden; es bleibt nur die Kostprobe mit ihrer Unsicherheit und vielen Fehlerquellen.

J. Großfeld.

W. J. Baragiola: Zur Wertung des Gehaltes an flüchtiger Säure bei der Beurteilung von Wein, Süßwein und Obstwein. (Zeitschr. öffentl. Chem. 1916, **22**, 257—262.) — Gegenüber der Ansicht von A. Jonscher (Zeitschr. öffentl. Chem. 1916, **22**, 33—37) hält Verf. in Übereinstimmung mit dem Schweizerischen Lebensmittelbuch bei der Beurteilung der Weine auf Säurestich die Kostprobe für unentbehrlich. „Die Art der flüchtigen Säure, ob Essigsäure oder Buttersäure, tritt durch die Analyse, bei der nur die Gesamtmenge, berechnet als Essigsäure, bestimmt wird, nicht genügend hervor, wird aber bei der Kostprobe empfunden. Südländische Weine sind selbst bei Gehalten von 2,0—2,5 g flüchtiger Säuren im Liter im Geschmack häufig noch nicht stichig, besonders wenn sie reich an Zucker und Mineralstoffen sind. Ein Teil dieser Säure ist ja auch durch Bindung an Mineralbestandteile oder durch die Gegenwart reichlicher Zuckermengen unschädlich gemacht. Solche Weine können daher nicht als verdorben bezeichnet werden, wohl aber als minderwertig, da sie, gewöhnlich zum Verschnelden mit anderen Weinen benutzt, diese Verschnitte leicht stichig machen. Der milden Beurteilungsweise von A. Jonscher, Süßweine mit bis zu 3,0 g flüchtigen Säuren unbeanstandet zu lassen, von 3,1—4,0 für minderwertig und solche mit über 4,0 g flüchtigen Säuren als verdorben zu bezeichnen, schließt sich Verf. nicht an. Von Obstweinen enthalten besonders Birnenweine und Verschnitte dieser mit Apfelweinen flüchtige Säuren bis zu 1,5 g im l, ohne stichig zu sein. Indessen sind im Geschmack wirklich stichige Obstweine, wenn sie 1,5—2,0 g Essigsäure im l enthalten als minderwertig, über 2,0 g als verdorben zu bezeichnen. In Fässern wird der Wein häufig von oben her stichig, während die unteren Schichten noch gut sind; die Probenentnahme muß daher stets sowohl aus dem oberen wie unteren Teile des Faßinhaltes geschehen.

J. Großfeld.

G. Possetto: Die Wässerung von Wein. (Giorn. Farm. Chim. 1914, **63**, 241—250.) — Verf. hat die Halphen'sche Regel (Säure: Alkohol) mit Bezug auf den Nachweis von Weinverfälschungen durch Wasserzusatz kritisch nachgeprüft. Die Richtigkeit der Methode wird einwandfrei bestätigt.

C. Grimme.

C. Mensio und E. Garino-Canina: Chemisch-physikalische Untersuchung zweier Weine und Auslegung der dabei erhaltenen Ergebnisse. (Staz. sperim. agrar. ital. 1914, **47**, 119—157.) — Die Verff. haben zwei anerkannt unverfälschte Weine der Jahre 1912 und 1913 nach den neuesten Methoden sowohl physikalisch-chemisch wie chemisch-analytisch untersucht. Ihre dabei gemachten Beobachtungen sprechen für die gute Brauchbarkeit der empfohlenen Methoden (Ionenkonzentration, Leitfähigkeit).

C. Grimme.

H. Malosse: Die Ermittlung des Extraktes algerischer Weine aus ihrem spezifischen Gewichte. (Journ. Pharm. Chem. 1913, [7] **7**, 283—285.) — Verf. ermittelt für algerische Weine (23 Proben) das mittlere Verhältnis $\frac{e}{d-d'}$ zu 2685 bzw. 2129, wenn e die Extraktmenge im Vakuum bzw. bei 100° gefunden, d die Dichte des Weines und d' die Dichte des Destillates bedeuten. Das Analysenbild ergibt, daß die aus den obigen Zahlen berechneten von den experimentell bestimmten Werten für das Extrakt um höchstens $\pm 0,9\%$ abweichen.

J. Großfeld.

P. Dutoit und M. Duboux: Bestimmung der Sulfate im Wein durch physiko-chemische Volumetrie. (Bull. Soc. Chim. France 1913, [4], **13**,

1068—1074.) — Um einige Widersprüche aufzuklären, die sich in der Abhandlung von Bruno und Turquand d'Auzay (*Z.* 1916, **32**, 534) gegenüber den Erfahrungen der Verff. mit dem von ihnen angegebenen Verfahren (*Z.* 1916, **32**, 144) finden, wurden nochmals einige Bestimmungen von Sulfaten ausgeführt, aus denen geschlossen wird: 1. Die volumetrische Bestimmung der Sulfate im Wein mit $\frac{1}{4}$ N.-Barytlauge, die kein Alkalihydroxyd enthalten darf, unter Benutzung der Leitfähigkeit als Indikator ist genauer als die gewichtsanalytische, wenn die Analyse mit der gleichen Menge Wein (50 ccm) ausgeführt wird. Die Gegenwart von Kalk-, Magnesium- und anderen Salzen, von Weinsäure, Äpfelsäure usw. in Mengen, in denen sie im Wein vorkommen, machen die Bestimmung nicht fehlerhaft. 2. Die Bestimmung kann mit einer Genauigkeit von 1—5 mg Kaliumsulfat im Liter ausgeführt werden, wenn man an Stelle des Bariumhydroxyds das Bariumsalz einer starken Säure (Bariumchlorid, -bromid, -nitrat usw.) anwendet und die Genauigkeit der Leitfähigkeitsmessungen steigert.

G. Sonntag.

J. Pritzker: Ein rasches Verfahren zur Bestimmung des Sulfatgehaltes im Wein. (*Chem.-Ztg.* 1916, **40**, 499—501.) — Zur annähernden Bestimmung des Sulfatgehaltes von Weinen werden in einem eigens für diesen Zweck hergestellten Röhrchen, dessen unterer Teil ausgezogen und mit Einteilung versehen ist (zu beziehen durch F. Huguershoff in Leipzig), 4 ccm Wein abgemessen, aufs Doppelte mit heißem Wasser verdünnt und alsdann mit 1 ccm einer 10⁰/o-igen salzsäurehaltigen Bariumchloridlösung versetzt, mit einem Gummistopfen verschlossen und in einer Zentrifuge mit 1400 Umdrehungen in der Minute drei Minuten lang ausgeschleudert, worauf man den Gehalt an Kaliumsulfat direkt aus dem Volumen des abgeschleuderten Bariumsulfates als Gramm im Liter abliest. Bei Verwendung von 8 ccm Wein ist der abgelesene Sulfatgehalt zu halbieren. Bei sulfatreichen Weinen verwendet man nur 2 ccm und multipliziert das Ergebnis mit 2. — Zur genaueren Bestimmung des Sulfatgehaltes werden in einem passenden Röhrchen, z. B. in einem Albuminometer nach Schmid (*Mitteil. d. Schweizer. Gesundh.* 1912, **3**, 193 u. 1914, **5**, 309) 10 ccm Wein abgemessen und, falls die annähernde Bestimmung etwa 1,0 g ergeben hat mit 0,8 ccm einer Bariumchloridlösung versetzt, die im Liter 14 g kryst. Bariumchlorid und 50 ccm konc. Salzsäure enthält, und etwa eine Minute zentrifugiert. Zu der über dem Niederschlag stehenden klaren Flüssigkeit wird sodann nur 0,1 ccm Bariumchloridlösung gefügt und nochmals zentrifugiert. Bleibt nun bei weiterem Zusatz eines Tropfens Chlorbariumlösung die Flüssigkeit klar, so liegt der richtige Wert zwischen 0,8—0,9, ist also durch den Mittelwert dieser Zahlen: 0,85 g K_2SO_4 gegeben. Trübt sich die Lösung noch, so wird noch 0,1 ccm Bariumchloridlösung zugesetzt und nochmals zentrifugiert, bis die Flüssigkeit klar bleibt. Daß Verfahren wird von Verf. als Zentrifugiertitration bezeichnet. Die erhaltenen Werte stimmen auch mit den durch Leitfähigkeitstitration gefundenen gut überein, letztere beansprucht aber nicht, wie angegeben, 10 Minuten, sondern ein Mehrfaches dieser Zeit zur Untersuchung.

J. Großfeld.

W. J. Baragiola und Ch. Godet: „1753-er Sparrenberger“. Untersuchung eines alten Flaschenweines. (*Schweizer. Wein-Ztg.* 1916, **24**, 303 bis 307.) — Dieser Wein, für dessen Echtheit alle Gewähr geboten ist, soll im Jahre 1819, also nach 66-jähriger Faßlagerung auf Flaschen abgezogen sein. Der Stopfen der altmodischen Flasche, die auf der in den wichtigsten Teilen gut erhaltenen Etikette den Jahrgang 1753 noch deutlich anzeigte, zerbröckelte sehr stark; doch enthielt die 840 ccm fassende Flasche noch 725 ccm Wein, der, selbst leicht getrübt, einen dicken Bodensatz, bestehend aus einem Gemenge von vielen hautartigen Ausscheidungen von Farbstoff, neben eingeschrumpften Hefezellen, Bakterien und sehr kleinen, aber schön

ausgebildeten Weinsteinkrystallen enthielt. Vermutlich hat der Wein, ursprünglich ein Rotwein, bei der Lagerung seinen Farbstoff völlig verloren. Der Geruch zeigte ein kräftiges, alterfines Bukett, der Geschmack war etwas abfallend, nicht harmonisch, leicht kratzig und leer, aber immerhin durchaus gesund. Die weitere Untersuchung ergab: Spezifisches Gewicht 0,9950, Alkohol 78 g in 1 l (= 9,8 Vol.-%), Extrakt 19,8, reduzierende Bestandteile (als Invertzucker) 0,5, zuckerfreies Extrakt 19,3, Gesamtsäure 5,9 (= 79 ccm n), flüchtige Säure 0,7 (= 12 ccm n), nichtflüchtige Säure 5,0 (= 67 ccm n), Extraktrest 14,3, Asche 1,51 g im l, Alkalitätszahl 6,4, Sulfatrest im Weine bestimmt 0,20 (= 4,1 ccm n), entsprechend Kaliumsulfat 0,36, schweflige Säure, gesamte 0,010, Gesamt-Stickstoff 0,185, Ammonium-Stickstoff 0,011, Eiweiß-Stickstoff aus der Differenz 0,174, Glycerin 12,8 g im l, Gewichtsverhältnis Alkohol: Glycerin 100:16,4; aus der Aschenanalyse: Phosphatrest g im l 0,436 = 28,9% der Asche, Sulfatrest 0,234 = 15,5%, Chloridrest 0,005 = 0,3%, Kalium 0,501 = 33,2%, Natrium 0,036 = 2,4%, Wasserstoffionenkonzentration bei 76,0°: 0,57 Millimole im l; Aschenalkalität nach Farnsteiner 6,7, Ammonium 0,8, nichttitrierbare organische Säure 17,5, titrierbare organische Säure 74, gesamte organische Säuren 92, Weinsäure 35 (= 2,6 g im l), Milchsäure 29 (2,6), Essigsäure 12 (0,7), Gerbsäure 2 (0,7), aldehydschweflige Säure 0, Äpfel- und Bernsteinsäure aus der Differenz 14 (0,9) ccm n; Bindungszustand der organischen Säuren (ccm n im l) nach A. Quartaroli (nach P. Dutoit und M. Duboux): Weinsäure 38 (31), Milchsäure 81 (79), Bernsteinsäure 90 (89), Essigsäure 97 (97), Gerbsäure 100 (100)% an freier Säure. — Auffällig ist der sehr geringe Gehalt an flüchtiger Säure und der Gehalt an Sulfatrest, wohl infolge der sehr sorgfältigen Kellerbehandlung. Das Jahr 1753 lieferte, wie berichtet wird, den besten Wein des Jahrhunderts. *J. Großfeld.*

W. J. Baragiola und Ch. Godet: „1781-er Schloß Eigenthal.“ Untersuchung eines alten Flaschenweines. (Schweizer. Wein-Ztg. 1914, 22, 24 bis 26 u. 34—36.) — Der von Schloß Eigenthal, Bezirk Andelfingen, stammende, ursprünglich wohl rote Wein besaß eine braungelbe, an der Luft nachdunkelnde Farbe, ein fines Bukett und einen für sein Alter noch recht guten Geschmack. Der Trub bestand mikroskopisch aus hautförmigen Fetzen von Ausscheidungen mit ziemlich vielen hefeartigen Zellen und einigen inkrustierten Bakterien in Stäbchenform. Die weitere Analyse ergab: Spez. Gew. 0,9997, Alkohol 7,3 Vol.-%, Extrakt 23,8, reduz. Bestandteile (Invertzucker) 0,7, zuckerfreies Extrakt 23,1, Gesamtsäure 7,9 (106 ccm n), flüchtige Säure 1,1 (18 ccm n), nichtflüchtige Säure 6,6 (= 88 ccm n), Extraktrest 16,5, Asche 2,27 g im l, Aschenalkalitätszahl 2,8, Sulfate im Wein als Kaliumsulfat 1,2 g im l (= 14 ccm n), schweflige Säure, gesamte 9, freie 6, gebundene 3 mg im l; nichttitrierbare organische Säuren 15,0, titrierbare 101, Weinsäure 32, Milchsäure 37, Essigsäure 18, Gerbsäure 2, aldehydschweflige Säure 0, Äpfel- und Bernsteinsäure (aus der Differenz) 27, gesamte organische Säuren 116 ccm n; Gesamt-Stickstoff 0,21, Ammonium-Stickstoff 0,024 (= 1,7 ccm n), Eiweiß-Stickstoff 0,19, Eiweiß 1,2 g im l; Aschenalkalität Farnsteiner 2,6, Sulfatrest in der Asche 16,4, Phosphatrest 16,0, Chlor 1,1 ccm n. Bemerkenswert ist der scheinbar niedere Alkoholgehalt, trotz dessen der Wein sich gut erhalten hat; in Wirklichkeit ist derselbe aber mit Rücksicht auf die lange Lagerung des Weines sehr hoch. Der Gehalt an flüchtiger Säure ist hoch, ohne daß jedoch der Wein stichig war. Die geringe Aschenalkalität ist auf Sulfate, entstanden aus Schwefelungen zurückzuführen. Der Chlorgehalt ist ziemlich hoch. Der Wein ist anscheinend in einem guten Jahrgange gewachsen, trotz der Widersprüche in den meteorologischen Aufzeichnungen über das Jahr 1781; indessen ist es in Ermangelung jeglichen Vergleichsmateriales sehr schwer, die Qualität so alter Weine jetzt noch richtig zu beurteilen. *J. Großfeld.*

W. J. Baragiola und Ch. Godet: 1865-er Markgräfler. Untersuchung eines alten Flaschenweines. (Schweizer. Wein-Ztg. 1916, **24**, 273—275). — Dieser Wein, der in zwei halben Flaschen vorlag, bietet besonderes Interesse, weil er seinerzeit im Fasse fast vollständig gefroren gewesen sein soll. Die Untersuchung der beiden schon angebrochenen Flaschen ergab: Spez. Gewicht 1,0220 (0,9954), Alkohol 11,3 (10,3) Vol.-% Extrakt 95,4 (22,0) g in 1 l, reduzierende Bestandteile (als Invertzucker) 63,2 (0,9), zuckerfreies Extrakt 32,2 (21,1), Gesamtsäure 12,2 = 163 ccm n (8,3 = 100 ccm n), flüchtige Säure 1,3 = 22 ccm n (1,3 = 22 ccm n), nicht flüchtige Säure 10,6 = 141 ccm n (6,7 = 89 ccm n), Extraktrest 21,6 (14,4), Asche 2,67 (1,86) g im l, Aschenalkalitätszahl 9,2 (5,4), Sulfatrest im Wein bestimmt 0,04 = 0,8 ccm n (0,20 = 4,2 ccm n), Phosphatrest 0,45 g im l = 14,2 ccm n (0,49 = 15,4 ccm n), Aschenalkalität nach Farnsteiner 21,4 (6,5), Ammonium 0,4 (2,0), nichttitrierbare organische Säuren 31,3 (18,8), titrierbare organische Säuren 158 (105), gesamte organische Säuren 189 (124) ccm n, Weinsäure 0,0 (1,3), Milchsäure 4,1 (4,6), Essigsäure 1,3 (1,3), Bernsteinsäure berechnete 1,1 (0,9), Äpfelsäure aus der Differenz 6,9 (1,2) g im l. Der Bindungszustand war in % an freier Säure für Weinsäure 0 (40), Äpfelsäure 60 (61), Milchsäure 81 (83), Bernsteinsäure 90 (91), Essigsäure 97 (97), gesamte Säuren 72 (77). Die große Verschiedenheit der beiden Weine, die aus demselben Faß stammen sollen, ist wahrscheinlich auf die durch das Auftauen bedingte Schichtenbildung zurückzuführen. Auch nur so läßt sich der abnorm hohe Alkohol- und Zuckergehalt, die völlige Abscheidung der Weinsäure im ersten Wein sowie der schwächere Säureabbau, gekennzeichnet durch den wesentlich erhöhten Gehalt an Äpfelsäure, im Gegensatz zu dem Wein der zweiten Flasche erklären. Unter dem Mikroskope zeigten beide Weine, besonders der zweite, schöne lange Krystallnadeln von Calciumtartrat, daneben stark zusammengeschrumpfte Hefezellen und hautartige Fetzen. Durch die Kostprobe wurde im Geruch beider Weine eine recht schöne Altersfirne bemerkt. Der erste Wein schmeckte ganz fremdartig, an Süßwein erinnernd, der andere war ein mattes, plattes Getränk.

J. Großfeld.

W. J. Baragiola und Ch. Godet: „1834-er Meiler“. Untersuchung eines alten Flaschenweines. (Schweizer. Wein-Ztg. 1916, **24**, 323—326). — Der Wein, stammend aus Meilen am rechten Zürichseeufer befand sich in 2 Rheinweinflaschen, deren beiden Korke schon sehr brüchig waren. Der Geruch war nicht besonders kräftig, der Geschmack noch verhältnismäßig recht voll, von frischer angenehmer Säure und bestens erhalten. Bei der chemisch-physikalischen Untersuchung der vereinigten Flaschen wurden folgende Werte gefunden: Spez. Gewicht 0,9969, Alkohol 66,6 g im l (= 8,4 Vol.-%), Extrakt 20,1, reduzierende Bestandteile als Invertzucker 0,6, zuckerfreies Extrakt 19,5, Gesamtsäure 6,6 (= 88 ccm n), flüchtige Säure 1,1 (= 18 ccm n), nicht flüchtige Säure 5,2 (= 70 ccm n), Extraktrest 14,3, Asche 2,21, Alkalitätszahl 3,1, Sulfatrest im Weine bestimmt 0,675 g im l (= 14,1 ccm n), entsprechend Kaliumsulfat 1,22, schweflige Säure, gesamte 0,082; Gesamt-Stickstoff 0,226, Ammonium-Stickstoff 0,022, Eiweiß-Stickstoff aus der Differenz, 204 Glycerin 9,2 g im l, Gewichtsverhältnis Alkohol: Glycerin 100 : 13,8; aus der Aschenanalyse Phosphatrest 0,403 g im l (= 12,7 ccm n = 18,2% der Asche), Sulfatrest 0,795 (16,6; 36,0%) Chloridrest 0,023 (0,6 = 1,0%), Wasserstoffionenkonzentration 0,84 Millimole im l. Aschenalkalität nach Farnsteiner 5,0, nichttitrierbare organische Säuren 17,5, titrierbare organische Säuren 84, gesamte organische Säuren 101, Weinsäure 33 ccm n (= 2,5 g im l), Milchsäure 31 (2,8), Essigsäure 18 (1,1), Gerbsäure 1 (0,4), aldehydschweflige Säure 1 (0,2) Äpfel- und Bernsteinsäure, aus der Differenz, 17 (1,0); Bindungszustand nach A. Quartaroli (P. Dutoit und M. Duboux) in % an freier Säure: Weinsäure 41 (41), Milchsäure 83 (84), Bernsteinsäure 91 (92), Essigsäure 97 (98), Gerbsäure 100 (100), gesamte organische Säuren 72 (73). Wie

bei allen alten Weinen ist ein Teil des Alkohols bei der Lagerung verdunstet, worauf der recht hohe relative Glycerinwert hindeutet. Der für einen alten Wein hohe Gehalt an Sulfid deutet auf wiederholtes und kräftiges Einbrennen hin, dem auch der Wein wohl hauptsächlich seine heutige Frische zu verdanken hat. Das Jahr 1834 war sehr warm und lieferte nach den Chronisten reichliche und vollkommene Ernte. So gute Jahrgänge werden mit Vorliebe als Andenken viele Jahre, wie hier, aufbewahrt.

J. Großfeld.

W. J. Baragiola und Ch. Godet: 1834-er Neuenburger. Untersuchung eines alten Flaschenweines. (Schweizer. Wein-Ztg. 1916, **24**, 373—376.) — Aus demselben Jahre (vergl. vorstehendes Referat) wurde ein Weißwein, Wachstum der Stadt Neuenburg untersucht. Wegen des sehr mangelhaften Korkes enthielt die Flasche nur noch 365 ccm Wein, der aber merkwürdigerweise trotzdem sehr gut erhalten war. Er zeigte eine zarte, feine Blume, war im Geschmack etwas brandig, neigte aber in keiner Weise zum Stich oder zu sonstigen Krankheiten und Fehlern. Aus der sehr geringen Substanzmenge konnte trotzdem folgendes ermittelt werden: Spez. Gew. 0,9928, Alkohol 88 g im l (= 11,1 Vol.-%), Extrakt 18,0, reduzierende Bestandteile (als Invertzucker) 1,3, zuckerfreies Extrakt 16,7, Gesamtsäure 5,6 (= 75 ccm n), flüchtige Säure 0,7 (12), nichtflüchtige Säure 4,7 (63), Extraktrest 12,0, Asche 1,51, Alkalitätszahl 3,2, Sulfatrest, im Weine bestimmt g im l 0,22 (= 4,6 ccm n), entsprechend Kaliumsulfat 0,40, schweflige Säure 0,008, Gesamt-Stickstoff 0,171, Ammonium-Stickstoff 0,011, Eiweiß-Stickstoff aus der Differenz 0,160, Glycerin 9,3, Gewichtsverhältnis Alkohol: Glycerin 100:10,6, Phosphatrest 0,423 (= 13,4 ccm n = 28% der Asche); Aschenalkalität nach Farnsteiner 2,8, ccm n, nichttitrierbare organische Säuren 12,5, titrierbare organische Säuren 70, gesamte organische Säuren 83, Weinsäure 32 (= 2,4 g im l), Milchsäure 26 (2,3), Essigsäure 12 (0,7), Gerbsäure 1 (0,2), Äpfel- und Bernsteinsäure, aus der Differenz, 12 (0,7); Bindungszustand der organischen Säuren nach Quartaroli in % an freier Säure: Weinsäure 48, Milchsäure 87, Bernsteinsäure 93, Essigsäure 98, Gerbsäure 100, gesamte organische Säuren 74. Bemerkenswert ist, daß alle diese Bestimmungen mit nur 365 ccm ausgeführt werden konnten.

J. Großfeld.

W. J. Baragiola und Ch. Godet: 1915-er Bieler Weißwein. (Schweizer. Wein-Ztg. 1916, **24**, 183—186.) — Das Erzeugnis des letzten Rebberges der Stadt Biel, der wegen anderweitiger Inanspruchnahme bald der Vergangenheit angehören wird, wurde aus diesem Grunde noch einer eingehenden Analyse unterworfen, mit folgendem Ergebnis: Spez. Gew. 0,9989, Alkohol 63,4 g im l (= 8,0 Vol.-%), Extrakt 23,6, reduzierende Bestandteile (als Invertzucker) 0,3, zuckerfreies Extrakt 23,3, Gesamtsäure 11,7 (= 156 ccm n), flüchtige Säure 0,6 (= 10 ccm n), nichtflüchtige Säure 10,9 (= 146 ccm n), Extraktrest 12,4, Asche 2,14 (Alkalitätszahl 7,4), Sulfatrest, im Weine bestimmt, 0,26 (= 5,4 ccm n), entsprechend Kaliumsulfat 0,47, schweflige Säure, gesamte 0,038, freie 0,002, gebundene 0,036, Gesamt-Stickstoff 0,420, Ammonium-Stickstoff 0,013 (= 0,9 ccm n), Eiweiß-Stickstoff aus der Differenz, 0,407, Glycerin, nach dem Jodidverfahren 5,9, (Gewichtsverhältnis Alkohol: Glycerin 100:9,3), aus der Aschenanalyse: Sulfatrest 0,397 (= 8,3 ccm n = 18,5% der Asche), Phosphatrest 0,592 (16,7 ccm; 24,7%), Chloridrest 0,005 (0,1 ccm; 0,2%), Wasserstoffionenkonzentration bei 76,0° 1,02 Millimole im l, Aschenalkalität nach Farnsteiner 15,0 ccm n, nichttitrierbare organische Säuren 29,9, titrierbare organische Säuren 150, gesamte organische Säuren 180, Weinsäure 57 (= 4,3 g im l), Milchsäure 16 (1,4), Essigsäure 10 (0,6), Gerbsäure 1 (0,3), aldehydschweflige Säure 0,5 (0,07), Bernsteinsäure berechnet 12 (0,7), Äpfelsäure, aus der Differenz 83 (5,6); Bindungszustand der organischen Säuren nach A. Quartaroli (P. Dutoit und M. Duboux) in % an

freier Säure: Weinsäure 48 (47), Äpfelsäure 70 (69), Milchsäure 87 (87), Bernsteinsäure 93 (93), Essigsäure 98 (98), Gerbsäure 100 (100), aldehydschweflige Säure 68 (67), gesamte organische Säuren 68 (67). Bei der Kostprobe hatte der Wein einen leichten Anflug von Gärungsböckser und war noch nicht genügend ausgebaut. Bemerkenswert ist der hohe Gehalt an Phosphatrest, sowie an Weinsäure. Die Herabsetzung des hohen Säuregehaltes wäre hier durch eine mäßige Kalkentsäuerung geboten, durch die dann auch der biologische weitere Abbau der Äpfelsäure begünstigt würde.

J. Großfeld.

K. Aschoff und H. Haase: Die 1915-er Moste aus dem Nahegebiet und seiner Umgebung. (Zeitschr. öffentl. Chem. 1916, **22**, 49—56.)

G. Gschwender: Die Bedeutung des Weinbaues Italiens. (Zeitschr. öffentl. Chem. 1916, **22**, 101—104.)

G. Gschwender: Griechenlands wirtschaftliche Verhältnisse, insbesondere sein Weinbau. (Zeitschr. öffentl. Chem. 1916, **22**, 104—106.)

Bier.

L. Heintz: Über eine vereinfachte Methode zur Extraktbestimmung in der Gerste. (Wochenschr. Brauerei 1916, **33**, 305.) — Das Kochen übt bei der „kurzen“ Methode keinen Einfluß auf das Ergebnis aus, wenn die Maische dafür eine Stunde statt eine halbe Stunde verzuckert wird. Nach dieser Vereinfachung gestaltet sich die kurze Methode folgendermaßen: 1. Herstellung des Malzauszuges. Helles, nicht zu grobes Malzschrot wird mit destilliertem Wasser von 45—47° im Verhältnis von 1:5 eingemaischt, 10 Minuten unter Umschütteln stehen gelassen, blank filtriert und abgekühlt. 2. Gerstenanalyse. 25 g feinstes Gerstenmehl werden mit 100 ccm Malzauszug (2×50) eingemaischt und eine Stunde im Maischbade bei 50—52° gehalten; dann wird die Temperatur schnell auf 70—72° gebracht; nach einer halben Stunde gibt man 50 ccm Wasser von 70° zu, läßt den Becher noch eine halbe Stunde bei 70° stehen, kühlt ab, wägt auf 225 g auf und verfährt weiter nach bekannter Weise.

H. Will.

L. Heintz: Praktische Ergebnisse mit der „kurzen“ Methode zur Extraktbestimmung. (Wochenschr. Brauerei 1916, **32**, 268—271.) — Verf. hat zunächst in einer Tabelle die praktischen Ergebnisse von etwa 4 Monaten Mälzereikampagne mit der von ihm angegebenen „kurzen“ Methode zur Extraktbestimmung niedergelegt. Außerdem teilt er noch einige kleine Handgriffe mit, welche die Ausführung der Analyse noch etwas beschleunigen. Der warm hergestellte Malzauszug ist dem kalt hergestellten praktisch vollständig gleich. Die kurze Methode macht keinen Anspruch darauf, eine höchstmögliche Extraktausbeute zu liefern; sie sollte nur gleich den annähernden Extraktgehalt angeben.

H. Will.

L. Adler: Vergleichende Studien über Tennen-, Trommel- und Kropffkastenmalz. (Zeitschr. ges. Brauw. 1916, **39**, 201—204, 210—212, 217—219 u. 225—226.) — Das Kropffkastenmalz hat sich sowohl während der Keimung als auch bei der Maische als äußerst enzymkräftig erwiesen. Die Stickstoffsubstanzen sind im fertigen Malz vorzüglich abgebaut. Die kräftige Betätigung der Enzyme bewirkt, daß der Kolloidgehalt der Würze abnimmt. Das Malz enthält eine große Menge vorgebildeter Säure. Die Farbe der Kropffmalzwürzen ist trotz gleicher Behandlung auf der Darre dunkler als bei den beiden anderen Malzen. Die gute Wirksamkeit aller Enzymkräfte spricht für eine tadellose Lösung, wodurch auch eine höhere Extraktausbeute gewährleistet wird. Das Trommelmalz erwies sich in den meisten Punkten als das ausgesprochene Gegenteil des Kropffkastenmalzes. Es ent-