ausser der Blatternimpfung noch die Schafpocken- und die Rinderpest-Impfung, welche um jene Zeit eifrig betrieben wurden. Die Kuhpocken-Impfung war Jenner selbst bereits 1768 bekannt und wurde von ihm während der ganzen folgenden Zeit eifrig studirt, bis er 1796 das berühmte entscheidende Experiment an dem Knaben James Phipps vornahm. Seine erste Veröffentlichung über diesen Gegenstand erfolgte 1798.

Auf diese hier kurz skizzirte Darstellung lässt Verfasser eine sehr ausführliche Zusammenstellung der Literatur über Schutzpockenimpfung im vorigen Jahrhundert folgen.

L. Pfeiffer (Weimar). Ueber die Nothwendigkeit einer thierärztlichen Untersuchung der Impfkälber. Korr.-Bl. d. Allg. ärztl. Ver. v. Thüringen 1886 No. 10.

Im vorliegenden Aufsätze giebt Verfasser eine zusammenfassende Darstellung derjenigen Krankheiten, welche vom Rinde durch Impfung auf den Menschen übertragen werden können, und erörtert die Frage, welche Vorsichtsmassregeln daher für die Benutzung von Kälbern zur Herstellung grösserer Mengen animalen Impfstoffes geboten sind. Die Gefahr der Ansteckung durch Vaccination ist gegeben durch Milzbrand, Diphtherie, Erysipel, Lungenseuche der Kälber, möglicherweise auch Actinomycose, vor allem aber durch Sepsis und Tuberculose. Der Sepsis verdächtig sind die jungen noch nicht drei Wochen alten Kälber mit eitriger Nabelvenenentzündung und Erhöhung der Temperatur im After über 40°. Die obschon sehr seltene Tuberculose der Kälber kommt wohl nur als allgemeine Milchartuberculose vor; das diesen Thieren etwa entnommene Impfmateriel würde daher ganz besonders zu einer Ansteckung Anlass geben können.

Als practische Consequenz ergibt sich hieraus, dass diejenigen Kälber, die nicht alsbald geschlachtet werden, noch 14—20 Tage nach der Impfung thierärztlich beaufsichtigt werden müssten, ehe die ihnen entnommene Lymphe verwendet werden dürfte, bei solchen Kälbern jedoch, die zur Schlachtbank kommen, erst das Sectionsergebniss über die Brauchbarkeit der Lymphe entscheiden sollte.

S. Weinbaum.

Centralblatt für allgemeine Gesundheitspflege. 5. Jahrg. Heft 6, 7, 8, 9. Ref. Lotze-Osterode a/H.

Steffan-Frankfurt a/M. weist nach, dass die „Schulkurzsichtigkeit“ trotz der gut beleuchteten und mit guten Subsellien versehenen modernen „Schulpaläste“ zugenommen hat; daher es „mit dem hygienisch besten Schulgebäude allein“ nicht gethan sei, sondern erst auch die hygienischen Schädlichkeiten des elterlichen Hauses, sowie fehlerhaftes Unterrichtsmateriel zu beseitigen seien, bevor man Abnahme der Schulmyopie erwarten dürfe.

Aird, C., Berlin. Zur Frage der Rieselanlagen. Enthält: Vorschriften für Anlage intermittirender Filtration nach Bailey-Denton mit dem bewährten Nothbehelf von Weidenanpflanzungen zur Aufnahme abnorm grosser Niederschläge; Empfehlung der Verbindung der intermittirtten Filtration mit einem Rieselgute, erläutert an der bewährten Anlage in Merthyr-Tydfäll; Bailey-Denton's Vorschlag, an wasserarmen Orten die Drainwässer der Rieselgüter nochmals aufzufangen und zu Industriezwecken zu verwenden; Abwehr der Angriffe Mittermaiers, der für das Tonnensystem plaidirt, durch Rectificirung seiner Darstellung der Verhältnisse in Birmingham, wo man seit 1867 theilweise berieselt, daneben erst Dung aus Excrementen, Küchenabfällen und Asche gemischt an Landwirthe verkaufte, später wegen Unrentabilität des Verfahrens mit Kalk praecipitirte und den werthlosen Schlamm vergrub, dann die festen Stoffe aus den Aschentonnen zu Klinker als Baumaterial brannte und daneben aus den excrementirten Stoffen schlechtbezahlte Poudrette fabricirte, während das Rieselgut blühte; Darstellung der Verhältnisse in Leicester, wo Flussverunreinigung zur Anlage von Klärbassins mit Kalkmilch zwang, der Dung Leicester bricks schlecht bezahlt wurde, der A.-B.-C.-Process zur Abwässerklärung, sowie nachträgliche Filtration sich schlecht bewährten und jetzt Rieselung aller Abwässer projectirt ist; schliesslich eine eingehende Darstellung und warme Empfehlung des „Ensilage system“ auch für Deutschland, welches namentlich die zur Heubereitung untauglichen Gewässer der Rieselanlagen „für den Winter und ohne grosse Kosten für das Frühjahr“ in den sogen. „Silo's“ conservirt, wobei man in England die „süsse, saure und alkoholische Ensilage“ oder „Einlage“ unterscheidet und worüber in England (Ensilage commission) unter Begünstigung der Regierung und in Nordamerika werthvolle und vielversprechende Versuche gemacht worden sind; über die Construction der „Silo's“, „von 4 innen mit Cement verputzten Mauern umschlossener Räume“, zur Einlage der Pflanzenmassen, die „luftdicht, wasserdicht und wärmedicht“ sein müssen, und über den Chemismus der Ensilage vergleiche man die Arbeit selbst.

Wolffberg. Zur Registrirung der neuen Pockenfälle. Verfasser verlangt genaue „Buchführung über jeden einzelnen Pockenfall mit Rücksicht auf Zahl der etwa nachweislichen Impfnarben, Zeitpunkt der vorhergegangenen Impfung (und Wiederimpfung) und Art des benutzten Impfstoffes.“ Die Mortalitätsstatistik der Pocken soll die Altersklasse der Kinder unter 1 Jahr besonders berücksichtigen; ferner die Lebensjahre vom 10.—20. Jahre in 2 Gruppen, vom 10.—15. und vom 15.—20. Jahre theilen, da „die Zeit der Pubertätsentwicklung eine entscheidende Wendung in den Dispositionsverhältnissen bedingt“, „die Empfänglichkeit“ nimmt „mit der Epoche der geschlechtlichen Entwicklung in hohem Masse zu“, hier ist „Methode der Sammelforschung“ geboten: einstweilen nimmt die Redaction des Centralblattes einzelne Beobachtungen auf. Aus übereinstimmenden Beobachtungen scheint hervorzugehen, dass die Anzahl der Impfpocken wesentlich für die Schutzkraft der Impfung ist, da die Mortalität im umgekehrten Verhältniss zu der Anzahl der Impfnarben sinkt. Es „wurden Individuen mit mehr als einer gewissen Anzahl, etwa 6—9 Narben“, „unter den tödtlichen Pockenfällen nur selten registrirt.“ Doch sind genauere Untersuchungen erforderlich, auch um die „strittige Frage zu klären, wie viele Schutzpocken sollen bei der Jugendimpfung in minimo gefordert werden, um den Erfolg als den Zwecken des Gesetzes genügend zu bezeichnen?“ Zudem ist der Beweis, ob der Schutz der animalen und der humanisirten Lymphe gleichwerthig „wissenschaftlich noch nicht erbracht.“

XIII. Oeffentliches Sanitätswesen.

L. Pfeiffer (Weimar). Die Schutzimpfungen des vorigen Jahrhunderts. Ein Beitrag zur Literaturgeschichte der Blattern- und Kuhpocken-Impfung. Korr.-Bl. d. Allg. ärztl. Vereins v. Thüringen. 1886 No. 11.

Verfasser giebt im ersten Theile seines werthvollen Beitrages einen historischen Ueberblick über die Entwicklung der Vaccinationsmethode im Laufe des vorigen Jahrhunderts. Im zweiten Jahrzehnt desselben drang die Kenntniss der Blatterninoculation von Konstantinopel nach England. Die ersten Impfungen mit Blatterninhalt wurden 1719 in Paris und 1721 in London (letztere an dem zweiten Kinde der bekannten Lady Montague) ausgeführt. Zwischen 1728 und 1743 wurden dann in England fast gar keine Impfungen vorgenommen. Es folgte hierauf eine Periode lebhafter Controversen, in welchen die Vertheidiger der Blatternimpfung sich darauf berufen konnten, dass es ihnen durch Vorsicht gelang, die Gefahr für die Impffinge auf einen sehr geringen Procentsatz hinabzudrücken, während die Gegner betonten, dass die Impfung immerhin mit Lebensgefahr verbunden sei, und dass die Nichtgeimpften von den Geimpften leicht angesteckt werden könnten. Auf Grund dieser Erwägungen wurde denn auch an vielen Orten die Blatternimpfung verboten und unter Strafe gestellt. Weitere Vorläufer der Vaccination waren

Hensgen, hygienische Reflexionen über eine Scharlachepidemie, fordert nach seinen Erfahrungen mit Recht zu Nutzen sowohl der Arbeiter, als auch der Krankenkassen, für Fabriken häufige Controlen auf ansteckende Krankheiten, Anlage von Barackenbauten, Badestuben und Desinfections-Anstalten in grossen Fabriken zum Zweck der Isolirung erkrankter und der Desinfection genesener Arbeiter und ihrer Effecten.

Wolffberg, über die experimentelle Prüfung der prophylactischen Wuthimpfung, bespricht die Versuche Pasteur's, „nach der natürlichen Infection durch das unabgeschwächte Wuthgift, d. i. nachdem der Mensch vom wuthkranken Hunde gebissen war, durch von ihm sogen. „präventive“ Impfungen mit abgeschwächtem Wuthgifte dem Ausbruche der tödtlichen Wuthkrankheit zuvorzukommen.“ Hierin liegt ein „wissenschaftlich Neues.“ Es werden die Versuche v. Frisch's (diese Wochenschrift 1886 No. 31 p. 542) besprochen. Das „bisher bekannt gewordene Material spreche einstweilen eher für, als wider Pasteur.“ Doch bleibe beste Wuthprophylaxis „radicale Verminderung der Hunde und Maulkorbzwang.“

Goppelsröder, über practische Milchuntersuchung, giebt eine „kurze Anleitung zur practischen Prüfung der Milch“, deren Zuverlässigkeit und leichte Ausführbarkeit der Aufsatz erweist. Nachweisung über Krankenaufnahme und Bestand in den Krankenhäusern von 53–55 und Sterblichkeitsstatistik von 54–55 Städten Westphalens, Rheinlands und Hessen-Nassau's im III., IV., V., VI. Monat 1886 ist für Medicinalstatistik von Interesse. Folgen reichhaltige kleinere Mittheilungen und Literaturberichte.

— In der Sitzung der deutschen Gesellschaft für öffentliche Gesundheitspflege vom 29. November, sprach Professor E. Salkowski im Anschluss an den Vortrag von Professor Frank, in der vorangehenden Sitzung, welcher die **Nitrification im Boden** behandelt hatte, über den gleichen Vorgang im Wasser. In Widerspruch mit den Ausführungen desselben, sprach sich der Vortragende mit Bestimmtheit dafür aus, dass die Uebertragung des Sauerstoffs, durch welchen Ammoniak und Nitrite im Wasser zu Nitraten, organische Substanz zu Kohlensäure und Wasser oxydirt wird, ausschliesslich durch Bakterien erfolgt, in Uebereinstimmung mit den Anschauungen vieler neueren Forscher und dass der Vorgang der Selbstreinigung mit der Ertödtung dieser nitrificirenden Organismen vollkommen erlischt. Der Vortragende konnte die Abtödtung der nitrificirenden Organismen ausser durch die bekannten Mittel, auch durch Zusatz von ein wenig Chloroform und starkes Durchschütteln erreichen: ein solches Wasser kann beliebig lange Zeit aufbewahrt werden, ohne sich im Geringsten zu ändern, während sonst auch beim Aufbewahren von verunreinigtem Wasser in Flaschen allmähig eine Oxydation von Ammoniak etc. eintritt. Das Chloroform, das sich spurenweise in Wasser löst, stört die quantitative Analyse desselben nicht. Beiläufig berührte der Vortragende die stark conservirende und desinficirende Wirkung des Chloroformwassers, die sich auch auf pathogene Bakterien erstreckt, sich die weitere Verfolgung dieses Gegenstandes vorbehaltend.

Auf die Reinigung der Schmutzwässer durch die Rieselfelder übergehend, zeigt der Vortragende durch Vergleichung der für das Drainwasser in Osdorf im Jahre 1881/1882 und 1885/1886 erhaltenen Zahlen, dass die Befürchtung einer allmähigen Erschöpfung des Bodens unbegründet ist, vielmehr zu erwarten steht, dass die reinigende Wirkung des cultivirten Bodens zeitlich ganz unbegrenzt sein werde. Für die Rieselfelder im Norden der Stadt liegt noch kein genügendes Beobachtungsmaterial vor, doch zeigt der Vortragende durch die Analyse von Wasserproben, die genau an denselben Stellen entnommen waren, welche vor 3 Jahren eine Ministerialcommission gewählt hatte, dass die Verhältnisse im Norden seit jener Zeit eine bedeutende Besserung erfahren haben und führt einzelne Beispiele von enormer Wirksamkeit der nördlichen Anlagen genauer an.

— Der Bundesrath hat einem **Gesetzentwurf über den Verkehr mit Kunstbutter** seine Zustimmung ertheilt. In allen Verkaufsläden einschliesslich der Marktstände, in welchen Kunstbutter gewerbsmässig verkauft wird, soll hinfür eine in die Augen fallende Inschrift: „Verkauf von Kunstbutter“ angebracht werden. Im Reiche bestehen nahezu 50 Fabriken von Kunstbutter. Der Entwurf beruht nicht auf sanitätspolizeilichen Gründen, da Fälle, in denen der Genuss von Kunstbutter Erkrankungen im Gefolge gehabt hätte, bisher amtlich nicht bekannt geworden sind, und überhaupt die Kunstbutter hinsichtlich ihres Nährwerthes nicht erheblich hinter der Naturbutter zurücksteht. Für die Einbringung des Entwurfs waren wirthschaftliche Gründe massgebend. Die Erschwerung der Fabrication ist nicht beabsichtigt; sie würde einen Productionszweig von bedeutendem Umfange treffen. Das Ziel ist, der Uebervorthellung, namentlich der kleinen Leute, denen in der Kunstbutter ein wohlfeiler Ersatz für Naturbutter gegeben ist, entgegen zu wirken; die Uebervorthellung besteht darin, dass die Kunstbutter vielfach — die Nahrungsmittelpolizei in Berlin hat fast in jedem ihrer Monatsberichte solche Fälle zu constatiren — als Naturbutter verkauft wird. Diese „fraudulöse Concurrrenz“ der Molkereien soll beseitigt werden. Sie erschwert den Absatz der deutschen Naturbutter auf dem ausländischen Markt. Die jährliche Abnahme dieser letzteren beträgt rund 38 Millionen Kilogramm.

Das Reichsgesundheitsamt hat seiner Zeit sein Urtheil dahin abgegeben: es bestehe zwar der Verdacht, dass ein Theil der Kunstbutter nach solchen Fabricationsweisen, die eine Gefahr der Uebertragung von Krankheiten nicht ausschliessen und aus ekelerregenden Stoffen hergestellt wird, aber das Material reiche zu Anordnungen genereller Art nicht aus; die aus wirthschaftlichen Gründen vorgeschlagene Kennzeichnung der Verkaufsstellen werde den Rücksichten auf die öffentliche Gesundheitspflege im Allgemeinen ausreichend Rechnung tragen.

— In Jamaica wüthen gegenwärtig die Pocken. Am 13. December waren schon 1000 Fälle mit 100 Todesfällen vorgekommen. (Lancet).