Oeffentliches Sanitätswesen.

— J. Schmidt, Die transatlantischen Schnelldampfer, die Gefahren der Seereise und die Rettungsmittel der Seeschiffe, von einem Gereisten. Leipzig 1896.

Referent hat vor einiger Zeit in dieser Wochenschrift einen Artikel über die Ausbildung und Leistungsfähigkeit der Aerzte unserer Handelsflotte veröffentlicht. Er musste damals sein Bedauern darüber aussprechen, dass den jungen Medicinern keine Litteratur zur Verfügung stände, um sich für die Seefahrt vorzubereiten. Nach zwei Richtungen hin ist bereits eine Besserung eingetreten, einmal hat Scheube ein gutes kurzgefasstes Buch, über welches vom Referenten in dieser Zeitschrift geschrieben ist, über die Krankheiten der warmen Länder herausgegeben, und nun ist von einem Gereisten (J. Schmidt) das vorstehend angegebene Werk veröffentlicht worden. Von Medicin findet sich in dem ganzen Buch kein Wort, der Arzt wird an zwei Stellen ganz beiläufig erwähnt, und doch möchte Referent in dieser Wochenschrift kurz über das Buch referiren, und zwar mit Rücksicht auf diejenigen Collegen, welche einige Zeit zur Seefahrt wollen. Die jungen Aerzte haben, wenn sie zur See gehen wollen, von dem „Schiff“, dem sie sich anvertrauen und das ihnen das gesundheitliche Wohl und Wehe seiner Besatzung und Passagiere anvertraut, keinen Begriff, konnten ihn auch nicht erhalten, da ein passendes gemeinverständliches, billiges Werk kaum existirte. Diese Lücke wird durch das vorliegende Werk nach mehreren Richtungen hin in vorzüglicher Weise ausgefüllt. Der Autor geht von der transatlantischen Schnellfahrt aus, giebt eine Uebersicht der Schnelldampfer, ihrer Grösse, Manörfähigkeit, ihren Sicherheitsvorkehrungen — diesen wird nachher noch ein besonderes und sehr beherzigenswerthes Kapitel gewidmet —, dann bespricht er die Ursachen der Schiffscollisionen und beleuchtet den Unglücksfall der „Elbe“, bezw. die im Reichstage 1895 gepflogenen Verhandlungen. Die nächsten Kapitel sind für den unbefahrenen Arzt von dem grössten Interesse, und selbst der befahrene wird sie gern lesen, er

wird aus ihnen noch manche Aufklärung, noch manche Belehrung schöpfen. Sie behandeln den Bau, die Ausrüstung, den Betrieb der Seepersonendampfer; es wird das Material, die Construction, die Maschinenanlage, die Raumeintheilung u. s. w. besprochen, dann folgen die meteorologischen Verhältnisse, Wind, Wellen, Gezeiten, Strömungen, Eis, Nebel u. dergl., darauf werden die Seezeichen besprochen; das letzte der Gruppe dieser Kapitel ist dem Leben und Treiben an Bord gewidmet. Alle diese Abschnitte sind mit hervorragender Sachkenntnis, mit Lust und Liebe zur Sache und sehr gewandt geschrieben, und ich glaube, der angehende Schiffsarzt liest sie, ohne das Buch einen Augenblick aus der Hand zu legen, ich glaube aber, er wird sie wieder und wieder lesen, wenn er an Bord ist, um die Verhältnisse, in denen er lebt, begreifen zu lernen, um mit ihnen vertraut zu werden.

Das nächste Kapitel unterzieht die Unfallverhütungsvorschriften der Seeberufsgenossenschaft einer strengen, sogar sehr strengen Kritik, die allerdings nicht ungerechtfertigt erscheint und die bei Neubearbeitung dieser Vorschriften entschieden die Berücksichtigung von Seiten der Seeberufsgenossenschaft verdient. Der folgende Abschnitt, die nautische Litteratur, berührt unsympathisch; was der Autor dort geschrieben hat, geht vielfach über berechtigte Kritik hinaus. Zuletzt werden der Unfall der Elbe, das Urtheil der Seegerichte, die Besprechungen in der Presse und im Reichstag 1895 der Beurtheilung unterzogen und vieles nicht mit Unrecht scharf verurtheilt. — Das Werk ist in seinem ganzen Wesen durch den Unglücksfall des Schnelldampfers Elbe stark beeinflusst, es ist auch zweizeitlich entstanden, und dieser doppelte Dualismus war nicht zu Gunsten des Buches. Will der Autor wirklich das Seewesen im Binnenlande populär machen, dann sollte er bei einer zweiten Auflage, die dem hochinteressanten Werke bald zu wünschen ist, eine reinliche Scheidung vornehmen, den kritischen Theil in der Tagespresse verwerthen und den rein sachlichen, ja man kann sagen didactischen Theil in Buchform erscheinen lassen, es wird dem deutschen Volk willkommen und jedem jungen seefahrenden Arzte ein treuer Begleiter und guter Wegweiser sein.

— **H. Rohwedder, Die Gesundheitsverhältnisse der Arbeiter am Bau des Nord-Ostseecanals vom Standpunkt der öffentlichen Gesundheitspflege.** Deutsche Vierteljahrsschrift für öffentliche Gesundheitspflege 1896, 4. Heft.

Der Autor war Streckenarzt während des Canalbaues und hat seine Beobachtungen in dankenswerther Weise veröffentlicht. Zunächst beschreibt er die Räumlichkeiten, soweit die gesundheitlichen Verhältnisse in Frage kommen. Die Holzbaracken mit doppelter Verschalung erwiesen sich im allgemeinen als günstig. Im Laufe der Zeit stellte es sich jedoch heraus, dass die Leute die ihnen überwiesenen gesonderten „Wohnräume“ nicht benutzten, ebenso wenig hielten sie sich zur kühlen Jahreszeit Abends in dem Esssaal auf, weil durch den starken Verkehr seine Erwärmung eine ungleichmässige war, sie zogen es vor, in ihren gut gewärmten und genügend beleuchteten Schlafstuben zu sitzen. Die direkt über den Ziegelsteinfussboden gelegten Lattenroste bewährten sich nicht. Infolge dieser Beobachtungen wurden später die Schlafräume gedeilt, die Oefen und Lampen aus denselben entfernt und der 3 m breite Corridor jeder Baracke mit den Lampen und Oefen, den erforderlichen Tischen und Bänken besetzt, so dass dieser den Wohnraum darstellte. Die Umänderung hat sich bewährt. Die Wasserversorgung fand grösstentheils aus 70 m tiefen artesischen Brunnen statt, soweit die Geest in Betracht kam; in der Marsch mussten Cisternen angelegt werden, um das Regenwasser zu fangen, welches durch Abstehen oder Filtriren je nach Bedarf verbessert wurde. Der Wasserversorgung, welche besonders in der späteren Zeit des Canalbaues Schwierigkeiten machte, wurde grosse Aufmerksamkeit zugewendet. Die Fäces fielen in gemauerte Gruben, deren Entleerung contractlich mit den umwohnenden Landleuten vereinbart war. Während der Nacht stand in dem Corridor jeder einzelnen Baracke ein Nachstuhl, die Aufstellung von Urinkübeln allein hatte nicht genügt. Die Defäcation ausserhalb der entsprechenden Oertlichkeiten wurde mit relativ hohen Geldstrafen geahndet. Der Müll wurde abgefahren, das Regenwasser liess man versickern. Die Hausabwässer, welche in cementirten Gruben aufgefangen wurden, sollten ebenfalls von den Bauern contractlich abgefahren werden; als die Leute indessen merkten, dass der Dungwerth minimal sei, liessen sie das hübsch bleiben. Die Canalbaucommission machte also aus der Noth eine Tugend, erklärte die Gruben für Absitzbassins und liess das seiner dicksten Sinkstoffe entledigte Schmutzwasser auf den Acker laufen, wenn einer vorhanden war. Desinfectionspulver (Desodorisationsmittel) thaten dann das übrige, so dass wenigstens grössere Unbequemlichkeiten und Schäden verhütet waren. Die Ernährung der Arbeiter war von der Canalcommission in die Hand genommen und, wie Rohwedder an mehreren Beispielen nachweist, eine sehr gute, welche die physiologischen Bedürfnisse an Eiweiss, Fett und Kohlehydraten voll erfüllte. Der Verdienst des Arbeiters belief sich auf durchschnittlich 3 M.; für Wohnung incl. Bettwäsche und Handtuch wurde gezahlt 20 Pf., für Essen 1,00. Infolge der guten Ernährung und der sonstigen hygienischen Maassnahmen war die Zahl der Erkrankungen nicht beträchtlich. Die Cholera bewirkte nur vereinzelte Krankheitsfälle, zu einer Epidemie kam es nicht; gegen die Cholera- ebenso

wie gegen die Tuberkuloseinfection waren besondere Vorschriften erlassen. Bezüglich der Spucknäpfe erzählt der Autor: „Es hat sich jedoch gezeigt, dass ein Publikum, wie es hier zusammenlief, für solchen Gesundheitsschutz noch unempfänglich ist. Wie oft bin ich am Morgen in eine Stube gekommen, in welcher der Fussboden dicht mit Sputis besetzt war und der Spucknapf nur reinen Sand enthielt.“ Auffällig ist, dass in der Praxis des Autors bis auf zwei Italiener kein Mann an Malaria erkrankte, trotzdem in dieser Gegend und in den umliegenden Marschen bis vor circa 30 Jahren die Krankheit in einer Weise geherrscht hat, dass fast keiner verschont geblieben ist. — Dr. Rohwedder hat sich mit dieser Arbeit ein Verdienst erworben; sie und die von Lütjohann (in derselben Zeitschrift Bd. 21) sind geeignet, als Muster für ähnliche Verhältnisse zu dienen, und sie können den Aerzten, die in die Lage kommen, über einschlägige Verhältnisse Rath zu ertheilen, viele Anhaltspunkte geben.

— **Metzger, Ein neues System der Städteentwässerung.** Bromberg, Mittler'sche Buchhandlung (A. Fromm), 1896. 29 S., 1,50 M.

In den letzten Jahren bricht sich immer mehr die Anschauung Bahn, dass für kleinere und mittlere Städte das Schwemmcanalisationssystem, d. h. die Aufnahme aller Schmutz- und aller Regenwässer, nicht das Richtige sei. Auf die Gründe will Referent hier nicht eingehen, weil das zu weit über den Rahmen des einfachen Referates hinausgehen würde. Man wünscht vielfach und mit Recht ein Trennsystem, d. h. ein Canalsystem, welches das Schmutzwasser, und ein zweites, welches das Regenwasser aufnehmen soll; letzteres kann ein geschlossenes System oder ein offenes sein (Rinnsteine u. dergl.), es kann aber auch ganz fehlen. — So hatte z. B. die Berliner Gewerbeausstellung ein vorzüglich arbeitendes System der Schmutzwässerabführung (Drucklufterrichtung, Firma Erich Merten, Berlin), während die Regenwässer einfach dem Untergrund überwiesen wurden. Die Einrichtung von zwei Canalsystemen ist nun nach Ansicht des Oberingenieurs Metzger (Bromberg) theuer, und er versucht statt zweier Canäle einen Doppelcanal einzuführen, in der Weise, dass aus Beton ein Rohrstück mit zwei Seelen construirt wird; das unten liegende erheblich kleinere Rohr soll die Schmutzwässer, das obere die Regenwässer aufnehmen, auch durch Einlage eines beweglichen Zwischenstückes lässt sich die Trennung der Wässer erreichen. Der Hauptinhalt des Werkes ist der Durchführung dieser Trennung gewidmet und also vorwiegend bautechnischer Natur. Soviel geht aus den Ausführungen hervor, dass die Sonderung gelingt und eine genügende Reinigung der unteren Canäle sich wird ermöglichen lassen. Schwierigkeiten bereitet das neue System gerade so wie die übrigen Trennsysteme wegen der Hofanschlüsse; sollen dieselben an die Schmutzwasserleitung oder an die Regenwasserleitung angeschlossen werden? Diese Frage wird sich wohl nur von Fall zu Fall correct entscheiden lassen. Dem Vorschlage Metzger's, das „schmutzige“ Hofwasser in Brunnen, die auch zugleich für Reinigungsarbeiten Verwendung finden sollen, versickern zu lassen, können wir nicht beistimmen; im übrigen aber ist die Metzger'sche Arbeit ein werthvoller Beitrag zur Entwicklung der Trennsysteme. Gärtner (Jena).

— **E. Rochon, Hygiène du garde-manger.** La Médecine moderne 1897, S. 145.

Die Speiseschränke, die man gegenwärtig ausserhalb der Fenster anbringt, mit Ventilationsöffnungen gegen den Hof und Thüren ins Küchenfenster, sind permanent von einem Luftzug durchströmt, welcher den Strassenstaub, insbesondere aber des Morgens den Staub der ausgeklopften Teppiche, der Besen, der Staubtücher, welche mit Vorliebe von den Mägden zum Fenster hinaus in den Hof ausgebeutelt werden, durchsaugt. Wurde ein solcher Schrank mit gefaltetem Seidenpapier ausgekleidet, so liessen sich nach 24 Stunden 2 g Staub am Seidenpapier nachweisen. Ein derartiger Speiseschrank bildet also geradezu ein Luftfilter für den hinter demselben befindlichen Wohnraum (meist die Küche). Alle die in der Luft enthaltenen Mikroorganismen werden geradezu systematisch auf die Speisevorräthe abgelagert. Ein solcher Speiseschrank bildet also eine permanente Quelle der Infectionsgefahr für die, welche seinen Inhalt geniessen. Abhülfe lässt sich leicht schaffen, indem man die äussere Wand nur mit einigen grossen Löchern versieht, welche mit Hilfe entsprechender Gittervorrichtungen durch hydrophile Watte verschlossen werden. Sorgt man noch für luftdichten Schluss der in die Küche führenden Thüren durch Kautschukbänder und versieht dafür die Thüren mit ähnlichen mit Watte geschützten Öffnungen wie die äussere Wand, so hat man noch immer einen Luftzug von mehr als 100 cm in der Stunde, aber ohne hygienische Gefahr. M. Sternberg (Wien).

— **G. E. Cartwright Wood, Special report to the British medical Journal on the circumstances under which infectious diseases may be conveyed by shellfish, with special reference to oysters.** British medical Journal 1896, 12.—26. September.

Bekannt ist, dass durch Schalthiere gelegentlich gastrointestinale Affectionen und Typhus verbreitet sind. Die Austern, *Ostrea edulis*, nähren sich von Partikelchen organischer Substanz und kleinsten Lebewesen, und zwar, worauf schon ihre wechselnde Färbung deutet, an ver-

schiedenen Gegenden von verschiedenen Arten; sie können nur in stark salzhaltigem, nicht unter 3 ‰ Seewasser leben, die Bänke gedeihen am vortheilhaftesten unfern der Mündung von Flüssen. — Nach Wood können sich nun Cholera- und Typhusbacillen in Seewasser zum mindesten zwei Monate halten und werden mehr oder weniger infectiös bleiben; beide Formen scheinen sich darin im allgemeinen nicht zu vermehren, wohl aber thun sie dies bei höheren Temperaturen, also solchen, denen die aus ihrem Element herausgenommenen Austern vor und bei dem Verkauf ausgesetzt sind, in dem in den Schalen enthaltenen, durch die Lebensfähigkeit des Thieres in seiner Zusammensetzung freilich schon leicht veränderten Wasser. Nach Laboratoriumsversuchen mit inficirten Austern, Versuchen, die sich quantitativ nicht mit den natürlichen Verhältnissen auf Austernbänken decken, aber doch die Infectionsmöglichkeit andeuten, verschwinden die Choleraspirillen — und von anderen pathogenen Keimen haben wir das gleiche anzunehmen — nicht sehr rasch aus den Muschelschalen, liessen sich bis zum 18. Tage nachweisen. Die Zahl der Keime nimmt, wie Experimente mit dem in Seewasser sich nicht vermehrenden *Staphylococcus pyogenes aureus* darlegten, progressiv dabei ab, theils wohl durch vitale Thätigkeit der Austern, theils durch ausschwemmende Wirkung des Wassers. Versuche mit Cholerabacillen weisen darauf hin, dass die wachstumsfähigen Mikroorganismen nicht im Gewebe der Auster, sondern an ihrer Oberfläche sitzen, dass sie sich also gegen Infection zu schützen vermag.

Das in Amerika häufig getübte Verfahren, die Austern für zwei bis drei Tage vor dem Vertrieb in süßem oder halbsalzhaltigem Wasser zu halten, wobei sie durch Wasseraufnahme dicker, „gemästet“ werden, ist aufs schärfste zu verurtheilen, weil es die Thiere leichter verderben lässt und Infectionsgefahren durch das dazu benutzte Wasser herbeiführt, ebenso bedarf das Wasser, in dem die Schalthiere in den Austernläden gehalten werden, strengster Aufmerksamkeit. Untersuchungen desselben, sowie aus verschiedenen Restaurants und Läden bezogener Austern ergaben denn auch einen enormen Gehalt an Mikroben, überwiegend Wasserbakterien, und die nach Blachstein im Thierexperiment gemachte Prüfung der von ihnen gezüchteten Bouillonculturen wies nicht selten eine mehr oder weniger starke Toxicität nach. Man muss nach allem an Seewasser die gleichen Anforderungen wie an Trinkwasser stellen und, was allein durch die oberen sanitären Aufsichtsbehörden geschehen kann, Austern von Verunreinigungen ausgesetzten Bänken aus dem Verkehr fernzuhalten suchen.

F. Reiche (Hamburg).

— H. Surmont et L. Delval, *Recherches chimiques et expérimentales sur la toxicité du genièvre*. Annales d'hygiène publique et de médecine légale 1896, X.

Der Genever ist ein bei der Arbeiterklasse im Norden Frankreichs sehr beliebtes Getränk; er wird dargestellt durch Behandlung der Beeren von *Juniperus communis* mit 96 ‰ Alkohol und nachheriger Verdünnung mit Wasser, so dass etwa ein Alkoholgehalt von 50 ‰ zustande kommt, selten viel weniger, nie unter 39 ‰. Das Material, auf welches sich die folgenden Untersuchungen gründen, wurde den verschiedensten Verkaufsstellen jedes Genres entnommen. Der Genever ist im allgemeinen arm an Fuselöl — fast die Hälfte der untersuchten Proben zeigen weniger als 0,5 ‰, seine Acidität beträgt im Mittel 0,3. Die Giftigkeit wurde experimentell durch intravenöse Injectionen an Kaninchen ermittelt; die injicirte Flüssigkeit war eine 25 ‰ige Geneverlösung in einer acht Blutegelsköpfe im Liter enthaltenden Chlornatriumlösung, wodurch Coagulationen vermieden wurden. Geachtet wurde besonders darauf, dass die Flüssigkeit die gleiche Temperatur wie das Versuchsthier hatte und dass Schnelligkeit der Injection und der Druck constant blieben (10 ccm in der Minute). Der solchergestalt ermittelte Giftigkeitscoefficient schwankte zwischen 16 und 30 g pro Kilo Thier (Kirsch 8 g, Cognac 11 g, Alkohol 6–11 g); er ist einerseits auf Rechnung des Alkohols zu setzen, andererseits des Fuselöls und endlich auf Rechnung einer durch die Analyse nicht ermittelten Substanz. Die Verfasser betonen, dass stets für die Ermittlung der Giftigkeit neben Alkoholgehalt, Fuselölgehalt und Acidität der Thierversuch maassgebend sein soll. Bei den angestellten Parallelversuchen ergab die Methode constante Befunde.

Puppe (Berlin).