Datum	Ort d. Beob.	ΔAR	$\Delta Decl.$
1855 Dec. 11 11 ^h	Leipzig	+ 9,3	+ 0,6
12	Florenz	- 5,0	- 4,5
	Padua	+16,5	-20,7
	Leyden	- 5,8	-12,0
13	Padua	+60,5	- 4,6
	Hamburg	+71,2	- 8,7
	Berlin	+13,6	- 9,9
14	Florenz	- 3,3	- 4,5
	Padua	+40,1	-25,5
15	Florenz	- 8,7	+28,7
	Padua	+22,1	-34,9
19	Berlin	+14,0	- 4,7
20	„	+18,7	+ 1,6
25	Leipzig	+67,1	+11,3
28	„	+27,1	+ 3,2
29	„	+ 5,3	- 1,7

Datum	Ort d. Beob.	ΔAR	$\Delta Decl.$
1855 Dec. 29	Berlin	-12,8	- 3,4
30	Leipzig	+16,8	-13,8
1856 Jan. 2	„	+33,9	+ 6,4
	Hamburg	+22,9	+42,6
	Berlin	- 0,3	+12,3
3	Leipzig	+43,3	+16,2
	Berlin	-12,4	+14,0

Obgleich die Fehler grösser sind, als gewöhnlich bei Cometen, so scheint mir doch ein Abweichen von der Parabel nicht indicirt zu sein, sondern ich erkläre mir sie vielmehr aus der bedeutenden Grösse und Verwaschenheit des cometarischen Nebels, sowie dem gänzlichen Mangel eines ausgezeichneten Punktes innerhalb desselben.

Leipzig 1856, Juli 14.

Ludwig Rudolf Schulze.

Note sur les coefficients théoriques, déterminés par *Tobie Mayer*, relativement aux deux inégalités Lunaires, ayant pour argument $(2E - 2g + c'm)nt$, $(2E - 2g - c'm)nt$, par Monsieur *J. Plana*.

La formule théorique de *Mayer*, pour la longitude vraie de la Lune en fonction de sa longitude moyenne, donne, suivant mes dénominations; en parties du rayon

$$v = -15^{\text{''}}697 \sin(2E - 2g + c'm)nt + 12^{\text{''}}479 \sin(2E - 2g - c'm)nt; \dots\dots\dots(2)$$

où E est désigné l'élongation moyenne de la Lune au Soleil; $(1-g)nt$ le moyen mouvement du noeud, et $c'm$ l'anomalie moyenne du Soleil. Ces deux termes se trouvent à la page 47 de l'ouvrage posthume de *Mayer* publié à Londres en

$$v = -1^{\text{''}}475 \sin(2E - 2g + c'm)nt + 2^{\text{''}}329 \sin(2E - 2g - c'm)nt. \dots\dots\dots(3)$$

La différence est, comme l'on voit, fort grande; et il n'est pas surprenant que *Mayer*, en consultant les observations, n'ait pas conservés les deux inégalités exprimées par l'équation (2) dans la formule pratique posée à la page 52 de son ouvrage. Il voyait bien que ce résultat théorique ne pouvait pas s'accorder avec le Ciel, „paucis secundis adjectis vel demtis“. Mais cette suppression est associée à une espèce de déclaration d'impuissance contre la théorie, qui mérite d'être repoussée; autrement, on pourrait penser que *Mayer*, à la page 50, avait complètement raison de classer ces deux termes parmi ceux „quos theoria, licet „summo studio tractata, accurate praebere non potest, ob „rationes nulli non cognitās, qui in hac re vires suas ac „patientiam exercuit“. Or il m'est facile de démontrer que ce reproche contre la théorie n'est pas fondé. Car, en abandonnant la détermination absolument numérique des coefficients des inégalités Lunaires, conformément à la méthode de *Mayer*, et ayant recours à leur détermination lit-

$$v = -0,0000761 \cdot \sin(2E - 2g + c'm)nt \left\{ \dots\dots\dots(1) \right. \\ \left. + 0,0000605 \cdot \sin(2E - 2g - c'm)nt \right\}$$

et en secondes d'arc:

1767 avec le titre: „Theoria Lunae juxta systema Newtonianum“. Cependant à la page 623 du Premier Volume de ma Théorie de la Lune, j'ai rapporté que, d'après mes calculs, l'on avait à l'égard de ces deux inégalités:

térale, telle que je l'ai exposée dans mon ouvrage, on reconnaît que les deux inégalités, dont il est ici question, quoique du cinquième ordre avant l'intégration, doivent nécessairement s'abaisser au troisième ordre après l'intégration, sauf la circonstance, que le premier terme du développement de leur coefficient ne soit pas réduit à zéro par la destruction mutuelle des parties constituantes. Et comme ce cas exceptionnel est précisément celui qui a lieu, d'après le résultat que j'ai donné à la page 96 du Second Volume de mon Ouvrage, on conçoit, que la théorie démontre a priori que ces deux inégalités sont du quatrième, et non du troisième ordre. Telle est la cause radicale que l'on a pour leur premier terme (Voyez les pages 102 et 106 du même Volume);

$$\delta nt = \sin 2Ev + c'mv - 2gv \cdot e\gamma^2 \left(\frac{9}{16}m\right) \\ + \sin 2Ev - c'mv - 2gv \cdot e\gamma^2 \left(-\frac{7}{16}m\right).$$

En poussant plus loin l'approximation on parvient à la page 829, où l'on a:

$$\frac{d \delta nt}{dv} = \cos 2Ev + c'mv - 2gv \cdot \epsilon' \gamma^2 \left(-\frac{9}{16}m^2 - \frac{43}{16}m^3 + o.me^2 + o.m\gamma^2 \right) \\ + \cos 2Ev - c'mv - 2gv \cdot \epsilon' \gamma^2 \left(\frac{9}{16}m^2 - \frac{29}{32}m^3 + o.me^2 + o.m\gamma^2 \right);$$

et par conséquent :

$$\delta nt = \sin 2Ev + c'mv - 2gv \cdot m\epsilon' \gamma^2 \left(-\frac{9}{16} + \frac{59}{32}m \right) \\ + \sin 2Ev - c'mv - 2gv \cdot m\epsilon' \gamma^2 \left(-\frac{9}{16} + \frac{1}{4}m \right) \} \dots (4)$$

Ce résultat met en évidence l'avantage que présente un développement purement analytique des inégalités Lunaires. Il n'est pas moins clair, que, par le renversement de la série, on aura dans l'expression de la longitude vraie en fonction de la longitude moyenne de la Lune :

$$v = \sin(2E + c'm - 2g)nt \cdot m\epsilon' \gamma^2 \left(-\frac{9}{16} - \frac{59}{32}m \right) \\ + \sin(2E - c'm - 2g)nt \cdot m\epsilon' \gamma^2 \left(\frac{9}{16} - \frac{1}{4}m \right) \} \dots (5)$$

c'est-à-dire les coefficients que j'ai donnés vers le fond de la page 580 du Premier Volume de mon Ouvrage.

Si l'on remarque, que le facteur $\epsilon' \gamma^2$ est d'environ $28''$ (en parties de l'arc) on sentira, que l'équation (2) de *Mayer* est le résultat d'un calcul tout-à-fait incomplet, où la destruction mutuelle des quantités du troisième ordre (ce qui est ici un point capital) ne pouvait pas avoir lieu.

Cette destruction se voit (suivant mes dénominations) par l'équation

$$d \cdot \frac{\delta nt}{dv} = -2\delta u + m^2 \int R_1 dv;$$

en observant que, aux pages 61 et 76 de mon second Volume, l'on a ;

$$m^2 \int R_1 dv = \cos 2Ev + c'mv - 2gv \cdot m\epsilon' \gamma^2 \left(-\frac{3}{8} - \frac{39}{32}m \right) \\ + \cos 2Ev - c'mv - 2gv \cdot m\epsilon' \gamma^2 \left(\frac{7}{8} + \frac{25}{32}m \right); \\ -2\delta u = \cos 2Ev + c'mv - 2gv \cdot m\epsilon' \gamma^2 \left(\frac{3}{8} + \frac{3}{16}m \right) \\ + \cos 2Ev - c'mv - 2gv \cdot m\epsilon' \gamma^2 \left(-\frac{7}{8} + \frac{103}{16}m \right).$$

Je pourrais faire d'autres remarques analogues sur la formule-théorique de *Mayer*. Dans la même page 47 on y voit les deux inégalités

$$\varphi = -0,0001166 \cdot \sin(r+n)q + 0,0000296 \sin(r-n)q; \dots (6)$$

c'est-à-dire

$$v = +24''051 \cdot \sin(E+c'm)nt - 6''848 \sin(E-c'm)nt, \dots (7)$$

suivant mes dénominations; tandis que l'on a

$$v = +17''216 \sin(E+c'm)nt - 0''383 \sin(E-c'm)nt; \dots (8)$$

conformément à l'expression analytique des coefficients de ces inégalités que j'ai donnée à la page 582, et à la valeur numérique dans la page 625 du Premier Volume.

Toutefois je dois observer que ces deux coefficients de *Mayer* doivent être multipliés par la fraction $\frac{312}{357}$, afin de les réduire à la parallaxe du Soleil, employée par moi; tandis que *Mayer* les a calculés en supposant cette parallaxe de $10''8$ comme il le dit à la page 32. Plus loin (page 53) il l'a réduite à $7''8$. En multipliant par $\frac{312}{357}$ l'on a $18''862$ au lieu de $24''051$; et $5''381$ au lieu de $6''848$: ce qui diminue la différence entre les équations (7) et (8).

Dans la même page 47 de l'ouvrage de *Mayer*, il y a les deux inégalités,

$$+0,0000545 \cdot \sin(r+\alpha)q + 0,0000100 \cdot \sin(r-\alpha)q,$$

qui suivant mes dénominations correspondent à

$$-11''242 \cdot \sin(E+c)nt - 3''269 \sin(E-c)nt,$$

et se réduisent (en les multipliant par la fraction $\frac{312}{357}$) à

$$-8''835 \cdot \sin(E+c)nt - 2''569 \sin(E-c)nt.$$

D'après ma théorie de la Lune (voyez la page 625 du 1^{er} Vol.), l'on a

$$-8''237 \cdot \sin(E+c)nt - 18''045 \cdot \sin(E-c)nt.$$

La différence est, comme l'on voit, fort grande relativement à l'argument $(E-c)nt$, qui est un de ceux dont le calcul du coefficient exige d'avoir égard, même aux quantités du 7^{ième} ordre, après les intégrations. Le coefficient de l'argument $(E+c)nt$ est, au contraire, un des plus faciles à calculer. L'inégalité $(E-c)nt$, du cinquième ordre avant les intégrations, s'abaisse au quatrième et non au troisième ordre, à cause que le premier terme devient mathématiquement égal à zéro (voyez la page 103 du second Vol.). La grandeur de cette inégalité tient à la grandeur des coefficients numériques absolus qui entrent dans l'expression littérale de son coefficient.

Ces remarques suffisent pour faire entendre que l'on doit étudier, avec précaution, la théorie de la Lune de *Tobie Mayer*, et pour infirmer les réflexions contraires à la Mécanique Céleste, dévoilées par *Delambre* à la page 445, de son Histoire de l'Astronomie du 18^{ième} Siècle publiée en 1827.

Turin le 12. Juillet 1856.

Jean Plana.