Da im Wesentlichen hier der Anschluss an die Tabulae reductionum beabsichtigt wird, in welchen die 2^{te} Reihe der Werthe von *Peters* angewandt ist, die nur um 0⁴ von *Hansen* und *Olufsen* abweichen, so folgt hier noch eine Tafel, welche von 1845 bis 1861 die Correctionen der scheinbaren Schiefen des Jahrbuchs auf die Werthe nach *Peters* angiebt. Diese Correctionen sind zusammengesetzt aus den Unterschieden der betreffenden mittleren Schiefen, welche die obige Zusammenstellung giebt und dem Gliede $+0^{\circ}25 \cos \Omega$ (Länge des Mondknotens).

Jahre	Δs
1845	—1 ⁰⁰ 3
1846	—1,11
1847	—1,16
1848	—1,19
1849	—1,19
1850	—1,17
1851	—1,11
1852	—1,04
1853	—0,97
1854	—0,90
1855	—0,84
1856	—0,78
1857	—0,76
1858	—0,77
1859	—0,81
1860	—0,86
1860 Schluss	—0,93

Dadurch, dass ich durch die obigen Zusammenstellungen motivirte, bestimmte Vorschläge zur Annahme empfohlen habe, glaube ich nur dem auf den astronomischen Zusammenkünften 1860 und 1861 zu Berlin und Dresden vielfach ausgesprochenen Wunsche, sich über gemeinsame Grundlagen zu einigen, entgegen gekommen zu sein, und erwarte, dass man sich gelegentlich über deren vorläufige Annahme oder Nichtannahme ausspreche, resp. mit anderen Vorschlägen hervortrete.

C. Pomalky.

Messungen über die Bewegung der Lichtmaterie des Cometen innerhalb der Coma.

Von Herrn J. F. Julius Schmidt, Director der Königl. Sternwarte in Athen.

Die grossen Cometen von 1858, 1860 und 1861 haben mir Gelegenheit geboten, jene Beobachtungen wieder aufzunehmen, die ich vormals an verschiedenen Cometen seit 1842 versucht hatte. Während sich früher solche Messungen nur auf die Grösse der Coma, einigemal auf die Länge des Schweifes bezogen, traten an den 3 obenerwähnten Cometen Erscheinungen auf, welche, an Merkwürdigkeit und Complication fast nur denen von 1744 vergleichbar, zu der genauesten Untersuchung auffordern mussten. Durch eigene Anschauung, und unter dem Einflusse der Arbeit *Bessel's* über *Halley's* Cometen, war ich seit Langem der Ansicht, dass unsere Studien über die Natur dieser Himmelskörper nur dann sicher zum Ziele führen, wenn man sich (erster und umfassender als es jemals ausser von *Bessel* geschehen ist) mit der sorgsamsten und umfassendsten Untersuchung der Phänomene des Nucleus beschäftigt, nicht mit dem Schweife und den gelegentlichen Anomalien desselben den Anfang macht. Die denkwürdigen Erscheinungen, welche die 3 genannten Cometen uns zeigten, haben mich in jener Ansicht nur befestigen können. So lange man nicht weiss, wie an der Wurzel, also am Kerne selbst, alle Hauptphänomene des Cometen sich entwickeln, scheint es mir, wenn auch nicht ganz vergeblich, doch wenigstens sehr gewagt und unsicher,

aus isolirten Messungen an verschiedenen Tagen irgend welche Schlussfolgerungen ziehen zu wollen. Denn die Änderungen in der Intensität, Gestaltung und Grösse der ausgeströmten Materie gehen viel rascher von Statten, als man bis jetzt zu glauben scheint, und alle Wirkungen des Keros äussern sich sehr bald an der Grösse und Form der Corona, langsamer und später im Schweife.

Ich gebe im Folgenden einen kurzen Auszug aus druckfertigen Manuscripten, welche ich über die Cometen von 1858, 1860 und 1861 beobachtet habe, sie sind von zahlreichen Abbildungen begleitet. Da sich nicht bestimmen lässt, wann diese erscheinen werden, so glaub ich meine Mittheilung durch den Wunsch gerechtfertigt zu sehen, dass diese oder jene Bemerkung manchem Beobachter nützlich werden könne, wenn inzwischen bald ein neuer grosser Comet uns überraschen sollte.

Alle meine Messungen sind mit unvollkommenen Hilfsmitteln ausgeführt, sowohl 1858 in Wien, als später in Athen; aber man weiss, dass im Nothfalle auch bei ungünstigen Umständen gute Resultate erlangt werden können, wenn nur der Charakter der zu messenden Phänomene die Anwendung ungewöhnlicher Methoden gestattet. Bei dem Mangel eines Mikrometers, um Distanzen und Positionswinkel zu messen,

beobachtete ich zu Wien (an einem kleinen Plössl'schen Refractor auf der k. meteorologischen Centralanstalt) Passagen der Radien oder Durchmesser der Strömungssectoren (Lichtfächer, Halo's) an einem Fadenkreuze, welches stets genau auf die scheinbare tägliche Bewegung der Fixsterne eingestellt ward. In Athen beobachtete ich an dem grossen Refractor von Plössl Passagen am Kreismikrometer. Im erstern Falle war ich begünstigt durch Helligkeit und Schärfe der Phänomene, im andern namentlich durch die Grösse derselben. Dass die Dämmerung auf scharf begrenzte Gestalten für die Messung eben so einflusslos sei, wie auf die Messung der Planetendurchmesser unter ähnlichen Umständen, habe ich in gedachter Abhandlung ausgeführt. Hier mag noch bemerkt werden, dass ich 1861 die Messung der Lichtbüschel bis $\frac{1}{2}$ Stunde vor dem Aufgange der Sonne fortgesetzt habe, ohne dass sich wegen der Zunahme der Dämmerung eine Abnahme der zu messenden Grösse herausgestellt hätte.

Um zu zeigen, dass die Ausströmung des Cometenkerns demnach die Veränderung der Gestalt und Grösse der dadurch erzeugten Phänomene sehr rasch von Statten gehe, werde ich folgende Beispiele hersetzen.

1858. Donati's Comet.

Octbr. 4. Es zeigten sich 2 helle Halbkreise um den Kern, beide an der Seite gegen den Schweif offen. Den Halbmesser des äussern neune ich r' , den des innern r . Die Zeiten t sind mittlere von Wien. m ist der wahrscheinliche Fehler des Mittels aus n Beobachtungen; alles in abgekürzten Zahlen.

t	r'	m	n
5 ^h 59 ^m 5 =	32 ^{''} 2	± 0 ^{''} 5	10
6 19,0	35,6	0,5	10
6 58,0	37,1	0,4	10
7 20,0	37,9	0,3	10
7 41,0	39,7	0,3	10

t	r	m	n
5 ^h 36 ^m 5 =	5 ^{''} 4	± 0 ^{''} 1	14
5 57,0	8,8	0,2	10
6 2,0	9,4	0,1	10
6 23,0	10,6	0,1	10
6 31,0	11,7	0,1	10
6 56,5	13,2	0,2	10
7 18,0	13,8	0,2	11
7 39,0	16,4	0,2	10
7 56,5	16,6	0,2	10
8 10,0	18,4	0,2	10
8 19,0	19,8	0,4	10

Betrachten wir nur den innern Halo, so zeigt sich, dass sich die Werthe r durch eine gerade Linie construiren lassen,

und dass die Zunahme der Zeit nahe proportional vor sich ging. Werden sie auf die Entfernung Eins reducirt, so findet man, dass r sich in 2^h 42^m 5 von 358 bis 1179 Meilen vergrössert habe (1 Grad = 15 Meilen); und da ich es für ausgemacht halte, dass diese Sektoren oder Fächer nur die Projectionen von Kugelschaalen waren, concentrisch vom Kern aufsteigend und sich ausdehnend, und deren grösste Helligkeit sich an den Rändern zeigen musste, so kann ich aus diesen Angaben die Geschwindigkeit ableiten, mit welcher der Kern seine Materie ausströmte. Diese finde ich:

$$g = 321 \text{ Toisen} = 1926 \text{ par. Fuss in einer Secunde.}$$

Ähnliche Werthe habe ich zwischen Oct. 1 und 18 aus allen (etwa 1700) Messungen berechnen können. Für Oct. 3 fand ich:

t	r	m	n
6 ^h 10 ^m =	30 ^{''} 8	± 0 ^{''} 3	10
7 56 =	38,0	± 0,7	10

Daraus ergibt sich $g = 271 \pm 38$ Toisen in der Secunde.

Comet II. 1861.

Am 1^{ten} Juli beobachtete ich im Laufe der ganzen Nacht die vollständige sehr rasche Entwicklung des anomalen Strömungssectors, der, höchst ausgezeichnet durch 4—5 glänzende Lichtbögen (Figur des Seesterns) die linke Seite des innern Paraboloides bildete. γ heisse die Spitze des gegen den Schweif zurückgekrümmten Strabes, β die Spitze eines beiläufig gegen die Sonne gerichteten Strabes, r und ρ seien die Abstände dieser Spitzen vom Kerne, p und ϕ die Positionswinkel der Verbindungslinien jener Spitzen mit dem Kerne gegen den Meridian des Cometen, von Norden an durch Osten herum gezählt. Die Messungen gehen im Folgenden die AR.-Unterschiede in mittleren Zeitsecunden, die Decl.-Unterschiede in Bogensecunden; r und ρ ebenfalls in Bogensecunden.

M. Zt. Athen	AR. ($\phi - \gamma$)	δ ($\phi - \gamma$)	r	ρ
10 ^h 20 ^m 20 ^s	+ 4 ^{''} 375	— 9 ^{''} 9	39 ^{''} 0	284 ^{''} 0
10 25 38	+ 5,075	— 11,9	45,3	285,2
10 29 28	+ 4,725	— 16,9	44,0	292,6
11 20 31	+ 6,481	— 20,5	59,0	289,8
15 30 55	+ 14,625	— 45,1	128,7	290,5
15 46 20	+ 15,125	— 60,2	130,9	297,4
15 54 3	+ 15,550	— 42,4	134,6	288,4

Nimmt man Mittel aus den 3 ersten und den 3 letzten Messungen, so hat man

$$10^h 25^m 9^s \quad r = 42'' 8$$

$$15^h 43^m 46^s \quad r = 131,4$$

Geschwindigkeit $g = 252$ Toisen in 1 Sec., von der Sonne abwärts gerichtet.

In dem nahe gegen die Sonne gerichteten Strahle ergab die Messung

$$\begin{array}{lcl} 10^h 20^m 3 & \rho = 47'' 1 & \varphi = 243^\circ 1 \\ 15 46,3 & \rho = 107,0 & \varphi = 241,0 \end{array}$$

Geschwindigkeit $g = 167$ Toisen in 1 Secunde.

Ähnliche und zum Theil kleinere Werthe ergaben die Beobachtungen von Juli 2, 3, 4, 5, 6, worauf diese Phänomene unkenntlich wurden.

Coma des Cometen.

Ich nenne so die ganze Umbüllung des eigentlichen Kernes, welche nicht nur sämtliche Phänomene umschliesst, sondern überhaupt das an der Sonnenseite halbkugelförmig begrenzte Ende des ganzen Cometenkörpers bildet, mag dieser Körper nun einfach sein, oder wie bei dem grossen Cometen von 1861 aus 2 ineinander steckenden hohlen Paraboloiden bestehen. Man hält dafür, dass die Coma sich mit zunehmender Entfernung von der Sonne vergrössere, und führt besonders *Encke's* Cometen als Beispiel an. Erwäge ich aber die grosse Unvollkommenheit des vorhandenen Materials; die Armuth der Wissenschaft an solchen Bestimmungen überhaupt, dazu noch alle Schwierigkeiten, welche bei der Messung der Coma in Frage kommen, so will mir scheinen, dass man die Vergrösserung der Nebelhülle noch nicht als allgemeine Eigenschaft der Cometen ansehen dürfe. Für die Ansicht sprechen *Schröter's* Beobachtungen über den Cometen von 1807, und die Meinigen über die Cometen von 1845, beobachtet zu Bilk, so wie 1853 zu Olmütz (Astr. Nachr. Jahrg. 1853), besonders auch *Encke's* Comet in einer der frühern Erscheinungen. Dagegen lassen sich andere Angaben aufstellen, ebenfalls aus meinen eigenen Messungen. Dass aber auch periodische Änderungen in der Grösse der Coma vorkommen, zeigt der Comet von 1861 nach meinen Beobachtungen zu Athen fast unzweifelhaft, sofern man nicht geneigt ist, den Messungen grosse Fehler zuzuschreiben, die anzunehmen, ich wenigstens durchaus keine Ursache finde. Ich will zugeben, dass in den ersten 10 oder 12 Tagen der Halbmesser der Coma wegen seiner ausserordentlichen Grösse um 3' bis 5' fehlerhaft bestimmt werden konnte (wie denn unsere Refractoren zu solchen Messungen schlecht geeignet sind). Aber diese Fehler werden schon bei der Reduction auf die Entfernung 1 verringert, weil der Comet der Erde nahe war. Die spätern Messungen, stets ohne Einfluss des Mondlichtes und der Dämmerung angestellt, können nicht Fehler darbieten, welche 4 und selbst 5 Bogenminuten betragen, wenn die zum Grunde liegenden Schätzungswerthe, nämlich Radius des Kreismikrometers und Breite des Ringes selbst nur 9 und 1'1 betragen. Überdies finde ich, dass die Resultate aus Passagen und aus Schätzungen nach der

Breite des Ringes, stets nur um 20" bis 30" von einander abwichen. Reducire ich die von mir gemessenen Scheitelradien der Coma auf die Entfernung Eins, so hat man in abgekürzten Zahlen:

Juni 30	= 4' 7	Juli 30	= 5' 3	Aug. 30	= 6' 4
Juli 1	2,9	31	6,3	31	5,7
3	3,4	Aug. 1	8,4	Sept. 1	5,3
4	3,3	2	7,6	2	5,3
5	5,3	3	7,9	4	6,9
9	5,3	4	7,0	5	5,6
10	4,9	5	8,2	7	5,3
11	5,0	6	6,8	22	7,6
12	5,1	7	7,0	24	6,7
14	4,9	8	6,6	25	6,5
15	5,0	10	5,8	26	6,7
24	3,6	22	3,2	27	6,6
26	4,3	24	6,7	Oct. 1	5,6
27	4,0	25	4,8	2	6,4
28	4,1	26	6,8	4	5,5
29	5,5	29	7,9	7	6,2

Der mittlere Scheitelradius war hiernach $\approx 5' 7$ oder 40,2 Erdhalbmesser, d. h., gegen 35000 geogr. Meilen. Der Parameter hatte meist solche Grösse, dass die ganze Mondbahn darin Raum gefunden haben würde. Man sieht, dass Abweichungen von $-2' 8$ bis $+2' 5$ vom Mittel vorkommen, und dass die Minima und Maxima um mehr als 5' verschieden sind. Juli 24 und Aug. 22 mag man für weniger sicher halten, da auf der einen Seite die Dämmerung, auf der andern Seite der aufgehende Mond drängte. Nennt man die Abweichungen der einzelnen Abgaben vom Mittel $= f$, die Abweichungen von den Werthen einer möglichst anschliessenden Wellencurve $= f'$, so hat man die Summe der (als positiv angenommenen) übrigbleibenden Fehler: $\Sigma f = 52,8$, $\Sigma f' = 26,8$, und danach die wahrscheinlichen Fehler $\pm 1' 0$ und $\pm 0' 5$. Die letztere Fehlergrenze ist der Natur der Messungen angemessen und erreicht die halbe Breite des Ringes, d. h., 30" bis 32"; die Wellencurve selbst giebt Folgendes zu erkennen:

Maxima von r		Minima von r	
Juli 10	$\approx 5' 1$ (?)	Juli 24	$\approx 3' 9$
Aug. 3	8,0	Aug. 19	4,7
29	7,6	Sept. 11	5,1
Sept. 23	7,0	Oct. 5	5,7
Perioden			
aus den Maximis		aus den Minimis	
24 Tage		26 Tage	
26 "		23 "	
25 "		24 "	

Lässt man die ersten 11 Tage aus dem obenerwähnten Grunde ganz aus dem Spiele, so zeigt sich, dass sich die Fehler sehr durch jene Curve verringern, und dass die Variationen in der Grösse der Coma in je 24,8 Tagen ihre Extreme erreichten, wobei das mittl. Maximum $\approx 7' 5$, das

mittl. Minimum = 4' 8; Unterschied = 2' 7 oder 19 Erdhalbmesser. Es zeigt sich aber noch eine andere Eigenthümlichkeit der Curve, dass nämlich bei gleichbleibender Periode von 25 Tagen die Extreme sich einander nähern, d. h., dass die Unterschiede zwischen den Maximal- und Minimalwerthen abnehmen, so dass der Schluss nahe liegt, es trete bald der Zeitpunkt ein, da die Differenzen Null werden, oder, da der Durchmesser der Coma sich nicht mehr ändert.

die Ausströmung des Nucleus, als auch die damit zusammenhängende Variation in den Dimensionen der Coma. Welche Wechselwirkung aber bei diesem Cometen die beiden Parabolöide auf die Gesamtformation der Coma ausübten, bleibt nach meinen Beobachtungen dunkel, da das innere Paraboloid, einigemal in aller Klarheit sichtbar, meist verdeckt blieb von der äussern Hülle, welche als der Anfang des breiten und matten, bis 30° langen Seitenschweifes zu betrachten ist.

Athen 1861 Oct. 26.

Diff. von Minim. bis Maxim. = 4' 2	Juli 24 bis Aug. 3
": Maxim. : Minim. = 3,3	Aug. 3 : 19
": Minim. : Maxim. = 2,9	19 : 29
": Maxim. : Minim. = 2,5	29 : Sept. 11
": Minim. : Maxim. = 1,9	Sept. 11 : 24
": Maxim. : Minim. = 1,3	24 : Oct. 4

Es scheint also, dass nach dem Perihelie die Lebhaftigkeit aller Phänomene im Cometen sich vermindert, sowohl

J. F. Julius Schmidt.

Zweite Berechnung der Danaë von Herrn Dr. R. Luther.

Da die Elemente I. der Danaë in № 1282 der Astr. Nachr. auf eine Zwischenzeit von nur 29 Tagen beruhten, so berechnete ich aus den Beobachtungen 1860 Sept. 22, Dec. 2 1861 Febr. 6 folgende

Elemente II. der Danaë.

Epoche 1862 Jan. 0 0^h mittl. Zt. Berlin

$$L = 73^{\circ} 6' 25'' 4$$

$$M = 90 22 12,7$$

$$\pi = 342 44 12,7$$

$$\Omega = 334 16 57,9$$

$$t = 18 16 32,9$$

$$\phi = 9 41 48,7$$

$$\mu = 681'' 4933$$

$$\log a = 0,4776966$$

mittl. Äquin. 1862,0

Ephemeride II. der Danaë.

0 ^h Berlin	AR.	Decl.	$\log \Delta$	$\log r$
1861 Nov. 4	6 ^h 50 ^m 15 ^s	+45° 12' 2	0,3762	0,4767
5	50 10	17,1		
6	50 4	22,0		
7	49 55	26,8		
8	49 44	31,6	0,3695	0,4777
9	49 31	36,4		
10	49 15	41,1		
11	48 58	45,8		
12	48 38	50,5	0,3632	0,4787
13	48 16	55,1		
14	47 53	59,7		
15	47 27	+46 4,2		
16	46 59	8,6	0,3573	0,4796
17	46 29	12,9		
18	45 56	17,2		
19	45 22	21,4		
20	44 46	25,5	0,3518	0,4806
21	44 77	29,5		
22	43 27	33,4		
23	42 44	37,2		
24	42 0	40,9	0,3469	0,4815
25	41 13	44,5		

0 ^h Berlin	AR.	Decl.	$\log \Delta$	$\log r$
1861 Nov. 26	6 ^h 40 ^m 25 ^s	+46° 47' 9		
27	39 34	51,2		
28	38 42	54,3	0,3425	0,4825
29	37 48	57,3		
30	36 52	+47 0,1		
Dec. 1	35 55	2,7		
2	34 56	5,2	0,3389	0,4834
3	33 55	7,5		
4	32 53	9,6		
5	31 50	11,5		
6	30 45	13,2	0,3360	0,4843
7	29 38	14,7		
8	28 31	16,0		
9	27 22	17,1		
10	26 13	18,0	0,3338	0,4853
11	25 2	18,7		
12	23 50	19,1		
13	22 38	19,3		
14	21 24	19,3	0,3325	0,4862
15	20 10	19,0		
16	18 56	18,6		
17	17 41	17,9		
18	16 26	17,0	0,3321	0,4871
19	15 10	15,8		
20	13 54	14,3		
21	12 38	12,6		
22	11 22	10,7	0,3326	0,4880
♂ 23	10 6	8,6		
24	8 51	6,2		
25	7 35	3,6		
26	6 20	0,7	0,3339	0,4889
27	5 6	+46 57,6		
28	3 52	54,3		
29	2 38	50,7		
30	1 25	46,9	0,2362	0,3898
31	6 0 13	42,8		
32	5 59 2	38,6		
33	57 52	34,2		
34	56 43	29,6	0,3393	0,4907

Bilk bei Düsseldorf 1861 Nov. 1.

R. Luther.