Ungleich glatter als bei der β -Chlorcrotonsäure geht die Umwandlung bei der Allo- α -Bromcrotonsäure vor sich.¹⁾ Wir haben zwei Röhrchen mit je 1 Grm. reiner Säure beschickt und diese in siedendem Xylol erhitzt. Die Flüssigkeit färbte sich etwas braun, beim Oeffnen der Röhre war aber kein Ueberdruck zu bemerken. Eine Probe der herausgenommenen Säure schmolz bei ca. 104°. Beide wurden nun je in 10 Grm. absolutem Alkohol aufgelöst und mit 10 procent. alkoholischer Kalilauge neutralisirt.

Es fielen starke Niederschläge aus, die filtrirt, getrocknet und gewogen wurden.

Probe I., während 10 Stunden auf 139° erwärmt, lieferte an unlöslichem Kaliumsalz 1,18 Grm., entsprechend 94 %.

Probe II., während 15 Stunden auf 139° erwärmt, ergab 1,25 Grm. unlösliches Kaliumsalz, entsprechend 99 %.

Im Gegensatz zu allen oben angeführten ähnlichen Umsetzungen scheint Allo- α -bromcrotonsäure leicht und vollständig in die bei 106° schmelzende alloisomerische Säure überzugehen.

4. Ueber die Bildung von fester Crotonsäure bei der Reduction von allo- α -Brom- und -Chlorcrotonsäure;

von

Arthur Michael.

Vor einigen Jahren haben H. Pendleton und ich²⁾ die überraschende Beobachtung gemacht, dass allo- α -Bromcrotonsäure mittelst Natriumamalgam glatt in feste Crotonsäure überführbar ist, während man doch die Entstehung von flüssiger Crotonsäure hätte erwarten sollen. Wir bemerkten ferner, dass bei der entsprechenden Chlorsäure ähnliche Verhältnisse in dieser, sowie anderer, Beziehung stattfinden, führten aber an, dass diese Versuche nicht abgeschlossen waren.³⁾ In meiner ersten Kritik⁴⁾ der Wislicenus'schen Broschüre wurde hervorgehoben, dass diese Beobachtungen im Widerspruch mit der van't Hoff'schen Hypothese

¹⁾ Dies. Journ. [2] 38, 1.

²⁾ Das. S. 2.

³⁾ Das. S. 4.

⁴⁾ Das. S. 11.

sind, und da die feste Crotonsäure ebenfalls aus den α -Halogensäuren gebildet wird, so war man berechtigt anzunehmen, dass die Halogensäuren eigentlich Derivate der festen Crotonsäure seien. J. Wislicenus¹⁾ hat die allo- α -Chlorcrotonsäure (α -Chlorisocrotonsäure) in einer späteren Arbeit ebenfalls mit Natriumamalgam reducirt und glaubte, neben sehr wenig Buttersäure, die Bildung von nur flüssiger Crotonsäure bewiesen zu haben.

In seiner „Antikritik“ führt Wislicenus²⁾ weiter an, dass er die Beobachtungen betreffend die Bildung von fester Crotonsäure aus α -Bromsäure bestätigen könne, dass aber, wenn man in verdünnter saurer Lösung reduciren, ziemlich grosse Mengen von flüssiger Crotonsäure neben der festen Säure gebildet werden. Wislicenus hat meine Angabe über die Bildung von fester Crotonsäure aus der allo- α -Chlorcrotonsäure in einer Weise behandelt, wie es glücklicher Weise selten bei wissenschaftlichen Discussionen vorkommt, denn unter Anderem behauptet er: „Hätte nur Michael, anstatt einfach anzunehmen, die α -Chlorisocrotonsäure werde durch Natriumamalgam ebenfalls in feste Crotonsäure übergeführt, den Versuch wirklich ausgeführt, er würde obigen Satz nicht geschrieben haben.“³⁾ Die Sache lag aber folgendermassen: Pendleton und ich bekamen zunächst eine Flüssigkeit, die bei längerem Stehen im Vacuum allmählich zum Theil erstarrte, und die ausgeschiedenen Krystalle waren nichts anderes als feste Crotonsäure. Da dieselben anscheinend einen bedeutenden Theil des Reductionsproduktes ausmachten, so habe ich nicht gezögert anzugeben, dass feste Crotonsäure bei dieser Reduction gebildet wird, nicht aber, wie dies Wislicenus mir zuschreibt, dass dieselbe als einziges Produkt entsteht. Die Angabe, dass unsere Versuche über die Chlorsäure nicht vollendet waren, bezog sich gerade auf die nebenbei entstehende flüssige Säure, die wir zur Zeit nicht näher untersucht hatten. Es ist ersichtlich, dass die Angabe von Wislicenus, es bilde sich allein die flüssige Crotonsäure, unmöglich richtig sein kann, da Pendleton und ich das Reductionsprodukt auf ähnliche Weise darstellten, und, trotzdem wir dasselbe nie

¹⁾ Ann. Chem. 248, 290.

²⁾ Das. S. 352.

³⁾ Das. S. 352.

erhitzten, gewannen wir daraus beträchtliche Mengen von fester Crotonsäure. Die oben angegebene Methode der Trennung von fester und flüssiger Crotonsäure vermittelt ihrer Natriumsalze ermöglichte eine Entscheidung zwischen diesen auseinander gehenden Angaben, und veranlasste mich, die Reduction von allo- α -Brom- und Chlorcrotonsäure von neuem zu untersuchen.

Da Wislicenus die glatte Bildung von fester Crotonsäure bei der Reduction von allo- α -Bromcrotonsäure in alkalischer Lösung nicht bestreitet, so war kein Grund vorhanden, diese Versuche zu wiederholen, dagegen habe ich die Reduction dieser Säure in saurer Lösung möglichst genau nach Wislicenus, soweit seine spärlichen Angaben hierüber es gestatten, wiederholt.

20 Grm. zwischen 91° — 92° schmelzende allo- α -Bromcrotonsäure¹⁾ wurden in 800 Grm. Wasser gelöst, die Lösung durch fließendes Wasser auf etwa 10° kalt gehalten und, während 15 Stunden, 2240 Grm. 1procent. Natriumamalgam (4 At. Na zu 1 Mol. Säure) in der Weise zugesetzt, dass man zuerst 5 Ccm. einer 20procent. Lösung von Schwefelsäure, und darauf 36 Grm. des Amalgams zufügte, und diese Operation wiederholte, bis alles Amalgam verbraucht war. Während der Reduction ist die Lösung stets durch überschüssige Schwefelsäure schwach sauer gewesen. Die Reduction ging sehr langsam von statten, da weitaus der Haupttheil des entstehenden Wasserstoffs entwich, nach kurzer Zeit konnte man aber den Geruch nach Buttersäure bemerken. Eine kleine Portion der Flüssigkeit wurde stark angesäuert und mit Aether ausgezogen; es zeigte sich aber, dass das Produkt noch stark bromhaltig war. Nun wurden abermals 1120 Grm. Amalgam (2 Mol.) portionsweise, unter vorherigem

¹⁾ Zur Darstellung der bei 87° schmelzenden Dibrombuttersäure haben Norton und ich früher die Crotonsäure in Schwefelkohlenstoff gelöst, wobei man relativ grössere Mengen des Lösungsmittels gebrauchen muss. Es ist aber in diesem Fall dies nicht nothwendig, sowie auch bei anderen Additionen, wenn das Additionsprodukt in dem angewandten Lösungsmittel löslich ist. Man hat nur die Crotonsäure zu pulverisiren, dieselbe mit wenig Schwefelkohlenstoff zu übergiessen (oder in heissem CS_2 zu lösen und die Lösung erkalten zu lassen) und mit CS_2 verdünntem Brom unter Belichtung zufließen zu lassen.

Zusatz von Schwefelsäure, zugefügt; und da die aus einer neuen Probe ausgezogene Säure nur Spuren von Brom anzeigte, wurde die ganze, sehr nach Buttersäure riechende Flüssigkeit nach starkem Ansäuern mehrmals mit Aether ausgezogen, der Auszug mit Natriumsulfat getrocknet, und die nach dem Erhitzen im Wasserbad rückständige Lösung bis zu annähernd constantem Gewicht im Vacuum getrocknet, wobei sie zum Theil erstarrte. Dieselbe wurde nun in zwanzigfacher Menge 99—99,5 procent. Alkohol gelöst, und mit einer 10 procent. absolut alkoholischen Lösung von Natronhydrat derartig neutralisirt, dass sie sowohl rothes Lackmuspapier schwach bläute, als blaues Lackmuspapier schwach röthete. Es fiel sogleich ein starker Niederschlag aus, welcher nach mehrstündigem Stehen auf ein gewogenes Filter gebracht, gut ausgewaschen und bei 100° getrocknet wurde. Das Filtrat wurde zuerst im Wasserbad erhitzt, bis der grösste Theil des Alkohols verjagt war, alsdann im Vacuum bei 100°, bis das Gefäss ein constantes Gewicht besass, und nun wieder die zwanzigfache Menge absoluten Alkohols zugefügt. Nach fünftägigem Stehen wurde die vorher möglichst fein unter Alkohol zerriebene Krystallkruste wieder auf ein gewogenes Filter gebracht und bei 100° getrocknet. Aus dem Gesamtgewicht des erhaltenen Natriumsalzes wurde berechnet, dass 88% der neutralisirten Masse aus fester Crotonsäure bestand. Der Niederschlag enthielt aber jedenfalls etwas buttersaures Natrium, welches sich in etwa 30 Thle. Alkohol auflöst und vielleicht auch Spuren von allocrotonsaurem Salze, denn, in Wasser aufgelöst, wurde nach Ansäuern und Ausziehen mit Aether eine Säure erhalten, welche im Vacuum nicht ganz erstarrte; es blieb eine sehr geringe Quantität Oel, während die Krystalle sich als feste Crotonsäure erwiesen.

Nach Verjagen des Alkohols vom Filtrat wurde aus dem geringen Rückstand die Säure isolirt, und der Versuch gemacht, durch Fractioniren im Vacuum die etwa gebildete flüssige Crotonsäure zu isoliren. Unter 20 Mm. Druck gingen aber zwischen 65°—85° nur 5 Tropfen einer Flüssigkeit über, und, obwohl unter diesen Umständen von einem nur einigermaßen genauen Siedepunkt gar nicht die Rede sein konnte, musste diese Fraction doch alle flüssige Crotonsäure enthalten. Dieselbe roch übrigens stark nach Buttersäure, und ihre geringe

Menge genügte nicht zur Entscheidung, ob etwas Allocrotonsäure darin enthalten war oder nicht.

Beim weiteren Erhitzen des Fractionskolbens ging sehr wenig einer krystallinischen Substanz über, worauf das Thermometer schnell stieg und eine weitere Menge eines festen Körpers überdestillirte. Dieselbe war noch etwas bromhaltig, aber die erhaltene Menge genügte nicht, um eine reine Substanz daraus zu gewinnen. Es scheint demnach, dass neben fester Crotonsäure als Hauptprodukt, und etwas Buttersäure, eine bedeutend höher siedende Säure bei der Reduction von allo- α -Bromcrotonsäure in saurer Lösung gebildet wird. Ich habe den Versuch mit 10 Grm. Bromsäure wiederholt, indem 8 At. Natrium zur Reduction angewandt wurden, wobei jede Spur Brom entfernt war. Auch in diesem Fall wollte es mir nicht gelingen, die Bildung von flüssiger Crotonsäure nachzuweisen, und ich glaube daher, dass bevor man die Angaben von Wislicenus als richtig ansehen darf, derselbe die Methoden genau beschreiben muss, wonach es gelingen soll, die Allocrotonsäure aus dem Reductionsprodukt zu isoliren oder selbst nachzuweisen; jedenfalls kann es sich nur um Spuren handeln.

Bei der Reduction der allo- α -Chlorcrotonsäure übergoss Wislicenus¹⁾ 20 Grm. der Säure mit Wasser und brachte unter Abkühlen portionsweise 400 Grm. (2 At. Natrium auf 1 Mol. Säure) 4 procent. Natriumamalgam hinzu. Beim Destilliren der erhaltenen flüssigen Säure ging sehr wenig zwischen 162°—170°, weitaus die Hauptmasse zwischen 170°—175° und eine geringe Menge von 175°—183° über, deren letzter Theil erstarrte. Durch dreimaliges Rectificiren soll es ihm gelingen sein, die flüssige Crotonsäure so rein zu erhalten, dass sie „von 172° bis 173° bis auf eine geringe Spur fester Crotonsäure übergang.“ Sehr befremdend erscheint es, dass Wislicenus die Entstehung von fester Crotonsäure bei dem ersten Rectificiren der Wirkung der Wärme auf die flüssige Säure zuschreibt, während er die spätere Fraction destilliren konnte, unter Bildung von nur einer geringen Spur der festen Säure.

¹⁾ Ann. Chem. 248, 290.

Ich habe nun zuerst genau nach den Angaben von Wislicenus verfahren mit dem Unterschied, dass ich 10 Grm. Chlorsäure anwandte, welche mit 100 Grm. H_2O übergossen wurden. Beim Wägen der reducirten Säure fand ich, dass dieselbe $1\frac{1}{2}$ Grm. mehr wog, als die Theorie erforderte, und in der That enthielt das Produkt noch bedeutende Mengen von Chlor. Die Säure wurde daher mit Wasser übergossen, worin sie sich auflöste, und mit 50 Grm. 4procent. Natriumamalgam behandelt. Auch die zweimal behandelte Säure zeigte Spuren von Chlor, die ich übersehen zu dürfen glaubte, und es wurde aus der Masse durch Scheidung der Natriumsalze die feste Crotonsäure zu trennen gesucht. Es gelang in der That sehr leicht, die Anwesenheit von bedeutenden Mengen fester Crotonsäure nachzuweisen, aber ich theile die weiteren Einzelheiten dieses Versuches nicht mit, da beim Destilliren der aus dem löslichen Salze dargestellten Säure und Prüfung der Fractionen auf Chlor sich durchweg nicht unbedeutende Mengen des Halogens zeigten.

Beim zweiten Versuch habe ich 10 Grm. Säure mit 70 Grm. Wasser übergossen und während zwei Tage allmählich, unter Abkühlung auf $10^0 - 12^0$, 200 Grm. 4procent. Natriumamalgam hinzugefügt. Da bei der Bearbeitung einer Probe ein noch stark chlorhaltiges Produkt erhalten wurde, so habe ich noch 100 Grm. Amalgam zugesetzt, und als noch Spuren von Chlor angezeigt wurden, setzte ich abermals die gleiche Quantität von Amalgam hinzu. Erst dann gelang es, ein ganz chlorfreies Präparat zu erhalten.¹⁾ Bei der Bearbeitung der reducirten Säure nach der Natriumsalzmethode gewann ich 3,4 Grm. schwer lösliches und 2,7 Grm. leicht lösliches Natrium Salz. Aus dem schwer löslichen Salz konnte mit Leichtigkeit die feste Crotonsäure erhalten werden, beigemengt war etwas ölige Säure, die sehr stark nach Buttersäure roch.²⁾ Aus dem leicht löslichen Salz wurde die flüssige,

¹⁾ Es wäre sehr wünschenswerth, wenn Wislicenus die Einzelheiten seiner Versuche noch näher mittheilen wollte, sonst wird man sicherlich nicht dazu gelangen, die Chlorsäure mit 2 Mol. Natrium völlig zu reduciren, was mir überhaupt sehr zweifelhaft erscheint.

²⁾ Ganz reines crotonsäures Natrium wird man wohl erhalten, wenn die Niederschläge mit der 20 fachen Menge Alkohol ausgezogen werden.

stark nach Buttersäure riechende Säure isolirt, und unter 17 Mm. Druck im Vacuum destillirt. Etwas mehr als die Hälfte der Flüssigkeit ging zwischen 60° — 90° über; im Kolben blieb eine Masse, welche beim Stehen zum Theil kry- stallisirte. Die flüssige Fraction zwischen 60° — 90° konnte die Butter- und die Allocrotonsäure enthalten. Von einer Trennung mittelst Destillation musste ich, der geringen Menge wegen, absehen; und ich habe bis jetzt vergeblich nach einer Methode gesucht, um diese Säuren auf nassem Wege zu trennen. Das Calciumsalz der Buttersäure löst sich bekanntlich in der Wärme in etwa 6 Thln. Wasser auf, während das allocroton- saure Calcium in etwa 2 Thln. löslich ist; aber man müsste grössere Quantitäten des Gemisches haben, um eine selbst annähernde Trennung desselben auf diese Weise zu bewirken. Vielleicht liesse sich, nach schärferem Fractioniren, ein unge- fähres Bild von dem relativen Verhältniss der Säuren durch Titriren mit einer Bromlösung von bekanntem Gehalt ge- winnen.

Nach diesen Versuchen glaube ich noch sehr entschieden, entgegen der Ansicht von Wislicenus, dass meine älteren Angaben ganz richtig sind; und dass' jedenfalls viel mehr feste als flüssige Crotonsäure bei der Reduction von allo- α - Chlorcrotonsäure gebildet wird. Ich möchte weiter hervor- heben, dass ich, vor der Hand, die Destillationsversuche und die Analyse von Wislicenus nicht als endgültigen Beweis für die Bildung von flüssiger Crotonsäure bei dieser Reduction ansehen kann.