Spaltes am lebhaftesten glänzt; die Lampe E stellt man dann so, dass der Spalt hinter dem Theile des Raumes ihrer Flamme erscheint, von welchem nach Einbringen der Perle das meiste Licht ausgeht. Ähnlich findet man den Ort der Lampe D, indem man durch das kleine Prisma nach der unteren Hälfte des Spaltes visirt.

Die Schraube c dient dazu, dem Spalt diejenige Breite zu geben, die der Stärke der Lichtquelle und der Reinheit des Spectrums, die man beabsichtigt, angemessen ist.

Fremdes Licht wird vom Fernrohr abgehalten durch ein schwarzes Tuch, das mit einer kreisförmigen Oeffnung über das Rohr C gesteckt und über das Prisma P und die Röhren A und B gehängt ist.

Die Beleuchtung der Skale wird am zweckmässigsten durch eine leuchtende Flamme bewirkt, die vor dieselbe gesetzt und deren Licht nöthigenfalls gedämpft wird durch ein Stückchen Seidenpapier, das unmittelbar vor der Skale angebracht ist. Mit Leichtigkeit kann man dabei durch Verschieben der Flamme diejenige Helligkeit der Skale erhalten, die für die Lichtstärke des zu beobachtenden Spectrums geeignet ist.

In Betreff der Benutzung der Skale vergl. Seite 1 dieses Heftes.

Flüssigkeits-Diffusion, angewandt auf die Analyse. Th. Graham (Compt. rend. 53. 275) hat mitgetheilt, dass das ungleiche Diffusionsvermögen in Wasser gelöster Substanzen, in ähnlicher Art wie die verschiedene Flüchtigkeit der Körper ein Trennungsmittel derselben abgeben könne. Er theilt alle Substanzen in zwei Classen. Die erste — die der Krystalloide — enthält Körper, welche geneigt sind allein oder in Verbindung mit Wasser zu krystallisiren und welche, in Wasser gelöst, auf die Flüchtigkeit desselben einen Einfluss ausüben. Ihre Lösung ist nicht klebrig und hat stets einen Geschmack. Diese Körper haben ein grosses Diffusionsvermögen. Die zweite Classe — die der Colloide — finden ihr Urbild im thierischen Leim. Sie haben ein geringes Diffusionsvermögen, glasigen Bruch und keine oder fast keine Neigung zu krystallisiren; sie zeigen abgerundete Formen und eine gewisse weiche und zähe Beschaffenheit. Sie quellen in Wasser auf, binden in wässriger Lösung das Wasser so wenig, dass sie auf seine Flüchtigkeit nur einen geringen Einfluss ausüben und werden aus ihren Lösungen durch Krystalloide gefällt. Im concentrirten Zustande ist ihre Lösung immer mehr oder weniger zähe und klebrig. Die Colloide sind geschmacklos, wenn sie nicht im Munde eine Zersetzung erleiden, bei welcher ein schmeckbares Krystalloid entsteht. Ihre Wasserverbindungen sind gallertartig und halten das Wasser nur lose gebunden, und ihre Verbindungen mit Krystalloiden

zeigen im Allgemeinen denselben Charakter. Das Aequivalent derselben ist immer sehr hoch. Als Beispiele in diese Classe gehörender Körper können Kieselsäurehydrat, viele noch wenig bekannte lösliche Hydrate höherer Metalloxyde, Stärke, die Gummiarten, Dextrin, Caramel, Gerbsäure, Eiweiss und Extractivstoffe gelten.

Ich verzichte hier darauf, die Bedeutung beider Körperclassen in der Natur mit dem Verfasser eingehender zu betrachten, und beschränke mich auf die Mittheilung, wie dieselben auf Grundlage ihres verschiedenen Diffusionsvermögens von einander getrennt werden können. Man verbindet zu dem Ende einen Diffusionsprocess mit der Wirkung einer aus einer unlöslichen colloidalen Materie, z. B. aus thierischer Haut, Eiweiss, thierischem Schleim, am besten aber aus Pergament-Papier bestehenden Zwischenwand. Als Apparat dient ein flaches rundes Gefäss, von der Gestalt eines Siebes, dessen Reif aus Gutta-Percha und dessen Boden aus Pergamentpapier besteht. Sein Durchmesser kann 8—12 Zoll, seine Tiefe 3 Zoll betragen. Bringt man in dieses Gefäss beispielsweise eine gemischte, Zucker und Gummi enthaltende Lösung, so dass sie den Boden etwa $\frac{1}{2}$ Zoll hoch bedeckt, und lässt es auf einer grösseren, in einer Wanne enthaltenen, Wassermenge schwimmen, so dringt im Zeitraum von 24 Stunden aller Zucker durch die Zwischenwand und zwar so frei von Gummi, dass die Lösung durch basisch essigsames Bleioxyd kaum getrübt wird, und dass nach dem Verdampfen der in der Wanne enthaltenen Flüssigkeit der Zucker krystallisirt erhalten wird.

Der Verfasser erklärt diese Wirkung also: der Zucker — ein Krystalloïd — eignet sich das Wasser, welches die colloïdale Zwischenwand aufgenommen hat, an und erhält so ein Medium für die Diffusion, während das Gummi — ein Colloïd — nicht oder kaum das von der Zwischenwand aufgenommene Wasser abzuschneiden und so auch nicht die Wandung zu durchdringen vermag. Den durch die colloïdale Zwischenwand bewirkten Vorgang der Trennung nennt Graham eine Dialyse.

Die Dialyse ist nicht allein anwendbar zur Reindarstellung von colloïdalen Körpern, z. B. des Kieselsäurehydrates, des löslichen Eisenoxydhydrates, der Arabinsäure etc., eine Sache, welche ich hier nur andeute, sondern sie bietet auch das Mittel zu analytischen Scheidungen, z. B. zur Abscheidung der arsenigen Säure und anderer Metallgifte aus organische Stoffe enthaltenden Flüssigkeiten. Als man z. B. von Fibrin befreites Blut, Milch oder andere mit organischen Stoffen beladene Flüssigkeiten, nachdem man denselben einige Milligramme arsenige Säure zugefügt hatte, in den dialytischen Apparat brachte, fand man bereits nach 24 Stunden den grössten Theil der arsenigen Säure in dem in der Wanne

enthaltenen Wasser. Und diese Flüssigkeit — das Diffusat — erwies sich so frei von organischen Substanzen, dass das Arsen durch Schwefelwasserstoff ohne Weiteres ausgefällt und das Schwefelarsen direct gewogen werden konnte.

Bestimmung der Löslichkeit von Salzen. H. Schiff (Ann. d. Chem. u. Pharm. 118. 365) wandte zur Bestimmung der Löslichkeit von Salzen in wässrigem Weingeist von verschiedener Stärke folgende einfache Methode an. Er brachte 3—10 Grm. der gesättigten Lösungen in einen zu $\frac{2}{3}$ mit geglühtem Quarzsand gefüllten und mit diesem gewogenen Platintiegel, so zwar, dass die Flüssigkeit das Niveau des Sandes nicht überstieg, und dampfte dann bei gelindem freiem Feuer unter Einschaltung eines Drahtnetzes ab. Auf diese Art fand bei nöthiger Vorsicht durchaus kein Spritzen statt.

Zersetzung von Mineralien durch Säuren bei Erhitzung in zugeschmolzenen Glasröhren und dabei dienendes Metallbad. Alexander Mitscherlich (Journ. f. prakt. Chemie 81. 108 u. 83. 455) hat das Verhalten schwer löslicher oder schwer zersetzbarer Thonerde- und Kieselsäure-Verbindungen zu Schwefelsäure und Salzsäure untersucht und dabei gefunden, dass viele, welche beim Erhitzen in offenen Gefässen kaum angegriffen werden, vollständige Zerlegung erfahren, wenn man sie mit Säure von geeigneter Concentration in zugeschmolzenen Glasröhren auf etwa 200° C. erhitzt.

Man verwendet die Substanz in fein geschlammtem Zustand, bringt etwa 1 Grm. mit der erforderlichen Menge Säure (siehe unten) in ein auf einer Seite zugeschmolzenes, auf der anderen bereits etwas ausgezogenes starkes Rohr von schwer schmelzbarem böhmischen Glase, schmelzt es sorgfältig zu und erhitzt es 2 Stunden lang auf etwa 200° C. — Da hierbei leicht ein Zerplatzen der Röhren eintreten und dem Beobachter gefährlich werden kann, so wendet man zweckmässig das folgende, gegen jede Gefahr sicher stellende Metallbad an.

Durch den viereckigen Kasten a von Schmiedeeisen von 320 Mm. Länge, 110 Mm. Breite und 130 Mm. Höhe sind vier Stücke von Flintenläufen b von 20 Mm. Durchmesser der Länge nach gelegt, in den Wandungen desselben dicht eingepasst und mit Messingloth eingelöthet. In dem Kasten befindet sich eine bei 180° C. schmelzende Legirung von gleichen Theilen Zinn und Blei. Der Kasten ist durch den Deckel c verschlossen, in dessen Mitte in einem Loche e ein unten zugeschmolzenes, bis beinahe auf den Boden des Kastens reichendes Glasrohr d mittelst eines Korks befestigt ist. In dieses Glasrohr wird